



اختلال عملکرد تیروئید در خانم های مسن شهر تبریز

میترا نیافر^{*}، امیر بهرامی^۲، اکبر علی عسگرزاده^۳، نسرین غلامی^۴

- ۱-۳- دانشیار گروه بیماریهای داخلی، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- ۲- استاد گروه بیماریهای داخلی، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- ۴- رزیدنت بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۱۰/۲

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۲/۱۳

چکیده

مقدمه: هدف این مطالعه مقطعی، تحقیق در مورد شیوع اختلالات تیروئیدی در زنان بالای ۶۰ سال در تبریز که بزرگترین شهر شمال غرب ایران است می باشد.

روش بررسی: در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مراکز بهداشتی شهر تبریز و بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی، یک نمونه ۱۰۰۰ نفری با سن بین ۸۹-۶۰ سال (متوسط $۴۴/۵ \pm ۵/۴$) انتخاب شد و تست های عملکرد تیروئید (شامل TSH و سطح آزاد T4 و سطح آزاد T3) در این افراد انجام شد. آنتی میکروزومال آنتی بادی فقط در افرادی که سطح TSH بالا داشتند اندازه گیری شد.

نتایج: هفتاد و سه نفر (۷/۳٪) سطح TSH سرمی بالا ($4/5\text{mIU}/\text{l}$) و ۵۴ نفر (۴/۵٪) سطح TSH کمتر از میزان نرمال ($1/3\text{mIU}/\text{l}$) داشتند. شیوع کلی اختلالات تیروئیدی در کل نمونه ۱۲٪ بود. شیوع هیپوتیروئیدیسم آشکار و تحت بالینی به ترتیب ۱/۵٪ و ۵/۸٪ و شیوع هایپر تیروئیدیسم آشکار و تحت بالینی به ترتیب ۱/۲٪ و ۱/۴٪ بود. در افراد با سطح TSH بالا، تیترهای بالای آنتی میکروزومال آنتی بادی در ۶۰/۶٪ از بیماران به دست آمد.

نتیجه گیری: شیوع عملکرد بیوشیمیایی غیرطبیعی تیروئید گزارش شده در این مطالعه قابل توجه بوده و نتایج مطالعات قبلی در جمعیت های دیگر را تایید می نماید. ما در این مطالعه شیوع بالایی از اختلالات تیروئید را در جمعیت زنان مسن آذربایجان شرقی به دست آوردهیم. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند اطلاعات پایه ای جهت تعیین برنامه بهداشت عمومی و ایجاد تغییرات را فراهم نماید.

واژه های کلیدی: آنتی میکروزومال آنتی بادی - هایپوتیروئیدی - هایپر تیروئیدی - زنان مسن

* (نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۴۱۱-۳۸۱۰۱۰۵، پست الکترونیکی: dr_niafar@yahoo.com)

مقدمه

اختلالات تیروئیدی تحت بالینی در جمعیت سالخورده به صورت قابل توجه متفاوت بوده و بر اساس گروههای نژادی، میزان دریافت ید در رژیم غذایی و شیوع آنتی‌بادی‌های ضدتیروئیدی متغیر می‌باشد(۳۰-۲۷). شیوع هایپوتیروئیدیسم تحت بالینی در جمعیت سالخورده اروپا و آمریکا از ۱/۴٪ در جمعیت روسیه سوئدی(۳۱) تا ۷/۸٪ در مطالعه قلب فرامنیگه‌ام(۲۵) یعنی ۵ برابر تفاوت می‌کند. به نظر می‌رسد هایپوتیروئیدیسم تحت بالینی در زنان در مقایسه با مردان بالاتر باشد[۱۸-۷٪ در برابر ۱۵-۲٪]. مطالعه‌ای که در انگلیس در بالغین در همه رده‌های سنی انجام گرفت نشان داد که هایپوتیروئیدی تحت بالینی در زنان با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد(رسیدن به ۱۸٪ در سن بالای ۷۴ سالگی) در حالی که در مردان در حد نسبتاً ثابتی(۵-۲٪) باقی می‌ماند(۳۳).

به خاطر شیوع بالای اختلال عملکرد تیروئیدی در بیماران بالای ۶۰ سال، انجمن اندوکرینولوژیست‌های بالینی آمریکا غربالگری اختلال عملکرد تیروئیدی در زنان بالای ۶۰ سال را توصیه کرده‌اند(۳۴) ولی در مورد درمان هایپوتیروئیدی و هیپرتیروئیدی تحت بالینی اتفاق نظر وجود ندارد. کشور ایران در حال حاضر جزو مناطق با کمبود ید محسوب نمی‌شود ولی اختلال عملکرد تیروئیدی یکی از اهداف اصلی سلامت در ایران است(۳۵). در سال‌های اخیر شیوع اختلال تیروئیدی در زنان مسن در ایران بررسی نشده است. هدف این مطالعه بررسی شیوع اختلال تیروئیدی در زنان بالای ۶۰ سال می‌باشد.

روش بررسی

این مطالعه مقطعی از شهریور ماه ۱۳۸۵ لغایت اردیبهشت ۱۳۸۶ در مرکز استان آذربایجان شرقی(تبریز) انجام شد. نمونه‌ای مشتمل بر ۱۱۵۰ نفر با نمونه گیری تصادفی با استفاده از اطلاعات ثبت شده در مراکز بهداشتی انتخاب شد. پس از کنار گذاشتن افرادی که تمایل به شرکت در مطالعه نداشته‌اند، در نهایت ۱۰۰۰ نفر(۶/۸٪) به صورت تصادفی انتخاب وارد مطالعه شدند. معیار ورود به مطالعه تمام خانم‌های ۶۰ سال و بالاتر ساکن شهر تبریز بود و معیار خروج از مطالعه ابتلاء به بیماری‌های پیشرفت‌های کبدی و کلیوی، بدخیمی‌ها و سابقه

پیشرفت روش‌های آزمایشگاهی برای ارزیابی عملکرد تیروئید و استفاده روزافزون و گسترده از این تست‌ها منجر به افزایش قابل توجه در تشخیص اختلالات خفیف تیروئید شده است. مطالعات قبلی در بررسی شیوع بیماری‌های تیروئید در ایران و سایر کشورها، بیمارانی از همه سنین را شامل می‌شده و نتایج متضادی داشتند(۸-۱). اغلب این مطالعات فقط شمارکوچکی از بیماران سالخورده را تحت ارزیابی قرارداده بودند به علاوه پیشرفت‌های اخیر در تست‌های عملکرد تیروئیدی به این معناست که اختلالات تشخیص داده نشده قبلی ممکن است اکنون آشکارشوند.

نتایج بالقوه هایپوتیروئیدیسم تحت بالینی(میزان TSH بالاتر از سطح نرمال همراه با FT3، FT4 نرمال) کمتر بررسی شده ولی اخیراً پیشنهاد شده است که سطح افزایش یافته TSH در سالخورددگان می‌تواند تاثیر بسزایی در میزان مرگ و میر داشته باشد(۹)، در بیشتر این مقالات به عوارضی از جمله آترواسکلروزیس و مرگ و میر قلبی عروقی(۱۰)، افزایش در کلسترول توتال و LDL کلسترول(۱۱)، علایم عصبی-روانی(۱۲) و در نهایت پیشرفت به سمت هایپوتیروئیدی علامت دار اشاره شده است(۱۳). به نظر می‌رسد پس از تشخیص هایپوتیروئیدی تحت بالینی هر سال در حدود ۴٪ از این افراد به سمت هایپوتیروئیدی آشکار پیشرفت می‌کنند(۱۴،۱۳).

هایپرتیروئیدی تحت بالینی(میزان TSH کمتر از سطح نرمال همراه با FT3، FT4 نرمال) ممکن است با پیامدهای قلبی مضر(۱۵،۱۶) از جمله فیبریلاسیون دهلیزی(۱۷)، اختلال عملکرد قلبی، افزایش میزان مرگ و میر(۱۸)، علایم عصبی روانی(۱۹،۲۰) و کاهش دانسیته استخوانی و افزایش شکستگی استخوانی همراه باشد(۲۱،۲۲).

مطالعاتی که از پیشرفت هایپرتیروئیدی تحت بالینی به سمت هایپرتیروئیدی آشکار بالینی حمایت کند، نتایج متناقضی داشته‌اند به علاوه در مطالعات انجام شده حجم نمونه ناکافی بوده و جمعیت مطالعه شده عدم تجانس قابل اهمیتی داشته‌اند(۲۶،۲۳-۱۴). شیوع اختلال عملکرد تیروئید در جمعیت سالخورده مخصوصاً در زنان مسن بریتانیا بالا گزارش شده است. برآورد تقریبی شیوع

TSH و FT4 و FT3 بود.

سطح نرمال آزمایشگاهی برای TSH، $4/5 \text{ mU/L}$ تا $۰/۳$ ، برای FT4، $۴/۲ \text{ pg/ml}$ تا $۲/۲$ و برای آنتی میکروزومال آنتی بادی کمتر از ۷۵ mIU/l بود.

تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS^{۱۴} و آزمون های آماری کای اسکوئر، تست Exact Fisher و ضریب پیرسون انجام شد. P کمتر از $۰/۰۵$ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد و تطبیق با توزیع نرمال به روش Kolmogorov-Smirnov تحت بررسی قرار گرفت.

نتایج

افراد شرکت کننده در مطالعه خانمهای $۶۰-۸۹$ ساله بودند که میانگین سنی آنها ($۶۴/۵ \pm ۵/۴$) سال بود.

سطح کلی سرمی TSH، $۲/۳۱ \pm ۴/۴۴ \text{ mU/l}$ بود. ۸۷۳ نفر از نظر عملکرد تیروئیدی در محدود طبیعی قرار داشتند. در ۱۲۷ نفر سطح سرمی TSH غیر طبیعی گزارش شد. ۷۳ نفر از این بیماران سطح TSH بالا و ۵۴ نفر سطح TSH پائین داشتند و ارتباطی بین سطح TSH و سن بیماران مشاهده نشد(جدول ۱).

صرف داروهای موثر در تست های تیروئیدی نظیر آمیودارون، گلوکورتیکوئید، کربنات لیتیوم و فنی توئین بود. این تحقیق به وسیله کمیته تحقیق دانشگاه علوم پزشکی تبریز تائید شد. اطلاعات دموگرافیک و پزشکی بیماران در مورد سابقه بیماری تیروئیدی و داروهای مصرفی توسط پرسشنامه ثبت شدند. بعد از اخذ رضایت نامه نمونه خون وریدی افراد در وضعیت ناشتا اخذ گردید. سرم نمونه خون اخذ شده ۱۰ دقیقه بعد از ایجاد لخته و بعد از ۱۰ دقیقه سانتریفیوز با دور ۳۰۰۰ در دقیقه در دمای اتاق جدا شده و نمونه های سرمی قبل از آنالیز در دمای -۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری می شدند. تست های عملکرد تیروئیدی شامل سطح TSH در تمام افراد مورد مطالعه انجام و سطح آزاد T4 و T3 و سطح آنتی بادی آنتی میکروزومال در افرادی که سطح غیرطبیعی TSH داشتند بررسی شد. بیماران با تشخیص تیروتوکسیکوزیا هایپوتیروئیدیسم متعاقباً به شکل مناسب تحت درمان قرار گرفتند.

سطح سرمی TSH و FT4 و آنتی میکروزومال آنتی بادی به روش کمی لومینسنت (Chemiluminescent) تحت ارزیابی قرار گرفتند. ضریب درصد تغییرات به ترتیب $۶/۲$ ، $۷/۹$ و $۸/۳$ درصد برای

جدول (۲): شیوع TSH بالا در مطالعات اپیدمیولوژی (۲۴)

نام محقق	سن افراد مورد مطالعه	جنس	تعداد	درصد هایپوتیروئیدی	میزان نرمال TSH
Nystrom 38	+۶۰	% ۱۰۰ مونث	۲۲۲	۸/۶	>۸
Falkenberg 31	+۶۰	% ۱۰۰ مونث	۱۴۴۲	۲/۲۷	>۷
Sawin 25	+۶۰	% ۴۱ مذکر / % ۵۹ مونث	۲۱۳۹	۱۳/۶	>۵
Parie 24	+۶۰	% ۴۱ مذکر / % ۵۹ مونث	۱۲۱۰	۱۱/۶	>۵
Chuang 35	+۶۵	% ۵۷ مذکر / % ۴۳ مونث	۹۱۷	۳	>۴/۶۵
Wilson 39	+۶۵	% ۴۹ مذکر / % ۵۱ مونث	۵۹۶۰	۴	>۵/۵
مطالعه اخیر	+۶۰	% ۱۰۰ مونث	۱۰۰۰	۷/۳	>۴/۵

(df=۸ و p=۰/۰۵)

پائین(متوسط TSH سرمی 0.06 ± 0.04) سطح FT4 پائین داشتند. ۱ نفر سطح FT3 بالای سرمی با TSH پائین و FT4 طبیعی داشت و ۴۱ نفر با TSH طبیعی سطح FT3 و FT4 طبیعی داشتند. شیوع هایپوتیروئیدیسم آشکار بالینی و هایپوتیروئیدی تحت بالینی و T3 توکسیکوزیس به ترتیب $1/2$ ٪، $4/1$ ٪، $1/12$ ٪ بود.

تیتر آنتیبادی آنتی میکروزومال در افراد با TSH بالا $60/8$ ٪ بود که $88/8$ ٪ از این افراد سطح TSH بالای 10 و $51/5$ ٪ از آنها سطح TSH بالای $4/5$ و کمتر یا مساوی 10 داشتند. بررسی این نتیجه با تست فیشر معنادار بود($P=0.004$) و $df=1$ و $X^2=8/29$.

۷۳ نفر از افراد با میانگین سنی $65/8 \pm 6/9$ سطح TSH سرمی بالا داشتند سطح سرمی TSH در این گروه از $4/6$ $\mu\text{U/l}$ تا $10/4$ (متوسط $10/16 \pm 13/81$: TSH سرمی TSH قویاً با سطح FT4 در این گروه همخوانی داشت (متوسط $1/5$). از این ۷۳ نفر ۱۵ نفر سطح سرمی FT4 پائین و 58 نفر سطح FT4 در محدوده نرمال داشتند. شیوع هایپوتیروئیدی بالینی آشکار $1/5$ ٪(متوسط سطح سرمی TSH: $25/1 \pm 2/25$) و شیوع هایپوتیروئیدی تحت بالینی $5/8$ ٪ بود.

۵۴ نفر(متوسط سن $64/5 \pm 5/1$ سال) سطح سرمی TSH پائین داشتند(MU/L) $29/0$ تا $2/0$ و متوجه TSH سرمی TSH $45/0 \pm 4/067$ بود. از این ۵۴ نفر ۱۲ نفر با سطح

جدول (۱): میزان(TSH) در گروه مورد مطالعه بر اساس گروههای سنی

سن	تعداد		
TSH	$<0/3$	$>4/5$	$0/3-4/5$
$60-64$	۳۲	۴۱	۵۵۴
	$5/1$	$6/5$	$88/4$
$65-69$	۱۲	۱۳	۱۵۴
	$6/7$	$7/3$	$86/8$
$70-74$	۶	۹	۱۱۰
	$4/8$	$7/2$	$88/7$
	۳	۷	۳۷
	$6/4$	$14/9$	$78/7$
	۱	۳	۱۸
>80	$5/5$	$7/3$	$87/3$

($df=8$ و $P=0.05$ و $X^2=6/87$)

بحث

همکارانش(در سال ۱۹۸۳)(۳۱) و Chuang و همکاران(در سال ۱۹۹۸)(۳۵) شیوع هایپوتیروئیدی نسبت به سایر مطالعات پائین بوده است(به ترتیب ۲ و ۳ درصد)، که شاید این تفاوت ناشی از مشکلات در تعریف شاخصهای انتخاب نمونه های مورد بررسی و روش های مختلف اندازه گیری عملکرد تیروئید باشد.

مطالعه حاضر شیوع بالا و قابل توجه اختلالات تیروئیدی در زنان سالخورده را تایید می نماید. نتایج مطالعات مشابه در جدول ۲ آمده است. نکته قابل توجه آن است که در بیشتر این مطالعات شیوع هایپوتیروئیدی مشابه مطالعه ما بوده است. فقط دردو مطالعه Falkenberg و

اختلالات اتوایمیون علت اصلی کم کاری تیروئید در زنان مسن ایرانی است که در تائید مطالعات قبلی می باشد(۳۵، ۳۰، ۸).

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اختلال عملکرد تیروئید در زنان مسن شایع است و اغلب تشخیص داده TSH نمی شود و می توان با تشخیص زود هنگام(اندازه گیری TSH سرم) از عوارض آن جلوگیری کرد.

همچنین تیتر بالای بدست آمده آنتی میکروزوومال آنتی بادی در ۶۰٪ افراد با TSH بالا می تواند موید این نکته باشد که هنوز علت اصلی هایپوتیروئیدی در افراد سالخورده بیماری های خود اینمی تیروئید است.

سپاسگزاری

نویسندها از خدمات دکتر رامین حشمت (اپیدمیولوژیست)، دکتر مرتضی قوجازاده(متخصص آمار)، دکتر شعله امامی (مسئول آزمایشگاه هورمونی) و همچنین از نظرات و راهنمایی های ارزنده دکتر علیرضا استقامتی(دانشیار گروه بیماریهای داخلی دانشگاه تهران) که بازبینی این مقاله را قبل از ارسال بر عهده گرفتند کمال تشکر را دارند. تهیه کنندگان این مقاله از معاونت بهداشتی استان آذربایجان شرقی که در انجام این تحقیق همکاری داشته اند صمیمانه قدردانی می نمایند.

این مطالعه با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز انجام گرفته است.

در تعداد کمی از مطالعات شیوع هایپرتیروئیدی مورد بررسی قرار گرفته است ولی در دو مطالعه Parle و همکاران(۲۴) و Chuang و همکاران(۳۵) که از روش های با حساسیت بالا برای اندازه گیری TSH استفاده شده شیوع این اختلال مشابه با مطالعه ما بوده است(به ترتیب ۶/۳ و ۴/۳ درصد).

در مطالعه اخیر در افرادی که سطح TSH بالا داشتند سطح T4 آزاد به طور معکوس با آن پائین بود که در تائید مطالعات قبلی می باشد(۲۴، ۳۵، ۳۶). این امر بیانگر آن است که سطح TSH مستقیماً معکس کننده وضعیت تولید هورمونهای تیروئیدی می باشد.

مطالعات قبلی نشانگر آن است که افرادی که TSH بالاتر از ۱۰ داشته اند به طرف هایپوتیروئیدی واضح پیشرفت می کنند(۲۴، ۳۶، ۳۷) بنابراین پیگیری افراد با سطح سرمی TSH بالا، از نظر پیشرفت به طرف هایپوتیروئیدی واضح با اهمیت است.

بر عکس، به نظر می رسد ریسک پیشرفت به طرف تیرو توکسیکوز واضح در بیمارانی که TSH پائین تر از نرمال دارند جزیی باشد(۲۴).

در مطالعه اخیر تغییر در سطح TSH با سن مشاهده نشد که مشابه با مطالعات قبلی بوده است(۸).

وجود سطح بالای آنتی بادیهای تیروئید(۳/۷۳ درصد) در بیماران با هایپوتیروئیدی واضح در مطالعه اخیر، بیانگر آن است که

منابع:

- 1- Heydarian P, Azizi F. *Thyroid dysfunction and autoantibodies 10 years after implementation of universal salt iodiation: Tehran thyroid study*. Iran J Endocrinol Metab 2002; 4(4):229-41.[Persian]
- 2- Eggertsen R, Petersen K, Lundberg PA, Nystrom E, Lindstedt G. *Screening for thyroid disease in a primary care unit with a thyroid stimulating hormone assay with a low detection limit*. BMJ 1988; 297 (17):1586-92.
- 3- dos Remedios LV, Weber PM, Feldman R, Schurr DA, Tsui TG. *Detecting unsuspected thyroid dysfunction by the free thyroxine index*. Arch Intern Med 1980; 140 (8):1045-9.

- 4- Konno N, Yuri K, Taguchi H, Iizuka N, Kawasaki K. *Screening for thyroid diseases in an iodine sufficient area with sensitive thyrotrophin assays, and serum thyroid autoantibody and urinary iodide determinations.* Clin Endocrinol 1993; 38 (3):273-81.
- 5- Okamura K, Ueda K, Sone H, Ikenoue H, Hasuo Y, Sato K. *A sensitive thyroid stimulating hormone assay for screening of thyroid functional disorder in elderly Japanese.* J Am Geriatr Soc 1989; 37 (4):317-22.
- 6- Kagedal B, Manson JC, Norr A, Sorbo B, Tegler L. *Screening for thyroid disorders in middle-aged women by computer-assisted evaluation of a thyroid hormone panel.* Scand J Clin Lab Invest 1981; 41 (4):403-8.
- 7- Gordin A, Heinonen OP, Saarinen P, Lamberg BA. *Serum thyrotrophin in symptomless autoimmune thyroiditis.* Lancet 1972; 299(7750):551-4.
- 8- Tunbridge WM, Evered DC, Hall R, Appleton D, Brewis M, Clark F, et al. *The spectrum of thyroid disease in a community: the Wickham survey.* Clin Endocrinol (Oxf) 1977; 7 (6): 481-93.
- 9- Gussekloo J, van Exel E, de Craen AJ, Meinders AE, Frölich M, Westerdorp RG. *Thyroid status, disability and cognitive function, and survival in old age.* JAMA 2004; 292 (21):2591-9.
- 10- Hak AE, Pols HAP, Visser TJ, Drexhage HA, Hofman A, Witteman JCM. *Subclinical hypothyroidism is an independent risk factor for atherosclerosis and myocardial infarction in elderly women: the Rotterdam study.* Ann Intern Med 2000; 132 (4):270-8.
- 11- Danese MD, Ladenson PW, Meinert CL, Powe NR . *Clinical review 115: effect of thyroxine therapy on serum lipoproteins in patients with mild thyroid failure: a quantitative review of the literature.* J Clin Endocrinol Metab 2000; 85 (9):2993-3001.
- 12- Haggerty JJ Jr, Stern RA, Mason GA, Beckwith J, Morey CE, Prange AJ Jr . *Subclinical hypothyroidism: a modifiable risk factor for depression?* Am J Psychiatry 1993; 150 (3):508-10.
- 13- Vanderpump MP, Tunbridge WM, French JM, Appleton D, Bates D, Clark F, et al. *The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham survey.* Clin Endocrinol (Oxf) 1995; 43 (1):55-68.
- 14- Pirich C, Mullner M, Sinzinger H. *Prevalence and relevance of thyroid dysfunction in 1922 cholesterol screening participants.* J Clin Epidemiol 2000; 53 (6): 623-9.
- 15- Rodondi N, Newman AB, Vittinghoff E, de Rekeneire N, Satterfield S, Harris TB, et al. *Subclinical hypothyroidism and the risk of heart failure, other cardiovascular events, and death.* Arch Intern Med 2005; 165(21):2460-6.
- 16- Walsh JP, Bremner AP, Bulsara MK, O'Leary P, Leedman PJ, Feddema P, et al. *Subclinical thyroid dysfunction as a risk factor for cardiovascular disease.* Arch Intern Med 2005; 165 (21):2467-72.
- 17- Cappola AR, Fried LP, Arnold AM, Danese MD, Kuller LH, Burke GL, et al. *Thyroid status, cardiovascular risk, and mortality in older adults.* JAMA 2006; 295 (9):1033-41.

- 18- Parle JV, Maisonneuve P, Sheppard MC, Boyle P, Franklyn JA. *Prediction of all-cause and cardiovascular mortality in elderly people from one low serum thyrotropin result: a 10-year cohort study.* Lancet 2001; 358 (9285):861–5.
- 19- Bommer M, Eversmann T, Pickardt R, Leonhardt A, Naber D. *Psychopathological and neuropsychological symptoms in patients with subclinical and remitted hyperthyroidism.* Klin Wochenschr 1990; 68 (11):552–8.
- 20- Morrrale de Escobar, Obrego'n MJ, Escobar del Rey F. *Is neuropsychological development related to maternal hypothyroidism or to maternal hypothyroxinemia?* J Clin Endocrinol Metab 2000; 85 (11):3975–87.
- 21- Faber J, Galloe AM. *Changes in bone mass during prolonged subclinical hyperthyroidism due to l-thyroxine treatment: a meta-analysis.* Eur J Endocrinol 1994; 130 (4):350–56.
- 22- Bauer DC, Browner WS, Cauley JA, Orwoll ES, Scott JC, Black DM, et al. *Factors associated with appendicular bone mass in older women. The Study of Osteoporotic Fractures Research Group.* Ann Intern Med 1993; 118 (9):657– 65.
- 23- Tenerz A, Forberg R, Jansson R. *Is a more active attitude warranted in patients with subclinical thyrotoxicosis?* J Intern Med 1990; 228 (3):229–33.
- 24- Parle JV, Franklyn JA, Cross KW, Jones SC, Sheppard MC. *Prevalence and follow-up of abnormal thyrotropin (TSH) concentrations in the elderly in the United Kingdom.* Clin Endocrinol (Oxf) 1991; 34 (1):77– 83.
- 25- Sawin CT, Castelli WP, Hershman JM, McNamara P, Bacharach P. *The aging thyroid: thyroid deficiency in the Framingham study.* Arch Intern Med. 1985; 145:1386-8.
- 26- Stott DJ, McLellan AR, Finlayson J, Chu P, Alexander WD. *Elderly patients with suppressed serum TSH but normal free thyroid hormone levels usually have mild thyroid overactivity and are at increased risk of developing overt hyperthyroidism.* Q J Med 1991;78 (1):77–84.
- 27- Samuels MH. *Subclinical thyroid disease in the elderly.* Thyroid 1998; 8: 803–13.
- 28- Surks MI, Ocampo E. *Subclinical thyroid disease.* Am J Med 1996; 100 (2): 217–23.
- 29- Ayala AR, Wartofsky L. *Minimally symptomatic (subclinical) hypothyroidism.* Endocrinologist 1997; 7 (1):44–50.
- 30- Hollowell JG, Staehling NW, Flanders WD, Hannon WH, Gunter EW, Spencer CA, et al. *Serum TSH, T₄, and thyroid antibodies in the United States population (1988 to 1994):National Health and Nutrition Examination Survey (NHANESIII).* J Clin Endocrinol Metab 2002; 87 (2):489–99
- 31- Falkenberg M, Kagedal B, Norr A. *Screening of an elderly female population for hypo- and hyper-thyroidism by use of a thyroid hormone panel.* Acta Med Scand1983; 214 (5):361–65
- 32- Canaris GJ, Manowitz NR, Mayor G, Ridgway EC. *The Colorado thyroid disease prevalence study.* Arch Intern Med 2000; 160 (4):526–34.
- 33- Tunbridge WMG, Evered DC, Hall R, et al. *The spectrum of thyroid disease in a community: the Whickham Survey.* Clin Endocrinol 1977; 7:481-93.

- 34- Azizi F, Sheikholeslam R. *Final report of monitoring and evaluation of IDD control in the I.R. Iran.*;1996. Ministry of Health and Medical Education. Tehran, Iran.[Persian]
- 35- Chuang CC, Wang ST, Wang PW, Yub ML. *Prevalence Study of Thyroid Dysfunction in the elderly of Taiwan.* Gerontology 1998; 44 (3):162-7.
- 36- Mokshagundam SP, Barzel US. *Thyroid disease in the elderly.* Am Soc1993; 41(8):1361-9.
- 37- Gordin A, Lamberg BA. *Spontaneous hypothyroidism in symptomless autoimmune thyroiditis: a long-term follow-up study.*Clin Endocrinol 1981; 15 (6):537-43.
- 38- Nystrom E, Bengtsson C, Lindquist O, Noppa H, Lindstedt G, Lundberg PA. *Thyroid disease and high concentration of serumthyrotrophin in a population sample of women.* Acta Medica Scandinavica 1981; 210 (1-2), 39 -46.
- 39- Wilson S, Parle JV, Roberts LM, Roalfe AK, Hobbs FD, Clark P, et al. *Prevalence of Subclinical Thyroid Dysfunction and Its Relation to Socioeconomic Deprivation in the Elderly:A Community-Based Cross-Sectional Survey.* J Clin Endocrinol Metab 2006; 91(12):4809-16.

Thyroid Dysfunction in the Elderly Women of Tabriz

Niafar M(MD)^{1*}, Bahrami A(MD)², Aliasgarzadeh A(MD)³, Gholami N(MD)⁴

¹⁻⁴Department of Endocrinology and Metabolism, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

Received: 3 May 2010

Accepted: 23 Dec 2010

Abstract

Introduction: The present study aimed to investigate the prevalence of thyroid dysfunction in the elderly women of Tabriz city; the largest city in North West Iran.

Methods: By using the records of the local household registry, a sample of 1000 subjects aged between 60 and 89 years(mean 64.54 ± 5.41) was drawn by simple random sampling. Thyroid function tests including TSH concentration were done in all subjects and free T4 concentration, free T3 concentration and anti-microsomal antibodies were measured in those with abnormal TSH levels.

Results: Seventy-three(7.3%) participants had high(>4.5mU/liter), and 54(5.4%) had low (<0.3 mU/liter) TSH levels. The overall prevalence of thyroid dysfunction in the population under study was 12.7%. The prevalence of overt and subclinical hypothyroidism in study subjects were 1.5% and 4.1%, respectively. Overt and subclinical hyperthyroidism was seen in 4.1% and 1.2%, respectively. High titers of anti-microsomal antibodies were found in 60.6% of those with high TSH levels.

Conclusion: The prevalence of abnormal biochemical thyroid function reported in the study is substantial and confirms previous reports in other populations. The prevalence of thyroid dysfunction is high in the elderly female population of Tabriz. The results provide useful baseline information for designing public health plans and tracking changes.

Keywords: Hypothyroidism; Women's Health; Women; Thyroid FunctionTest; Thyrotropin

This paper should be cited as:

Niafar M, Bahrami A, Aliasgarzadeh A, Gholami N. ***Thyroid dysfunction in the elderly women of Tabriz.*** J Shahid Sadoughi Univ Med Sci; 19(2): 148- 56.

*Corresponding author: Tel:+98 411 3810105 , Email: dr_niafar@yahoo.com