



تعیین فراوانی آللی و ژنوتیپی پلیمورفیسم CYP ۲E۱*۵B در جمعیت عمومی جنوب غرب ایران

فاطمه زنگنه^۱، امیر جلالی^{۱*}، حمید گله‌داری^۲، غزاله محمدزاده شهریاری^۲،

محمدطه جلالی^۳، جواد محمدی‌اصل^۴

^۱ گروه فارماکولوژی و سمشناسی، مرکز تحقیقات سمشناسی، دانشگاه جندی شاپور اهواز

^۲ گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

^۳ گروه بیوشیمی، دانشکده پرایزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز

^۴ گروه ژنتیک، مرکز تحقیقات سمشناسی، دانشگاه جندی شاپور اهواز

(دریافت مقاله: ۹۱/۷/۱۷ - پذیرش مقاله: ۹۱/۳/۲)

چکیده

زمینه: سیتوکروم CYP2E1(P4502E1) آنزیمی اصلی است که نقش عملهای در فعال‌سازی و سمیت‌زدایی بسیاری از ژنوبیوتیک‌ها، سلطان‌زاها (کارسینوژن‌ها) و داروها اینا می‌کند. بررسی انواع پلیمورفیسم در CYP2E1 به عنوان یک ضرورت اولیه خطر ابتلا به انواع سرطان در صورت تماس با ترکیبات کارسینوژن، یافته‌های متفاوتی داشته است. هدف از این بررسی تعیین فراوانی آللی و ژنوتیپی پلیمورفیسم CYP2E1*5B در جمعیت ایرانی و مقایسه با سایر جمعیت‌های دنیا بود.

مواد و روش‌ها: بررسی کنونی در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز انجام شد. در این پژوهش پلیمورفیسم CYP2E1*5B (rs3813867-G-۱۲۹۳C) در ۲۰۰ نفر (۱۰۰ زن و ۱۰۰ مرد) از افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهر اهواز با روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون آماری مجدول کای و معادله هاردی-وابنرگ تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: فراوانی ژنوتیپ‌های (c1/c1, c1A/c1A, c1/c2, *1A/*1A, *1A/*5B(c1/c2), *5B/*5B(c1/c2) به ترتیب ۳/۹۷ و ۰ درصد به دست آمد. فراوانی آلل (c1)* و (c2)* نیز ۹۸/۵ و ۱/۵ درصد محاسبه شد. در نتایج حاصل از بررسی این پلیمورفیسم تفاوت معنی‌داری بین دو جنس مشاهده نشد (در این مطالعه، مقدار P کمتر از ۰/۰۵ معنی‌دار در نظر گرفته شد).

نتیجه‌گیری: توزیع ژنوتیپی B CYP2E1*5 با ترکیه و تعدادی از جمعیت‌های اروپایی شباهت داشت در حالی که اختلاف معنی‌دار با جمعیت‌های آسیای شرقی، آمریکایی و تعدادی از جمعیت‌های اروپایی مشاهده شد. جنسیت در توزیع آلل این پلیمورفیسم نقشی ندارد.

وازگان کلیدی: پلیمورفیسم، CYP2E1*5B، ژنوتیپ، فراوانی‌های آلل، ایران

* اهواز، جاده گلستان، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

مقدمه

آمینواسیدی می‌باشد. بیشترین توزیع بافتی آن در کبد و بهمیزان کمتر در بافت‌های شش، کلیه، موکوس بینی، مغز، مغز استخوان و قلب بیان می‌شود. این ژن دارای ۱۳ آلل بوده که از این میان بیشترین بررسی‌ها بر روی C-1۰۵T/G-۱۲۹۳C SNP) CYP2E1*5B (rs3813867 Rsal/PstI RFLP شده است (۱ و ۱۰). مطالعه و تعیین پلیمورفیسم اخیر به عنوان عامل فعال‌کننده و یا محافظت‌کننده در برابر تماس با ترکیبات زنوبیوتیک، دارویی و کارسینوژن ثابت شده اهمیت بیشتری دارد. این پلیمورفیسم در افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های حاصل از تماس با مواد شیمیایی و ایجاد انواع سرطان شامل سرطان دستگاه گوارش، سر و گردن، ریه، کلورکتال، دهان، مری و پستان نقش دارد (۸، ۱۱-۱۵).

بررسی‌های مختلف نشان دهنده اهمیت بررسی انواع ژنوتیپ SNP^۲ سیتوکروم CYP2E1*5B در ارزیابی سمیت دارویی و تماس شغلی محیطی با انواع ترکیبات کارسینوژن می‌باشد (۸). هدف این مطالعه تعیین فراوانی الی و ژنوتیپی پلیمورفیسم CYP2E1*5B در جمعیت ایرانی جهت مقایسه با جمعیت‌های دیگر مطالعه شده می‌باشد. از آنجائی که اطلاعات چندانی در ارتباط با میزان خطر در مواجهه با مواد شیمیائی سرطان‌زا در کشور ما در دسترس نیست، یافته‌های این بررسی از این جهت نیز دارای اهمیت می‌باشد.

مواد و روش‌ها

این پژوهش که یک بررسی اپیدمیولوژیک تحلیلی می‌باشد، در فاصله زمانی فروردین تا بهمن ماه سال

آنژیم‌های سیتوکروم ۴۵۰، آنزیم‌های مونو اکسیژناز اصلی مسئول متابولیسم اغلب مواد آندوژن، داروها و سایر مواد شیمیائی در فاز اول هستند. آین آنزیم‌ها در متابولیسم ترکیبات خارجی شامل داروها، افزودنی‌های غذایی، حلال‌های صنعتی و آلاینده‌های محیطی نقش دارند (۱-۳).

در برخی شرایط، این آنزیم‌ها مسئول فعال‌سازی متابولیک ترکیبات پیش سرطان‌زا (پروکارسینوژن) به ترکیبات سرطان‌زا (کارسینوژن) می‌باشند. بر همین اساس وجود پلیمورفیسم‌های ژنتیکی این آنزیم می‌تواند منجر به تغییر فعالیت آن در برابر ترکیبات سرطان‌زای شیمیائی و یا طبیعی شود. برای روشن شدن اهمیت تعیین پلیمورفیسم (فارماکوژنتیک)، بررسی‌های گوناگونی در مورد فارماکوژنتیک آنزیم‌های فاز اول متابولیسم کننده مواد سمی و داروئی انجام شده است. CYP2E1 نقش عمده در متابولیسم، فعال‌سازی (سمیت‌زائی) و سمزدایی برخی از ترکیبات با وزن مولکولی کم مانند اتانول (۴-۶)، استن، داروهایی مانند استامینوفن، ایزونیازید، بیهوش‌کننده‌های فلورینه و شماری از ترکیبات پروکارسینوژن مانند بنزن، NMDA^۱، استیرن، اورتان و اکریلونیتریل دارد و بهمین علت در سمتناسی مورد توجه خاص قرار گرفته است. این سیتوکروم می‌تواند توسط اتانول، بنزن، پیریدین، ایزونیازید و نیز در برخی شرایط پاتوفیزیولوژیک همچون دیابت، چاقی و گرسنگی القا شود (۱، ۲ و ۷-۹).

ژن CYP2E1 انسانی در ناحیه ۱۰q24/۳-qter کروموزوم شماره ۱۰، شامل؛ ۱۱۴۱۳ جفت باز همراه با ۹ اگزون و ۸ ایترون، کد کننده یک پروتئین

^۲ Single-Nucleotide Polymorphism

^۱ N-nitrosodimethylamine

به مدت ۴۰ ثانیه، دمای ۷۲°C جهت طویل شدن به مدت ۳۰ ثانیه و پس از آن طویل شدن نهایی در دمای ۷۲ °C به مدت ۵ دقیقه انجام شد. بعد از انجام واکنش PCR و تأیید یک باند در موقعیت ۵۷۶ جفت باز که نشان‌دهنده تکثیر قطعه مورد نظر می‌باشد، ۱۰ میکرولیتر محصول PCR با ۱۰ واحد آنزیم محدودکننده PstI (Restriction enzyme) ساخت شرکت vivantis® مالزی با تکنیک چند شکلی طولی قطعات محدود شونده (RFLP) به مدت ۱۶ ساعت در ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد. در ادامه محصول RFLP بر روی ژل ۲ درصد آگاراز الکتروفورز شد. در مورد محصولات PCR که توسط آنزیم PstI انکوپاسیون شده، سه حالت بررسی شد (۱۳).

۱- وجود آلل نرمال یا تیپ وحشی (c1) در هر دو رشته DNA که در این صورت با توجه به توالی آنزیم سایت برش در هیچ یک از دو رشته وجود ندارد. در این حالت پس از الکتروفورز محصول RFLP بر روی ژل یک باند ۵۷۶ جفت بازی قابل رویت است که نشان‌دهنده ژنتوتیپ (c1/c1).*

۲- حالت دیگر وجود یک سایت برش در یکی از دو رشته است که در این صورت پس از الکتروفورز بر روی ژل آگاروز یک باند ۵۷۶ جفت بازی مربوط به رشته برش نخورده (الل c1) و دو باند ۲۸۲ و ۲۹۴ جفت بازی (الل c2)، مربوط به رشته برش نخورده DNA قابل شناسایی است که بیانگر ژنتوتیپ هتروزیگوت (c1/c2) CYP2E1*1A/*5B می‌باشد.

۳- در صورت وجود سایت برش آنزیم PstI در هر دو رشته، دو باند ۲۸۲ و ۲۹۴ جفت بازی ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده ژنتوتیپ نادر CYP2E1*1A/*5B (c1/c2) است (تصویر ۱).

۱۳۹۰ در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اجرا شد. این بررسی بر روی ۲۰۰ نفر از افراد سالم مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های شهر اهواز در محدوده سنی ۱-۸۴ سال شامل ۱۰۰ زن (میانگین سنی $40/87\pm19/96$ سال، محدوده سنی ۳-۸۴ سال) و ۱۰۰ مرد (میانگین سنی $41/59\pm22/34$ سال، محدوده سنی ۱-۷۹ سال) انجام شد. از تمامی افراد در ابتدای مطالعه رضایت‌نامه آگاهانه اخذ شد.

جهت جلوگیری از لخته شدن خون تا زمان استخراج DNA، نمونه‌های خون جمع‌آوری شده از افراد مورد پژوهش، در لوله‌های حاوی EDTA در فریزر ۲۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. جداسازی DNA ژنومی از خون محیطی با استفاده از کیت استخراج -DIAtom DNA Prep.) DNA از خون محیطی انجام شد. محل پلی مورفیسم ژن به طول ۵۷۶ جفت باز به موسیله واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) و با استفاده از پرایمرهای مستقیم ۵'- ACCCCAATGGGTGTCTGTC ۳' و معکوس ۵'-TCATTCTGTCTTCTAACTGGCAAT ۳' تکثیر شد.

واکنش PCR بر روی ۲۵ میکرولیتر حجم نهایی حاوی ۰/۵ میکرولیتر از هر پرایمر با غلظت (۲۵PM)، ۴ میکرولیتر ژنوم DNA استخراج شده با غلظت ۳۰۰- ۲۰۰ نانوگرم، ۲/۵ میکرولیتر بافر واکنش با غلظت X، ۰/۵ میکرولیتر dNTP با غلظت ۵۰ ۱۰Mm)، ۱ میکرولیتر کلرید منیزیوم با غلظت ۱۱/۸ میلی‌مول، ۱ واحد Taq DNA پلی‌مراز، و میکرولیتر آب دیونیزه انجام شد. برنامه حرارتی PCR در دستگاه ترموسایکلر (Biorad®) بدین ترتیب انجام شد: دناتوراسیون اولیه در دمای ۹۴°C به مدت ۳ دقیقه و سپس ۳۵ سیکل در دمای ۹۴ °C جهت دناتوراسیون به مدت ۳۰ ثانیه، دمای ۵۲°C به مدت ۳۰ ثانیه، دمای


خارج می شد. هیچ گونه هزینه ای برای انجام این آزمایشات از بیماران دریافت نشد.

داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و معادله هاردی - واینبرگ تجزیه و تحلیل شدند. احتمال P کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

جدول ۱ نشان دهنده توزیع ژنتیکی و فراوانی آل های C1 و C2 است. درصد فراوانی ژنوتیپ ها در کل جمعیت مطالعه برای ژنوتیپ های هموژیگوت تیپ و حشی *1A/*1A (C1/C1) و هتروژیگوت (C1/C2) *1A/*5B (C1/C2) به ترتیب ۹۷ و ۳ درصد مشاهده شد. در صورتی که ژنوتیپ هموژیگوت تغییر یافته (*5B/C2/C2) در جمعیت مورد بررسی دیده نشد. درصد فراوانی آلی در کل جمعیت مورد بررسی ۹۸/۵ برابر آلل (C1) *1A (C1) و ۱/۵ درصد برای آل (C2) *5B (C2) به دست آمد. فراوانی ژنوتیپی مورد انتظار توسط معادله هاردی - واینبرگ محاسبه شد که بنابر آن تمام فراوانی های ژنوتیپی از تعادل پیروی کردند (جدول ۱).

به منظور تأیید کامل یافته های به دست آمده ۴ نمونه دارای الل تغییر یافته و نرمال به صورت تصادفی انتخاب شد و جهت تعیین توالی به آزمایشگاه نرجس اهواز فرستاده شد که در پایان یافته ها مؤید صحت تکنیک RFLP بود.



تصویر ۱) الکتروفورز محصول RFLP بر روی ژل آکاروز ۲/۵ درصد. شماره ۱ هتروژیگوت C1/C2 با ۳ باند ۵۷۶، ۲۸۲ و ۲۹۴ و جفت بازی که به دلیل فاصله کم بازی دو باند قادر به تشکیک نبوده اند. شماره ۲ تا ۵ هموژیگوت C1/C1 با ۳ باند ۵۷۶ جفت باز می باشد.

از افراد سالم مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی، برای وارد شدن در این مطالعه سؤال شد. تمام بیماران یک پرسشنامه تهیه شده را پر و از آنها رضایت نامه کتی گرفته شد. نمونه های خون و DNA با کد شماره گزاری و نام مراجعین فقط در نزد مجری مسئول، به صورت محترمانه با یگانی شد. در صورت اعلام انصراف از ادامه همکاری، نمونه فرد از طرح

جدول ۱) مقایسه فراوانی ژنوتیپ و آل های مختلف پلیمورفیسم CYP2E1*5B بررسی شده در جمعیت ایرانی

پلیمورفیسم CYP2E1*5B	ژنوتیپ	شده % (تعداد)	فرآوانی مشاهده شده % (تعداد)	فرآوانی مورد انتظار در معادله هاردی - واینبرگ	نوع آل	فرآوانی مشاهده شده % (تعداد)					
هموزیگوت نرمال	*1A/*1A(C1/C1)	(۱۹۴) ۹۷	(۹۷) ۹۷	۹۷/۰۲	۹۷/۰۲	(۳۸۸) ۹۸/۹۵	*	۱A(C1)			
هتروژیگوت	*1A/*5B(C1/C2)	(۶) .۳	(۶) .۳	۲/۹۵	۲/۹۵	(۱۲) ۱/۵	*	5B(C2)			
هموزیگوت تغییر یافته				۰/۰۲	۰/۰۲						
کل						۴۰۰					۲۰۰

زن و مرد به ترتیب ۹۶ و ۹۸ درصد مشاهده شد. فراوانی ژنتوپ هتروزیگوت (۱A/*۵B(c۱/c۲) در دو جنس زن و مرد ایرانی، به ترتیب ۴ و ۲ درصد مشاهده شد. ژنتوپ هموزیگوت تغییریافته (۵B(c۲/c۲)/*۵B(c۱/c۱)) در هیچ یک از دو جنس ایرانی مشاهده نشد.

جدول ۲ نشان‌دهنده توزیع فراوانی ژنتوپی و آللی در بین زن و مرد است که تفاوت معنی‌داری از نظر جنسیت در بین دو گروه مشاهده نشد. همان‌گونه در جدول ۲ مشاهده می‌شود مهم‌ترین و فراوان‌ترین ژنتوپ در هر دو جنس زن و مرد ایرانی، (۱A/*۱A(c۱/c۱)) می‌باشد که فراوانی آن در جنس

جدول ۲) مقایسه فراوانی ژنتوپ و آلل‌های مختلف پلی‌مورفیسم CYP2E1*۵B در بین زن و مرد

P.value	فراآنی آلل		تعداد	فراآنی ژنتوپی		جنس
	*۵B(c۲)	*۱A(c۱)		*۵B/*۵B(c۲/c۲)	*۱A/*۵B(c۱/c۲)	
NS	۲	۹۸	۱۰۰	.	.	زن ۹۶
	۱	۹۹	۱۰۰	.	.	مرد ۹۸

NS نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌داری در فراوانی‌های ژنتوپی وجود ندارد.

پلی‌مورفیسم‌های ژئی محصولات کادشونده (آنژیم‌های متاپولیزکننده) ترکیبات زنوبیوتیک از جمله سیتوکروم P450 را در سمیت ناشی از داروها و مواد شیمیایی را نشان می‌دهد (۱، ۱۰ و ۱۶).

با وجود مطالعات اخیر بر روی انواع پلی‌مورفیسم‌های این سیتوکروم، نقش پلی‌مورفیسم CYP2E1*۵B در ایجاد استعداد فردی ابتلا به سرطان در مواجهه با انواع ترکیبات کارسینوژن شناخته شده مانند وینیل کلرید (۲) در جمعیت‌های مختلف مورد بحث است.

از بین ۲۰۰ نفر از افراد مورد مطالعه، ۹۷ درصد دارای ژنتوپ هموزیگوت (c۱/c۱) و ۳ درصد ژنتوپ هتروزیگوت (c۱/c۲) بودند و هیچ فردی با ژنتوپ هموزیگوت تغییریافته (c۲/c۲) مشاهده نشد.

بنابر ارزیابی‌های انجام‌شده، فراوانی آلل تغییریافته (c۲) در آسیای شرقی ۲۳-۳۶ درصد و در سفیدپستان ۲-۸ درصد گزارش شده است (۱).

یافته‌های این بررسی نبود تفاوت معنی‌دار در توزیع فراوانی ژنتوپی و آللی بین زن و مرد را نشان می‌دهد.

بحث

CYP2E1 تقریباً حدود ۷ درصد از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 را تشکیل می‌دهد. این سیتوکروم دارای پیش سازهای اختصاصی می‌باشد و توسط ترکیبات کارسینوژن و سم قابل القاء است. بر همین اساس ب این سیتوکروم اهمیت بالایی در پزشکی و سمندانسی محیطی و صنعتی دارد. این سیتوکروم همچنین نقش مهمی در متاپولیسم داروها و بسیاری از زنوبیوتیک‌ها با وزن مولکولی کم را به‌عهده دارد. ژن CYP2E1 دارای چندین پلی‌مورفیسم می‌باشد که این پلی‌مورفیسم‌ها موجب افزایش حساسیت و استعداد ژنتیکی ایجاد سرطان در مواجهه با مواد سمی و کارسینوژن می‌شود (۱). اختلافات میان فردی در پاسخ دارویی و متاپولیسم ترکیبات زنوبیوتیک با این سیتوکروم ثابت شده است (۲). برخی از این پلی‌مورفیسم‌ها می‌توانند فاکتورهای خطر و استعداد ابتلا به بیماری‌هایی چون سرطان و واکنش‌های مضر دارویی (ADRs) باشند. این مطلب اهمیت

مطالعه با سایر جمعیت‌ها مقایسه شد. همان‌گونه که در جدول ۳ دیده می‌شود فراوانی ژنوتیپی **CYP ۲E۱*۵B** جمعیت ایرانی مشابه با جمعیت‌های ترکیه، آلمان، انگلیس، هند، فرانسه و لهستان بوده و اختلاف معنی‌داری را با جمعیت‌های سوئد، شیلی، برزیل، ایتالیا، سفید پوستان آمریکا، جمعیت آمریکایی-آفریقایی و آمریکایی-مکزیکی، چین، ژاپن، تایلند و اسپانیا نشان می‌دهد (۱، ۶، ۱۷ و ۳۱).

این مطالعه همانند بسیاری از مطالعات دیگر نشان‌دهنده عدم تفاوت و استعداد ژنتیکی جنسیتی در القاء انواع بیماری مانند سرطان در تماس با انواع مواد شیمیائی می‌باشد (۱، ۶، ۱۷ و ۳۱).

فرکانس پلیمورفیسم **CYP۲E۱** همانند اغلب آنزیم‌های متاپولیز کننده دارای اختلاف در میان جمعیت‌ها و نژادهای مختلف است. بر همین اساس توزیع فراوانی ژنوتیپی و آللی جمعیت ایرانی این

جدول ۳) بررسی مقایسه فراوانی ژنوتیپ‌های مختلف **CYP ۲E۱*۵B** این مطالعه با سایر جمعیت‌های مختلف بررسی شده

نویسنده سال	P.value	فرافراوانی ژنوتیپی (%)			تعداد	جمعیت
		*۵B/*۵B(c۲/c۲)	*۱A/*۵B (c۱/c۲)	*۱A/*۱A (c۱/c۱)		
Persson et al,1993(17)	<0.0001	۱	۹	۹۰	۱۴۸	سوئد
Ulusoy et al,2007(1)	NS	۰	۳/۸۸	۹۶/۱۲	۲۰۶	ترکیه
Boccia et al,2008(18)	۰/۰۳۷۴	۰/۴	۶/۱۲	۹۳/۰۶	۲۴۵	ایتالیا*
Neuhaus et al,2004(19)	NS	۰/۷	۳/۴	۹۴/۹	۲۹۷	آلمان
Quinones et al,2001(20)	<0.0001	۲	۲۷	۷۱	۱۴۸	شیلی*
Olivieri et al,2009(21)	<0.0001	۰	۱۱/۰۳	۷۲/۴۱	۱۴۵	برزیل*
Yang et al,2001(6)	NS	۰	۲۲	۹۶/۸	۱۵۵	انگلیس
Ruwali et al,2009(22)	NS	۰	۲	۹۸	۳۵۰	هند
Li et al,2005(23)	۰/۰۱۸۲	۰/۴۴	۷/۰۱	۹۲/۷	۱۲۲۶	آمریکای سفید*
Wu et al,1997(24)	<0.0001	۱/۱	۲۸/۳	۷۰/۶	۹۲	آمریکای مکزیکی*
Wu et al,1997(24)	<0.0001	۰/۹	۱۲/۳	۸۶/۸	۱۱۴	آمریکای افریقایی*
Persson et al,1999(25)	<0.0001	۴/۹	۴۳/۵	۵۱/۶	۱۲۲	چین*
Sugimura et al,2006(26)	<0.0001	۲/۹	۲۹/۰۴	۶۶/۶	۲۲۱	ژاپن*
Wang et al,1999(27)	<0.0001	۶/۹	۳۵/۱	۵۸	۲۳۱	تایوان*
Kongruttanachok al,2001(28)	<0.0001	۱/۶۸	۳۴/۶۸	۶۳/۶	۲۹۷	تایلند*
Bouchardy et al,2000(29)	۰/۰۰۰۸	۰	۴/۶	۹۵/۳	۱۷۲	فرانسه
González et al,1998(30)	NS	۰	۱۰/۵	۸۹/۵	۲۰۰	اسپانیا*
Gajecka et al,2005(31)	NS	۰	۵/۶	۹۶/۵	۳۱۶	لهستان
		۰	۳	۹۸	۲۰۰	ایران (این مطالعه)

*نشان‌دهنده معنی‌دار فراوانی ژنوتیپ با جمعیت ایرانی بررسی شده است.

NS: نشان‌دهنده عدم تفاوت معنی‌دار فراوانی ژنوتیپ با جمعیت ایرانی بررسی شده است.

دقیق‌تر انجام شود، همچنین اختلافات قومیتی (عرب و غیرعرب) و مطالعه بر روی جمعیت کارگران شاغل در مناطق مختلف صنعتی با توجه به اثر این پلیمورفیسم در تولید متاپولیت‌های سمی از آلاینده‌ها مورد بررسی قرار گیرد. همچنین انجام مطالعات

این تفاوت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده اثرات محیط و رژیم غذائی در توزیع انواع پلیمورفیسم مشاهده شده در **CYP۲E۱** باشد. پیشنهاد می‌شود با توجه به پایین بودن تعداد افراد مورد بررسی در این مطالعه، مطالعات بعدی با تعداد نمونه بیشتر جهت دستیابی به نتایج

بررسی‌های بیشتر بر روی این ارتباط، بر روی جمعیت‌های دیگر به ویژه شرق دور ادامه دارد. در یک بررسی مشخص شد که میزان دفع ادراری ترکیب سرطان‌زا شناخته شده استین در افراد با ژنتیپ هتروزیگوت $c1/c2$ * $5B/c1/c1A$ * $5B$ در مقایسه با ژنتیپ هموزیگوت $c1/c1A$ * $1A/c1A$ کمتر می‌باشد. این یافته به خوبی نشان‌دهنده تفاوت دفع ادراری ترکیب سرطان‌زا شناخته شده استین، در افراد با ژنتیپ هتروزیگوت می‌باشد (۳۷). از آنجائی که ژنتیپ هموزیگوت تغییریافته $c2/c2$ * $5B/c2/c2A$ * $5B$ در جمعیت ایرانی دیده نشد، می‌توان نتیجه گرفت که جمعیت ایرانی قادر به متابولیسم و دفع ادراری این ترکیب سرطان‌زا می‌باشد.

به نظر می‌رسد که افراد با آلل $CYP2E1$ دارای فعالیت آنزیمی بیشتر برای فعال کردن ترکیبات کارسینوژن و ایجاد سرطان در مقایسه با افراد بدون این آلل هستند. این تفاوت در سرطان دستگاه گوارش نشان داده شده است (۳۸). این مطالعه در ارزیابی آینده نقش انواع پلی‌مورفیسم $CYP2E1$ در افراد مبتلا به سرطان جمعیت ایرانی، سودمند می‌باشد.

جمعیت منطقه جنوب غرب، دارای تنوع ژنتیکی و شامل گروه‌های مختلف جمعیتی به ویژه لر، فارس و همچنین عرب می‌باشد. با توجه به تفاوت پلی‌مورفیسم این سیتوکروم در جمعیت‌های مختلف، این مطالعه بر روی یک جمعیت ۲۰۰ نفری از گروه‌های جمعیتی و قومی مختلف منطقه انجام شد. بر همین اساس یافته‌های بررسی پیش رو به عنوان معیار مناسب جامعه ایرانی محسوب می‌شود. هدف اصلی این مطالعه، تلاش برای ارزیابی دقیق از فراوانی پلی‌مورفیسم در یک جمعیت می‌باشد. مطالعات جمعیتی به این شکل می‌تواند در ارزیابی حساسیت جمعیت‌های مختلف به

همراهی این SNP با بیماری‌های القا شده توسط مواد شیمیایی و بیماری‌هایی نظیر کبدالکلی و غیر الکلی ضروری به نظر می‌رسد.

این آنزیم، مهم‌ترین آنزیم متابولیزکننده ترکیب اول سرطان‌زا شناخته شده شیمیائی دنیا، بنزن می‌باشد، بنابراین پلی‌مورفیسم این آنزیم می‌تواند نقش مهمی در استعداد ژنتیکی به سمت خونی و لوکمی ناشی از تماس با بنزن باشد. بنزن ترکیبی است که در صنایع مختلف پتروشیمی و نفتی و نیز صنایع دیگر تولیدی، کاربرد گسترده دارد. $CYP2E1$ در تولید متابولیت‌های سیتوکسیک و ژنتوکسیک بنزن در کبد نقش مهمی دارد (۳۲ و ۳۳). در یک مطالعه هدفمند، ارتباط پلی‌مورفیسم $CYP2E1$ با میزان دفع ادراری دو متابولیت اختصاصی بنزن، ترانس، ترانس موكونیک (SPMA) و S-فنیل مرکاپتوریک اسید (TMA) بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که در مواجهه اندک با بنزن، دفع ادراری TMA و SPMA با پلی‌مورفیسم $CYP2E1$ ارتباط معنی‌داری ندارد. ظاهراً جنسیت، مصرف سیگار، عادات غذایی و نیز نوع زندگی تأثیر بیشتری بر میزان متابولیسم بنزن در مواجهه با مقادیر اندک آن دارد (۳۴).

نتایج مطالعه اخیر بر تشخیص بیومارکرهای ژنتیکی آسیب در صورت تماس بالا با بنزن و سایر ترکیبات مشابه تأکید دارد.

برخی از مطالعات هدفمند اخیر بر روی تفاوت فراوانی آلل $B/CYP2E1$ * 5 در جمعیت‌ها استوار است. فراوانی این آلل در جمعیت اروپائی در حدود ۵ درصد گزارش شده است. ارتباط میان این نوع پلی‌مورفیسم ژنتیکی با میزان بیان و در نتیجه متابولیسم ترکیبات شیمیائی به خوبی نشان داده شده است (۳۵ و ۳۶).

سپاس و قدردانی

نتایج این طرح بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد سمشناسی انجام شده در مرکز تحقیقات سمشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است. هزینه انجام طرح توسط معاونت پژوهشی دانشگاه جندی شاپور اهواز پرداخت شده است. از کلیه کارشناسان گروه زنگنه دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و نیز آزمایشگاه های تشخیص طبی اهواز قدردانی می شود.

References:

- 1.Ulusoy G, Arinc E, Adali O. Genotype and allele frequencies of polymorphic CYP2E1 in the Turkish population. *Arch Toxicol* 2007; 81: 711-8.
- 2.Tang K, Li X, Xing Q, et al. Genetic polymorphism analysis of cytochrome P4502E1 (CYP2E1) in Chinese Han populations from four different geographic areas of Mainland China. *Genomics* 2010; 95: 224-9.
- 3.Lieber CS. Cytochrome P-4502E1: its physiological and pathological role. *Physiol Rev* 1997; 77: 517-44.
- 4.Roberts BJ, Song BJ, Soh Y, et al. Ethanol induces CYP2E1 by protein stabilization. Role of ubiquitin conjugation in the rapid degradation of CYP2E1. *J Biol Chem* 1995; 270: 29632-5.
- 5.Kim KW, Shinetugs B, Heo kH, et al. Polymorphisms of alcohol metabolizing enzyme and cytochrome P4502E1 genes in Mongolian population. *Genes Genomics* 2009; 31: 377-85.
- 6.Yang B, O'Reilly DA, Demaine AG, et al. Study of polymorphisms in the CYP2E1 gene in patients with alcoholic pancreatitis. *Alcohol* 2001; 23: 91-7.
- 7.Thier R, Lewalter J, Selinski S, et al. Possible impact of human CYP2E1 polymorphisms on the metabolism of acrylonitrile. *Toxicol Lett* 2002; 128: 249-55.
- 8.Niu Y, Yuan H, Leng W, et al. CYP2E1 Rsa I/Pst I polymorphism and esophageal cancer risk: a meta-analysis based on 1,088 cases and 2,238 controls. *Med Oncol* 2011; 28: 182-7.
- 9.Coura RdS, Marques CdFtS, Koifman RJ, et al. CYP1A1 and CYP2E1 polymorphism frequencies in a large Brazilian population. *Genet Mol Biol* 2007; 30: 1-5.
- 10.Bolt HM, Roos PH, Thier R. The cytochrome P-450 isoenzyme CYP2E1 in the biological processing of industrial chemicals: consequences for occupational and environmental medicine. *Int Arch Occup Environ Health* 2003; 76: 174-85.
- 11.Wang Y, Yang H, Li L, et al. Association between CYP2E1 genetic polymorphisms and lung cancer risk: a meta-analysis. *Eur J Cancer* 2010; 46: 758-64.
- 12.Wu SH, Tsai SM, Hou MF, et al. Interaction of genetic polymorphisms in cytochrome P450 2E1 and glutathione S-transferase M1 to breast cancer in Taiwanese woman without smoking and drinking habits. *Breast Cancer Res Treat* 2006; 100: 93-8.
- 13.Niu Y, Hu Y, Wu M, et al. CYP2E1 Rsa I/Pst I polymorphism contributes to oral cancer susceptibility: a meta-analysis. *Mol Biol Rep* 2012; 39: 607-12.
- 14.Lu D, Yu X, Du Y. Meta-analyses of the effect of cytochrome P450 2E1 gene polymorphism on the risk of head and neck cancer. *Mol Biol Rep* 2011; 38: 2409-16.
- 15.Zhou GW, Hu J, Li Q. CYP2E1 Pst I/Rsa I polymorphism and colorectal cancer risk: A meta-analysis. *World J Gastroenterol* 2010; 16: 2949-53.
- 16.Liu S, Park JY, Schantz SP, et al. Elucidation of CYP2E1 5' regulatory RsaI/PstI allelic variants and their role in risk for oral cancer. *Oral Oncol* 2001; 37: 437-45.
- 17.Persson I, Johansson I, Bergling H, et al. پیماری های همراه با پلی مورفیسم CYP2E1 و تعیین ضرورت طراحی پروتکل های درمانی و سمشناسی کاهنده آسیب، مفید باشد (۳۹). اما برای دستیابی به ارزیابی دقیق تر از ارتباط میان انواع پلی مورفیسم CYP2E1 با انواع سرطان ها مخصوصاً سرطان در کارگران صنایع مختلف مواجه و افزایش توان آماری مطالعه، جامعه آماری بزرگتر و یا مطالعات مورد شاهدی پیشنهاد شود.

- Genetic polymorphism of cytochrome P4502E1 in a Swedish population. Relationship to incidence of lung cancer. FEBS Lett 1993; 319: 207-11.
18. Boccia S, Cadoni G, Sayed-Tabatabaei FA, et al. CYP1A1, CYP2E1, GSTM1, GSTT1, EPHX1 exons 3 and 4, and NAT2 polymorphisms, smoking, consumption of alcohol and fruit and vegetables and risk of head and neck cancer. J Cancer Res Clin Oncol 2008; 134: 93-100.
19. Neuhaus T, Ko YD, Lorenzen K, et al. Association of cytochrome P450 2E1 polymorphisms and head and neck squamous cell cancer. Toxicol Lett 2004; 151: 273-82.
20. Quiñones L, Lucas D, Godoy J, et al. CYP1A1, CYP2E1 and GSTM1 genetic polymorphisms. The effect of single and combined genotypes on lung cancer susceptibility in Chilean people. Cancer Lett 2001; 174: 35-44.
21. Olivieri EHR, da Silva SD, Mendonca FF, et al. CYP1A2*1C, CYP2E1*5B, and GSTM1 polymorphisms are predictors of risk and poor outcome in head and neck squamous cell carcinoma patients. Oral Oncol 2009; 45: e73-e9.
22. Ruwali M, Khan AJ, Shah PP, et al. Cytochrome P450 2E1 and head and neck cancer: interaction with genetic and environmental risk factors. Environ Mol Mutagen 2009; 50: 473-82.
23. Li G, Liu Z, Sturgis EM, et al. CYP2E1 G1532C, NQO1 Pro187Ser, and CYP1B1 Val432Leu polymorphisms are not associated with risk of squamous cell carcinoma of the head and neck. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005; 14: 1034-6.
24. Wu X, Shi H, Jiang H, et al. Associations between cytochrome P4502E1 genotype, mutagen sensitivity, cigarette smoking and susceptibility to lung cancer. Carcinogenesis 1997; 18: 967-73.
25. Persson I, Johansson I, Lou YC, et al. Genetic polymorphism of xenobiotic metabolizing enzymes among Chinese lung cancer patients. Int J Cancer 1999; 81: 325-9.
26. Sugimura T, Kumimoto H, Tohnai I, et al. Gene-environment interaction involved in oral carcinogenesis: molecular epidemiological study for metabolic and DNA repair gene polymorphisms. J Oral Pathol Med 2006; 35: 11-8.
27. Wang SL, Lee H, Chen KW, et al. Cytochrome P4502E1 genetic polymorphisms and lung cancer in a Taiwanese population. Lung Cancer 1999; 26: 27-34.
28. Kongruttanachok N, Sukdikul S, Setavarin S, et al. Cytochrome P450 2E1 polymorphism and nasopharyngeal carcinoma development in Thailand: a correlative study. BMC Cancer 2001; 1: 4.
29. Bouchardy C, Hirvonen A, Coutelle C, et al. Role of alcohol dehydrogenase 3 and cytochrome P-4502E1 genotypes in susceptibility to cancers of the upper aerodigestive tract. Int J Cancer 2000; 87: 734-40.
30. Gonzalez MV, Alvarez V, Pello MF, et al. Genetic polymorphism of N-acetyltransferase-2, glutathione S-transferase-M1, and cytochromes P450IIE1 and P450IID6 in the susceptibility to head and neck cancer. J Clin Pathol 1998; 51: 294-8.
31. Gajecka M, Rydzanicz M, Jaskula-Sztul R, et al. CYP1A1, CYP2D6, CYP2E1, NAT2, GSTM1 and GSTT1 polymorphisms or their combinations are associated with the increased risk of the laryngeal squamous cell carcinoma. Mutat Res 2005; 574: 112-23.
32. Bernauer U, Vieth B, Ellrich R, et al. CYP2E1-dependent benzene toxicity: the role of extrahepatic benzene metabolism. Arch Toxicol 1999; 73: 189-96.
33. Seaton MJ, Schlosser PM, Bond JA, et al. Benzene metabolism by human liver microsomes in relation to cytochrome P450 2E1 activity. Carcinogenesis 1994; 15: 1799-806.
34. Verdina A, Galati R, Falasca G, et al. Metabolic polymorphisms and urinary biomarkers in subjects with low benzene exposure. J Toxicol Env Health 2001; 64: 607-18.
35. Hayashi S, Watanabe J, Kawajiri K. Genetic polymorphisms in the 5' flanking region change transcriptional regulation of the human cytochrome P450IIE1 gene. J Biochem 1991; 110: 559-65.
36. Kim RB, Yamazaki H, Chiba K, et al. In vivo and in vitro characterization of CYP2E1 activity in Japanese and Caucasians. J Pharmacol Exp Ther 1996; 279: 4-11.
37. Prieto-Catello, Cardona A, Marhuenda D, et al. Use of the CYP2E1 genotype and phenotype for the biological monitoring of occupational exposure to styrene. Toxicol Letter 2010; 192: 34-9.
38. Hung HC, Chuang J, Chien Y C, et al. Genetic polymorphisms of CYP2E1, GSTM1,

and GSTT1; environmental factors and risk of oral cancer. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 1997; 6: 901-5.
39.Chaleshtary JS, Moradi MT, Farrokhi E, et

al. Study of P53 gene mutations in promoter and exons 2-4 and 9-11 in patient with gastric cancer by PCR-SSCP in Chaharmahal Va Bakhtiari province. *ISMJ* 2011; 14: 220-9.

Archive of SID

Original Article

Genotype and allelic frequencies of CYP2E1*5B polymorphism in the southwest population of Iran

F. Zanganeh¹, A. Jalali^{1*}, H. Galehdari²,
Gh. Mohammadzadeh Shahriary², MT. Jalali³, J. Mohammadi-Asl⁴

¹Department of Pharmacology and Toxicology, Toxicology Research Center, Ahvaz Jundishapur University, Ahvaz, IRAN

²Department of Genetic, School of Sciences, Ahvaz Shahid Chamran University, Ahvaz, IRAN

³Department of Biochemistry, School of Paramedicine, Ahvaz Jundishapur University, Ahvaz, IRAN

⁴Department of Genetic, Toxicology Research Center, Ahvaz Jundishapur University, Ahvaz, IRAN

(Received 8 Nov, 2011 Accepted 22 May, 2012)

Abstract

Background: Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) is a main enzyme which plays a major role in activating and detoxifying many xenobiotics, carcinogens and drugs. Available studies suggest that CYP2E1 single nucleotide polymorphisms (SNPs) are involved in the risk of developing certain cancers after exposure to carcinogens. The purpose of the present study was to assess genotype and allele frequencies of polymorphic CYP2E1*5B in the Iranian population.

Material and Methods: This study was performed on 200 healthy individuals (female: 100, male: 100) in medical laboratories of Ahvaz during 2011. The CYP2E1 *5B (rs3813867; G-1293C) assessment was carried out using PCR-RFLP method. The data were analyzed with χ^2 and hardy-Weinberg Equation statistically methods.

Results: The frequency of *1A/*1A (c1/c1), *1A/*5B (c1/c2) and *5B/*5B (c2/c2) genotypes was computed 97, 3 and 0 percent, respectively. The frequency of *1A (c1) and *5B (c2) alleles was computed 98.5 and 1.5 percent, respectively. No statistically significant difference was between two genders ($p>0.05$).

Conclusion: The genotype distribution and allele frequencies of CYP2E1*5B polymorphism were similar to Turkish and some of the European populations. However, there are significant interethnic differences when the Iranian population is compared with the Eastern Asian, American and some of the European populations. The allelic distribution of this polymorphism did not vary with gender.

Keywords: polymorphism, CYP2E1*5B, genotype, allele frequencies, IRAN

*Address for correspondence: Department of Pharmacology and Toxicology, Toxicology Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, IRAN; E-mail: amjalali@hotmail.com