

علایم کلینیکی مسمومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز*

دکتر فرزاد قشلاقی^۱، زهره صدیقی نیا^۲

چکیده

مقدمه: به علت شباهت‌هایی که میان تظاهرات بالینی مسمومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز وجود دارد، در صورتی که مسمومیت با پایرتروئیدها با مسمومیت با مهار کننده‌های کولین استراز اشتباه شود و درمان با آتروپین با آتروپین شدید با آتروپین و گاهی حتی مرگ روی می‌دهد. از این‌رو، مطالعه‌ی حاضر جهت مقایسه‌ی علایم کلینیکی این دو نوع مسمومیت انجام شد.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی بر روی بیماران مسموم مرکز پزشکی نور اصفهان، ۱۶۷ نفر بیمار دچار مسمومیت با پایرتروئیدها و ۱۶۷ نفر بیمار دچار مسمومیت با مهار کننده‌های کولین استراز به صورت نمونه گیری آسان انتخاب شدند و مورد بررسی بالینی قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین سنی بیماران مسموم در گروه مهار کننده‌های کولین استراز ۲۸/۸ سال و میانگین سنی بیماران مسموم با پایرتروئید ۲۲/۴۷ سال به دست آمد. در هر دو گروه، مردان مسموم بیش از زنان بودند و بیشترین راه مسمومیت راه خوارکی بود. همچنین تعداد موارد عمده بیش از اتفاقی بود. شایع‌ترین علایم مسمومیت با مهار کننده‌های کولین استراز در این مطالعه به ترتیب تهوع (۶۸/۹ درصد)، استفراغ (۵۶/۳ درصد)، اسهال (۴۳/۱ درصد)، میوز (۴۰/۷ درصد)، تعریق (۳۸/۵ درصد) و سیالوره (۳۶/۵ درصد) و شایع‌ترین علایم مسمومیت با پایرتروئیدها به ترتیب تهوع (۷۴/۹ درصد)، استفراغ (۶۱/۷ درصد)، کرامپ شکمی (۲۰ درصد)، سیالوره (۱۵/۶ درصد) و ضعف عضلانی (۱۲/۶ درصد) بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس این مطالعه، اختلاف موجود بین علایم این دو نوع مسمومیت می‌تواند به تشخیص افتراقی کمک کند.

وازگان کلیدی: علایم کلینیکی، مسمومیت، مهار کننده‌های کولین استراز، پایرتروئیدها.

می‌دهد (۱). راه تشخیص این دو مسمومیت از یکدیگر، بر اساس شرح حال و علایم بالینی و نتایج آزمایشگاهی است، اما گاه شرح حال مخدوش می‌شود و قابل اعتماد نیست و نیز نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی در ساعت‌های اولیه در دسترس نیستند. این بررسی با این سؤال که آیا می‌توان از روی علایم بالینی مسمومین، این دو نوع مسمومیت را از هم افتراق داد، انجام شد. پژوهشگران این مطالعه، مقاله‌مشابهی در مورد مقایسه این دو سم نیافرتند.

روش‌ها

در یک مطالعه‌ی مقطعی، بیماران مسموم مراععه کننده

مقدمه

ترکیبات ارگانوفسفره و کاربامات‌ها دو دسته از آفت کش‌هایی هستند که با مهار آنزیم استیل کولین استراز منجر به پیدایش مسمومیت در انسان می‌شوند. دسته‌ی دیگری از حشره کش‌ها که به طور وسیعی در صنعت، با غداری و کشاورزی و مصارف خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پایرتروئیدها هستند. به علت شباهت‌هایی که میان تظاهرات بالینی مسمومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز وجود دارد، در صورتی که مسمومیت با پایرتروئیدها با مسمومیت با مهار کننده‌های کولین استراز اشتباه شود و درمان با آتروپین صورت گیرد، مسمومیت شدید با آتروپین و مرگ روی

* این مقاله حاصل پایان‌نامه‌ی دوره‌ی دکترای حرفه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشد.

^۱ دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

^۲ دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

نویسنده‌ی مسؤول: دکتر فرزاد قشلاقی

در نهایت، داده‌ها توسط آزمون‌های Student-t و تست دقیق فیشر با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی (version 13, SPSS Inc., Chicago, IL) آنالیز شد.

یافته‌ها

بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین سنی بیماران مسموم در گروه مهار کننده‌های کولین استراز ۲۸/۸ سال برآورد شد که در محدوده‌ی ۳-۶۵ سال بودند. میانگین سنی بیماران مسموم با پایرتروئید ۲۲/۴۷ سال با محدوده‌ی سنی ۱/۵-۷۳/۱ سال به دست آمد. بیشتر بیماران دچار مسمومیت با پایرتروئیدها در گروه سنی ۲۱-۴۰ سال بودند (۱۲۴ نفر معادل ۷۴/۱ درصد؛ در حالی که تنها ۱۹ نفر (۱۱/۴ درصد) در گروه سنی کوچک‌تر یا مساوی ۲۰ سال و ۲۴ نفر (۱۴/۵ درصد) در گروه سنی بزرگ‌تر یا مساوی ۴۱ سال بودند. این الگو باشد که در بیماران مسموم با مهار کننده‌های کولین استراز مشاهده شد؛ به طوری که به ترتیب ۳۶ نفر (۲۱/۶ درصد)، ۹۶ نفر (۵۷/۵ درصد) و ۳۵ نفر (۲۱ درصد) در گروه‌های سنی کوچک‌تر یا مساوی ۲۰ سال، ۲۱-۴۰ سال و بزرگ‌تر یا مساوی ۴۱ سال قرار گرفتند و تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنی دار بود ($P < 0.001$).

در حالی که ۱۲۴ نفر (۷۴/۳ درصد) از بیماران مسموم شده با پایرتروئید مرد بودند، در مسمومین با مهار کننده‌های کولین استراز به صورت معنی‌داری تعداد مردان (۹۷ نفر معادل ۵۸/۱ درصد) کمتر بود ($P = 0.002$).

مسومیت از طریق استنشاقی در مسمومیت با پایرتروئید و مهار کننده‌های کولین استراز به ترتیب در ۴۸ نفر (۲۸/۷ درصد) و ۹ نفر (۵/۴ درصد) اتفاق

به بخش مسمومین مرکز پزشکی نور اصفهان بررسی شدند. آن دسته از بیماران مسموم که بر اساس شرح حال و علایم بالینی بد و ورود و سم همراه و نیز اظهار همراهان بیمار تشخیص مسمومیت با پایرتروئیدها و یا مهار کننده‌های کولین استراز (ارگانوفسفه و کاربامات) برای آن‌ها قطعی شده بود، به روش نمونه گیری آسان انتخاب و وارد مطالعه شدند.

بیمارانی که مسمومیت همزمان با یکی از سmomom دیگر داشتند، بیمارانی که مسمومیت همزمان پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز داشتند، بیمارانی که در نهایت نوع مسمومیت آن‌ها مشخص نشد و بیمارانی که قبل از مراجعه، در مرکز دیگری مداخله درمانی بر روی آن‌ها صورت گرفته بود، از مطالعه خارج شدند.

حجم نمونه مورد نیاز ۱۶۷ نفر برای هر گروه محاسبه شد. برای جمع آوری اطلاعات، چک لیستی تهیه شد که حاوی سؤالاتی از قبیل نوع سم، راه مسمومیت، شیوه‌ی مسمومیت، جنس، سن، علایم چشمی (وضعیت مردمک، اشکریزش)، فشار خون، تعداد تنفس، تعداد ضربان قلب، درجه‌ی حرارت محیطی، علایم گوارشی (سیالوره، تهوع، استفراغ، کرامپ شکمی، اسهال، بی اختیاری ادرار و مدفعه)، تعریق، علایم ریوی (ویز، رال و ادم ریه)، علایم عضلانی (ضعف عضلانی، فاسیکولیشن، ترمور و توییچینگ) و علایم سیستم عصبی مرکزی (سردرد، تشننج، انواع سطح هوشیاری شامل هوشیار، خواب آلوده، کانفیوژن، استوپور و کما) بود و در بد و ورود و طی ۶ ساعت اول، بر اساس مصاحبه با بیمار و معاینه‌ی بالینی توسط پزشک حاضر در بخش (ایترن) تکمیل می‌گردید.

جدول ۱. فراوانی (نسبی) و ضمیمهای فشار خون، ضربان قلب، تعداد تنفس و مردمک در مسمومین با پایرتوئیدها و همراه کننده‌های کولین استراز

P value	مهار کننده‌های کولین استراز	پایرتو روئیدها	بالا	فشارخون
•/•/•>	(۲۰/۱۲)	(۶/۳) ۶		
	(۱۱۴/۶۸)	(۸/۸) ۱۴۵	طبيعي	
•/•/•>	(۳۳/۱۹)	(۶/۹) ۱۶	پاين	
	(۳۶/۲۱)	(۴/۲) ۴	تاكى كاردى	ضرربان قلب
•/•/•>	(۷۸/۴۶)	(۲/۲) ۱۵۴	طبيعي	
	(۵۳/۳۱)	(۴/۵) ۹	برادى كاردى	
•/•/•>	(۲۴/۱۴)	(۸/۷) ۱۳	تاكى پنه	تعداد تنفس
	(۱۲۵/۷۴)	(۴/۷) ۱۴۶	طبيعي	
•/•/•>	(۱۸/۱۰)	(۸/۴) ۸	برادى پنه	
	(۶۸/۴۰)	(۶/۶) ۱۱	ميوز	مردمك
•/•/•>	(۷۵/۴۴)	(۸/۸) ۱۵۰	طبيعي	
	(۲۴/۱۴)	(۶/۳) ۶	ميدرياز	

کولین استراز (۳۳ نفر ۲۰/۱ درصد) اتفاق افتاده بود
اگرچه در جدول ۲ علایم دو گروه را نشان می‌دهد. اگرچه در
قلب، تعداد تنفس و مردمک در دو گروه مورد بررسی
وضعیت فشار خون، ضربان (P = ۰/۰۰۱). جدول ۱ وضعیت
را نشان می‌دهد.

جدول ۲. فراوانی (نسبی) علایم مشاهده شده در افراد دچار مسمومیت پاپایر تروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز

P value	مهار کننده‌های کولین استراز	پاییرتروئیدها	
۰/۲۲۴	(۶۸/۹) ۱۱۵	(۷۴/۹) ۱۲۵	تهوع
۰/۳۱۷	(۵۶/۳) ۹۴	(۶۱/۷) ۱۰۳	استفراغ
۰/۰۰۱>	(۴۳/۱) ۷۲	(۳/۶) ۷	کرامپ شکمی
۰/۰۳۲	(۵/۴) ۹	(۱/۲) ۳	بی اختیاری مدفوع و ادرار
۰/۰۰۱>	(۳۸/۳) ۶۴	(۷/۸) ۱۳	تعريق
۰/۰۰۱>	(۱۳/۲) ۲۲	(۱/۸) ۳	ویز
۰/۲۸۰	(۸/۴) ۱۴	(۵/۴) ۹	رال
۰/۳۵۸	(۴/۲) ۷	(۲/۴) ۴	ادم ریه
۰/۰۱۵	(۲۲/۸) ۳۸	(۱۲/۶) ۲۱	ضعف عضلانی
۰/۰۴۸	(۱۶/۲) ۲۷	(۰/۹) ۱۵	فاسیکولیشن
۰/۰۰۳	(۱۰/۲) ۱۷	(۲/۴) ۴	ترمور
۰/۰۱۱	(۸/۶) ۱۱	(۱/۲) ۲	توبیچینگ
۰/۷۳۱	(۱۰/۸) ۱۸	(۹/۶) ۱۶	سر درد
۰/۱۵۳	(۷/۲) ۱۲	(۳/۶) ۶	تشنج

افتداد بود و مابقی به روش خوراکی مسموم شده بودند ($P < 0.001$)؛ هیچ موردی از مسمومیت پوستی گزارش نشد.

مسمویت اتفاقی با پایرتروئید (۶۳ نفر معادل ۳۶/۶ درصد) به صورت معنی‌داری بیشتر از مهار کننده‌های

جدول ۳. فراوانی (نسبی) وضعیت هوشیاری در افراد چار مسومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز

P value	مهار کننده‌های کولین استراز	پایرتروئیدها
>0.001	(65/39) ۱۰.۹	(۸۸/۶) ۱۴.۸
	(۸/۴) ۱۴	(۰) ۰
	(۱۶/۸) ۲۸	(۱۰/۲) ۱۷
	(۲/۴) ۴	(۰) ۰
	(۷/۲) ۱۲	(۱/۲) ۲
		کما

شایع‌ترین علایم مسومیت با پایرتروئیدها در این مطالعه به ترتیب تهوع، استفراغ، کرامپ شکمی، سیالوره و ضعف عضلانی بود. در مطالعه‌ای روی مسومین با پایرتروئید شایع‌ترین علایم استفراغ، درد شکمی، گرافی غیرطبیعی ریه و افزایش ترشحات برآورد شده بود که غیر از گرافی غیرطبیعی ریه، که در مطالعه‌ها مورد بررسی قرار نگرفت، سایر موارد با نتایج این مطالعه همانگی تقریبی داشت (۵). در هر دو گروه مسومین شایع‌ترین علایم کلینیکی تهوع و استفراغ بود. در مسومیت با مهار کننده‌های کولین استراز میوز با ۴۰/۷ درصد بعد از تهوع و استفراغ و اسهال شایع‌ترین علامت بود. در مطالعه‌ی خیام، شایع‌ترین علامت مسومیت با مهار کننده‌های کولین استراز عوارض موسکارینی به صورت افزایش ترشحات بدن برآورد شده بود (۷). در مطالعه‌ی الحمدی و همکاران نیز شایع‌ترین علامت میوز بود که در ۸۸ درصد موارد مشاهده شد و پس از آن تهوع و استفراغ با ۴۴ درصد موارد شایع‌ترین علایم بودند (۲). در مطالعه‌ای در بولیوی روی مسومیت با مهار کننده‌های کولین استراز، شایع‌ترین علامت مشاهده شده درد شکم (۸۳/۳) درصد)، سپس تهوع و استفراغ (۷۹/۳ درصد) و بعد از آن میوز (۷۲/۳ درصد) بود (۳). در مطالعه‌ای در استرالیا، استفراغ شایع‌ترین علامت بود و اسهال و میوز در رتبه‌های بعدی قرار داشتند (۶). همچنین در تایوان

گروه مسومیت با پایرتروئید ۱۳ نفر (۷/۸ درصد) و در مقابل در گروه مهار کننده‌های کولین استراز ۲۴ نفر (۱۴/۴ درصد) اشکریزش داشتند ولی تفاوت مشاهده شده در حد مرزی معنی‌دار بود ($P = 0.055$)؛ اما سیالوره که در گروه پایرتروئید تنها در ۲۶ نفر (۱۵/۶ درصد) مشاهده شده بود، در گروه مهار کننده‌های کولین استراز در ۶۱ (۳۶/۵ درصد) نفر دیده شد ($P = 0.001$).

وضعیت هوشیاری بیماران دو گروه در جدول ۳ نمایش داده شده است.

بحث

در این مطالعه، شایع‌ترین علایم مسومیت با مهار کننده‌های کولین استراز به ترتیب تهوع، استفراغ، اسهال، میوز، تعریق و سیالوره بود. در مطالعه‌ی دیگری که روی مسومین با مهار کننده‌های کولین استراز انجام شد نیز نتایج مشابهی به دست آمده است (۶). در بررسی دیگری در مورد علایم کلینیکی بیماران مسوم با مهار کننده‌های کولین استراز که نیاز به مراقبت در ICU داشتند، علایم موسکارینی ۸۳ درصد، علایم سیستم عصبی مرکزی ۷۸ درصد و علایم نیکوتینی ۱۷ درصد موارد را تشکیل می‌دادند. شایع‌ترین علامت براق فراوان (۸۳ درصد) بود و پس از آن میوز در ۶۵ درصد موارد مشاهده شد (۴).

سمومیت) باشد. از این رو بهتر است در مطالعات آینده بیماران بیش از ۶ ساعت از نظر بروز علایم تحت بررسی قرار گیرند.

به طور کلی، بر اساس نتایج به دست آمده وجود هیپوتنشن، برادی‌کاردی، تاکی‌پنه، میوز، تعریق، سیالوره، اسهال، بی‌اختیاری ادرار و مدفعه، علایم عضلانی (فاسیکولیشن، ترمور، توییچینگ و ضعف عضلانی) ویز و اختلال سطح هوشیاری به نفع سمومیت با مهار کننده‌های کولین استراز است. اختلاف موجود بین تهوع، استفراغ، کرامپ شکمی، اشک‌ریزش، سردرد، ادم ریه و رال در دو گروه سمومین معنی دار نبود؛ بنابراین این علایم در تفکیک دو نوع سمومیت کمکی نمی‌کند.

شایع‌ترین علایم سمومیت با پایرتروئید عوارض گوارشی با فراوانی ۷۳ درصد گزارش شد (۵).

بیشترین راه سمومیت در این مطالعه راه خوراکی بود؛ این یافته می‌تواند توجیه کننده‌ی بالاتر بودن شیوع تهوع و استفراغ در مطالعه‌ی حاضر باشد. شاید علت تفاوت موجود در شایع‌ترین علایم مشاهده شده بین این مطالعه و تعدادی از مطالعات دیگر، تفاوت بین شدت سمومیت با این سموم باشد و هر چه شدت سمومیت متفاوت باشد، شیوع علایم مشاهده شده نیز تفاوت می‌کند.

شیوع کمتر میوز در سمومیت با مهار کننده‌های کولین استراز نسبت به سایر مطالعات می‌تواند ناشی از بررسی زودرس بیماران (قبل از بروز علایم کامل

References

- Clark RF. Insecticides organophosphate and carbamates. In: Goldfrank L, Flomenbaum N, Lewin N, Howland MA, Hoffman R, Nelson L. Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 7th ed. Chicago, IL: McGraw-Hill Professional; 2002. p. 1346-74.
- Ahmadi H. Investigating organophosphate insecticide poisoning and its treatment. The Scientific Journal of 1994; 2(5-5): 10-6.
- Exner CJ, Ayala GU. Organophosphate and carbamate intoxication in La Paz, Bolivia. J Emerg Med 2009; 36(4): 348-52.
- Lee P, Tai DY. Clinical features of patients with acute organophosphate poisoning requiring intensive care. Intensive Care Med 2001; 27(4): 694-9.
- Yang PY, Lin JL, Hall AH, Tsao TC, Chern MS. Acute ingestion poisoning with insecticide formulations containing the pyrethroid permethrin, xylene, and surfactant: a review of 48 cases. J Toxicol Clin Toxicol 2002; 40(2): 107-13.
- Emerson GM, Gray NM, Jelinek GA, Mountain D, Mead HJ. Organophosphate poisoning in Perth, Western Australia, 1987-1996. J Emerg Med 1999; 17(2): 273-7.
- Khayyam A. The correlation between the frequency of cardiovascular symptoms in organophosphate poisoning on arrival at Noor Hospital with other symptoms and prognosis of poisoning cases. [Thesis]. Isfahan: School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences; 2007.

Clinical Signs of Poisoning with Pyrethroid and Cholinesterase Inhibitors*

Farzad Gheshlaghi MD¹, Zohreh Sedighinia MD²

Abstract

Background: Due to the similarities between clinical signs of toxicity with pyrethroids and cholinesterase inhibitors, if the mistake between these two was made and the patient was treatment with atropine, severe atropine poisoning and even death could occur. This study was conducted to compare the clinical signs of two types of poisoning.

Methods: In this cross-sectionsl study, 167 patients with pyrethroids poisoning and 167 patients with cholinesterase inhibitors poisoning refered to Noor hospital, Isfahan were assessed. The patients were selected by simple sampelling method and were clinically examined.

Finding: The mean age of patients with pyrethroids poisoning was 22.47 and of patients with cholinesterase inhibitors poisoning was 28.80 years. In both groups, men were more than women and poisoning by eating was the most prevalent way. The intentional cases were more than accidental ones. The most prevalent signs of cholinesterase inhibitors poisoning were nausea (68.9%), vomiting (43.1%), diarrhea (43.1%), myosis (40.7%), sweating (38.3%) and sialorrhea (36.5%) respectively; also, the most prevalent signs of pyrethroids poisoning were nausea (74.9%), vomiting (61.7%), abdominal cramp (20%), sialorrhea (15.6%), and muscle weakness (12.6%) respectively.

Conclusion: Based on this study, the difference between these two types of poisoning symptoms can help the differential diagnosis.

Key words: Clinical symptoms, Toxicity, Pyrethroid, Cholinesterase inhibitors

* This paper derived from a Medical Doctorate thesis in Isfahan University of Medical Sciences.

¹ Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

² Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

Corresponding Author: Farzad Gheshlaghi MD, Email: gheshlaghi@med.mui.ac.ir