

فراوانی فلجهای منفرد اعصاب محركهی چشم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان

دکتر حسن رزمجو^۱، دکتر مسعود اعتمادی فر^۲، زهرا السادات ابطحی^۳

دکتر سید محمد علی ابطحی^۳، سید حسین ابطحی^۳

خلاصه

مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) به عنوان اصلی‌ترین علت ناتوانی عصبی در بالغین جوان محسوب می‌شود. تا امروز، شیوع دقیق فلجهای حرکتی چشم ناشی از درگیری اعصاب سوم، چهارم و ششم مغزی، در جمعیت مبتلا به MS در کشورمان به دقت ارزیابی نشده است. هدف این مطالعه بررسی شیوع فلجهای این اعصاب در مبتلایان به MS بود.

روش‌ها: این مطالعه به روش گذشته نگر و بر روی بیماران ثبت نام شده در انجمن MS اصفهان تا پایان مرداد ماه ۱۳۸۹ (۳۵۲۲ بیمار مبتلا به MS) (MS) انجام شد. برای کشف موارد فلجهای منفرد اعصاب محركهی چشم، تمامی مراجعات مربوط به ۳۵۲۲ بیمار این مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: در میان ۳۵۲۲ بیمار مبتلا به MS در این مرکز ۷۶ نفر (۲/۱۵ درصد) سابقه‌ی فلجهای منفرد اعصاب محركهی چشم را داشتند. در ۳۲ نفر (۹۱/۰ درصد) آن‌ها این علامت، اولین علامت بروز بیماری بود. تفاوت معنی‌داری بین فراوانی بروز این علامت به عنوان علامت شروع (۹۱ درصد) و سیر بیماری (۱/۲۴ درصد) وجود نداشت ($P = 0.19$). فلجهای عصب ابدوسنس شایع‌ترین فلجهای منفرد اعصاب محركهی چشم با درگیر کردن ۵۶ نفر (۱/۵۹ درصد) بود. فراوانی فلجهای اعصاب سوم (۵۱/۰ درصد) و زوج چهارم (۵/۰ درصد) بود. از میان ۷۶ نفری که فلجهای منفرد اعصاب محركهی چشم داشتند تنها ۳۰ بیمار در بررسی MRI ساقه‌ی مغز دارای پلاک بودند.

نتیجه‌گیری: گرچه درگیری ساقه‌ی مغز در طول سیر بیماری MS شایع است، اما فراوانی فلجهای منفرد اعصاب محركهی چشم در بیماران MS به نظر بسیار اندرک بوده است و تنها در کمتر از ۱ درصد موارد اولین علامت در ابتدای بیماری MS است.

وازگان کلیدی: فلجهای منفرد اعصاب محركهی چشم، مولتیپل اسکلروز، فراوانی، اصفهان، ایران.

موسوم به پلاک‌های MS است (۲-۴). این بیماری، موجب بروز طیف گسترده‌ای از علایم می‌شود که در این میان مشکلات حرکتی چشم، به عنوان یکی از مهم‌ترین علایم و نشانه‌ها چه در آغاز بیماری و چه در سیر آن محسوب می‌شوند. گستره‌ی عظیمی از انواع پلاک‌ها مسئول ایجاد این دسته از مشکلات هستند. بر اساس محل قرارگیری پلاک‌ها نسبت به هسته‌های

مقدمه

بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) به عنوان اصلی‌ترین عامل ناتوانی عصبی در بالغین جوان محسوب می‌شود (۱). پاتوفیزیولوژی این سندرم شامل حملات خود ایمنی و ایجاد التهاب در دستگاه عصبی مرکزی و در نتیجه، دمیلینه شدن رشته‌های دستگاه عصبی مرکزی و تولید اسکارهایی

* این مقاله هاصل پایان نامه‌ی دوسری دکترای هرفة‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

^۱ استاد، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

^۲ استاد، گروه بیماری‌های اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

^۳ دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

^۴ دستیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

گرفته شد. تمامی اطلاعات مورد نیاز این طرح، پس از اطمینان از قطعیت رضایت کتبی بیماران برای مشارکت در آن، جمع آوری شد. سپس اطلاعات این بیماران، شامل سن کنونی، جنس، سن شروع MS، مدت ابتلای به MS، مدت زمانی که اطلاعات بیمار در پایگاه ثبت شده بود، نوع الگوی MS شامل پیشرونده‌ی اولیه (Primary progressive)، پیشرونده‌ی ثانویه (Secondary progressive) یا فروکش کننده (Relapsing remitting) یا (RR)،^(۴) یافته‌های رادیولوژی و کیفیت تمامی علایمی که بیمار از اولین تا آخرین حمله تجربه کرده بود ثبت شدند. سپس بیماران بر اساس نوع فلج منفرد چشمی به سه دسته‌ی درگیری منفرد عصب سوم مغزی، درگیری منفرد عصب چهارم معزی و درگیری منفرد عصب ششم مغزی تقسیم شدند. به علاوه، بیماران بر اساس دو طرفه یا یک طرفه بودن گرفتاری عصب و نیز بر اساس بروز فلج حرکتی چشم به عنوان اولین علامت یا علامت عود بیماری نیز تقسیم شدند. اطلاعات در نهایت برای آنالیز وارد نرم افزار PASW نسخه‌ی ۱۸ شد.

یافته‌ها

در میان ۳۵۲۲ بیمار مبتلا به MS در اصفهان ۷۶ نفر (۲/۱۵ درصد) سابقه‌ی فلح منفرد اعصاب محركه‌ی چشم را داشتند. در این میان فلح حرکتی چشم اولین علامت بیماری در ۳۲ نفر (۰/۹۱ درصد) بود و در ۴۴ بیمار دیگر (۱/۲۴ درصد) این علامت در سیر بیماری بروز کرده بود. تفاوت معنی داری بین فراوانی بروز این علایم به عنوان علامت شروع (۰/۹۱ درصد) و سیر بیماری (۱/۲۴ درصد) وجود نداشت ($P = 0/19$).^(P)

فلج عصب ابدولسنس شایع ترین فلح منفرد اعصاب محركه‌ی چشم با درگیر کردن ۵۶ نفر (۱/۵۹ درصد)

ساقه‌ی مغز می‌توان آن‌ها را به چهار گروه کلی فوق هسته‌ای، هسته‌ای، زیر هسته‌ای و بین هسته‌ای تقسیم کرد (۵، ۶-۲). اعصاب مغزی شماره‌ی سه، چهار و شش مسؤول حرکات کره‌ی چشم هستند (۶).

پلاک‌های هسته‌ای و زیر هسته‌ای مسؤول بروز علایم فلح چشمی ناشی از اختلال این اعصاب مغزی هستند. محل ایجاد این اختلالات می‌تواند از منشأ آن‌ها (یعنی هسته‌های اکولوموتور و تروکلئار در مغز میانی و هسته‌ی ابدولسنس در پل مغزی) تا رشتلهای این اعصاب در جسم ساقه‌ی مغز و حتی ریشه‌ی خروجی این اعصاب از ساقه‌ی مغز باشد (۶-۹).

تا به امروز مطالعات اندکی که بر روی فراوانی درگیری منفرد اعصاب مغزی در بیماری MS صورت گرفته بر روی جمعیت کشورهای ایالات متحده، ژاپن، و غرب اروپا بوده است (۱۰-۱۳)،^{(۱)، (۲)، (۵)، (۷)} و گزارشی از جمعیت کشورهای خاورمیانه از جمله ایران وجود ندارد.

در صورتی که فراوانی دقیق فلح حرکتی چشم ناشی از درگیری اعصاب سوم، چهارم و ششم مغزی، در جمعیت MS کشورمان به دقت ارزیابی شود، ارزش وجود این فلح در تشخیص و ارزیابی بیماران قابل لمس خواهد بود. لازم به ذکر است که این مطالعه بزرگ‌ترین مطالعه از نظر حجم نمونه در این زمینه است. این مطالعه در صدد توصیف مشخصات و فراوانی فلجهای منفرد اعصاب محركه‌ی چشم بیماران MS اصفهان بود.

روش‌ها

این مطالعه به روش گذشته‌نگر انجام شد. در انجمان MS از همه‌ی بیماران امضای فرم رضایت‌نامه‌ی کتبی

از میان ۷۶ نفری که فلجهای منفرد اعصاب محركه‌ی چشم را بروز داده بودند تنها ۳۰ بیمار در بررسی ساقه‌ی مغز (MRI) Magnetic resonance imaging دارای پلاک بودند (جدول ۳).

بود. رتبه‌ی دوم مربوط به عصب شماره‌ی سوم با فراوانی ۱۸ نفر (۵۱٪ درصد) بود. درگیری عصب چهارم در دو بیمار (۵٪ درصد) دیده شد. سایر ویژگی‌های کلینیکی این بیماران در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده‌اند.

جدول ۱. ویژگی‌های بیماری در بیماران مورد مطالعه به تفکیک عصب درگیر فلجهای منفرد اعصاب محركه‌ی چشم

الگوی MS			سمت درگیری			تعداد بیماران			فلج فراوانی		عصب درگیر
RR تعداد	SP تعداد	PP تعداد	راست تعداد	چپ تعداد	زن تعداد	مود تعداد	درگیر تعداد	(درصد) تعداد	فراءانی	فلج	
۱۶	۲	۰	۱۰	۸	۱۱	۷	۱۸	(۲۳/۶۸)	عصب سوم		
۱	۱	۰	۰	۲	۱	۱	۲	(۲/۶۴)	عصب چهارم		
۵۲	۶	۰	۲۹	۲۷	۴۳	۱۳	۵۶	(۷۳/۶۸)	عصب ششم		
۶۹	۹	۰	۳۹	۲۷	۵۵	۲۱	۷۶		کل		

Primary progressive :PP (پیشرونده‌ی اولیه) Secondary progressive :SP (پیشرونده‌ی ثانویه)
Relapsing remitting :RR (پیشرونده‌ی فروکش کننده)

جدول ۲. فراوانی، سن بروز و مدت ابتلاء به مولتیپل اسکلروزیس در مبتلایان به انواع فلجهای منفرد اعصاب محركه‌ی چشم به تفکیک زمان بروز فلجهای

نوع فلجهای	بروز فلجهای	تعداد بیماران	سن شروع MS	مدت پی‌گیری
			سال	سال
فلجهای منفرد عصب سوم	MS اولیه	۸	۳۰/۷۵	۳/۳۲
فلجهای منفرد عصب چهارم	MS عود	۱۰	۳۰/۳۷	۷/۹۵
فلجهای منفرد عصب ششم	MS اولیه	۰	.	.
فلجهای منفرد عصب ششم	MS عود	۲	۳۱/۵	۱۲/۱۲
فلجهای منفرد عصب ششم	MS اولیه	۲۴	۲۶/۴۳	۳/۶۴
فلجهای منفرد عصب ششم	MS عود	۳۲	۲۵/۹۰	۶/۵۵

جدول ۳. فراوانی وجود یا عدم وجود پلاک در ساقه‌ی مغز در MRI بیماران به تفکیک عصب درگیر

عصب درگیر	تعداد بیماران	وجود پلاک ساقه‌ی مغز در MRI	عدم وجود پلاک ساقه‌ی مغز در MRI	تعداد
عصب سوم	۱۸	۶	۱۲	۱۲
عصب چهارم	۲	۱	۱	۱
عصب ششم	۵۶	۲۳	۳۳	۳۳
کل	۷۶	۳۰	۴۶	۴۶

بحث

شده است (۱۰)، مطالعات دیگری شیوع فلچ سوم و چهارم را مشابه ارزیابی کردند (۱). در مطالعه‌ی ما کمترین فراوانی فلچ‌های منفرد اعصاب ساقه‌ی مغز، مربوط به عصب زوج چهارم مغزی (تروکلثار) بود. این پدیده با توجه به کم بودن همراهی مسیر عبور این عصب با میلین در ساقه‌ی مغز قابل توجیه است.

در مطالعات گذشته، فراوانی مثبت بودن MRI از نظر آسیب‌های ساقه‌ی مغز در بیماران MS با درگیری منفرد اعصاب مغزی، با مقادیر بسیار اندک گزارش شده است. در مطالعه‌ی Thomke و همکاران این مقدار برابر $21/4$ درصد گزارش شده است. در مطالعه‌ی ما نیز تنها ۳۰ بیمار از بین ۷۶ بیمار دارای پلاک‌های ساقه‌ی مغز بودند (۱۰). از طرف دیگر، در مطالعات بر روی کل جامعه گفته شده است که MS علت $4-9$ درصد کل فلچ‌های یک طرفه‌ی عصب ششم است (۱۷-۱۸).

همچنین تا به امروز سه مطالعه‌ی بزرگ گذشته نگر با بررسی علت درگیری عصب سوم در جامعه نشان داده‌اند که $1/7$ درصد این بیماران دچار MS بوده‌اند (۱۱). باید گفت که در کل چنین نتایجی بسیار پر اهمیت هستند؛ چرا که امروزه اختلاف نظرهای بسیاری در مورد ارزش استفاده‌ی از MRI ساقه‌ی مغز در بیماران دچار فلچ‌های اعصاب $4, 3$ و 6 مغزی وجود دارد. پیشنهاد ما، انجام MRI در تمامی این موارد و به خصوص بالغین جوان است؛ چراکه به این ترتیب امکان عدم تشخیص علل پر اهمیت فلچ اعصاب مغزی همچون بیماری MS بسیار اندک خواهد بود.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان از مهندس مجتبی اکبری به خاطر نظارت آماری در این طرح تشکر می‌کنند.

گرچه درگیری ساقه‌ی مغز در سیر بیماری MS شایع است، اما فراوانی فلچ‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران MS با مقادیر بسیار اندک و حتی نادر گزارش شده‌اند (۱۵، ۷، ۵، ۳، ۱). در مطالعه‌ی گذشته‌نگری که توسط Thomke و همکاران انجام شد، فراوانی کل فلچ‌های منفرد اعصاب ساقه‌ی مغز در بیماران مبتلا به MS معادل $1/6$ درصد گزارش شد. در همین مطالعه برای اولین بار پیشنهاد شد که فلچ‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم بیشتر به عنوان علامت اولیه دیده می‌شود (۱۰). جالب است که این یافته در مطالعه‌ی Zadro و همکاران نیز تکرار شد (۱۱)، اگرچه نتایج مطالعه‌ی ما از وجود چنین رابطه‌ای حمایت نمی‌کند. از طرفی لازم به ذکر است، از لحاظ پاتوفیزیولوژیک دلیل قانع کننده‌ای برای توجیه چنین رابطه‌ای وجود ندارد.

عملدهی نتایج مطالعاتی که فراوانی فلچ‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران MS را مورد توجه قرار داده‌اند، حاکی از فراوانی بیشتر فلچ عصب ششم مغزی نسبت به عصب سوم و چهارم هستند (۱۰-۱۲). در مطالعه‌ی Zadro و همکاران فلچ منفرد عصب شماره‌ی شش تنها در 1 درصد کل بیماران ($0/6$ درصد به عنوان علامت اولیه و $0/4$ درصد به عنوان علامت سیر بیماری) مشاهده شد (۱۱). در مطالعه‌ی Thomke و همکاران نیز تنها $0/4$ درصد بیماران این مشکل را به عنوان علامت اولیه بیماری نشان دادند (۱۰). Barr و همکاران نیز همین فراوانی را معادل $0/5$ درصد گزارش کردند (۱۶).

اگرچه در بعضی مطالعات، فلچ عصب چهارم در MS بسیار نادر و کمتر از درگیری عصب سوم گزارش

References

1. Kaur P, Bennett JL. Optic neuritis and the neuro-ophthalmology of multiple sclerosis. *Int Rev Neurobiol* 2007; 79: 633-63.
2. Weinshenker BG, Rice GP, Noseworthy JH, Carriere W, Baskerville J, Ebers GC. The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study. 3. Multivariate analysis of predictive factors and models of outcome. *Brain* 1991; 114 (Pt 2): 1045-56.
3. Pula JH, Reder AT. Multiple sclerosis. Part I: neuro-ophthalmic manifestations. *Curr Opin Ophthalmol* 2009; 20(6): 467-75.
4. McDonald WI, Compston A, Edan G, Goodkin D, Hartung HP, Lublin FD, et al. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. *Ann Neurol* 2001; 50(1): 121-7.
5. Jacobs DA, Galetta SL. Multiple sclerosis and the visual system. *Ophthalmol Clin North Am* 2004; 17(3): 265-73, v.
6. Bianchi-Marzoli S, Brancato R. Third, fourth, and sixth cranial nerve palsies. *Curr Opin Ophthalmol* 1997; 8(6): 45-51.
7. Rucker JC. Efferent visual dysfunction from multiple sclerosis. *Int Ophthalmol Clin* 2007; 47(4): 1-13, x.
8. Miller NR. Multiple sclerosis and related demyelinating diseases. In: Walsh FB, Hoyt WF, Miller NR, Editors. *Walsh and Hoyt's Clinical neuro-ophthalmology*. Philadelphia: Williams & Wilkins; 1995. p. 4324.
9. Savitsky N, Rangell L. The ocular findings in multiple sclerosis. *Res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis* 1950; 28: 403-13.
10. Thomke F, Lensch E, Ringel K, Hopf HC. Isolated cranial nerve palsies in multiple sclerosis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1997; 63(5): 682-5.
11. Zadro I, Barun B, Habek M, Brinar VV. Isolated cranial nerve palsies in multiple sclerosis. *Clin Neurol Neurosurg* 2008; 110(9): 886-8.
12. De Seze J, Vukusic S, Viallet-Marcel M, Tilikete C, Zephir H, Delalande S, et al. Unusual ocular motor findings in multiple sclerosis. *J Neurol Sci* 2006; 243(1-2): 91-5.
13. Tsuda H, Ishikawa H, Matsunaga H, Mizutani T. A neuro-ophthalmological analysis in 80 cases of multiple sclerosis. *Rinsho Shinkeigaku* 2004; 44(8): 513-21.
14. Saadatnia M, Etemadifar M, Maghzi AH. Multiple sclerosis in Isfahan, Iran. *Int Rev Neurobiol* 2007; 79: 357-75.
15. Etemadifar M, Maghzi AH. Sharp increase in the incidence and prevalence of multiple sclerosis in Isfahan, Iran. *Mult Scler* 2011. [Epub ahead of print].
16. Barr D, Kupersmith MJ, Turbin R, Bose S, Roth R. Isolated sixth nerve palsy: an uncommon presenting sign of multiple sclerosis. *J Neurol* 2000; 247(9): 701-4.
17. Rush JA, Younge BR. Paralysis of cranial nerves III, IV, and VI. Cause and prognosis in 1,000 cases. *Arch Ophthalmol* 1981; 99(1): 76-9.
18. Rucker CW. The causes of paralysis of the third, fourth and sixth cranial nerves. *Am J Ophthalmol* 1966; 61(5 Pt 2): 1293-8.