

بررسی اثر و مکانیسم عمل IGF-1 و IGFBP-3 در بروز سرطان پستان انسان: مروز سیستماتیک

عماد خدادادی^۱, نگار عطایی^۲, دکتر محمدرضا مفید^۳

مقاله مروزی

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین بدخیمی در زنان ایرانی است. مطالعات نشان داده‌اند که سطح بالای (IGF-1) و غلظت پایین ۳ (IGFBP-3) در خون و یا نسبت بالای IGF-1 به IGFBP-3 می‌تواند به عنوان یک عامل پیش‌آگهی از سرطان پستان به کار رود.

روش‌ها: با بررسی کلیه اطلاعات موجود در Ncbi-Pubmed بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۳ ارتباط بین IGF و سرطان پستان تحت بررسی مروزی قرار گرفت.

یافته‌ها: از مجموع ۱۱۸۸ مقاله که کلیدواژه‌های مورد جستجوی ما را در برداشت و به بررسی IGF-1 در سرطان پستان پرداخته بودند، ۴۶ مقاله ارتباط آن را با سرطان پستان به طور مستقیم و در عنوان مقاله نشان داده بودند، ۹۲ مقاله ارتباط IGF-1 و IGFBP-3 با سرطان پستان بررسی کرده بودند که ۹ مورد آن‌ها مقالات مروزی بود. از این میان، ۳۰ مقاله به عنوان مرجع اصلی انتخاب و بررسی شدند.

نتیجه‌گیری: مطالعات نشان دادند که بیان زن IGF-1 در افراد مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم افزایش می‌یابد. ۱۰۰٪ دارای اثرات میتوژنیکی و آنتی‌آپوپوتیکی باست و بدین ترتیب سبب افزایش خطر بروز سرطان پستان می‌شود. عمل رشد، تکثیر و تومورزایی IGF-1R صورت می‌گیرد و IGFBP-3 عمل IGF-1 را با جلوگیری از اتصال آن به گیرنده سطحی IGF-1R مهار می‌کند و از این طریق با عمل میتوژنی IGF-1 مقابله می‌نماید. همچنین IGFBP-3 با اتصال به پروتئین‌های خاص غشاء، موجب آپوپتوز می‌شود و در نتیجه رشد سلولی را مهار می‌کند.

وازگان کلیدی: سرطان پستان، IGF-1، IGFBP-3

ارجاع: خدادادی عماد، عطایی نگار، مفید محمدرضا. بررسی اثر و مکانیسم عمل IGF-1 و IGFBP-3 در بروز سرطان پستان انسان: مروز سیستماتیک. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ۱۳۹۲؛ ۳۱(۲۵۴): ۱۵۶۷-۱۵۶۰

مقدمه

با وجود پیشرفت‌هایی که در زمینه‌ی تشخیص و پیشگیری از بیماری‌ها در علم بهداشت صورت گرفته است، آمار انجمن سرطان آمریکا نشان می‌دهد که

۵۶۵۴۶۹ آمریکایی در سال ۲۰۰۸ جان خود را به دلیل سرطان از دست داده‌اند (۱) در سال ۲۰۱۲ سرطان پستان به تنها ۲۹ درصد (۲۲۶۸۷۰ مورد) علل ایجاد سرطان‌های جدید در زنان آمریکایی بود

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۲- دانشجوی دکتری، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۳- استادیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

Email: mofid@pharm.mui.ac.ir

نویسنده‌ی مسؤول: دکتر محمدرضا مفید

تکثیر، تمایز، آپیتووز و ترانسفورماسیون دارد و به صورت آندوکرین، اتوکرین و پاراکرین عمل می‌کند (۴). مطالعه‌ی مروری حاضر به ارتباط بین سرطان پستان با IGF-1 و IGF-BP-3 می‌پرداخت.

روش‌ها

با دادن کلیدواژه‌های IGF Binding Protein-3، IGF-1 و Breast cancer و کلیه‌ی مقالات موجود در Ncbi-Pubmed بین سال‌های ۱۹۸۷-۲۰۱۳ مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات موردن‌شاهدی، کوهورت و مشاهده‌ای و مروری، در این مرور سیستماتیک، در نظر گرفته شد.

هدف اصلی، بررسی ارتباط IGF-1 و IGFBP-3 با سرطان پستان و مکانیسم عمل آن‌ها بود.

مافته‌ها

از مجموع ۱۱۸۱ مقاله که به بررسی اثر IGF-1 در سرطان پستان پرداخته بودند، ۴۶ مقاله ارتباط آن را با سرطان پستان به طور مستقیم و در عنوان مقاله نشان داده بودند که ۳ مورد آن‌ها مقالات مرویری بودند. ۹۲ مقاله ارتباط IGF-1 و IGFBP-3 را با سرطان پستان بررسی کرده بودند و ۹ مورد آن‌ها مقالات مرویری بودند (جدول ۱). از این میان، با توجه به کلیدواژه‌های مورد نظر، ۳۰ مقاله به عنوان مرجع اصلی انتخاب شدند و بررسی گردیدند.

دحث

هورمون رشد (GH) توسط هیپوفیز قدامی تولید می‌شود. این هورمون برای رشد در دوران پس از تولد و متابولیسم طبیعی بدن ضروری است^(۶).

(۱). عوامل زیادی نظیر استروژن‌ها، نوع تغذیه، سیگار، فلزات سنگین نظیر کادمیوم و عوامل متعدد دیگری در بروز سرطان پستان دخیل هستند(۲).

از جمله عواملی که در سال‌های اخیر مورد بحث (Insulin growth factors) و مطالعه قرار گرفته‌اند، IGFs می‌باشند. مطالعات نشان می‌دهند که بیان ژن IGF-1 در افراد مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم افزایش می‌یابد و همچنین خطر این سرطان در مقایسه با افراد مبتلا به IGFBP-3 (Insulin like growth factor binding protein 3) کاهش می‌یابد (۳).

این سیستم از سه بخش هورمون های پلی پپتیدی (IGFBPs)، پروتئین های اتصالی (IGF-1، IGF-2، IGF-1R) و گیرنده ها (IGF-2R) تشکیل شده است. GFs پروتئین هایی هستند که در پاسخ به هورمون رشد هیپوفیزی، توسط کبد تولید می شوند (۴) و برای انتقال از خون به بافت های هدف به پروتئین های خاصی به نام پروتئین های اتصالی (IGFBPs) به IGF، متصل می شوند. IGFBPs در تنظیم باز گردش IGF موجود در خون نقش دارند، می توانند به عنوان ممانعت کننده، تحریک کننده، حامل و یا ذخیره کننده IGF-1 عمل نمایند. ۶ نوع پروتئین اتصالی به IGFs وجود دارد که IGFBP-3 اصلی ترین آن ها است و بیش از ۸۰ درصد پروتئین های اتصالی را به خود اختصاص می دهد (۵). این پلی پپتیدها (IGF-2، IGF-1)، مسؤول رشد و توسعه‌ی بافت های سوماتیک مانند عضله‌ی اسکلتی و استخوان می باشند که این اثرات را از طریق گیرنده های سطحی IGF-1R اعمال می کنند. IGF نقش مهمی در تنظیم

جدول ۱. مربوط به استراتژی جستجو در Ncbi-Pubmed

استراتژی جستجو	تعداد مقالات یافته شده
IGF-1 AND "Breast cancer"	۱۱۸۸
IGF-1 [ti] AND "Breast cancer" [ti]	۴۶ مقاله و ۳ مروری
IGF-1 [ti] OR IGF binding protein-3 AND "Breast cancer" [ti]	۹۲ مقاله و ۹ مروری
IGF-1: Insulin like growth factor-1	

شده‌اند (۹). مطالعات نشان می‌دهند که سطح بالای IGF-1 و IGFBP-3 IGF-1 پایین و یا نسبت بالای IGF-1 به IGFBP-3 می‌تواند به عنوان یک شاخص پیش‌آگهی در برخی از سرطان‌ها باشد (۶). محققان دریافتند که بروز سرطان‌های پستان، پروستات، کولون، معده، کبد، پانکراس، تخمدا، تیروئید، مغز و رحم در افرادی که مبتلا به کمبود مادرزادی هورمون رشد و سطح پایین IGF-1 می‌باشند، در مقایسه با افراد سالم، پایین‌تر است (۱۰-۱۱). مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان می‌دهند که بروز سرطان پستان در زنان مبتلا به آکرومگالی به علت داشتن IGF-1 بالا در مقایسه با زنان غیر مبتلا، بالاتر است (۱۲). برخی بررسی‌ها مشخص کردند افزایش غلظت‌های IGF-1 با افزایش خطر سرطان پستان در زنان بالای ۵۰ سال همراه است (۱۳). همچنین برخی آزمایشات بالینی نشان دادند که IGF-1 و انسولین، عوامل خطر آندوکرینی سرطان پستان هستند اما اثرات آنتی‌آبوبیتیکی و میتوژنیکی IGF-1 قوی‌تر از انسولین می‌باشد (۱۴).

عمل رشد، تکثیر و تومورزاکی IGF-1 به واسطهٔ IGF-1R صورت می‌گیرد. این گیرنده در همهٔ سلول‌ها به استثنای هپاتوسیت و لنفوسیت‌های T بیان می‌شود و یک فاکتور ضروری برای رشد است. سلول‌هایی که IGF-1R جهش یافته را بیان می‌کنند

اثرات مربوط به رشد این هورمون به طور عمده از طریق فاکتورهای رشد شبه انسولینی (IGF-1 و IGF-2) که جزء گروه ژنی ترکیبات مشابه انسولین هستند، اعمال می‌شود. IGF-1 یک پپتید تک زنجیر با ۷۰ اسید آمینه است. غلظت IGF-1 در گردش خون تقریباً ۱ میکروگرم در میلی‌لیتر است و کبد محل اصلی تولید آن می‌باشد اما در بافت‌های دیگر مانند بافت پستان هم تولید می‌شود. تنظیم کبدی تولید IGF-1 توسط هورمون رشد و انسولین صورت می‌گیرد (۴).

انتقال IGF-1 در خون و رسیدن آن به بافت هدف توسط IGFBP صورت می‌گیرد که به طور اختصاصی به IGF-1 متصل می‌شود. ۶ نوع IGFBP در بدن انسان شناخته شده است و ۸۰ درصد آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، این پروتئین نقش حامل IGF-1 را در بدن ایفا می‌کند (۷). بیش از ۹۰ درصد IGF-1 موجود در بدن به (۱) نسبت ۱ به ۱) متصل می‌شود. IGFBP-3 توسط IGFBP-3 Protease تجزیه می‌گردد (۶).

IGFs و سرطان

سیستم IGF در شرائط پاتوفیزیولوژیکی مختلفی دخیل است و نقش مهمی در تومورزاکی دارد (۸). اولین مطالعات اپیدمیولوژیک بررسی ارتباط بین IGF-1 و IGFBP-3 با سرطان، در سال ۱۹۹۰ منتشر

mekanisem وابسته به IGF و مستقل از IGF اعمال می‌کند (۱۹، ۲۵)، IGFBP-3 عمل IGF-1 را با جلوگیری از اتصال آن به گیرنده سطحی IGF-1R مهار می‌کند و در نتیجه با عمل میتوژنی IGF-1 مقابله می‌نماید (۲۰).

همچنین در مطالعه‌ی صورت گرفته توسط Yu و همکاران مشاهده شد که IGF-3 آزاد هم می‌تواند رشد سلولی سرطان پستان را مهار کند، زیرا دارای گیرنده‌ی غشایی ویژه‌ای است که سبب بروز اثرات مستقل از IGF می‌شود (۳، ۲۶).

IGFBP-3 به عنوان لیگاندی برای گیرنده‌های X رتینوئید (RXR) و اسید رتینوئیک (RAR) عمل می‌کند، این پروتئین از طریق انتهای کربوکسیل خود به RAR/RXR اتصال می‌یابد (۴). در سلول‌های سرطان پستان انسانی MCF7، IGFBP-3 فسفوتیروزین فسفاتاز را فعال می‌کند و باعث دفسفریله کردن IGF-1R می‌شود و از این طریق می‌تواند مسیر سیگنالینگ را قطع کند (شکل ۱) (۲۷). برخی مطالعات نشان می‌دهد که در مکانیسم مستقل از IGF، اتصال IGFBP-3 به پروتئین‌های غشای ویژه از طریق P53 موجب آپوپتوز می‌شود (۲۱). همچنین Yamanaka و همکاران مشاهده کردند که IGFBP-3 به وسیله‌ی تومور ساپرسور ژن P53 تحریک می‌گردد و IGFBP-3 در مسیر سیگنالینگ P53، یک مدیاتور است (۲۱). به علاوه (Transforming growth factor- β) TGF- β به واسطه‌ی IGFBP-3 اعمال می‌شود (۲۵). با توجه به تومورزاوی سیستم IGF، تداخل‌های دارویی برای این سیستم در حال بررسی است و استراتژی‌های گوناگونی مانند کاهش تولید لیگاند

قدرت تومورزاوی ندارند (۱۸-۱۵).

IGF-1 با اتصال به IGF-1R، فعالیت تیروزین کینازی آن را فعال می‌کند و این عمل باعث تشکیل آبشارهای سیگنالی داخل سلولی می‌شود. دو مسیر سیگنالی (Ras/Raf/mitogen activated protein kinase) (Phosphoinositide 3-kinase و MAPK PI3K/Akt) بیشترین نقش را در خاصیت میتوژن و تومورزاوی IGF-1 دارند (۱۹-۲۰). طی این مسیرهای سیگنالی با تحریک بیان سیکلین D1 باعث افزایش سنتز DNA می‌شود و به دنبال آن، پیشرفت چرخه‌ی سلولی از فاز G1 به S تسریع می‌گردد (۱۴). همچنین IGF-1 بیان پروتئین‌های دخیل در آپوپتوز را تغییر می‌دهد و سبب افزایش بیان Bcl و کاهش بیان Bax در مسیر آپوپتوز می‌شود. بدین ترتیب مقدار Bcl/Bax افزایش می‌یابد و مسیر آپوپتوز مهار می‌شود. به این ترتیب اثرات میتوژنیکی و آنتی‌آپوپتیکی، IGF-1 سبب افزایش خطر ابتلاء به سرطان پستان خواهد شد (۷).

در مقابل اثر IGF، IGFBP تولیدشده توسط سلول‌های سرطان پستان، می‌توانند سنتز DNA در فیبروبلاست‌های کشت داده شده را مهار کنند و با اثرات IGF در سلول‌های ترانسفورم شده تداخل نمایند (۲۱). Ibrahim و همکاران نشان دادند که IGFBP-3 اگزوژن خصوصیات ضد توموری تاکسول را افزایش می‌دهد (۲۲). تاکسول را می‌توان مهم‌ترین داروی ضد سرطانی دانست که تاکنون شناسایی شده است و یکی از مهم‌ترین داروهای ضد سرطان حال حاضر جهان می‌باشد که از گیاه سرخ دار به دست می‌آید (۲۳-۲۴).

IGFBP-3 نقش خود در سرطان پستان را با دو


توجه در سرطان پستان می‌باشد تلاش‌هایی برای تولید مؤثر آن در پلاسمیدهای باکتریایی انجام گردیده است (۲۸).

آنالوگ IGFBP کاندیداتور مناسبی برای درمان سرطان می‌باشد (۲۹). فاکتورهای مهارکننده رشد سلول‌های سرطانی مانند TGF-B (Transforming growth factor-B)، اسید رتینوبیک و آنتی استروژن‌ها اثر خود را به وسیله‌ی IGFBP-3 اعمال می‌کنند (۱۹). همچنین اندازه‌گیری سطح IGF-1 و IGFBP-3 در سرم و بافت پستان می‌تواند به عنوان یک فاکتور پیش‌آگهی برای تشخیص این سرطان مورد استفاده قرار گیرد (۳۰).

نتیجه‌گیری

مطالعات نشان می‌دهند که بیان ژن IGF-1 در افراد مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم افزایش می‌یابد و سطح بالای IGF-1 و غلظت پایین IGFBP-3 در خون و یا نسبت بالای IGF-1 به IGFBP-3 می‌تواند به عنوان یک شاخص پیش‌آگهی از سرطان سینه به کار رود.

(IGFs)، تداخل در اتصال لیگاندی و یا در فعالیت گیرنده می‌تواند مؤثر باشد. همچنین استفاده از مهارکننده‌های IGFs سبب کاهش سطح آزاد آن‌ها می‌شود و در نتیجه، اثرات میتوژنیکی IGF کاهش می‌یابد. در همین راستا Sciacca و همکاران تلاش کردند با کاهش سطح آزاد IGF-1 سبب افزایش اثر تاموکسیفن در سرطان پستان شوند. برای این کار از آنالوگ سوماتوستاتین (Octreotide) استفاده کردند. اگر چه این کارآزمایی بالینی نتیجه نداد اما احتمال دادند که Octreotide سطح آزاد IGF-1 را کاهش نمی‌دهد (۲۲). استراتژی دیگر، استفاده از آنتی‌بادی‌های مونوکلونال می‌باشد که می‌توانند با شناسایی IGF-1R و خشی کردن IGF-2 و IGF-1 مسیر سیگنالینگ انتقالی را بلوکه کنند (۱۱، ۱۰، ۴). در سال‌های اخیر، استفاده از آنتی‌بادی‌های مونوکلونال نوترکیب و مشتقات آن‌ها به عنوان اهداف درمانی مهمی در سرطان مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند و با وجود هزینه‌های بالای تولید آن‌ها، امروزه روش‌هایی برای تولید به صرفه‌ی آن‌ها ابداع شده‌اند. به طور مثال در مورد داروی هرسپتین که یکی از داروهای مورد



شکل ۱. اثرات متقابل IGF-1 (Insulin like growth factor-1) و IGFBP-3 (Insulin like growth factor binding protein 3) در رشد سلولی

مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به تومورزاوی سیستم IGF و اثرات ضد توموری IGFBP-3، تداخل های دارویی برای این سیستم در حال بررسی است و استراتژی های گوناگون در این زمینه، می تواند در درمان سرطان پستان مؤثر باشد.

تشکر و قدردانی

این تحقیق تحت حمایت مالی ستاد توسعه‌ی فناوری راهبردی سلول‌های بنیادی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت، نویسنده‌گان کمال تشکر خود را از حمایت‌ها و مساعدت‌های انجام‌شده اعلام می‌دارند.

IGF-1 دارای اثرات میتوژنیکی و آنتی‌آپوپتیکی است و بدین ترتیب سبب افزایش خطر سرطان پستان می‌شود، اما IGFBP-3 عمل IGF-1 را با جلوگیری از اتصال آن به گیرنده‌ی سطح سلول، مهار می‌کند و در نتیجه با عمل میتوژنی IGF-1 مقابله می‌نماید، همچنین با اتصال به یک گیرنده‌ی غشایی خاص، می‌تواند سبب بروز اثرات مستقل از IGF می‌شود و رشد سلولی سرطان پستان را مهار کند. در همین رابطه، اندازه‌گیری سطح IGF-1 و IGFBP-3 در سرم و بافت پستان می‌تواند به عنوان یک شاخص پیش‌آگهی برای تشخیص این سرطان

References

1. Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin 2012; 62(1): 10-29.
2. Panjehpour M, Taher MA, Bayesteh M. The growth inhibitory effects of cadmium and copper on the MDA-MB468 human breast cancer cells. J Res Med Sci 2010; 15(5): 279-86.
3. Yu H, Rohan T. Role of the insulin-like growth factor family in cancer development and progression. J Natl Cancer Inst 2000; 92(18): 1472-89.
4. Maki RG. Small is beautiful: insulin-like growth factors and their role in growth, development, and cancer. J Clin Oncol 2010; 28(33): 4985-95.
5. Fletcher O, Gibson L, Johnson N, Altmann DR, Holly JM, Ashworth A, et al. Polymorphisms and circulating levels in the insulin-like growth factor system and risk of breast cancer: a systematic review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005; 14(1): 2-19.
6. Renahen AG, Zwahlen M, Minder C, O'Dwyer ST, Shalet SM, Egger M. Insulin-like growth factor (IGF)-I, IGF binding protein-3, and cancer risk: systematic review and meta-regression analysis. Lancet 2004; 363(9418): 1346-53.
7. Gennigens C, Menetrier-Caux C, Droz JP. Insulin-Like Growth Factor (IGF) family and prostate cancer. Crit Rev Oncol Hematol 2006; 58(2): 124-45.
8. LeRoith D, Roberts CT, Jr. The insulin-like growth factor system and cancer. Cancer Lett 2003; 195(2): 127-37.
9. Jones JI, Clemons DR. Insulin-like growth factors and their binding proteins: biological actions. Endocr Rev 1995; 16(1): 3-34.
10. Orciari S, Di NS, Lazzarini R, Caprari P, Procopio A, Catalano A. The effects of insulin and insulin-like growth factors on tumor vascularization: new insights of insulin-like growth factor family in cancer. Curr Med Chem 2009; 16(30): 3931-42.
11. Yee D. Insulin-like growth factor receptor inhibitors: baby or the bathwater? J Natl Cancer Inst 2012; 104(13): 975-81.
12. Gallagher EJ, LeRoith D. Minireview: IGF, Insulin, and Cancer. Endocrinology. 2011; 152(7): 2546-51.
13. Rinaldi S, Peeters PH, Berrino F, Dossus L, Biessy C, Olsen A, et al. IGF-I, IGFBP-3 and breast cancer risk in women: The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Endocr Relat Cancer 2006; 13(2): 593-605.
14. Gunter MJ, Hoover DR, Yu H, Wassertheil-Smoller S, Rohan TE, Manson JE, et al. Insulin, insulin-like growth factor-I, and risk of breast cancer in postmenopausal women. J Natl Cancer Inst 2009; 101(1): 48-60.
15. Endogenous Hormones and Breast Cancer Collaborative Group, Key TJ, Appleby PN, Reeves GK, Roddam AW. Insulin-like growth factor 1 (IGF1), IGF binding protein 3 (IGFBP3), and breast cancer risk: pooled

- individual data analysis of 17 prospective studies. *Lancet Oncol* 2010; 11(6): 530-42.
- 16.** Sciacca L, Costantino A, Pandini G, Mineo R, Frasca F, Scalia P, et al. Insulin receptor activation by IGF-II in breast cancers: evidence for a new autocrine/paracrine mechanism. *Oncogene* 1999; 18(15): 2471-9.
- 17.** Davison Z, de Blacquiere GE, Westley BR, May FE. Insulin-like growth factor-dependent proliferation and survival of triple-negative breast cancer cells: implications for therapy. *Neoplasia* 2011; 13(6): 504-15.
- 18.** Zhu C, Qi X, Chen Y, Sun B, Dai Y, Gu Y. PI3K/Akt and MAPK/ERK1/2 signaling pathways are involved in IGF-1-induced VEGF-C upregulation in breast cancer. *J Cancer Res Clin Oncol* 2011; 137(11): 1587-94.
- 19.** Liu B, Lee HY, Weinzimer SA, Powell DR, Clifford JL, Kurie JM, et al. Direct functional interactions between insulin-like growth factor-binding protein-3 and retinoid X receptor-alpha regulate transcriptional signaling and apoptosis. *J Biol Chem* 2000; 275(43): 33607-13.
- 20.** Dar AA, Majid S, Nosrati M, de SD, Federman S, Kashani-Sabet M. Functional modulation of IGF-binding protein-3 expression in melanoma. *J Invest Dermatol* 2010; 130(8): 2071-9.
- 21.** Yamanaka Y, Fowlkes JL, Wilson EM, Rosenfeld RG, Oh Y. Characterization of insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3) binding to human breast cancer cells: kinetics of IGFBP-3 binding and identification of receptor binding domain on the IGFBP-3 molecule. *Endocrinology* 1999; 140(3): 1319-28.
- 22.** Ibrahim YH, Yee D. Insulin-like growth factor-I and breast cancer therapy. *Clin Cancer Res* 2005; 11(2 Pt 2): 944s-50s.
- 23.** Abbasi Kajani A, Mofid MR, Abolfazli K, Tafreshi SA. Encapsulated activated charcoal as a potent agent for improving taxane synthesis and recovery from cultures. *Biotechnol Appl Biochem* 2010; 56(2): 71-6.
- 24.** Abbasi Kejani A, Hosseini Tafreshi SA, Khayyam Nekouei SM, Mofid MR. Efficient isolation of high quality nucleic acids from different tissues of *Taxus baccata* L. *Mol Biol Rep* 2010; 37(2): 797-800.
- 25.** Giles ED, Singh G. Role of insulin-like growth factor binding proteins (IGFBPs) in breast cancer proliferation and metastasis. *Clin Exp Metastasis* 2003; 20(6): 481-7.
- 26.** Yu H, Levesque MA, Khosravi MJ, Papanastasiou-Diamandi A, Clark GM, Diamandis EP. Insulin-like growth factor-binding protein-3 and breast cancer survival. *Int J Cancer* 1998; 79(6): 624-8.
- 27.** Samani AA, Yakar S, LeRoith D, Brodt P. The role of the IGF system in cancer growth and metastasis: overview and recent insights. *Endocr Rev* 2007; 28(1): 20-47.
- 28.** Farahmand L, Majidzadeh A, Sepehrizadeh Z, Mofid MR, Esmaeili R, Yazdi MT. Ligation Independent Cloning of Polycistronic, Genetically Modified, HuMAb4D5-8 F (ab') 2, in Bacterial Plasmid. *Avicenna J Med Biotechnol* 2012; 4(1): 15-22.
- 29.** Helle SI. The insulin-like growth factor system in advanced breast cancer. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab* 2004; 18(1): 67-79.
- 30.** LÖNNING PE, Helle SI. IGF-1 and breast cancer. In: *Biology of IGF-1: Its interaction with insulin in health and malignant states*. Novartis Foundation Symposium 262. Chichester, UK: Wiley; 2008.

The Effect and Mechanism of Action of Insulin-Like Growth Factor-1 and Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 in Human Breast Cancer; A Systematic Review

Emad Khodadadi¹, Negar Ataei MSc², Mohammad-Reza Mofid PhD³

Review Article

Abstract

Background: Breast cancer is the most common malignancy in women. Many factors such as estrogens, nutrition, etc. play role in the incidence of this cancer. Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3) are the factors recently considered as components of insulin-like growth factor (IGF) system.

Methods: Studies in this field from 1987 to 2012 by using the databases of NCBI (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>) were analyzed and reviewed.

Findings: 1181 article had examined the effect of IGF-1 in breast cancer. 46 showed a direct association with breast cancer. 92 articles were studied relation of IGF-1 and IGFBP-3 with breast cancer, 9 of them were review articles. Of these, 30 articles were selected as the main references.

Conclusion: Studies have shown that IGF-1 gene expression increases in breast cancer. IGF-1 effects in growth, proliferation and tumor genesis is mediated by IGF-1R. IGFBP3 inhibit IGF-1 effects by preventing its binding to a surface receptor (IGF-1R) and interferes with IGF-1 mitoses action. Also, in a mechanism independent on IGF, IGFBP-3 binds to specific membrane proteins and induces apoptosis and inhibits cell growth.

Keywords: Breast cancer, IGFBP3, IGF-1

Citation: Khodadadi E, Ataei N, Mofid MR. The Effect and Mechanism of Action of Insulin-Like Growth Factor-1 and Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 in Human Breast Cancer; A Systematic Review. J Isfahan Med Sch 2013; 31(254): 1560-7

1- MSC Student, Department of Medical Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2- PhD Student, Department of Medical Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3- Assistant Professor, Department of Medical Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Corresponding Author: Mohammad-Reza Mofid PhD, Email: mofid@pharm.mui.ac.ir