

بیماریهای گیاهی، جلد ۴۲، ۱۳۸۵

بررسی عکس العمل تعدادی از ارقام خیار گلخانه‌ای رایج در ایران

**Meloidogyne incognita*، نسبت به نماتود ریشه گرهی

Responses of some common cucumber cultivars in Iran to root-knot nematode,

Meloidogyne incognita, under greenhouse conditions

شهرزاد صادق موسوی، اکبر کارگریده*

دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعالی سینا و دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

پذیرش ۱۳۸۵/۳/۱۷

دریافت ۱۳۸۴/۴/۲۹

چکیده

عکس العمل ۱۳ رقم و لاین در دسترس خیار گلخانه‌ای در ایران، به نامهای Ps-29033 2201, Spark, Luna F1 Hybrid, Gb, Sina(Rs 24189)F1, Royal 21445, Super Monarch, Rubah Super Dominus, Rz F1 و Vilmorin Zenubia, Danito F1, Vikima-982 (رقم مزرعه‌ای) به همراه یک توده بذر محلی همدانی نسبت به نماتود ریشه گرهی، نژاد یک *Meloidogyne incognita* مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در شرایط گلخانه و در خاک استریل، در دمای بین ۲۲ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گردید. در ارزیابی درجه مقاومت ارقام، ضمن مقایسه روش‌های مختلف ارزیابی مقاومت، از سیستم مبتنی بر دو فاکتور تولید مثل نماتود و میزان آلودگی ریشه (درصد گالدھی) استفاده گردید. نتایج آزمایشات نشان داد که همه ارقام مورد آزمایش نسبت به نژاد یک گونه

* بخشی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول ارائه شده به دانشگاه بوعالی سینا

** مسئول مکاتبه

حساس می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: خیار، گلخانه، نژاد، مقاومت، نماتود ریشه‌گری،
Meloidogyne Cucumis sativus incognita

مقدمه

خیار یکی از سبزیجاتی است که در ایران سطح زیر کشت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. براساس آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۰، سطح زیر کشت این محصول (سال زراعی ۸۱-۸۰) ۷۷۰۸۹ هکتار بوده است. همچنین طبق تخمین سازمان خواروبار جهانی (FAO)، ایران در سال ۲۰۰۴ میلادی با تولید حدود ۱۳۵۰،۰۰۰ تن خیار، بعد از چین و ترکیه مقام سوم جهانی را به خود اختصاص داده است. این گیاه در شرایط آب و هوایی مختلف در فضول مناسب به صورت آزاد، و در پاییز و زمستان درون گلخانه‌های پلاستیکی کشت می‌شود. با توجه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف ایران و همچنین شرایط خاص گلخانه‌ها، این گیاه مورد حمله عوامل مختلف بیماری‌زا از جمله نماتودهای ریشه‌گری قرار می‌گیرد.

نماتودهای ریشه‌گری از نظر اقتصادی از مهم‌ترین نماتودهای پارازیت گیاهی در سطح جهان می‌باشند که به طیف وسیعی از گیاهان حمله می‌کنند (Chen & Roberts 2003). پراکنده‌گی جهانی، وسعت دامنه میزبانی و تعامل با سایر بیمارگرهای گیاهی در کمپلکس‌های بیماری، آنها را به عنوان یکی از پنج عامل درجه اول بیماری‌زا و در رده مهم‌ترین بیمارگرهای گیاهی، که تأمین منابع غذایی جهان را تهدید می‌کنند، قرار داده است. از نظر اقتصادی، چهار گونه *M. hapla*, *M. javanica*, *M. arenaria*, *M. incognita* نماتودهای ریشه‌گری به کشاورزی محسوب می‌شوند. نماتودهای ریشه‌گری کاهشی حدود پنج درصد از کل تولیدات محصولات کشاورزی در سطح جهان را باعث شده و یکی از عمدت‌ترین موانع تولید غذای مناسب در خیلی از کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید. این جانوران انگل داخلی ساکن بوده و به بیش از ۲۰۰۰ گونه گیاهی حمله کرده و اغلب ارتباط غذایی پیچیده و اختصاصی را با میزبان‌های خود ایجاد کرده می‌کنند.

.(Hussey & Janssen 2002)

گونه *M. incognita* یکی از گونه‌های رایج در تمام مناطق دنیاست که در دامنه جغرافیایی وسیع‌تری نسبت به سایر گونه‌ها (قریباً) از عرض ۴۰ درجه شمالی تا عرض ۳۳ درجه جنوبی)، گسترش داشته و دارای میزان‌های بسیار زیادی است. میانگین دمای سالیانه مناسب برای فعالیت این نماتود بین ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد است، ولی بیشترین جمعیت نماتود در دمای ۲۴ تا ۳۰ درجه دیده می‌شود. میانگین دمای گرمترین ماه سال در مناطق فعالیت این نماتود ۲۷ درجه است. این گونه عمدها به همراه *M. javanica* یافت می‌شود .(Eisenback & Triantaphyllou 1991)

تاکنون علاوه بر چهار گونه اصلی نماتودهای ریشه گرهی که قبلاً از مناطق مختلف ایران گزارش شده است (خیری، ۱۹۷۲؛ باروتی، ۱۹۷۴؛ ایوردی و همکاران، ۱۹۷۹؛ اخیانی و همکاران، ۱۹۸۴؛ معافی و مهدویان، ۱۹۹۷) سه گونه دیگر نیز به نام‌های *M. cruciani* Garcia- Chitwood in *M. microcephala* Cliff & Hirschmann, 1984 Martinez, 1982 و *M. thamesi* Chitwood, Specht & Havis, 1952 از چند منطقه شناسایی گردیده است (مهدیخانی مقدم و همکاران، ۲۰۰۳). براساس منابع فوق، به ترتیب گونه‌های *M. javanica* و *M. incognita* در ایران بوده و تاکنون نژادهای دو و چهار گونه دوم در ایران شناسایی گردیده است (اخیانی و همکاران، ۱۹۸۴؛ ماننی و همکاران، ۱۹۹۵a؛ معافی و مهدویان، ۱۹۹۷؛ سجودی و همکاران، ۲۰۰۲).

نظر به گسترش جغرافیایی، دامنه میزانی و اهمیت نماتودهای ریشه گرهی، کترل آنها امری اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به اینکه اغلب روش‌های کترول کارایی لازم را نداشته و یا در بعضی موارد نظیر مبارزه شیمیایی برای سلامتی انسان و محیط زیست مضر شناخته شده‌اند، لذا شناسایی و استفاده از ارقام مقاوم به عنوان یکی از اقتصادی‌ترین و بی‌خطرترین روش‌های مدیریتی امری لازم و ضروری است .(Starr et al. 2002).

طبق مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر، برخی از ارقام خیار معمولی (*Cucumis sativus* L.) و خیار آفریقایی (*C. metuliferus* Naud.) درجاتی از مقاومت نسبت به نماتودهای ریشه گرهی از خود نشان داده‌اند (Walters et al. 1999, Wehner et al. 1991)، و

احتمال دارد بعضی از ارقام مورد استفاده در ایران نیز چنین ویژگی داشته باشند. ولی تاکنون تحقیقی روی آن صورت نگرفته است و فقط عکس العمل درختان میوه هسته‌دار، انار، زیتون نسبت به *M. javanica* و پسته نسبت به نژاد دو *M. incognita* بررسی شده است (اخیانی و بهداد، ۱۹۸۶؛ اخیانی و مجتبهدی، ۱۹۸۶؛ مدنی و همکاران، ۱۹۹۵b؛ حسینی نژاد و رمضانی ملک‌رودی، ۲۰۰۲). با توجه به توسعه گلخانه‌ها و افزایش سطح زیر کشت خیار گلخانه‌ای، ضرورت دارد جهت جلوگیری از خسارت نماتودها روش‌های مختلف کنترل، از جمله شناسایی و معرفی ارقام مقاوم مورد مطالعه قرار گیرد. هدف از این تحقیق، بررسی عکس العمل برخی از ارقام خیار گلخانه‌ای رایج در ایران نسبت به نماتود *M. incognita* بوده است.

روش بررسی خالص‌سازی و تکثیر نماتود

در نیمه دوم سال ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۸۱، تعداد هفت نمونه خاک و گیاه آلدود به نماتود ریشه گرhei از استان‌های یزد (پسته)، مازندران (نارنگی) و همدان (هویج و گوجه‌فرنگی) جمع‌آوری گردید. برای تعیین گونه نماتود با استفاده از کیسه‌های تخم متصل به ریشه‌های آلدود گیاه اصلی و یا ریشه گوجه‌فرنگی رقم ارلی اوربانا (Early urbana) کاشته شده در خاک آلدود، نماتودهای هر کدام از نمونه‌ها خالص‌سازی و تکثیر شدند. خاک مورد استفاده در تمام مراحل تحقیق، خاک شنی لومی ضدغافونی شده با بخار آب، شامل ۸۲/۵٪ شن، ۲/۵٪ سیلت و ۱۵٪ رس، جمع‌آوری شده از یکی از رودخانه‌های فصلی بود. همه مراحل تحقیق درون گلخانه و در دمای بین ۳۲–۲۲ درجه سانتی‌گراد انجام گرفت.

برای خالص‌سازی، پس از انتخاب تک گال، کیسه تخم مربوط به آن به وسیله سوزن نوک نیز به آرامی از گال جدا و در یک ظرف پتري شبشهای سه سانتی‌متر قرار داده شد. هر کدام از کیسه‌های تخم به طور جداگانه و با دقیق با محلول هیپوکلریت سدیم ۰/۵ درصد به مدت ۳/۵ الی ۴ دقیقه ضدغافونی و بلا فاصله بر روی الک ۵۰۰ مش و در زیر جریان آب به خوبی شستشو داده شد. سپس تخم‌های هر کیسه تخم به طور جداگانه به وسیله آب مقطر در یک بشر کوچک ۲۰ میلی‌لیتری جمع‌آوری و در کنار ریشه نشاء‌های گوجه‌فرنگی ۱۵ روزه که در زمان مایه‌زنی به مرحله دو تا چهار برگی رسیده بودند، قرار داده شد. جهت اطمینان عمل

خالص‌سازی در دو نوبت متوالی انجام شد.

برای تکثیر نماتود، پس از خالص‌سازی دوم ریشه بوته‌های گوجه‌فرنگی آلوده به نماتود را به دقت با آب جاری شستشو داده، و به وسیله پنس ۲۰ تا ۴۰ عدد کیسه تخم از هر جمعیت جدا و به خاک یک عدد نشای گوجه‌فرنگی در مرحله دو تا چهار برگی اضافه نموده و ۶۰ روز بعد مقدار کافی کیسه‌تخم به دست آمد.

تعیین گونه و نژاد نماتودها

برای شناسایی گونه جمعیت‌های جمع‌آوری شده، از مشخصات مرفو‌لوزیکی و مرفو‌متربیکی نماتودهای ماده، لارو سن دو و نماتودهای نر (که فقط از نارنگی و گوجه‌فرنگی به دست آمد) استفاده گردید. جهت بررسی شبکه کوتیکولی انتهای بدن ماده، نماتودهای بالغ را پس از خارج کردن از گال، درون یک قطره اسید لاکتیک ۴۵٪ روی طلق قرار داده و برش‌های لازم تهیه گردید. برای مطالعه مشخصات مهم مرفو‌لوزیکی از قبیل طول بدن، طول دم، اندازه هیالین، محل ریزش غده پشتی مری، شکل سر و فرم استایلت، لاروهای سن دوم را از خاک و ریشه استخراج و پس از تثبیت، انتقال به گلیسرین و تهیه اسلامیدهای میکرو‌سکپی دائمی مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین نژاد *M. incognita*, با استفاده از روش تایلر و ساسر (Taylor & Sasser 1978) و هارتمن و ساسر (Hartman & Sasser 1985)، و انجام تست میزبان‌های افتراقی تعیین گردید. در این تحقیق از پنج گیاه پنه رقم 16 Deltapin، توتون رقم Rutgerse NC-95، هندوانه رقم Charleston grey، فلفل رقم Early California و گوجه‌فرنگی رقم Florunner به عنوان میزبان‌های افتراقی استفاده، و به دلیل عدم دسترسی به بادامزمینی رقم *M. incognita* از آزمون تعیین نژاد حذف گردید.

هر کدام از میزبان‌های افتراقی در چهار تکرار، در گلدان‌هایی به قطر ۱۰ سانتی‌متر در خاک استریل کاشته شده و پس از رشد مناسب با *M. incognita* (جمعیت جمع‌آوری شده از ریشه پسته اردکان، یزد) مایه‌زنی شدند. دمای گلخانه در طول دوره‌ی آزمایش بین ۲۴ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت بین ۶۰ تا ۸۰ درصد متغیر بود. پس از گذشت ۶۰ روز از زمان مایه‌زنی، بوته‌ها را از خاک در آورده و سیستم ریشه طبق روش تایلر و ساسر

(جدول ۱) بررسی و نژاد فیزیولوژیکی نماینده تعیین گردید.

جدول ۱- درجه بندی شاخص گال و یا کیسه تخم بر اساس تایلر و ساسر، ۱۹۷۸ و هارتمن و ساسر، ۱۹۸۵

Table 1. Gall or egg masses rating index No. (Taylor & Sasser, 1978; Hartman & Sasser, 1985)

تعداد گال یا کیسه تخم Gall or egg masses No.	درجه بندی شاخص گال یا کیسه تخم Gall or egg masses rating index No.	عکس العمل میزان افتراقی Differential host reaction
0	0	Resistant (-)
1-2	1	Resistant (-)
3-10	2	Resistant (-)
11-30	3	Susceptible (+)
31-100	4	Susceptible (+)
>100	5	Susceptible (+)

ارزیابی عکس العمل ارقام خیار

برای ارزیابی ارقام خیار گلخانه‌ای رایج در ایران، ابتدا بذور ارقام در دسترس، شامل ۱۳

رقم و لاین، به نام‌های Sina(Rs 24189)F1, Royal 21445, Super Monarch, Rubah, Ps-29033

Vilmorin, Zenobia, Danito F1, Vikima-982, 2201 Rz F1, Spark, Luna F1 Hybrid, Gb

همچنین رقم Super Dominus (رقم مزرعه‌ای) به همراه یک توده بذر محلی همدانی جمع‌آوری

و درون گلدان کاشته، پس از مایه‌زنی و سپری شدن زمان لازم تعداد گال، کیسه تخم و تخم

شمارش، و شاخص‌های گال و کیسه تخم تعیین و فاکتور تولید مثل محاسبه گردید. سپس

براساس روش‌های مختلف، عکس العمل ارقام مورد بررسی تعیین گردید. تجزیه آماری داده‌ها

با نرم افزار SAS انجام و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن استفاده گردید.

آزمایش در شهریور ماه سال ۱۳۸۲ انجام گرفت، در آن ۱۵ رقم خیار فوق الذکر را در

قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، درون گلدان‌های پلی‌اتیلنی به قطر ۱۳ سانتی‌متر،

حاوی خاک استریل، کاشته شده و دو هفته بعد به وسیله ۵۰۰۰ عدد تخم نژاد یک (جدا شده از ریشه پسته) مایهزنی گردید. در تمام طول آزمایش دمای گلخانه بین ۲۲ تا ۳۲ درجه سانتی گراد نگه داشته و گلدانها هر روز یکبار و در روزهای گرم دوبار آبیاری شدند. همچنین هر هفته یک بار ۱۵۰ سی سی محلول کود میکرو (NPK) به میزان ۲/۵ گرم در هزار به گلدانها داده می شد. در این آزمایش برای هر تیمار یک شاهد (مایهزنی با آب مقطر) در نظر گرفته شد تا فاکتورهای رشدی در تیمارهای آلوده و سالم بررسی شود. شش هفته بعد از مایهزنی نتیجه آزمایش بررسی گردید.

برای بررسی نتایج حاصل از آزمایش، از قبیل شاخص گال، تعداد کیسه های تخم و تعداد تخم در هر ریشه، ابتدا بوته های خیار به آرامی از گلدان بیرون آورده شده و ریشه هر یک را با تکان دادن درون ظرف بزرگ آب شستشو داده و با قرار دادن روی کاغذ خشک کن آب آنها گرفته شد. بعد از توزین ساقه و ریشه و نیز اندازه گیری طول ریشه و ساقه، براساس روش پیشنهادی هوسی و جنسن، (Hussey & Janssen 2002) و با در نظر گرفتن تعداد گال و تطبیق سیستم ریشه هر بوته با الگوی ارائه شده، شاخص گال برای آنها تعیین گردید.

پس از تعیین شاخص گال، برای شمارش کیسه های تخم، ریشه ها به قطعات ۴-۳ سانتی متری تقسیم شده و برای راحتی شمارش، کیسه های تخم با محلول فلوکسین ب ۰/۱۵ گرم در یک لیتر آب) رنگ آمیزی و سپس با لاکتوفنل رنگبری شدند. برای تعیین شاخص کیسه تخم از سیستم تایلر و ساسر (Taylor & Sasser 1978) استفاده گردید.

برای محاسبه تعداد تخم های نماتود، قطعات ریشه را درون ارلن حاوی هیپوکلریت سدیم ۱/۰۵ درصد ریخته و به مدت ۵-۶ دقیقه به سرعت تکان داده شد. بعد محتوی ارلن را بر روی الک های ۲۰۰ و ۵۰۰ مش ریخته و پس از شستشوی با آب، محتویات الک ۵۰۰ مش را به ارلن ۲۵۰ میلی لیتری متقل و حجم سوسپانسیون به ۱۰۰ میلی لیتر رسانده شد. تعداد تخم ها در یک میلی لیتر از سوسپانسیون در سه نوبت شمارش و در ۱۰۰ میلی لیتر حجم محاسبه گردید.

محاسبه فاکتور تولید مثل طبق فرمول $RF = Pf/Pi$ انجام گرفت (Walters *et al.* 1999) که در آن RF فاکتور تولید مثل، Pf جمعیت نهایی و Pi جمعیت اولیه است که ۵۰۰۰ عدد تخم

نماتود در نظر گرفته شد. تجزیه آماری داده‌ها با نرم افزار SAS انجام و مقایسه میانگین‌های طول و وزن ریشه و ساقه با آزمون t (استیودنت) و سایر میانگین‌ها به وسیله آزمون دانکن صورت گرفت.

در مورد ارزیابی ارقام خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی که هدف اصلی این تحقیق بوده است، روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج کم و بیش مشابهی حاصل گردید. از جمله روش‌های مورد بررسی، روش مبتنی بر تعداد و شاخص گال بود که توسط فسولیوتیس (Fassuliotis 1985) ارائه شده و توسط محققان مختلف استفاده شده است (Wehner *et al.* 1991). در این تحقیق، شاخص گال، تعداد کیسه تخم و تعداد تخم در هر ریشه و فاکتور تولید مثل مورد ارزیابی قرار گرفته و درجه‌بندی نهایی میزان حساسیت یا مقاومت بر اساس درصد آلدگی (شاخص گال) و فاکتور تولید مثلی انجام گردید (Walters *et al.* 1999).

نتیجه

شناسایی گونه و تعیین نژاد جمعیت‌های خالص شده نماتود ریشه گرهی اندازه‌گیری‌های مرفو‌متريکی و بررسی‌های مرفو‌لوزیکی انجام شده در مورد نماتودهای ماده، نر و لاروهای سن دوم، همچنین مقایسه این مشخصات با منابع مربوطه نشان داد که جمعیت‌های پسته و نارنگی به گونه *M. incognita* *M. javanica* جمعیت هویج به (Eisenback 1985, Eisenback & Triantaphyllou 1991,) گوچه‌فرنگی به *M. hapla* تعلق دارند. (Orton Williams 1972, 1973, 1974, Taylor & Sasser 1978

دو جمعیت گونه *M. incognita* جدا شده از پسته و نارنگی، نتوانستند روی پنبه تولیدمثل کرده و یا گال ایجاد کنند. همچنین تعداد گال و کیسه تخم ایجاد شده روی توپون توسط جمعیت پسته در کل سیستم ریشه کمتر از ۱۰ عدد و در مورد جمعیت نارنگی صفر بود. هر دو جمعیت روی فلفل و گوچه‌فرنگی بخوبی توانستند تولیدمثل کنند. لذا هر دو جمعیت، نژاد یک گونه *M. incognita* تشخیص داده شد. قابل ذکر است طبق مطالعه صورت گرفته نژاد یک این گونه در بین چهار رایج‌ترین بوده (Hartman& Sasser 1985) ولی در ایران تاکنون گزارش نشده است.

ارزیابی عکس ارقام خیار

(الف) ارزیابی بر اساس شاخص گال: جدول تجزیه واریانس نشان داد که در سری دوم آزمایش نیز از نظر شاخص گال بین تیمارها در سطح ۹۵٪ اختلاف معنی دار می باشد. بررسی و مقایسه میانگین های شاخص گال نشان داد که ارقام Ps-29033 و Super Monarch، Luna f1 با میانگین Hybrid با داشتن میانگین شاخص گال برابر با ۵ بالاترین و رقم Super Dominus با میانگین شاخص گال برابر با ۱/۶۶ پایین ترین شاخص گال را دارا می باشند. شاخص های گال به دست آمده از بررسی ارقام خیار با سایر سیستم های ارائه شده توسط محققان مقایسه و بر اساس هر سیستم درجه مقاومت به ارقام داده شده که نتایج آن در جدول ۴ نشان داده شده است. همانطور که در جدول مشاهده می شود، بر اساس روش ارائه شده توسط هووسی و جنسن (Hussey & Janssen 2002) بر اساس روش فسولیوتیس (Fassuliotis 1985) غیر از ارقام Super Dominus Luna f1، Super monarch، Ps-29033 و Vikima 982 که حساس هستند بقیه ارقام دارای مقاومت جزئی بوده و رقم Super Dominus مقاومت متوسط دارد. در حالیکه بر اساس روش ارائه شده به وسیله وهنر و همکاران (Wehner *et al.* 1991) علاوه بر رقم های حساس ذکر شده در سیستم قبلی، ارقام Vilmorin، Zenobia، Spark و رقم محلی همدان نیز جزو ارقام حساس محسوب می شوند.

(ب) ارزیابی بر اساس شاخص کیسه تخم و فاکتور تولید مثل: جدول تجزیه واریانس میانگین های تعداد کیسه تخم و تخم مربوط به هر تیمار در سری دوم آزمایش نشان داد که اختلاف بین ارقام در سطح ۹۵٪ معنی دار می باشد. همانطور که در جدول ۵ نشان داده شده است، رقم Ps-29033 با داشتن میانگین ۸۶۰/۷ عدد کیسه تخم و ۳۲۵۵۳۳ تخم (میانگین به دست آمده از سه تکرار)، و رقم Super Dominus با داشتن میانگین ۷۸/۳ عدد کیسه تخم و ۱۴۴۳۳ عدد تخم، در بین ارقام مورد آزمایش، به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین میزان کیسه تخم و تخم هستند. همچنین شاخص گال همه ارقام به جز رقم Super Dominus بزرگتر از دو و فاکتور تولید مثل نیز بزرگتر از یک می باشد، و لذا همه ارقام مورد بررسی حساس بوده ولی رقم Super Dominus به دلیل داشتن شاخص گال کمتر از دو و فاکتور تولید مثلی بیشتر از یک متحمل شناخته می شود.

جدول ۲- مقایسه میانگین‌های شاخص گال با سیستم‌های مختلف و درجه مقاومت نسبت داده
شده به ۱۵ رقم و لاین خیار، شش هفته بعد از مایهزنی

Table 2. Comparison of means of gall index in 15 cultivars and lines of cucumber and their reaction according to three systems of evaluation, six weeks after inoculation

Cucumber Cultivars	Root Infection (percent)	Hussey & Janssen, 2002		Fassuliotis, 1985		Wehner <i>et al.</i> , 1991	
		شاخص گال	درجه مقاومت	شاخص گال	درجه مقاومت	شاخص گال	درجه مقاومت
		Gall index	DR*	Gall index	DR	Gall index	DR
Ps-29033	75	5.00 a	S	5	S	4	S
Rubah	33	3.33 bc	S	4	SR	3	SR
Super Monarch	75	5.00 a	S	5	S	4	S
Royal 21445	25	3.00 c	S	4	SR	3	SR
Sina (RS 24189	33	3.33 bc	S	4	SR	3	SR
Gb	33	3.33 bc	S	4	SR	3	SR
Luna F1 Hybrid	75	5.00 a	S	5	S	4	S
Spark	41	3.66 bc	S	4	SR	4	S
2201 Rz F1	33	3.33 bc	S	4	SR	3	SR
Vikima-982	58	4.33 ab	S	5	S	4	S
Danito F1	50	4.00 abc	S	5	S	4	S
Zenubia	41	3.66 bc	S	4	SR	3	S
Vilmorin	33	3.33 bc	S	4	SR	3	S
Super Dominus	12	1.66 d	R	3	MR	2	MR
Local mass (Hamadan)	33	3.33 bc	S	4	SR	4	S

* درجه مقاومت: حساس (S)، با مقاومت جزئی (SR)، با مقاومت متوسط (MR)، مقاوم (R).

- اعداد میانگین سه تکرار است. تیمارهای دارای حروف مشترک در سطح ۵٪ اختلاف

معنی‌دار با همدیگر ندارند.

* Degree of resistance: Susceptible (S), slightly resistant (SR), moderately resistant (MR), resistant (R).

- Data presented are means of three replications.

- Values followed by the same letter are not significantly different ($P = 0.05$) according to Duncan's multiple-range test.

مقایسه فاکتورهای رشدی گیاه در تیمارهای سالم و آلوده

نتایج بررسی فاکتورهای رشد (طول ریشه، وزن ریشه، طول ساقه و وزن ساقه) در مورد تیمارهای آلوده و شاهد در جدول شماره ۶ نشان داده شده است. وزن ریشه در کلیه تیمارهای آلوده بیشتر از تیمارهای سالم ولی طول ریشه در کلیه تیمارهای آلوده کمتر از تیمارهای سالم است. تفاوت‌های موجود در وزن و طول ریشه تیمارهای آلوده و سالم در آزمون جفتی (t استیودنت) تجزیه شده و نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که اختلاف به دست آمده از مقایسه میانگین‌های حاصل از اندازه‌گیری وزن ریشه و طول آن در تیمار آلوده با شاهد مربوط به همان تیمار، معنی‌دار است. بررسی وزن و طول ساقه نشان داد که میانگین‌های به دست آمده در تیمارهای آلوده با میانگین‌های به دست آمده از شاهد فاقد تفاوت معنی‌دار بوده و تغییرات این فاکتور رشدی ارتباطی با تیمارهای آزمایش یعنی آلوده بودن یا نبودن به نماینده ندارد.

بحث

آلودگی بوته‌های خیار به نماینده ریشه گرهی و افزایش وزن ریشه‌ها نسبت به تیمارهای سالم، احتمالاً در اثر هیپرتروفی و هیپرپلازی سلول‌های ریشه، همچنین افزایش ریشه‌های فرعی، به عنوان واکنش میزان نسبت به نماینده است. از طرف دیگر تغذیه نماینده و ایجاد سلول‌های غولپیکر باعث ضعف سیستم ریشه و بروز اختلالات رشدی و کاهش رشد طولی آن نسبت به ریشه تیمارهای سالم می‌گردد.

در مورد ارزیابی ارقام خیار نسبت به نماینده ریشه گرهی به عنوان هدف اصلی این تحقیق، روش‌های مختلفی از جمله روش مبتنی بر تعداد و شاخص گال، همچنین تعداد و شاخص کیسه تخم مورد استفاده قرار گرفت و نتایج کم و بیش مشابهی حاصل گردید. ولی ارزیابی نهایی ارقام براساس میزان آلودگی ریشه (درصد گالدهی) و تولید مثل نماینده انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمامی ارقام مورد آزمایش به استثناء رقم Super Dominus که یک رقم مزرعه‌ای می‌باشد، نسبت به نژاد یک *M. incognita* حساس می‌باشند. رقم Super Dominus، که یک رقم مزرعه‌ای می‌باشد، با داشتن شاخص گال کمتر از دو و فاکتور تولید مثلی بیش از دو، متحمل شناخته شد. به طور کلی دو رقم خیار مزرعه‌ای نسبت به ارقام

گلخانه‌ای میزان آلدگی کمتری را نشان دادند، اما بر اساس سیستم درجه‌بندی مقاومت مورد نظر در این تحقیق، آنها نیز حساس شناخته شدند.

نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان داده که تنها برخی از کالتشن‌های خیار آفریقایی، گونه *Cucumis metuliferus* نسبت به *M. hapla* نژاد *M. javanica* از خود مقاومت نشان داده‌اند، ولی کلتیوار *Sumter* یک *M. incognita* و نژاد یک *M. arenaria* از خود مقاومت نشان داده است. از آنجاییکه خیار معمولی (*Cucumis sativus*) فقط نسبت به *M. hapla* مقاومت نشان داده است. از آنجاییکه تعداد کروموزوم‌های خیار آفریقایی با کروموزوم‌های خیار معمولی متفاوت است، بنابراین انتقال ژن مقاومت نمی‌تواند صورت بگیرد (Wehner *et al.* 1991). در آزمایش دیگر که در حضور چهار گونه اصلی از جمله نژاد یک *M. incognita* صورت گرفته است، فقط کالتشن‌نژاد *LJ90430* واریته Hardwickii خیار معمولی نسبت به نژادهای یک و دو *M. arenaria* همچنین مقاومت نشان داده است (Walters *et al.* 1999).

مقایسه نتایج این آزمایش با نتایج تحقیقات انجام شده در سایر کشورها به دلیل یکی بودن ارقام مورد بررسی اندکی مشکل است ولی در حالت کلی می‌توان نتیجه گرفت که اغلب ارقام خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی به خصوص گونه *M. incognita* حساس بوده و در نتیجه فاقد ژن مقاوم برای استفاده در اصلاح نباتات می‌باشند. لذا با عنایت به بررسی‌های انجام شده، توصیه می‌شود تا به دست آمدن ارقام مقاوم یا متتحمل در این زمینه، برای مبارزه با این نماتود از سایر روش‌های مدیریتی این نماتود از جمله تقویت خاک با استفاده از کودهای آلی، شخم زدن و در معرض نور خورشید قرار دادن زمین در فصل تابستان اشاره نمود که از روش‌های اقتصادی و بی‌خطر در مدیریت نماتودهای بیماریزای گیاهی به ویژه نماتود ریشه گرهی محسوب می‌شوند.

منابع

جهت ملاحظه به صفحات (61-64) متن انگلیسی مراجعه شود.

نشانی نگارندگان: شهرزاد صادق موسوی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعالی سینا، اکبر کارگر بیده، بخش گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، علی دلجو، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعالی سینا