

اثر گونه‌های تریکودرما بر رهاسازی زئوسپور *Phytophthora sojae*

## شدت بیماری در سویا و سنجش فعالیت آنزیم‌های گلوکاناز\*

EFFECT OF *Trichoderma* SPECIES ON ZOOSPORE PRODUCTION OF *Phytophthora sojae*, DISEASE SEVERITY, AND GLUCANASE ENZYMES ACTIVITY ASSAYنجمه ایوبی<sup>۱</sup>، دوستمراد ظفری<sup>۱\*</sup> و منصوره میرابوالفتحی<sup>۲</sup>

(تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۶/۲۴)

## چکیده

در این بررسی اثر ترشحات مایع خارج سلولی ۱۲ گونه قارچ تریکودرما شامل *T. virens*, *T. pseudokoningii*, *Trichoderma ceramicum*, *T. spirale* بر تولید زئوسپور *Phytophthora sojae* و میزان فعالیت آنزیم‌های بتا ۱ و ۳ گلوکاناز و بتا ۱ و ۴ گلوکاناز (سلولاز) این گونه‌ها در ارتباط با تجزیه دیواره سلولی فیتوفتورا در شرایط آزمایشگاه آزمایش شده و در نهایت اثر این گونه‌ها بر کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه سویا در گلخانه بررسی شد. جهت بررسی اثر ترکیبات فیلتر شده گونه‌های فوق‌الذکر بر بازداری از تولید زئوسپور *Phytophthora sojae* غلظت‌های ۰/۵، ۱، ۵ و ۱۰ این ترکیبات در آب مقطر دیونیزه سترون تهیه شد. میزان فعالیت آنزیم‌های بتا ۱ و ۳ گلوکاناز و بتا ۱ و ۴ گلوکاناز جدایه‌های اخیرالذکر در حضور گلسیرین و هیف فیتوفتورا به عنوان منبع کربن، در محیط کشت ویندینگ، ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که ترکیبات فیلتر شده خارج سلولی تمامی گونه‌ها سبب کاهش تولید زئوسپور شدند، غلظت‌های مختلف اثر بازدارندگی متفاوتی داشته و بیشترین بازدارندگی مربوط به *T. virens* و *T. brevicompactum* بود. در بررسی اثر دو منبع کربن در تولید آنزیم‌های هیدرولیتیک توسط تریکودرما، نتایج نشان داد که کاربرد هیف فیتوفتورا در مقایسه با گلسیرین به عنوان منبع کربن در محیط رشد گونه‌های تریکودرما سبب افزایش فعالیت آنزیم‌های بتا ۱ و ۳ گلوکاناز و بتا ۱ و ۴ گلوکاناز در تمامی گونه‌ها شد و بیشترین میزان فعالیت هر دو آنزیم مربوط به *T. virens* و *T. brevicompactum* بود که میزان فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۳ گلوکاناز به ترتیب معادل ۲/۳۱ و ۱/۷۳ U/mg protein مربوط به تیمار گلسیرین، ۴/۴۷ و ۳/۹۱ U/mg protein مربوط به تیمار هیف *P. sojae* بود و میزان فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۴ گلوکاناز مربوط به این دو گونه به ترتیب ۰/۶۶ و ۰/۸۶ U/mg protein در تیمار حاوی گلسیرین و ۱/۷۲ و ۱/۷۲ U/mg protein در تیمار حاوی میسلیم فیتوفتورا در محیط کشت بود. جهت بررسی اثر گونه‌های تریکودرما بر شدت بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه سویا در شرایط گلخانه در خاک سترون و در مرحله سه برگی (v<sub>1</sub>) در قالب دو طرح کاملاً تصادفی با ۱۵ تیمار شامل شاهد سالم، شاهد آلوده، هر کدام از گونه‌های تریکودرما به علاوه عامل بیماری و سبوس گندم به علاوه عامل بیماری در سه تکرار انجام گرفت. در این بررسی موفق‌ترین گونه‌ها در کنترل بیماری، کاهش شدت بیماری و کاهش درصد مرگ گیاهچه در گلخانه *T. brevicompactum*، *T. virens* و *T. spirale* بودند.

واژه‌های کلیدی: *Trichoderma* spp., *Phytophthora sojae*. آنزیم‌های بتا ۱ و ۳ گلوکاناز و بتا ۱ و ۴ گلوکاناز

\*بخشی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول ارائه شده به دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

\*\*مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: zafari\_d@yahoo.com

۱. به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیار بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

۲. دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

## مقدمه

به تعداد فراوان در خاک‌های غرقاب یا اشباع تولید می‌شوند و به وسیله آب موجود در خاک انتشار یافته و اینوکولوم ثانویه را فراهم می‌سازد (Sinclair 1989).

امروزه یکی از کامل‌ترین روش‌های مدیریت تلفیقی برای کنترل بیماری‌ها استفاده از کنترل بیولوژیک با یک ریز جاندار آنتاگونیست است. از میان عوامل بیولوژیک، قارچ تریکودرما دارای قدرت آنتاگونیستی بالایی است و باعث کنترل بیمارگرهای خاکزاد گیاهی مختلف مانند *Sclerotinia sclerotiorum* (Dos Santos et al. 1982)، *Pythium* (Honeycutt 2001)، *Rhizoctonia solani* (Howell 2002) و گونه‌های جنس *Phytophthora* (Smith et al. 1990; Khan et al. 2004; Ezziyani et al. 2007) شده‌اند. گونه‌های تریکودرما از مکانیزم‌های آنتاگونیستی مؤثر زیادی، برای بقا و ساکن شدن در محیط رقابتی خود استفاده می‌کنند. این مکانیزم‌ها شامل پدیده آنتی بیوز (Antibiosis)، رقابت برای فضا و مواد غذایی، تولید آنزیم‌های لیزکننده و پارازیتسم، افزایش رشد گیاه و القای مقاومت می‌باشند (Hraman 2003).

ترکیبات و متابولیت‌های بسیاری از ترشحات مایع خارج سلولی جنس تریکودرما که دارای خاصیت آنتاگونیستی هستند تاکنون جداسازی شده و خصوصیات شیمیایی این ترکیبات نیز مشخص شده است. این ترکیبات شامل آنتی بیوتیک‌ها، توکسین‌ها و آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره سلولی هستند.

آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره سلولی که توسط جنس تریکودرما تولید می‌شوند و تحت عنوان CWDEs (Cell Wall Degrading Enzymes) شناخته شده‌اند در طول دهه اخیر مورد توجه زیادی واقع شده‌اند. مفیدترین این آنزیم‌ها، آنزیم‌های گلوکانولیتیک و

سویا (*Glycin max*) در ایران در استان‌های مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی، لرستان، آذربایجان شرقی، اصفهان، گلستان و گیلان کشت می‌شود (Agriculture Jihad Ministry 2009). علی‌رغم آب و هوای مساعد برای کشت سویا در استان لرستان، به دلیل عوامل متعددی سطح زیر کشت این گیاه کاهش یافته است که یکی از عوامل محدود کننده کشت در استان لرستان بیماری بوته میری سویا بوده که در اکثر مزارع سویا مشاهده شده است (Mohammadi et al. 2007). بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه سویا که توسط *Phytophthora sojae* Kauf. & Gerd. ایجاد می‌شود باعث مرگ گیاهچه قبل و بعد از ظهور آن می‌شود، هم‌چنین در تمام مراحل رشدی گیاه مخصوصاً زمانی که آب کافی در اختیار این بیمارگر قرار گیرد باعث پوسیدگی ریشه، مرگ و کاهش عملکرد گیاه تا حدود ۵۰ درصد می‌شود (Xiao et al. 2002).

کنترل مؤثر این بیماری بسیار مشکل است، کاشت گیاهان مقاوم روش کنترلی متداول و اصولی این بیماری است (Erwin & Ribeiro 1996) ولی ظهور نژادهای جدید بیمارگر باعث شکسته شدن مقاومت کولتیوارهای سویا می‌شوند (Sadeghi Garmaroodi et al. 2007; Mohammadi et al. 2007) (Giesler & Christensen 2002). روش‌های زراعی مانند زه‌کشی، کاهش فشردگی خاک و تناوب زراعی در مدیریت این بیماری مؤثر است (Schmitthener 1999). از آنجایی که عامل بیماری به شکل اوسپور می‌تواند در غیاب میزبان برای مدت زیادی در خاک دوام یابد، از این‌رو تناوب زراعی اثر کنترلی کمی دارد (Schmitthener & Van Doren 1985). در بهار هرگاه دما مناسب باشد اسپورها جوانه می‌زنند و تشکیل اسپورانژیوم‌ها و در نهایت، زئوسپورها

کمک روش‌های مورفولوژیکی و ملکولی شناسایی شده بودند (Mirabolfathy et al., 2000, 2001)، با روش زیالو و همکاران (۲۰۰۲) بر علیه رقم ویلیامز گیاه سویا در شرایط گلخانه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و نهایتاً جدایه دارای بیشترین قدرت بیماری‌زایی جهت مطالعات بیوکنترلی انتخاب شد.

## ۲- تهیه جدایه‌های *Trichoderma* spp.

جدایه‌هایی از ۱۲ گونه تریکودرما شامل *T. virens*, *T. pseudokoningii*, *T. koningii*, *T. koningiosis*, *T. atroviridae*, *T. ceramicum*, *T. viridescens*, *T. asperellum*, *T. harzianum*, *T. spirale* و *T. brevicompactum T. orientalis* که قبلاً توسط نظمی و همکاران (۲۰۰۶، ۲۰۰۷) به کمک روش‌های مورفولوژیکی و ملکولی شناسایی شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت.

## ۳- آزمون اثر ترشحات خارج سلولی تولید شده در محیط مایع بر تولید زئوسپور

این آزمایش با کمی تغییرات طبق روش دنیس و وبستر (Dennis & Webster 1971a) انجام شد. برای تهیه ترشحات مایع خارج سلولی از گونه‌های تریکودرما، تعداد پنج دیسک پنج میلی‌متری از حاشیه کشت پنج روزه تریکودرما را داخل ارلن‌های حاوی محیط کشت PDB انداخته و در ارلن‌مایر شاهد به جای دیسک قارچ آنتاگونیست پنج دیسک از محیط کشت اضافه گردید. ارلن‌ها در دستگاه شیکر (Shaker) با ۱۰۰ تکان در دقیقه با دمای  $25 \pm 1^\circ C$  به مدت ۱۵ روز نگهداری شدند. سپس محتویات ارلن‌ها به طور جداگانه از کاغذ صافی سترون عبور داده شدند تا توده‌های میسلیومی آنها جدا شود، مایع

کیتینولیتیک می‌باشند زیرا قادر به تجزیه مفید دیواره سلولی قارچ‌های بیمارگر گیاهی هستند و امروزه به عنوان ترکیبات فعال در فرمول قارچکش‌های جدید به کار می‌روند. برای مثال اثر قارچ‌کشی ترکیبات آزولی زمانی که در ترکیب با میزان کمی از اندوکیتینازهای استخراج شده از *T. harzianum* استفاده شدند، بالغ بر ۱۰۰ بار افزایش داشته است. (Monte 2001).

در این تحقیق ابتدا به علت اهمیت زئوسپور *P. sojae* در انتشار بیماری در مزرعه اثر ترشحات مایع خارج سلولی ۱۲ گونه تریکودرما بر میزان تولید زئوسپور فیتوفتورا بررسی شد. سپس از آنجایی که دیواره سلولی بیمارگر، نخستین و مهم‌ترین سد در برابر نفوذ آنتاگونیست است و به علت این‌که اجزای اصلی دیواره سلولی فیتوفتورا شامل بتا ۱ و ۳ گلوکان و سلولز می‌باشد میزان فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۳ گلوکاناز و بتا ۱ و ۴ گلوکاناز (سلولاز) در گونه‌های تریکودرما بررسی شد و در نهایت جهت معرفی بهترین گونه تریکودرما در کنترل موفق و همه‌جانبه بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی سویا اثر تمامی گونه‌ها در شرایط گلخانه بر بیماری بررسی شد و موفق‌ترین گونه در آزمایشگاه و گلخانه به عنوان عامل بیوکنترل بیماری معرفی شد.

## روش بررسی

### ۱- تهیه جدایه‌های عامل بیماری

در بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ از مزارع سویا منطقه الیستر استان لرستان بازدید شد و از بوته‌های دارای علائم پوسیدگی طوقه و ریشه نمونه‌برداری و نسوج آلوده در محیط PARPH + CMA کشت گردید. پس از خالص‌سازی تعداد ۱۰ جدایه *Phytophthora sojae* حاصل شد. شدت بیماری‌زایی جدایه‌های حاصل و جدایه‌هایی که قبلاً به

حاصل با کمک پمپ خلأ از صافی‌های میکروبیولوژیک با قطر روزنه ۰/۲۲ میکرومتر عبور داده شد. به منظور بررسی اثر عصاره خارج سلولی تولید شده در محیط مایع بر تولید زئوسپور غلظت‌های ۰/۵، ۱، ۵ و ۱۰ درصد از عصاره در آب مقطر دیونیزه سترون تهیه شد. به منظور تهیه زئوسپور به روش ای و همکاران (Eye et al. 1978) عمل شد. به این صورت که ابتدا دیسک‌های پنج میلی‌متری از حاشیه کشت یک هفته‌ای *P. sojae* در محیط کشت LBA را در مرکز تشتک حاوی ۱۰ میلی‌لیتر محیط کشت half-strength LBA قرار داده و در دمای ۲۵ °C به مدت چهار روز نگهداری شد، پس از این مدت، ۱۵ میلی‌لیتر از غلظت‌های فوق‌الذکر عصاره به آن افزوده شد و در دمای ۲۱ °C نگهداری شد، پس از ۱۸ ساعت تعداد زئوسپورهای آزاد شده با استفاده از لام مدرج هموسیتومتر شمارش گردید. در تشتک‌های شاهد تنها آب مقطر دیونیزه سترون ریخته شد. در نهایت با توجه به میزان تولید زئوسپور در تیمار شاهد، میزان درصد کاهش تولید زئوسپور فیتوفتورا از طریق فرمول تفاضل میزان تولید زئوسپور فیتوفتورا در هر غلظت از تفاضل میزان تولید زئوسپور تیمار شاهد تقسیم بر میزان تولید زئوسپور تیمار شاهد ضربدر صد محاسبه شد.

برای تهیه دیواره سلولی *P. sojae*، پس از ۱۰ روز رشد آن در محیط مایع سیب‌زمینی - گوجه‌فرنگی توده میسلیمی حاصل سه بار با آب مقطر سترون شستشو داده شد، با کاغذ صافی واتمن شماره یک جمع‌آوری و چندین بار با آب مقطر سترون شسته و با استفاده از هموژنایزر و آب مقطر سترون خرد و یک‌نواخت گردید، سوسپانسیون حاصل سه بار و هر بار به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۶۰۰۰ rpm سانتریفیوژ گردید، بعد از هر بار سانتریفیوژ میسلیم با آب مقطر سترون شسته شد. رسوب نهایی لیوفیلیز شده (El-Katanty et al. 2001) و به عنوان منبع کربن به محیط کشت فوق‌الاضافه شد.

#### ب) بررسی فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۳ گلوکاناز

بررسی فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۳ گلوکاناز به روش میلر (Miller 1959) با تغییراتی به شرح زیر صورت گرفت. مخلوط واکنش شامل ۲۵۰ میکرولیتر محلول ۰/۵ درصد لامینارین، تهیه شده در بافر استات سدیم ۰/۰۵ مولار

حاصل با کمک پمپ خلأ از صافی‌های میکروبیولوژیک با قطر روزنه ۰/۲۲ میکرومتر عبور داده شد.

به منظور بررسی اثر عصاره خارج سلولی تولید شده در محیط مایع بر تولید زئوسپور غلظت‌های ۰/۵، ۱، ۵ و ۱۰ درصد از عصاره در آب مقطر دیونیزه سترون تهیه شد. به منظور تهیه زئوسپور به روش ای و همکاران (Eye et al. 1978) عمل شد. به این صورت که ابتدا دیسک‌های پنج میلی‌متری از حاشیه کشت یک هفته‌ای *P. sojae* در محیط کشت LBA را در مرکز تشتک حاوی ۱۰ میلی‌لیتر محیط کشت half-strength LBA قرار داده و در دمای ۲۵ °C به مدت چهار روز نگهداری شد، پس از این مدت، ۱۵ میلی‌لیتر از غلظت‌های فوق‌الذکر عصاره به آن افزوده شد و در دمای ۲۱ °C نگهداری شد، پس از ۱۸ ساعت تعداد زئوسپورهای آزاد شده با استفاده از لام مدرج هموسیتومتر شمارش گردید. در تشتک‌های شاهد تنها آب مقطر دیونیزه سترون ریخته شد. در نهایت با توجه به میزان تولید زئوسپور در تیمار شاهد، میزان درصد کاهش تولید زئوسپور فیتوفتورا از طریق فرمول تفاضل میزان تولید زئوسپور فیتوفتورا در هر غلظت از تفاضل میزان تولید زئوسپور تیمار شاهد تقسیم بر میزان تولید زئوسپور تیمار شاهد ضربدر صد محاسبه شد.

#### ۴- سنجش فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۳ گلوکاناز و بتا ۱ و ۴ گلوکاناز

الف) تهیه عصاره آنزیمی و بستر کشت با منابع کربن متفاوت

گونه‌های تریکودرما در ارلن‌های ۲۵۰ ml حاوی ۳۰ ml محیط کشت مایع و معدنی Wiendling که توسط جونز و هنکوک تغییر یافته (Jones & Hancock 1987) (و شامل: ۰/۰۵٪ منبع کربنی، ۲ گرم  $[NH_4]_2SO_4$ ، ۱ گرم

(Varian Cary 100 Conc) جذب در طول موج ۵۰۰ نانومتر اندازه‌گیری و منحنی استاندارد بر اساس غلظت‌های مختلف گلوکز رسم شد. دستگاه اسپکتروفوتومتر برای هر نمونه به وسیله مخلوط واکنش که عصاره آن در حمام آب ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد فعالیتش متوقف شده بود، صفر شد. میزان پروتئین کل نیز به روش برادفورد تعیین شد. فعالیت اختصاصی آنزیم به صورت میلی‌گرم گلوکز آزاد شده در دقیقه به ازای میلی‌گرم پروتئین تام موجود در عصاره تعیین شد.

#### ۵- اثر گونه‌های تریکودرما روی بیماری پوسیدگی

##### فیتوفترایی طوقه و ریشه سویا در شرایط گلخانه

تعیین اثر گونه‌های تریکودرما بر شدت بیماری پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه سویا و فاکتورهای رویشی گیاه در شرایط گلخانه در خاک سترون و در مرحله اولین برگ سه برگچه‌ای بررسی شد. این آزمون در قالب دو طرح کاملاً تصادفی با ۱۵ تیمار شامل شاهد سالم، شاهد آلوده، هر کدام از گونه‌های تریکودرما به علاوه عامل بیماری و سبوس گندم به علاوه عامل بیماری در سه تکرار انجام گرفت. در این بررسی ابتدا بذرهای ضدعفونی شده سویا در سینی‌هایی به ابعاد  $4 \times 20 \times 20$  سانتی‌متری حاوی ورمی‌کولیت مرطوب و پرلیت (به نسبت ۱:۱) کاشته شد و در اتاقک رشد با دمای  $24 \pm 2^\circ C$  و رطوبت ۷۸٪ و نور ۱۲ ساعت نگهداری شده و بعد از ۴ روز به گلدان‌ها منتقل شدند. در روش اول ابتدا یک سانتی‌متر از عمق گلدان را با ماسه پر کرده و سپس شش سانتی‌متر عمق بعدی را از خاک پاستوریزه‌ای که حاوی ۶ گرم سوسپانسیون میسلیم *P. sojae* به ازای یک کیلوگرم بود، پر شد، سپس در هر گلدان ۵ گیاهچه سویا کشت شده و پنج روز بعد به هر گلدان سه گرم از مایه تریکودرما که در بستر سبوس گندم

(pH 5) و ۲۵۰ میکرولیتر از عصاره آنزیمی بود. مخلوط حاصله برای مدت ۳۰ دقیقه در حمام آب  $40^\circ C$  نگهداری شد. سپس واکنش با اضافه کردن ۵۰۰ میکرولیتر معرف دی‌نیترو سالیسیلیک‌اسید (DNS) متوقف شد و برای مدت پنج دقیقه در آب در حال جوشیدن قرار داده شد. سپس حجم نهایی مخلوط واکنش به وسیله آب مقطر به دو میلی‌لیتر رسانده شد و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر (Varian Cary 100 Conc) میزان جذب در طول موج ۵۰۰ نانومتر اندازه‌گیری و منحنی استاندارد بر اساس غلظت‌های مختلف گلوکز رسم شد. دستگاه اسپکتروفوتومتر برای هر نمونه به وسیله مخلوط واکنش که عصاره آن در حمام آب  $100^\circ C$  فعالیتش متوقف شده بود، صفر شد. میزان پروتئین کل نیز به روش برادفورد (Bradford 1976) تعیین شد. فعالیت اختصاصی آنزیم به صورت میلی‌گرم گلوکز آزاد شده در دقیقه (واحد آنزیم) به ازای میلی‌گرم پروتئین تام موجود در عصاره تعیین شد.

#### ج) بررسی فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۴ گلوکاناز

بررسی فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۴ گلوکاناز به روش توندج و همکاران (Tondje et al. 2007) با تغییراتی صورت گرفت. مخلوط واکنش شامل ۲۵۰ میکرولیتر محلول یک درصد کربوکسی‌متیل سلولز که در بافر استات سدیم ۰/۰۵ مولار (pH=5) تهیه شده و ۲۵۰ میکرولیتر عصاره آنزیمی بود. مخلوط واکنش (۵۰۰ میکرولیتر) برای مدت ۳۰ دقیقه در حمام آب  $50^\circ C$  نگهداری شد و سپس با اضافه کردن ۶۰۰ میکرولیتر معرف DNS و قرار دادن مخلوط واکنش در آب جوش به مدت پنج دقیقه متوقف شد. سپس حجم مخلوط واکنش با آب مقطر به دو میلی‌لیتر رسانده شد و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر

جدایه‌های تریکودرما بعد از تقریباً پنج الی شش ساعت اسپورانژیوم‌ها با تراکم کمتری ظاهر شدند. نتایج تأثیر ترشحات مایع خارج سلولی تریکودرما بر تولید زئوسپور نیز، نشان داد که غلظت ۵٪ و ۱۰٪ ترشحات خارج سلولی اکثر جدایه‌های تریکودرما مانع از تولید زئوسپور شده است. بیشترین ممانعت از تولید زئوسپور در همه غلظت‌ها مربوط به *T. virens* و *T. brevicompactum* با ۱۰۰٪ بازداری بوده و کمترین ممانعت مربوط به *T. asperellum* با ۴۱٪ بازداری بود (شکل ۱).

#### نتایج فعالیت آنزیمی، تریکودرما

فعالیت آنزیم به صورت واحد آنزیمی در میلی‌گرم پروتئین کل تعیین شد. فعالیت آنزیمی بتا ۱ و ۳ گلوکاناز در همه گونه‌ها به جز *T. ceramicum* بیشتر از فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۴ گلوکاناز بود. فعالیت هر دو آنزیم گونه‌های تریکودرما در شرایط رشد در محیط حاوی هیف اتوکلاو شده فیتوفتورا تقریباً دو برابر محیط حاوی گلسیرین بود و بیشترین میزان فعالیت هر دو آنزیم مربوط به *T. brevicompactum* و *T. virens* بود که میزان فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۳ گلوکاناز به ترتیب معادل U/mg protein ۲/۳۱ و ۲/۲۳ مربوط به تیمار گلسیرین، U/mg protein ۴/۴۷ و ۳/۹۱ مربوط به تیمار هیف *P. sojae* بود و میزان فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۴ گلوکاناز مربوط به این دو گونه به ترتیب U/mg protein ۰/۶۶ و ۰/۸۶ در تیمار حاوی گلسیرین و U/mg protein ۱/۷۲ و ۱/۷۲ در تیمار حاوی میسلیم فیتوفتورا در محیط کشت بود (جدول ۱ و شکل ۲).


تهیه شده بود اضافه کرده و سطح گلدان با یک لایه ماسه پوشانده شد. در روش دوم ابتدا سه گرم از مایه تریکودرما با خاک مخلوط شد و پنج روز بعد سوسپانسیون میسلیم *P. sojae* به خاک اضافه شد. فاکتورهای مورد ارزیابی در آزمون گلخانه‌ای شامل ارتفاع بوته از سطح خاک تا نوک بوته در پایان آزمایش، وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، درصد مرگ گیاهچه و شدت بیماری بود. به منظور محاسبه شاخص‌های مذکور ۳۰ روز پس از کشت و زمانی که در شاهد آلوده ساقه‌ها تقریباً زرد شده بودند، بوته‌ها از خاک خارج شده و شدت بیماری با مقیاس صفر تا چهار (Xiao et al. 2002) که در آن شاخص صفر برای بوته‌های دارای ریشه سالم و سیستم ریشه‌ای گسترده، شاخص یک برای کاهش انشعابات نسبت به ریشه سالم و وجود لکه‌های نکروز قهوه‌ای روشن و مشخص که اغلب در نوک و یا حاشیه ریشه‌ها دیده می‌شد، شاخص دو برای ریشه‌های جانبی کم و لکه‌های نکروز قهوه‌ای تیره و واضح که فقط در یک طرف ریشه‌ها دیده می‌شد، شاخص سه برای ریشه‌های جانبی کم و لکه‌های نکروز قهوه‌ای تیره که در تمام سیستم ریشه و یا تمام اطراف طوقه‌ها دیده می‌شد، شاخص چهار برای گیاهچه مرده، ارزیابی شد.

#### نتایج

##### نتایج اثر ترشحات خارج سلولی تولید شده در محیط


##### مایع بر تولید زئوسپور

در بررسی میکروسکوپی کشت چهار روزه فیتوفتورا در محیط half-strength LBA اسپورانژیومی دیده نشد که با غوطه‌ور نمودن محیط ظروف پتری شاهد بعد از گذشت سه ساعت اسپورانژیوم شروع به ظهور کرد، در حالی که در ظروف پتری حاوی ترشحات خارج سلولی همه



شکل ۱. مقایسه میانگین اثر بازدارندگی غلظت‌های ۰.۵، ۱، ۵ و ۱۰، در صد ترشحات مایع فیلتر شده گونه‌های تریکودرما بر تولید زئوسپور *Phytophthora sojae*، در آب مقطر دیونیزه در شرایط آزمایشگاه

Fig. 1. Mean comparison of inhibitory effect at .5%,5%,1% and 40% concentrations of *Trichoderma* species liquid culture filtrates on mycelial growth of *P. sojae*, in deionized distilled water, in vitro abbreviation of *Trichoderma* species in this experiment showed as : *T. virens* (T. vi), *T. orientalis*(T. o), *T. ceramicum* (T. ce), *T. atroviride* (T. at), *T. koningii* (T. ko), *T. brevicompactum* (T. br), *T. spirale* (T. sp), *T. viridescens* (T. vid), *T. pseudokoningii* (T. pu), *T. harzianum* (T. ha), *T. asperellum* (T. as)



شکل ۲. مقایسه میانگین فعالیت آنزیمی، گونه‌های تریکودرما (واحد آنزیمی در میلی گرم پروتئین یا U/mg protein) در محیط حاوی هیف اتوکلاو شده (WP) و محیط حاوی گلیسرین (WG).

Fig. 2. Mean comparison of *Trichoderma* species enzyme assay (released glucose milligram in minute in milligram protein or U/mg protein) in medium plus autoclaved hyphae (WP) and medium plus glycerol (WG) abbreviation of *Trichoderma* species in this experiment: showed as *T. virens* (vi), *T. orientalis*(o), *T. ceramicum* (ce), *T. atroviride* (at), *T. koningii* (ko), *T. brevicompactum* (br), *T. spirale* (sp), *T. viridescens* (vid), *T. pseudokoningii* (pu), *T. harzianum* (ha), *T. asperellum* (as)

جدول ۱. مقایسه میانگین فعالیت آنزیمی، تریکودرما (U/mg protein). در محیط‌های متفاوت

Table 1. Mean comparison of enzyme activities from *Trichoderma* species grown on various media

$\beta$ -1,3-glucanase		$\beta$ -1,4-glucanase		Enzyme	<i>Trichoderma</i> species
WP	WG	WP	WG		
۳/۹۷± ۰/۰۶ <sup>a</sup>	۱/۷۳± ۰/۰۷ <sup>a</sup>	۱/۷۲± ۰/۰۸ <sup>a</sup>	۰/۸۶± ۰/۰۲ <sup>a</sup>		<i>T. virens</i>
۲/۲۷± ۰/۰۵ <sup>bc</sup>	۰/۷۳± ۰/۰۴ <sup>dc</sup>	۰/۶۸± ۰/۰۳ <sup>d</sup>	۰/۳± ۰/۰۱ <sup>ab</sup>		<i>T. orientalis</i>
۰/۹۱± ۰/۰۵ <sup>d</sup>	۰/۴۱± ۰/۰۳ <sup>fg</sup>	۱/۱۸± ۰/۰۷ <sup>c</sup>	۰/۱۶± ۰/۰۰۸ <sup>d</sup>		<i>T. ceramicum</i>
۲/۷۶± ۰/۰۵ <sup>b</sup>	۱/۶۹± ۰/۰۵ <sup>b</sup>	۰/۵± ۰/۰۲ <sup>fg</sup>	۰/۳۷± ۰/۰۱ <sup>ab</sup>		<i>T. atroviride</i>
۲/۸۵± ۰/۰۶ <sup>b</sup>	۱/۵۹± ۰/۰۵ <sup>bc</sup>	۱/۲۸± ۰/۰۴ <sup>b</sup>	۰/۴۹± ۰/۰۱ <sup>abcd</sup>		<i>T. koningii</i>
۴/۴۷± ۰/۰۷ <sup>a</sup>	۲/۳۱± ۰/۰۵ <sup>a</sup>	۱/۷۲± ۰/۰۳ <sup>a</sup>	۰/۶۶± ۰/۰۳ <sup>ab</sup>		<i>T. brevicompactum</i>
۲/۴۴± ۰/۰۵ <sup>b</sup>	۰/۶۱± ۰/۰۳ <sup>efg</sup>	۰/۴۲± ۰/۰۲ <sup>g</sup>	۰/۱۶± ۰/۰۰۷ <sup>cd</sup>		<i>T. spirale</i>
۲/۳۴± ۰/۰۶ <sup>b</sup>	۱/۳۶± ۰/۰۳ <sup>c</sup>	۱/۱۲± ۰/۰۳ <sup>c</sup>	۰/۶± ۰/۰۲ <sup>ab</sup>		<i>T. viridescens</i>
۱/۵۱± ۰/۰۵ <sup>dc</sup>	۰/۹± ۰/۰۳ <sup>d</sup>	۰/۵۳± ۰/۰۲ <sup>ef</sup>	۰/۴۱± ۰/۰۲ <sup>abc</sup>		<i>T. pseudokoningii</i>
۱/۱۳± ۰/۰۴ <sup>d</sup>	۰/۳۵± ۰/۰۲ <sup>g</sup>	۰/۵۴± ۰/۰۱ <sup>ef</sup>	۰/۲۳± ۰/۰۰۷ <sup>bcd</sup>		<i>T. harzianum</i>
۱/۳۴± ۰/۰۸ <sup>d</sup>	۰/۶۷± ۰/۰۲ <sup>ef</sup>	۰/۵۸± ۰/۰۱ <sup>e</sup>	۰/۳± ۰/۰۱ <sup>bcd</sup>		<i>T. asperellum</i>
۱/۳۹± ۰/۰۸ <sup>d</sup>	۰/۵۳± ۰/۰۳ <sup>efg</sup>	۰/۵۲± ۰/۰۲ <sup>ef</sup>	۰/۲۱± ۰/۰۰۵ <sup>bcd</sup>		<i>T. koningiopsis</i>

\*: گونه‌های تریکودرما در محیط کشت مایع و معدنی Wiending که توسط جونز و هنکوک تغییر یافته، به علاوه ۰/۵٪ glycerol (WG) و یا ۰/۵٪ دیواره سلولی فیتوفتورا (WP) کشت شدند. اعداد جدول میانگین سه تکرار هستند. میانگین‌هایی که در هر ستون با حروف کسان نشان داده شده‌اند، در آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار (P ≤ ۰/۵) با یکدیگر اختلاف معنی‌دار ندارند.

\*: *Trichoderma* species were grown in Wiending's minimal salts (Jones and Hancock, 1987) plus 0.5% (v/v) glycerol (W G), Wiending's minimal salts plus 0.5% (w/v) hyphae of *Phytophthora sojae* (W P). values are average of 3 replicates. Means with the same letter in each column are not significantly different at least significant difference (P ≤ 0.5)

هوایی نسبت به شاهد آلوده تفاوت معنی‌داری داشته و وجود تریکودرما در خاک باعث افزایش این فاکتورها در تمامی تیمارها شد (جدول ۳ و ۴). موفق‌ترین گونه در کاهش مرگ گیاهچه و شدت بیماری، گونه *T. brevicompactum* و در افزایش فاکتورهای رویشی گونه‌های *T. orientalis*، *T. brevicompactum* و *T. spirale* شناخته شد.

### نتایج آزمایش‌های گلخانه‌ای

افزودن زادمایه *P. sojae* قبل از گونه‌های تریکودرما باعث افزایش معنی‌دار تعداد گیاهچه زنده نسبت به شاهد آلوده پس از ۳۰ روز شد (شکل ۳)، هم‌چنین در این حالت شدت بیماری نسبت به شاهد آلوده کاهش یافت (شکل ۴) و در بررسی فاکتورهای رویشی از قبیل وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، طول ریشه، وزن تر اندام هوایی و طول اندام



جدول ۲. تجزیه واریانس برای تاثیرگونه‌های تریکودرما بر شدت بیماری *P. sojae* و فاکتورهای رویشی در گلخانه

Table 2. analysis of variance for the effect of *Trichoderma* species on *P. sojae* disease severity and growing factors in vivo


Disease severity	Shoot height	Shoot fresh weight	Root dry weight	Root length	Root fresh weight	Degree of freedom	Source of variation
۹۰۷/۰۷*	۱۰۱۰/۷۵*	۱۱/۰۳*	۱۰۱۰/۱۲*	۷۸/۷۹*	۰/۳۵*	۱۴	Treatment
۷۹۱۰۸/۱۹*	۱۹۵۰/۹*	۳۷/۱*	۱۹۴۱/۸*	۱۳۸/۳۴*	۱/۳۸*	۱	Ph +T and T+Ph methods
۶۱۵/۱۸*	۱۱۶/۷۳*	۱/۰۰۳*	۱۱۵/۵۶*	۶/۶*	۰/۰۴*	۱۴	Interact of Ph +T * T+Ph
۵۰/۱۳	۹/۰۵۲	۰/۰۵۷	۹/۴۳	۰/۵۴	۰/۰۰۱	۶۰	Error
						۸۹	Total

ضریب تغییرات (CV) برای وزن تر ریشه ۷/۹۴، طول ریشه ۶/۶۸، وزن خشک ریشه ۴/۵، وزن اندام هوایی ۵/۴، طول اندام هوایی ۴/۷ و شدت بیماری ۱۵ می‌باشد.

\*: معنی‌دار در سطح ۵ درصد


Coefficient of variation (C.V.) is 7.49 for Root fresh weight, 6.68 Root length, 4.5 Root dry weight, 5.4 Shoot fresh weight, 4.7 Shoot height and 15 for Disease severity

\*: significant at 5% level



شکل ۳. اثر گونه‌های تریکودرما روی مرگ گیاهچه با افزودن زادمایه فیتوفتورا پنج روز قبل از تریکودرما به خاک (PH+T) و پنج روز بعد از تریکودرما به خاک (T+PH) همراه با شاهد بدون فیتوفتورا (co-), شاهد آلوده بدون تریکودرما (co+) و شاهد سبوس گندم به علاوه عامل بیماری در شرایط گلخانه

Fig. 3. Effect of *Trichoderma* species on damping off for *Phytophthora* inoculum were introduced to soil five days before the *Trichoderma* inoculation ( PH+T) and five days after the *Trichoderma* inoculation (T+PH) mid control without *P. sojae* (co- ), infected control without *Trichoderma* (co+) and wheat bran control with pathogen (Wb), in vitro



شکل ۴. اثر گونه‌های تریکودرما بر شدت بیماری با افزودن زادمایه فیتوفتورا پنج روز قبل از تریکودرما به خاک (PH+T) و پنج روز بعد از تریکودرما به خاک (T+PH) همراه با شاهد بدون فیتوفتورا (co-) و شاهد آلوده بدون تریکودرما (co+) و شاهد سبوس گندم به علاوه عامل بیماری در شرایط گلخانه

Fig. 4. effect of *Trichoderma* species on disease severity for *Phytophthora* inoculum were introduced to soil five days before the *Trichoderma* inoculation (PH+T) and five days after the *Trichoderma* inoculation (T+PH) mid control without *P. sojae* (co-) and infected control without *Trichoderma* (co+) and wheat bran control with pathogen (Wb), in vitro

\*: values in fig.3, 4 are average of 3 replicates.

\*: اعداد به کار رفته در نمودار ۳ و ۴ میانگین سه تکرار هستند.

abbreviation of *Trichoderma* species in this experiment: showed as: *T. virens* (vi), *T. orientalis*(o), *T. ceramicum* (ce), *T. atroviride* (at), *T. koningii* (ko), *T. brevicompactum* (br), *T. spirale* (sp), *T. viridescens* (vid), *T. pseudokoningii* (pu), *T. harzianum* (ha), *T. asperellum* (as)

## بحث

موفق‌ترین گونه‌ها در تولید ترشحات مایع خارج سلولی جهت کاهش تولید زئوسپور در این بررسی *T. virens*، *T. brevicompactom* بودند که بر اساس تحقیقات نیلسن و همکاران گونه *T. brevicompactom* پس از رشد روی محیط کشت مایع و جامد تولید تریکوتسین و هارزیانوم آ می‌کنند که در محیط کشت مایع میزان آن بیشتر است. بر اساس مطالعات چت و همکاران (Chet et al. 1997) موتانت‌هایی از *T. virens* که میزان زیادی گلايوویرین تولید می‌کنند، گیاهچه‌های پنبه را از *P. ultimum* (عامل مرگ گیاهچه) حفاظت می‌کنند.

طیف وسیعی از میکروارگانیزم‌های هسته‌دار (یوکاریوتی) و پیش هسته‌ای (پروکاریوتی) زمانی که در

در آزمون افزودن تریکودرما پنج روز قبل از زادمایه *P. sojae* به خاک، مرگ گیاهچه در هیچ کدام از تیمارهای گونه‌های تریکودرما دیده نشد (شکل ۳)، شدت بیماری نیز نسبت به شاهد آلوده کاهش یافته (شکل ۴) و فاکتورهای رویشی هم در این حالت افزایش یافته و حتی در برخی از تیمارها نسبت به شاهد سالم، افزایش نشان داد (جدول ۳ و ۴) موفق‌ترین گونه‌ها در کنترل بیماری و کاهش شدت بیماری و افزایش فاکتورهای رویشی *T. orientalis*، *T. brevicompactum* و *T. spirale* بودند. این آزمون نسبت به آزمون اول مؤثرتر واقع شده و تفاوت بین دو روش در آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار (LSD) در سطح  $P \leq 0.05$  معنی‌دار بود (جدول ۲).

جدول ۳. مقایسه میانگین اثر جدایه‌های تریکودرما (T) روی بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی سویا (Ph) در شرایط گلخانه‌ای (شاخص‌های رویشی ریشه)

Table 3. Mean comparison of *Trichoderma* (T) isolates on soybean *Phytophthora* (Ph) rot *in vivo* (root growing factors)

Treatment	Shoot fresh weight		Shoot height		Disease severity	
	Ph+T	T+Ph	Ph+T	T+Ph	Ph+T	T+Ph
<i>T. asperellum</i>	۳/۴ <sup>cd</sup>	۵/۴ <sup>de</sup>	۵۸/۹۳ <sup>def</sup>	۷۸/۶ <sup>cd</sup>	۸۱/۶۶ <sup>abc</sup>	۶۳/۳ <sup>bcd</sup>
<i>T. ceramicum</i>	۲/۹۳ <sup>def</sup>	۴/۲۶ <sup>gf</sup>	۵۵/۷۵ <sup>fe</sup>	۷۲/۹ <sup>fe</sup>	۸۰/۸۳ <sup>abc</sup>	۶۰/۸۳ <sup>bcd</sup>
<i>T. harzianum</i>	۳/۰۴ <sup>cdef</sup>	۳/۸ <sup>hi</sup>	۵۹/۶۳ <sup>def</sup>	۶۷/۹ <sup>gf</sup>	۷۷/۵ <sup>bc</sup>	۷۵ <sup>ab</sup>
<i>T. orientalis</i>	۴/۳ <sup>q</sup>	۶/۵ <sup>ab</sup>	۷۹/۹۸ <sup>a</sup>	۸۶/۳ <sup>b</sup>	۴۸/۳ <sup>d</sup>	۲۸/۳ <sup>ef</sup>
<i>T. koningi</i>	۳/۱۸ <sup>cdef</sup>	۴ <sup>hi</sup>	۶۲/۹۱ <sup>de</sup>	۶۳/۳ <sup>gh</sup>	۷۰/۸ <sup>bc</sup>	۵۳/۳ <sup>bcd</sup>
<i>T. atroviride</i>	۳/۴۳ <sup>c</sup>	۶/۰۷ <sup>c</sup>	۵۷/۹۱ <sup>def</sup>	۸۲/۲ <sup>c</sup>	۷۲/۵ <sup>bc</sup>	۵۲/۵ <sup>bcd</sup>
<i>T. koningiopsis</i>	۳/۵۲ <sup>c</sup>	۴/۶۲ <sup>fg</sup>	۶۳ <sup>de</sup>	۶۲/۵ <sup>hi</sup>	۷۲/۱ <sup>bc</sup>	۷۰/۴ <sup>bc</sup>
<i>T. virens</i>	۳/۳۳ <sup>cde</sup>	۳/۵ <sup>i</sup>	۵۹/۹۱ <sup>def</sup>	۶۶/۳ <sup>hg</sup>	۶۱/۶ <sup>dc</sup>	۴۳/۳ <sup>cdef</sup>
<i>T. brevicompactum</i>	۴/۴ <sup>b</sup>	۶/۲ <sup>abc</sup>	۷۱/۳۳ <sup>bc</sup>	۷۹/۷ <sup>cd</sup>	۴۷/۹ <sup>d</sup>	۴۰/۸ <sup>def</sup>
<i>T. viridescens</i>	۴ <sup>b</sup>	۵۷/۸۷ <sup>dc</sup>	۶۵/۲۶ <sup>cd</sup>	۷۴ <sup>de</sup>	۶۷/۵ <sup>bcd</sup>	۵۵ <sup>bcd</sup>
<i>T. pseudokoningii</i>	۳/۱۴ <sup>cdef</sup>	۵/۱۲ <sup>ef</sup>	۶۰/۱ <sup>def</sup>	۷۹/۳ <sup>cd</sup>	۷۳/۳ <sup>bc</sup>	۴۴/۵ <sup>cdef</sup>
<i>T. spirale</i>	۴/۱ <sup>b</sup>	۶/۷ <sup>a</sup>	۵۷/۳۸ <sup>ab</sup>	۹۶/۴ <sup>a</sup>	۶۵ <sup>bcd</sup>	۲۷/۰۸ <sup>fg</sup>
Co +	۶/۵۹ <sup>a</sup>	۶/۵ <sup>ab</sup>	۵۷/۰۶ <sup>ef</sup>	۵۷/۱۶ <sup>zj</sup>	۰ <sup>e</sup>	۰ <sup>g</sup>
Co -	۰/۵۲ <sup>g</sup>	۰/۵۲ <sup>k</sup>	۳۰/۶۶ <sup>g</sup>	۳۰/۶ <sup>k</sup>	۱۰۰ <sup>a</sup>	۱۰۰ <sup>a</sup>
Wb	۲/۸۴ <sup>ef</sup>	۲/۸ <sup>j</sup>	۵۳ <sup>f</sup>	۵۳ <sup>j</sup>	۷۵/۶ <sup>bc</sup>	۷۵ <sup>ab</sup>

اعداد جدول میانگین سه تکرار هستند. میانگین‌هایی که در هر ستون با حروف یکسان نشان داده شده‌اند، در آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار ( $P \leq 0.05$ ) با یکدیگر اختلاف معنی‌دار ندارند.

Values of table are average of three replicates. Means with the same letter in each column are not significantly different at least significant difference ( $P \leq 0.5$ ).

گلوکاناز، کیتیناز و پروتئاز به دیواره سلولی میزبان نفوذ می‌کنند (Viterbo et al. 2002) تولید آنزیم بتا ۱ و ۳ گلوکاناز، سلولاز، کیتیناز و پروتئاز به طور معنی‌داری زمانی که تریکودرما در محیط کشت هیف اتوکلاو شده یا دیواره سلولی قارچ میزبان رشد کرده است، افزایش یافته است. این مشاهدات با این حقیقت که کیتین، بتا ۱ و ۳ گلوکان، سلولز و پروتئین از ترکیبات ساختمانی مهم دیواره سلولی اکثر قارچ‌ها

محیط کشت آنها کیتین و یا دیواره سلولی قارچی موجود باشد پتانسیل تولید بالای آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره سلولی را دارند. فعالیت مستقیم میکوپارازیتی گونه‌های مختلف قارچ تریکودرما به عنوان یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های آنها برای فعالیت آنتاگونیستی علیه قارچ‌های پاتوژن گیاهی است. تریکودرما به وسیله ساختارهای قلاب مانند، اپرسوریوم و یا پیچیدن، به هیف میزبان متصل می‌شوند و به وسیله ترشح آنزیم‌های هیدرولیتیک مانند

جدول ۴. مقایسه میانگین اثر جدایه‌های تریکودرما (T) روی شدت بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی و فاکتورهای رویشی هوایی در شرایط گلخانه‌ای

Table 4. Mean comparison of *Trichoderma* (T) isolates on disease severity of *Phytophthora* rot disease and aerial growing factors, in vivo

Treatment	Root fresh weight		Root dry weight		Root length	
	Ph+T	T+Ph	Ph+T	T+Ph	T+Ph	Ph+T
<i>T. asperellum</i>	۰/۳ <sup>fg</sup>	۰/۶۹ <sup>dc</sup>	۰/۰۸ <sup>ef</sup>	۰/۱۷ <sup>dc</sup>	۸/۲۵ <sup>def</sup>	۱۴/۵ <sup>bc</sup>
<i>T. ceramicum</i>	۰/۲۵ <sup>h</sup>	۰/۴۲ <sup>h</sup>	۰/۰۷ <sup>gh</sup>	۰/۱ <sup>g</sup>	۷/۶ <sup>fe</sup>	۱۱/۷۶ <sup>def</sup>
<i>T. harzianum</i>	۰/۲۴ <sup>h</sup>	۰/۶۶ <sup>ef</sup>	۰/۰۵۷ <sup>i</sup>	۰/۱۶ <sup>d</sup>	۷/۵۶ <sup>fe</sup>	۱۰/۴ <sup>f</sup>
<i>T. orientalis</i>	۰/۴۳ <sup>d</sup>	۰/۸۵ <sup>d</sup>	۰/۱ <sup>d</sup>	۰/۲ <sup>c</sup>	۱۲/۶۶ <sup>bc</sup>	۱۵/۷۶ <sup>ab</sup>
<i>T. koningi</i>	۰/۲ <sup>h</sup>	۰/۴۸ <sup>gh</sup>	۰/۰۵۳ <sup>i</sup>	۰/۱۲ <sup>f</sup>	۹ <sup>ed</sup>	۱۲/۴ <sup>ed</sup>
<i>T. atroviride</i>	۰/۳۲ <sup>fe</sup>	۰/۵۵ <sup>fg</sup>	۰/۰۷۲ <sup>g</sup>	۰/۱۳ <sup>fe</sup>	۹/۵۱ <sup>d</sup>	۱۲/۷ <sup>d</sup>
<i>T. koningiopsis</i>	۰/۳۴ <sup>e</sup>	۰/۵۳ <sup>gh</sup>	۰/۰۸۷ <sup>ef</sup>	۰/۱۳ <sup>fe</sup>	۹/۱۶ <sup>ed</sup>	۱۰/۹ <sup>ef</sup>
<i>T. virens</i>	۰/۴ <sup>d</sup>	۰/۵۲ <sup>gh</sup>	۰/۰۹۶ <sup>de</sup>	۰/۱۱ <sup>fe</sup>	۸/۹۱ <sup>edf</sup>	۱۰/۵ <sup>f</sup>
<i>T. brevicompactum</i>	۰/۵۳ <sup>d</sup>	۰/۹۶ <sup>bc</sup>	۰/۱۱ <sup>c</sup>	۰/۲۵ <sup>b</sup>	۱۱/۵۸ <sup>c</sup>	۱۵/۶۶ <sup>abc</sup>
<i>T. viridescens</i>	۰/۳ <sup>fe</sup>	۰/۵۴ <sup>gh</sup>	۰/۰۷۱ <sup>gh</sup>	۰/۱۳ <sup>ef</sup>	۹/۱۳ <sup>ed</sup>	۱۲/۵۳ <sup>de</sup>
<i>T. pseudokoningii</i>	۰/۲۳ <sup>h</sup>	۰/۷۴ <sup>d</sup>	۰/۰۵۹ <sup>i</sup>	۰/۲۵ <sup>b</sup>	۷/۳۳ <sup>f</sup>	۱۴/۴ <sup>c</sup>
<i>T. spirale</i>	۰/۸۴ <sup>b</sup>	۰/۹۸ <sup>b</sup>	۰/۲۳ <sup>b</sup>	۰/۳۱ <sup>a</sup>	۱۴/۰۸ <sup>b</sup>	۱۶/۰۸ <sup>ab</sup>
Co +	۱/۱۶ <sup>a</sup>	۱/۱۳ <sup>a</sup>	۰/۳۱ <sup>a</sup>	۰/۳۱ <sup>a</sup>	۱۷/۰۸ <sup>a</sup>	۱۷/۰۸ <sup>a</sup>
Co -	۰/۰۹ <sup>i</sup>	۰/۰۸۸ <sup>j</sup>	۰/۰۲۱ <sup>j</sup>	۰/۰۲ <sup>i</sup>	۳/۴ <sup>g</sup>	۳/۴ <sup>g</sup>
Wb	۰/۲۵ <sup>h</sup>	۰/۲۸ <sup>i</sup>	۰/۰۶۱ <sup>hi</sup>	۰/۰۶ <sup>h</sup>	۴/۱۶ <sup>g</sup>	۴/۱۳ <sup>g</sup>

اعداد جدول میانگین سه تکرار هستند. میانگین‌هایی که در هر ستون با حروف یکسان نشان داده شده اند، در آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار ( $P \leq 0.5$ ) با یکدیگر اختلاف معنی‌دار ندارند.

Values of table are average of 3 replicates. Means with the same letter in each column are not significantly different at least significant difference ( $P \leq 0.5$ ).

کشت افزایش یافته و در روزهای پنجم تا هشتم به حداکثر میزان خود می‌رسد و پس از آن به تدریج کاهش می‌یابد (El-Katanty et al. 2001).

در سنجش فعالیت آنزیمی زمانی که میسلیم فیتوفتورا به محیط کشت اضافه شد میزان فعالیت آنزیمی بیشتر شده که با نتایج توندج و همکاران که میسلیم *P. capsici*، *P. citrophthora* و *P. palmivora* را به محیط کشت *T. asperellum* اضافه کرده بود و باعث پنج برابر شدن فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۳ گلوکاناز و کربوکسی‌متیل سلولاز

هستند، اساسی برای این پیشنهاد است که آنزیم‌های هیدرولیتیک تولید شده به وسیله تریکودرما نقش مهمی در تخریب بیمارگرهای گیاهی بازی می‌کنند (El-Katanty et al. 2001)

در بررسی میزان فعالیت آنزیم در این تحقیق گونه‌های تریکودرما کشت شده در محیط مایع معدنی، به مدت هفت روز در حالت تکان خوردن نگهداری شدند که بر اساس نتایج ون و همکاران (۲۰۰۵) و زال‌دیوار و همکاران (۲۰۰۱) میزان تولید آنزیم در تریکودرما در پنج روز اول

آزمایشی اضافه شدند. در آزمون گلخانه‌ای زمانی که مایه زنی عامل بیماری زودتر از تریکودرما صورت گرفت، بیمارگر فرصت استقرار روی گیاهچه را داشته، و در این حالت تنها گونه *T. brevicompactum* باعث کنترل بیماری و مانع مرگ گیاهچه شد ولی دیگر گونه‌های تریکودرما نتوانستند صد درصد مانع از مرگ گیاهچه شوند ولی شدت بیماری نسبت به شاهد آلوده تا اندازه‌ای کاهش یافت، در حالی که با مایه‌زنی تریکودرما زودتر از قارچ عامل بیماری تریکودرما فرصت استقرار و تسخیر فراریشه را یافته و زمانی که عامل بیماری اضافه شد به علت تسخیر فضای اطراف ریشه گیاه توسط تریکودرما، بیمارگر تنها قادر به استقرار روی ریشه‌های فرعی شده و مرگ گیاهچه به صفر رسیده و شدت بیماری نیز کاهش یافت، این نتایج با تحقیقات هدر و همکاران (Hadar et al. 1978) که قارچ *Rhizoctonia solani* را با استفاده از *T. harzianum* کنترل نمودند مطابقت دارد.

در یک دید کلی می‌توان گفت که *T. brevicompactum* که در مطالعات آزمایشگاهی به عنوان گونه موفق شناخته شده بود در بررسی‌های گلخانه‌ای توانست از شدت بیماری کاسته و باعث افزایش فاکتورهای رویشی گیاه شود و می‌توان آن را به عنوان بهترین گونه جهت کنترل این بیماری معرفی نمود.

### منابع

جهت ملاحظه به صفحات (57-59) متن انگلیسی مراجعه شود.

شده بود، مطابقت دارد. در نتایج توندج و همکاران میزان فعالیت آنزیم کربوکسی‌متیل سلولاز بیشتر از بتا ۱ و ۳ و گلوکاناز بوده ولی در این بررسی فعالیت آنزیمی بتا ۱ و ۳ گلوکاناز در همه گونه‌ها به جز *T. ceramicum* بیشتر از فعالیت آنزیم بتا ۱ و ۴ گلوکاناز بوده است.

بررسی‌های آزمایشگاهی روش خوبی برای شناسایی مقدماتی میکروارگانیسم‌های آنتاگونیست محسوب می‌شود، ولی بر اساس نتایج آزمایشگاه نمی‌توان مفید بودن یک آنتاگونیست را تعیین کرد، زیرا در آزمایشگاه عموماً اثر آنتاگونیست مستقیماً در تقابل با عامل بیماری روی یک محیط کشت غذایی بررسی می‌شود در حالی که اثر میکروارگانیسم‌ها در محیط طبیعی تحت تأثیر عوامل زیادی نظیر دما، اسیدیته، رطوبت، بافت خاک و رفتار سایر میکروارگانیسم‌ها می‌باشد. مثلاً ممکن است یک جدایه در آزمایشگاه اثر قوی بر عامل بیماری داشته باشد اما در محیط طبیعی و در رقابت با سایر آنتاگونیست‌ها نتواند موفق ظاهر شود، به همین علت تمامی گونه‌های مورد آزمون در آزمایشگاه، در شرایط گلخانه بررسی شدند. هدر و همکاران (Hadar et al. 1978) نشان دادند که استقرار و تکثیر تریکودرما در خاک بستگی به کاربرد آن دارد و هنگامی که روی سبوس گندم سترون تکثیر شود و سپس به خاک اضافه شود تا یک میلیون برابر تکثیر می‌شود و استقرار و پایداری آن از زمان کاربرد در خاک ۹ تا ۳۶ هفته به طول می‌انجامد. به نظر می‌رسد این روش یکی از بهترین روش‌های کاربرد تریکودرما می‌باشد. با توجه به این مطلب جدایه‌های تریکودرما با این روش به گلدان‌های