

گزارش کوتاه علمی

گزارش تولید فرم جنسی *Pyrenophora tritici-repentis* در ایران

FIRST REPORT OF THE SEXUAL STAGE OF PYRENOPHORA TRITICI-REPENTIS IN IRAN


حسن مؤمنی^۱، محمد جوان نیکخواه^۲، محمد رضوی^۱

۱. بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

۲. گروه گیاه‌پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

بیماری لکه خرمایی گندم با عامل قارچی *Pyrenophora tritici-repentis*(Died.) Drechsler در حال حاضر در مناطق شمالی کشور گسترش زیادی پیدا کرده است. هر چند گزارشی از جداسازی فرم غیرجنسی قارچ با نام *Drechslera tritici-repentis*(Died.) Shoemaker از مازندران قبل از ارائه شده (فروتن و همکاران ۱۹۹۵) ولی تولید فراوان کنیدیوم در محیط کشت و نیز فرم جنسی قارچ تاکنون از کشور گزارش نشده است. در این تحقیق برگ‌های آلوده گندم از مزارع استان‌های گلستان و مازندران جمع‌آوری و در آزمایشگاه و شرایط گلخانه‌ای بررسی شدند. نتایج نشان داد که پرگنهای هفت روزه قارچ در محیط V8-Caco3 به رنگ خاکستری تیره ، کنیدیوفورها در پایه متورم به رنگ زرد تا قهوه‌ای با ابعاد $7-8 \times 100-300$ میکرومتر، کنیدیوم‌ها زرد و دارای ۵-۷ بند و به ابعاد $100-200 \times 100-180$ میکرومتر با پاخته پایه مخروطی می‌باشند(شکل ۱ a). با کشت پلاگ‌هایی از محیط کشت فعال V8-Caco3 روی محیط کشت آب آگار (WA) ۲٪ حاوی قطعات برگ گندم سترون شده و نگهداری آنها در شرایط نوری و دمایی خاص شامل ۱۲ ساعت نور فلئورست و ۱۲ ساعت نور UV در دمای ۲۲ درجه سلسیوس، پس از دو هفته پسودوتیسیوم‌های تیره با ابعاد $200-250$ میکرومتر روی بافت برگ تشکیل شوند (شکل ۱ b و c). برای بلوغ بیشتر اندام‌های جنسی پتری‌های محتوی پسودوتیسیوم‌های قارچ به مدت دو هفته دیگر در یخچال نگهداری شدند. آسکوسبورها تخم مرغی شکل و دارای سه بند عرضی مشخص و یک بند طولی و با ابعاد $16-20 \times 40-50$ میکرومتر بودند (شکل ۱d). این مشخصات با مشخصات ارائه شده برای قارچ *Pyrenophora tritici-repentis* در Sivanesan (1987) کاملاً مطابقت داشت.

جهت رعایت اصول کنخ، آزمون بیماری‌زایی براساس مایه‌زنی سوسپانسیون آسکوسبورهای قارچ با غلظت 10^6 اسپور در هر میلی‌لیتر آب روی ارقام حساس بولانی و تجن گندم انجام شد. گیاهچه‌های گندم در مرحله ۳-۲ برگی مایه‌زنی شدند و سپس به مدت ۴۸ ساعت زیر اتافکی با پوشش پلاستیکی سیاه در گلخانه ، تحت دمای ۲۲ درجه سلسیوس و تناب نوری ۱۶ ساعت (۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی) قرار گرفتند. سپس اتافک از روی گیاهچه‌ها برداشته شده و گیاهچه‌های مایه‌زنی شده همچنان در شرایط نوری و دمایی ذکر شده قرار گرفتند. شش روز پس از مایه‌زنی، علایم ظاهری بیماری روی



شکل ۱. مشخصات اندام‌های بارده جنسی و غیرجنسی قارچ *Pyrenophora tritici-repentis* و نشانه‌های بیماری لکه خرمابی حاصل از این قارچ (a) کنیدیوم و کنیدیوفور (b) تشکیل سودوتیسیوم در محیط آب آگار (WA) ۲٪ حاوی قطعات برگ گندم (c) خروج آسک از سودوتیسیوم (d) آسک و آسکوپورها (e) علایم ظاهری بیماری روی برگ گندم رقم بولانی.

Fig. 1. Characteristics of asexual and sexual fruiting bodies of *Pyrenophora tritici-repentis*, and symptom of disease caused by the fungus. (a) Conidium and conidiophores. (b)Formation of pseudothecia on 2% WA amended with wheat leaves slices. (c)Exit of ascospores from pseudothecium. (d) Ascospores.(e) symptoms of disease on leaves of Bolani cv.

برگ شامل لکه‌های مشخص نکروز و کلروز مشاهده شد(شکل ۱ e). قارچ عامل بیماری مجدداً از بافت‌های آلوده جداسازی شد. این اولین گزارش از وقوع فرم جنسی قارچ *P. tritici-repentis* و توان بیماری زایی آن روی گندم در ایران می‌باشد.