

واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم*

مجید جعفری^۱، مسعود شمس‌بخش^{۲*} و احمد معینی^۳

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۵/۲۶؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۷)

چکیده

ویروس موزاییک شلغم (*Turnip mosaic virus, TuMV*) یکی از شایع‌ترین ویروس‌های مزارع کلزا در ایران محسوب می‌شود. بهترین روش برای کنترل خسارت این ویروس استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد. در پژوهش حاضر واکنش ۱۱ رقم تجاری و دو لاین کلزا به جدایه هلندی TuMV در شرایط گلخانه بررسی شد. بوته‌ها در مرحله ۳-۵ برگی و به روش انتقال مکانیکی با عصاره گیاه توتون آلوده به TuMV مایه زنی و واکنش آن‌ها بر اساس شاخص شدت علائم و میزان جذب الایزا (OD₄₀₅)، چهار هفته و میانگین وزن‌های خشک و تر گیاهان هفت هفته پس از مایه‌زنی تعیین شد. این پژوهش با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در سه تکرار و هر تکرار شامل چهار واحد آزمایشی برای گیاهان شاهد و آلوده انجام شد. آلودگی ویروسی گیاهان با استفاده از آزمون RT-PCR تایید شد. بر اساس شاخص‌های مورد بررسی، اختلاف ارقام معنی‌دار بود. بطوریکه در سطح پنج درصد، لاین کرج ۳ به عنوان رقم منحل، ژنوتیپ‌های RG5003 و کرج ۱ حساس، ژنوتیپ کرج ۲ بسیار حساس و سایر ژنوتیپ‌ها نیمه حساس شناخته شدند. نتایج نشان داد نرخ آلودگی برای همه ژنوتیپ‌ها یکسان بود. به رغم اینکه اختلاف میانگین جذب نوری الایزا بین گیاهان سالم و آلوده معنی‌دار بود، به استثنای رقم ساری گل، شاخص میزان جذب الایزا بین گیاهان آلوده رقم‌ها و لاین‌های بررسی شده، اختلاف معنی‌دار نداشت. بین ارقام کلزا، فقط وزن تر و خشک لاین کرج ۲ به طور معنی‌داری در اثر آلودگی به ویروس کاهش نشان داد. در این پژوهش برای اولین بار نمره‌دهی (صفر تا هشت) برای شدت علائم گیاهان کلزا به TuMV معرفی شد.

کلیدواژه: مقاومت، مایه زنی، الایزا، *Brassica napus*، ایران

* بخشی از رساله دکتری نگارنده اول، ارائه شده به دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

** مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: shamsbakhsh@modares.ac.ir

۱. دانشجوی دکتری گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

۲. دانشیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

۳. دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

Reaction of commercial canola varieties and lines against *Turnip mosaic virus* (TuMV) isolate

M. Jafari¹, M. Shams-bakhsh^{2*}, and A. Moieni³

(Received: 17.8.2015; Accepted: 27.1.2016)

Abstract

Turnip mosaic virus (TuMV) is one of the most prevalent viruses of canola fields in Iran. Use of resistant varieties is the best recommended manner to control losses caused by TuMV. In this research, the reaction of 11 commercial varieties and two lines of canola (*Brassica napus* L.) was investigated against a Netherland TuMV isolate under greenhouse condition. The seedlings were inoculated using TuMV-infected tobacco (*Nicotiana benthamiana*) sap at 3-5 leaf stage and their reaction was evaluated based on symptom severity index and ELISA OD₄₀₅ values at four and the mean values of fresh and dry weights of plants at seven weeks after inoculation. This study was performed in a factorial experiment and randomized complete block design with three replications and each repeat involved four experimental units for each group of inoculated and uninoculated plants. Virus-infection was confirmed by RT-PCR. In accordance with evaluated parameters, reaction of varieties to the virus was significantly different. At probability level of 5%, Karaj3 was tolerant while Karaj2 was the most susceptible, RGS003 and Karaj1 were susceptible and the rest of canola varieties/lines were moderately susceptible to TuMV. Difference of OD₄₀₅ values in ELISA was meaningless among inoculated plants of canola varieties/lines. Among canola varieties/lines, only fresh and dry weights of Karaj2 line was reduced significantly in virus-infected plants. The scoring system (0 to 8) for the symptoms severity of TuMV in canola was introduced for the first time in this research.

Keywords: Resistant, Inoculation, ELISA, *Brassica napus*, Iran

* Corresponding author's E-mail: shamsbakhsh@modares.ac.ir

1. Ph.D. student of Plant Pathology Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2. Associate Professor of Plant Pathology Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3. Associate Professor of Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

مقدمه

کنترل TuMV به دلیل دامنه میزبانی وسیع و انتقال آن توسط شته به روش ناپایا دشوار می‌باشد (Walsh & Jenner 2002). کنترل شیمیایی بیماری علاوه بر خطرات ناشی از آلودگی محیط‌زیست غیرمؤثر نیز می‌باشد بنابراین مقاومت طبیعی گیاهی روش کنترل مناسبی برای این ویروس می‌باشد (Hughes et al. 2002). مقاومت در *B. rapa* علیه دامنه وسیعی از جدایه‌های TuMV شناسایی شده است (Suh et al. 1995, Hughes et al. 2002, Walsh & Jenner 2002).

در یک بررسی ۱۲ پاتوتیپ ویروس، بر اساس رابطه متقابل ۱۲۴ جدایه TuMV با چهار لاین کلزا به نام‌های Rape S6, Rape R4, Rape 165 Swede و Swede S1 معرفی شد. در این بررسی مشاهده چهار نوع فنوتیپ O (بدون آلودگی یعنی گیاهان مصون می‌باشند، نتایج الیزای منفی در برگ مایه زنی شده و برگ‌های مایه زنی نشده)، + (بروز علائم بیماری و آلودگی سیستمیک، الیزای مثبت در برگ مایه زنی شده و مایه زنی نشده)، R (آلودگی لکه موضعی نکروتیک، بدون آلودگی سیستمیک با نتایج الیزای مثبت در برگ مایه زنی شده و منفی برای برگ‌های مایه زنی نشده) و +N (علائم موضعی نکروتیک به همراه علائم سیستمیک نکروتیک، شناسایی ویروس توسط آزمون الیزا در برگ‌های مایه زنی شده و مایه زنی نشده) در معرفی نوع پاتوتیپ مورد استفاده قرار گرفته است (Jenner & Walsh 1996). ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های استرالیایی کلزا حاکی از وجود چهار نوع فنوتیپ R, R_N, +N و + می‌باشد (Coutts et al. 2007). فنوتیپ‌های مختلف مقاومت به TuMV در پنج گونه گیاهی از تیره شب‌بو شامل گونه‌های *Camelina*, *Brassica junica*, *B. oleracea*, *sativa*، *B. rapa* و *Rhaphanus sativus* ارزیابی شده و در مجموع ۱۰ نوع فنوتیپ در اثر مایه زنی

مهمترین گیاه دانه روغنی ایران از نظر سطح زیر کشت کلزا (*Brassica napus* L.) می‌باشد. سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ حدود ۹۳/۶ هزار هکتار و میزان تولید آن برابر با ۱۷۵ هزار تن برآورد شده است (Anonymous 2014). ویروس موزاییک شلغم (*Turnip mosaic virus*, TuMV) گونه‌ی متعلق به جنس *Potyvirus* از خانواده *Potyviridae* است که گیاهان تیره شب‌بو (*Brassicaceae*) را آلوده می‌کند (Walsh & Jenner 2002) و بیشترین دامنه میزبانی را در بین گونه‌های جنس *Potyvirus* دارد (Shukla et al. 1994).

ویروس موزاییک شلغم از مزارع گیاه دانه روغنی کلزا در ایران به طور گسترده گزارش شده است (Farzadfar et al. 2005, Ghorbani et al. 2007, Shahraeen et al. 2003, Shahraeen 2012, Zahedi Tabarestani et al. 2010, Sabokkhiz et al. 2012). در ایران علاوه بر کلزا از گیاهان *Matthiola sp.*, *Cheianthus cheiri*, *Chrysanthemum sp.*, *Impatiens*, *Zinnia elegans*, *Petunia hybrida*, *balsamina* نیز گزارش شده است (Bahar et al. 1985, Farzadfar et al. 2009). همچنین در ایران TuMV از علف‌های هرز *Rapistrum rugosum*, *Sisymbrium loeselii*, *S. irio* و *Hirschfeldia incana* متعلق به گیاهان تیره شب‌بو نیز گزارش شده است (Farzadfar et al. 2009). میزان آلودگی کلزا به TuMV نسبت به سایر ویروس‌های آلوده کننده مزارع کلزا در استان گلستان بیشتر گزارش شده است (Zahedi Tabarestani et al. 2010). همچنین بررسی نمونه‌های کلزای دارای علائم بیماری‌های ویروسی با استفاده از آزمون الیزا در استان خراسان رضوی نشان دهنده آلودگی بالای ۲۶ درصدی به ویروس موزاییک شلغم می‌باشد (Sabokkhiz et al. 2012).

سیستمیک در توتون حدود ۱۰-۷ روز پس از مایه زنی ظاهر و آلودگی ویروسی تأیید شد.

مایه زنی گیاهان با TuMV

رشد و جوانه زنی بذر در دمای ۲۵ درجه سلسیوس انجام و خاک گلدان‌ها از ترکیب مساوی پیت، پرلیت و خاک آماده شد. گیاهان کشت شده در شرایط گلخانه در مرحله ۳-۵ برگی با عصاره برگ‌های توتون آلوده به TuMV مایه‌زنی شدند. گیاهان شاهد هر رقم نیز به عنوان کنترل منفی با بافر فسفات و پودر کاربوراندوم تیمار شدند. برگ‌های آلوده به ویروس موزاییک شلغم در بافر فسفات ۰/۱ مولار با pH ۷/۴ حاوی پودر کاربوراندوم مایه‌زنی شدند. گیاهان در شرایط گلخانه در دمای ۱۸ درجه سلسیوس تا پایان نمونه‌برداری نگهداری شدند.

ارزیابی آلودگی به ویروس با روش نسخه‌برداری معکوس - واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (RT-PCR)

برای تأیید آلودگی گیاهان مایه‌زنی شده به TuMV، گیاهان مایه‌زنی شده به ویروس با واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز به طریق نسخه‌برداری معکوس با استفاده از جفت آغازگرهای معرفی شده توسط سانچز و همکاران (Sanchez et al. 2003) تکثیر کننده قطعه ۹۸۶ جفت‌بازی، شامل بخشی از طول ژن پروتئین پوششی، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نسخه‌برداری معکوس و تکثیر واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز به ترتیب با استفاده از کیت‌های تجاری RT master mix (2×) شرکت HyperScript™ و Taq master mix (2×) شرکت Amplicon و طبق دستور العمل آن‌ها انجام شد. برنامه واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز شامل واسرشت سازی اولیه به مدت چهار دقیقه در ۹۵ درجه سلسیوس و

این گیاهان به ویروس معرفی شده است (Nyalugew et al. 2015).

در ایران از وضعیت واکنش ارقام تجاری کلزا در برابر TuMV اطلاعاتی دقیقی در دست نیست. از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی واکنش ارقام تجاری و لاین-های کلزای موجود در ایران در برابر TuMV و همچنین معرفی یک روش نمره‌دهی مناسب که بتواند ارتباط علایم و شدت بیماری را در ارقام و لاین‌های کلزا به TuMV نشان دهد.

روش بررسی

ژنوتیپ‌های کلزا و منبع ویروس

در این تحقیق ۱۱ رقم و دو لاین کلزای تجاری شامل ارقام بهاره و پاییزه مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیه ارقام و لاین‌های مورد بررسی به استثنای رقم هیبرید هایولا ۴۰۱ از نوع آزاد گرده افشان بودند. بذور کلیه ارقام از مرکز تحقیقات دانه‌های روغنی کشور تهیه گردید. نام و مشخصات ارقام مورد استفاده در این پژوهش در جدول یک آمده است.

جدایه ویروس مورد استفاده از دکتر Ko Verhoeven از سازمان گیاه پزشکی بین‌المللی واگنینگن کشور هلند دریافت گردید. این جدایه از گیاه *Brassica chinensis* جداسازی شده است. بخش عمده‌ای از توالی ژن رمز کننده پروتئین پوششی این جدایه توالی‌یابی و در بانک اطلاعاتی NCBI با شماره رس KU535893 ثبت شد. ابتدا برای فعال سازی ویروس، برگ‌های دریافتی آلوده به TuMV در بافر فسفات ۰/۱ مولار با pH ۷/۴ عصاره‌گیری شد و به همراه پودر کاربوراندوم به برگ‌های توتون *Nicotiana benthamiana* مایه‌زنی شد. علایم

جدول ۱: نام و مشخصات ارقام کلزای تجاری ایران ارزیابی شده در این تحقیق

Table 1: Name and characteristics of commercial canola varieties in Iran evaluated in this study

مبدأ Source	مناطق کشت Farming area	تیپ Type	نام رقم یا لاین Name of Varieties or lines
استرالیا Australia	Warm and humid zones	بهاره Spring	Hayola 401
ایران Iran	Warm and humid zones	بهاره Spring	Zafar
ایران Iran	Warm and humid zones	بهاره Spring	Sary gol
ایران Iran	Cool and temperate zones	زمستانه Winter	Karaj 1
ایران Iran	Cool and temperate zones	مناطق سرد و معتدل سرد Winter	Karaj 2
ایران Iran	Cool and temperate zones	مناطق سرد و معتدل سرد Winter	Karaj 3
آلمان Germany	Cool and temperate zones	مناطق سرد و معتدل سرد Winter	RGS003
آلمان Germany	Warm and humid zones	بهاره Spring	Opera
سوئد Sweden	Cool and temperate zones	مناطق سرد و معتدل سرد Winter	Talayeh
آلمان Germany	Cool and temperate zones	مناطق سرد و معتدل سرد Winter	Licord
آلمان Germany	Cool and temperate zones	مناطق سرد و معتدل سرد Winter	Okapi
فرانسه France	Cool and temperate zones	مناطق سرد و معتدل سرد Winter	SLM046
آلمان Germany	Cool and temperate zones	مناطق سرد و معتدل سرد Winter	Zarfam
ایران Iran	Cool and temperate zones	مناطق سرد و معتدل سرد Winter	

تعیین و ثبت شاخص شدت علائم

پس از مایه‌زنی ویروس، نوع و شدت علائم بیماری در برگ‌های مایه‌زنی شده و برگ‌های فوقانی به طور روزانه از زمان مایه‌زنی تا چهار هفته پس از آن بررسی و یادداشت برداری شد.

سپس ۳۰ چرخه شامل ۹۴ درجه سلسیوس به مدت ۲۰ ثانیه، دمای ۵۵/۵ درجه سلسیوس به مدت ۳۰ ثانیه و ۷۲ درجه سلسیوس به مدت یک دقیقه انجام و در آخر گسترش نهایی در دمای ۷۲ سلسیوس به مدت پنج دقیقه انجام شد.

اندازه‌گیری وزن تر و خشک گیاهان

برای بررسی اثر آلودگی ویروس بر وزن تر و خشک، اندام هوایی گیاهان ۵۰ روز پس از مایه‌زنی جمع‌آوری و وزن تر و خشک آنها اندازه‌گیری شد. به منظور اندازه‌گیری وزن خشک گیاهان، نمونه‌ها به مدت دو روز در دمای ۷۰ درجه سلسیوس در آون نگهداری و سپس وزن خشک اندام هوایی آنها اندازه‌گیری شد.

ارزیابی میزان آلودگی ویروس بر اساس نتایج آزمون الایزا

چهار هفته پس از مایه‌زنی ویروس، کلیه گیاهان با آزمون الایزای غیر مستقیم با استفاده از روش توصیف شده توسط کانورس و مارتین (Converse & Martin 1990) انجام شد. با آنتی بادی تهیه شده از شرکت DSMZ آلمان با رقت ۱:۱۰۰۰ در بافر PBST (حاوی دو درصد PVP و ۰/۲ درصد Bovine serum albumin) به عنوان آنتی‌بادی اولیه و Anti-rabbit IgG (Fc) AP conjugate شرکت پرومگا (آمریکا) با رقت ۱:۷۵۰۰ در بافر یادشده به عنوان آنتی‌بادی ثانویه استفاده شد. برای این منظور از برگ‌های میانی گیاهان در موقعیت یکسان برای استخراج عصاره با بافر عصاره‌گیری (PBST حاوی دو درصد PVP) به نسبت یک میلی لیتر بافر برای ۰/۱ گرم بافت برگ استفاده شد.

طرح آزمایشی و تحلیل داده‌ها

این پژوهش با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار بطوریکه در هر تکرار چهار گلدان با دو گلدان گیاه آلوده و دو گلدان از گیاه سالم انجام شد. آزمایش ارزیابی ارقام دو بار تکرار شد. تحلیل آماری مقایسه میانگین نتایج الایزا، وزن تر، وزن خشک و شاخص علایم با استفاده از نرم افزار SAS

9.1 انجام شد و جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون کمترین اختلاف معنی دار (LSD) در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.

نتایج

نتایج الایزا

نتایج الایزا نشان داد که تمام گیاهان شاهد ارقام تجاری و لاین‌های کلزای ایران از نظر آماری در یک گروه مستقل از گیاهان مایه‌زنی شده به TuMV قرار گرفتند، این نتیجه تایید کننده آلودگی سیستمیک گیاهان مایه‌زنی شده بود. از طرف دیگر، به استثنای رقم ساری گل بین گیاهان آلوده ارقام مختلف اختلاف معنی داری دیده نشد (جدول ۲).

نتایج نسخه‌برداری معکوس - واکنش زنجیره‌ای پلی-مرز (RT-PCR)

واکنش زنجیره‌ای پلی‌مرز به طریق نسخه‌برداری معکوس با آغازگرهای اختصاصی TuMV منجر به تکثیر قطعه حدود یک کیلوگفت‌بازی مورد انتظار شد که تاییدکننده آلودگی گیاهان مایه‌زنی شده با TuMV بود (شکل ۱).

تعیین شاخص‌های آلودگی و تحلیل نتایج آن‌ها

در این تحقیق با بررسی پیشرفت بیماری، شاخص‌های علایم از درجه صفر تا هشت تعیین شد (جدول ۳)، بطوریکه بیشترین شدت بیماری مربوط به شاخص هشت و کمترین آن شاخص صفر بود. کلیه شاخص‌ها از مقایسه تفاوت علایم بین گیاه شاهد مایه‌زنی شده با بافر فسفات و گیاه مایه‌زنی شده با عصاره گیاهی آلوده به ویروس در بافر فسفات برای هر رقم معرفی شدند (شکل ۲).


روند توسعه علایم بیماری از زمان مایه‌زنی ویروس تا ۵۰ روز بعد بررسی و تغییرات ایجاد شده در مقایسه با

جدول ۲: میانگین شاخص شدت علائم، جذب نوری در طول موج ۴۰۵ نانومتر، چهار هفته پس از مایه زنی، وزن های تر و خشک گیاهان هفت هفته پس از مایه زنی با TuMV
Table 2: Mean of severity index, absorbance at 405 nm wave length four weeks after inoculation, fresh and dried weights seven weeks post inoculation with TuMV

رقم یا لاین	میانگین شاخص شدت علائم		میانگین جذب نور در طول موج ۴۰۵ نانومتر		میانگین وزن تر گیاهان (گرم)		میانگین وزن خشک گیاهان (گرم)		میانگین درصد کاهش وزن خشک	
	(I)	(NI)	(I)	(NI)	(I)	(NI)	(I)	(NI)	(I)	(NI)
Karaj2	7.66 ^a	0 ^h	2.44 ^a	1.31 ^c	4.43 ^{cd}	10.51 ^a	0.60 ^{cde}	1.63 ^{ab}	57	63
RGS003	6.83 ^b	0 ^h	2.38 ^{ab}	1.27 ^c	5.99 ^{abcd}	9.21 ^{abc}	0.83 ^{abcde}	1.36 ^{abc}	34	38
Karaj1	6.58 ^b	0 ^h	2.46 ^a	1.28 ^c	5.38 ^{abcd}	7.70 ^{abcd}	0.64 ^{cde}	1.00 ^{abcde}	30	36
SLM046	5.41 ^c	0 ^h	2.29 ^{ab}	1.16 ^c	5.66 ^{abcd}	6.80 ^{abcd}	0.70 ^{cde}	0.93 ^{abcde}	16	24
Sary gol	5.25 ^c	0 ^h	1.92 ^b	1.28 ^c	6.06 ^{abcd}	8.11 ^{abcd}	0.84 ^{abcde}	1.01 ^{abcde}	25	16
Zafar	5.08 ^{cd}	0 ^h	2.10 ^{ab}	1.31 ^c	6.88 ^{abcd}	7.50 ^{abcd}	0.93 ^{abcde}	1.05 ^{abcde}	8	11
Opera	5.00 ^{cde}	0 ^h	2.42 ^a	1.27 ^c	4.06 ^{cd}	5.00 ^{bcd}	0.70 ^{cde}	0.83 ^{abcde}	18	15
Hayola 401	4.91 ^{cde}	0 ^h	2.37 ^{ab}	1.32 ^c	5.20 ^{abcd}	5.66 ^{abcd}	0.63 ^{cde}	0.76 ^{bcde}	8	17
Licord	4.58 ^{def}	0 ^h	2.38 ^{ab}	1.17 ^c	8.00 ^{abcd}	9.98 ^{ab}	1.36 ^{abcde}	1.70 ^a	19	20
Zarfam	4.5 ^{def}	0 ^h	2.09 ^{ab}	1.26 ^c	4.94 ^{bcd}	6.56 ^{abcd}	0.8 ^{bcde}	1.04 ^{abcde}	24	23
Talayeh	4.41 ^{ef}	0 ^h	2.48 ^a	1.31 ^c	6.75 ^{abcd}	7.75 ^{abcd}	0.80 ^{abcde}	0.93 ^{abcde}	12	13
Okapi	4.25 ^f	0 ^h	2.34 ^{ab}	1.26 ^c	2.93 ^d	4.29 ^{cd}	0.36 ^e	0.46 ^{cd}	31	21
Karaj3	2.58 ^g	0 ^h	2.33 ^{ab}	1.29 ^c	7.03 ^{abcd}	8.55 ^{abc}	1.09 ^{abcd}	1.30 ^{abc}	17	16

۱: میانگین مایه زنی شده با عصاره گیاه آلوده به TuMV در بافر فسفات، NI: گیاه مایه زنی شده با بافر فسفات

میانگین‌هایی که با حروف مشابه علامت گذاری شده‌اند بر اساس آزمون کمترین اختلاف معنی دار در سطح ۵٪ در یک گروه قرار دارند.
 Means light absorption values indicated by the same letters represent not significant differences at $P \leq 0.05$ calculated using the least significant difference test and put in one group.



شکل ۱: نقش الکتروفورزی واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز در ژل آگارز یک درصد با استفاده از آر.ان.ای استخراج شده از چهار نمونه گیاهی الیزا مثبت با آغازگرهای تکثیر کننده بخشی از ژن پروتئین پوششی TuMV. M: نشانگر اندازه دی.ان.ای (GenRuler™ 1kb DNA ladder, Fermentas) ۱: کرچ ۱، ۲: کرچ ۲، ۳: کرچ ۳، ۴: هایولا ۴۰۱ و ۵: گیاه سالم

Fig1: Agarose gel electrophoresis pattern of RT-PCR products obtained from total RNA extracts of four ELISA positive plants using the specific primers for coat protein gene of TuMV. Lanes M: molecular marker (GenRuler™ 1kb DNA ladder, Fermentas) 1: Karaj1, 2: Karaj2, 3: Karaj3, Hyola 401 and 5: Healthy plant

بحث

ارقام تجاری و لاین‌های بهاره و پاییزه کلزای ایران به مایه زنی با TuMV واکنش‌های متفاوتی از نظر سرعت ظهور و نوع علائم بیماری مانند پیسک، موزاییک، جزایر سبز، زردی و کاهش رشد گیاه نشان دادند (شکل ۲). بر اساس نتایج حاصل از آزمایش اولیه و دو تکرار آزمایش اصلی در شرایط کنترل شده گلخانه شاخص علائم برای ارقام کلزای آورده به TuMV برای اولین بار معرفی گردید. پیسک تنها در رقم کرچ ۳ مشاهده شد که به همراه تأخیر ۲۰ روزه در بروز علائم سیستمیک ویروس و بدون بروز علائم سبز در برگ‌های مایه‌زنی شده مشاهده شد. علائم زردی به طور غالب در رقم RGS003 و به میزان کمتری در لاین‌های کرچ ۱ و کرچ ۲ نیز قابل مشاهده بود.

در این پژوهش هشت شاخص علائم (صفر تا هشت) برای گیاهان مایه‌زنی شده به TuMV معرفی شد (جدول ۳). در شاخص یک در برگ‌های گیاهان مایه‌زنی شده به

شاهد هر رقم ثبت گردید. جدول دو تحلیل نتایج شاخص بیماری را نشان می‌دهد. نتایج تحلیل با نرم افزار SAS و در سطح احتمال پنج درصد نشان داد که لاین کرچ ۲ بیشترین شاخص شدت علائم را به خود اختصاص داد بطوریکه از نظر آماری اختلاف معنی‌داری با سایر ارقام داشت و پس از آن رقم RGS003 و لاین کرچ ۱ بیشترین شاخص شدت علائم را نشان دادند و با سایر ارقام اختلاف معنی‌داری داشتند. کمترین شاخص شدت علائم نیز به رقم کرچ ۳ تعلق گرفت (جدول ۲ و شکل ۳).

تحلیل وزن تر و خشک گیاهان

نتایج تحلیل آماری وزن تر و خشک گیاهان نشان داد که گیاهان لاین کرچ ۲ مایه‌زنی شده با ویروس در مقایسه با گیاهان شاهد این لاین از نظر آماری دارای اختلاف معنی‌داری بودند و این لاین بیشترین کاهش وزن تر و خشک را در برابر آلودگی ویروس نشان داد (جدول ۲).

جدول ۳: شاخص علائم آلودگی کلزا به TuMV


Table 3: TuMV symptom score in canola

شرح علائم Symptoms Description	شاخص علائم Symptom score
بدون علائم (Symptomless)	0
پیسک در برگ‌های بالایی (Mottling on top leaves)	1
موزاییک در برگ‌های بالایی (Mosaic on top leaves)	2
موزاییک عمومی (Systemic mosaic)	3
موزاییک شدید و روشن شدن رگبرگ در برگ‌های بالایی (Severe mosaic and vein clearing on top leaves)	4
شبه لکه حلقوی (Ring spot-like)	5
جزایر سبز (Green islands)	6
کاهش رشد (Growth reduction)	7
کاهش رشد و زردی (Growth reduction and yellowing)	8



شکل ۲: علائم ظاهر شده در اثر مایه‌زنی مکانیکی TuMV در ارقام تجاری و لاین‌های کلزا. A: لکه سبزرده موضعی در برگ مایه‌زنی شده. B: پیسک. C: جزایر سبز. D: موزاییک شدید و رگ‌روشنی. E: شبه لکه حلقوی. F: زردی گیاه

Fig2: Symptoms induced by mechanical inoculation with TuMV in commercial canola varieties, A: chlorotic local lesion on inoculated leaf, B: mottling, C: green islands, D: severe mosaic and vein clearing, E: ring spot-like F: yellowing



شکل ۳: علائم بیماری در گیاهان متحمل و بسیار حساس مایه زنی شده با TuMV در مقایسه با گیاه سالم. A: رقم متحمل کرج ۳. گیاه سالم (چپ) و آلوده با علائم خفیف (راست). B: لاین بسیار حساس کرج ۲. گیاه سالم (چپ) و آلوده (راست).

Fig 3: The disease symptoms of tolerant and the most susceptible plants inoculated with TuMV in comparison with healthy plant. A: Tolerant variety of Karaj3. Healthy (left) and inoculated (right) plants. B: The most susceptible line of Karaj2. Healthy (left) and inoculated (right) plants.

فنتیپ (یک فنتیپ حساسیت و سه نوع فنتیپ متفاوت مقاومت) را در اثر مایه زنی TuMV با ارقام کلزا معرفی کرده‌اند. بر خلاف گزارش‌های یاد شده در این پژوهش تمام ارقام تجاری کلزای ایران فنتیپ حساسیت به TuMV نشان دادند و به جز یک رقم متحمل در هیچ کدام از ارقام تجاری ایران فنتیپ‌های مقاومت مشاهده نشد. ارقام تجاری کلزای بررسی شده در این پژوهش فنتیپ-های متفاوتی از واکنش حساسیت به TuMV داشتند در حالیکه تنها یک فنتیپ حساسیت توسط جنر و والش (Jenner & Walsh 1996) معرفی شده است. بنابراین نیاز به معرفی یک سامانه نمره‌دهی که بتواند میزان حساسیت و تحمل ارقام را بر اساس شدت علائم تعیین کند ضروری بود. به نظر می‌رسد شاخص شدت علائم معرفی شده در این پژوهش بتواند فقدان چنین سامانه‌ای را جبران کند.

بر اساس تعریف ارائه شده توسط هال (Hull 2014) در اثر مایه‌زنی ویروس، امکان بروز یکی از دو نوع واکنش کلی ایمنی (غیرمیزبانی) و یا آلودگی (میزبانی) وجود دارد. بر این اساس واکنش آلودگی به سه گروه تقسیم می‌شود؛ گروه اول فوق حساسیت شدید؛ در این واکنش تکثیر

ویروس علائم لکه سبز زرد مشاهده نشد و علائم سیستمیک بیماری به صورت پیسک نیز با تأخیر بروز کرد. در شاخص دو به دنبال پیسک علائم موزاییک نیز تشکیل شد. در شاخص‌های سه و چهار به ترتیب علائم موزاییک و موزاییک شدید به صورت مستقیم و بدون پیسک ظاهر شدند. با توسعه و افزایش شدت بیماری علائم شبه لکه حلقوی برای شاخص پنج معرفی شد. همچنین در شاخص شش منطقه آلوده در برگ‌های جدید توسعه بیشتری پیدا کرد به طوری که از اطراف برگ به سمت داخل گسترش یافته تا جاییکه در شاخص شش جزایر سبز تشکیل شد. در شاخص هفت کاهش رشد گیاه نیز بر علائم یاد شده اضافه شد و در نهایت در شاخص هشت گیاه‌های مایه‌زنی شده با ویروس زرد شدند.

جنر و والش (Jenner & Walsh 1996) چهار نوع فنتیپ برای واکنش کلزا به TuMV شامل O، +، R و +N معرفی کرده‌اند. در بررسی دیگر سه نوع فنتیپ مقاومت (RN، R و +N) و یک فنتیپ حساسیت (+) در کلزا گزارش گردیده است (Coutts et al. 2007). همچنین هوگس و همکاران (Hughes et al. 2002) چهار نوع

نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد میزان غلظت ویروس در بافت گیاه تأثیر معنی‌داری از نظر آماری بر ایجاد شاخص‌های علایم بیماری نداشتند. اگرچه آزمون الیزا برای اندازه‌گیری میزان غلظت ویروس در بررسی واکنش گیاه به بیمارگر ویروسی بطور عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما نتایج الیزا همیشه رابطه مستقیمی با علایم بیماری ندارد و بنابراین به منظور تعیین اثر ویروس در گیاه نیاز به روش کمی دقیق‌تر و قابل اطمینان‌تری است. این یافته‌ها مطابق با یافته‌های استراسباخ و همکاران (Strausbaugh et al. 2003) می‌باشد.

مقایسه میانگین وزن خشک و تر بین گیاهان سالم و آلوده به TuMV در سطح احتمال پنج درصد نشان داد که بجز لاین کرج ۲ در سایر ارقام آلوده به ویروس تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. گیاهان آلوده لاین کرج ۲ شاخص‌های شدت علایم بالا (شاخص ۶ به بالا) را به خود اختصاص دادند. مقایسه میانگین وزن خشک و تر گیاهان سالم و آلوده رقم کرج ۳ (کمترین شاخص علایم) نشان داد هر چند که علایم بیماری با ۲۰ روز تأخیر و به صورت خفیف ظاهر شد ولی اختلاف معنی‌دار میانگین وزن خشک و تر گیاهان سالم و آلوده نبود.

تعیین خسارت TuMV در محصولات مختلف انجام و کاهش تعداد و وزن سر بوته کلم *B. var. capitata* (Spence et al., 2007) به میزان ۵۰ درصد در کنیا (Spence et al., 2007)، کاهش خسارت ایجاد شده در ریشه به میزان ۴۰ درصد در گیاه (Horseradish) *Cochlearia arnoracia* در لهستان (Gorecka & Lehmann 2001)، کاهش ۳۰ درصدی در *B. napus var. napobrassica* در کانادا (Shattuck & Stobbs 1987) و کاهش عملکرد بذر بیش از ۷۰ درصد در کلزا *B. napus* در بریتانیا (Hardwick et al. 1994) گزارش شده است. خسارت ایجاد شده توسط

ویروس به سلول‌های آلوده اولیه محدود می‌شود، گروه دوم فوق حساسیت: آلودگی به سلول‌های اطراف آلودگی اولیه محدود می‌شود که معمولاً به صورت مناطق بافت مرده موضعی قابل مشاهده است و گروه سوم واکنش پذیرنده: تکثیر ویروس و حرکت سیستیمیک آن در گیاه انجام می‌گیرد. واکنش پذیرندگی نیز به واکنش حساس و متحمل تقسیم می‌شود. گیاهان حساس علایم شدید بیماری را نشان می‌دهند اما در گیاهان متحمل علایم خفیفی از بیماری مشاهده می‌شود و یا ممکن است در این گیاهان علایمی مشاهده نشود. نتایج پژوهش حاضر واکنش تمام ارقام و لاین‌های مورد مطالعه را در گروه واکنش پذیرنده قرار داد. همچنین براساس شاخص‌های علایم معرفی شده در این تحقیق ارقام تجاری کلزای ایران به TuMV به چهار گروه متحمل (رقم کرج ۳)، نیمه حساس (هایولای ۴۰۱، اپرا، طلایه، اکاپی، زرقام، ظفر، ساری گل، لیکورد و SLM046)، حساس (کرج ۱ و RGS003) و بسیار حساس (کرج ۲) گروه بندی شدند.

میزان جذب نوری در طول موج ۴۰۵ نانومتر در آزمون الیزا بین گیاهان شاهد و آلوده برای هر رقم اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد نشان داد که بیانگر تأیید آلودگی گیاهان مایه‌زنی شده به TuMV بود. مقایسه بین گیاهان آلوده ارقام مختلف با یکدیگر نشان داد که تمام ارقام آلوده به استثنای رقم ساری گل در یک گروه قرار گرفتند. تاکنون رابطه بین میزان غلظت ویروس در بافت گیاه آلوده و شدت علایم بیماری برای TuMV بررسی نشده است. مقایسه نتایج تحلیل آماری میانگین جذب الیزا با میانگین شاخص‌های علایم نشان داد که هر چند جذب نوری در گیاهان آلوده رقم ساری گل در مقایسه با گیاهان آلوده سایر ارقام پایین‌تر است اما همبستگی معنی‌داری بین دو عامل جذب نوری و شاخص علایم وجود

که همبستگی شاخص علایم با سایر اجزای عملکردی مانند تعداد و اندازه غلاف‌ها، تعداد و وزن هزار دانه بذور و کیفیت روغن مورد بررسی قرار گیرد. به سبب آنکه پژوهش‌های انجام شده برای معرفی فنوتیپ‌های مقاوم به کلزا (Jenner & Walsh 1996) و یا سایر میزبان‌های تیره شب بو (Nyalugwe et al. 2015) در برابر TuMV محدود به شرایط کنترل شده گلخانه و بررسی علایم حداکثر ۴ هفته پس از مایه‌زنی ویروس بوده‌است، پیشنهاد می‌شود اعتبار شاخص علایم در شرایط مزرعه و تا پایان طول فصل رشد گیاه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

این پژوهش اولین گزارش از ارزیابی ارقام تجاری و لاین‌های کلزای موجود در ایران نسبت به TuMV و همچنین معرفی یک سامانه نمره‌دهی برای ارزیابی ارقام و لاین‌های متحمل و حساس کلزا به این ویروس می‌باشد.

TuMV در کلزا می‌تواند به صورت کاهش تعداد و اندازه غلاف‌های بذری، همچنین تعداد و اندازه بذرها ایجاد شود (Walsh & Tomlinson 1985). همچنین خسارت ایجاد شده توسط TuMV در گیاه میزبان می‌تواند به صورت کاهش کیفیت محصول نیز ایجاد شود (Hunter et al. 2002). در این مطالعه تأثیر آلودگی به TuMV بر وزن تر و خشک گیاه کلزا بررسی شد و نتایج نشان داد که وزن تر و خشک تا ۵۰ روز پس از مایه‌زنی به غیر از ژنوتیپ کرج ۲ تغییر معنی‌داری نکرد.

از آنجاییکه رقم تجاری با واکنش مقاومت به TuMV در ایران یافت نشد، بنابراین تلاش برای بهبود و اصلاح ژنتیکی این ارقام به روش‌های مختلف مانند انتقال ژن مقاومت و یا انتقال سازه مناسب القاکننده خاموشی آر ان ای ویروسی پیشنهاد می‌شود. به منظور افزایش اعتبار شاخص علایم معرفی شده در این پژوهش پیشنهاد می‌شود

منابع

- Anonymous. 2014. Agricultural statistics year book. Ministry of Jihad-e-Agriculture of Iran, Tehran. 156p.
- Bahar M., Danesh D. and Dehghan M. 1985. *Turnip mosaic virus* in stock plant. Iranian Journal of Plant Pathology 21(1-4), 33-39.
- Converse R. H. and Martin R. R. 1990. ELISA methods for plant viruses. In: R., Hampton, E., Ball and S. De Boer (Eds.). Serological Methods for Detection and Identification of Viral and Bacterial Plant Pathogens. A laboratory manual. APS Press. 389 pp.
- Coutts B. A., Walsh J. A., and Jones R. A. C. 2007. Evaluation of resistance to *Turnip mosaic virus* in Australian *Brassica napus* genotypes. Australian Journal of Agricultural Research 58: 67-74.
- Farzadfar S., Ohshima K., Pourrahim R., Golnaraghi A. R., Jalali S. and Ahoonmanesh A. 2005. Occurrence of *Turnip mosaic virus* on ornamental crops in Iran. Plant Pathology 54:261.
- Farzadfar S., Tomitaka Y., Ikematsu M., Golnaraghi A. R., Pourrahim R. and Ohshima K. 2009. Molecular characterisation of *Turnip mosaic virus* isolates from Brassicaceae weeds. European Journal of Plant Pathology 124:45-55
- Ghorbani S., Shahrane N., Dehghanyar H., Sahandi A. and Pourrahim R. 2007. Serological identification and purification of *Turnip mosaic virus*. (TuMV) in the oil seed rape. Iranian Journal of Biology 20:61-71.
- Gorecka K., and Lehmann P. 2001. Infectious diseases of horseradish (*Cochlearia amoracia* L.) in Poland. Plant Breeding and Seed Science 45:55-64.
- Hardwick N. V., Davies J. M. L. and Wright D. M. 1994. The incidence of three virus diseases of winter oilseed rape in England and Wales in the 1991/92 and 1992/93 growing seasons. Plant Pathology 43:1045-1049.
- Hughes S. L., Green S. K., Lydiate D. J., and Walsh J. A. 2002. Resistance to *Turnip mosaic virus* in *Brassica rapa* and *B. napus* and the analysis of genetic inheritance in selected lines. Plant Pathology 51:567-573.

- Hull R. 2014. Plant virology. 5th ed., Academic Press, USA, 1104 p.
- Hunter P. J., Jones J. E. and Walsh J. A. 2002. Involvement of *Beet western yellows virus*, *Cauliflower mosaic virus* and *Turnip mosaic virus* in internal disorders of stored white cabbage. *Phytopathology* 92:816-826.
- Jenner C. E., and Walsh J. A. 1996. Pathotypic variation in turnip mosaic virus with special reference to European isolates. *Plant Pathology* 45:848-856.
- Nyalugwe E. P., Barbetti M. J. and Jones R. A. C. 2015. Studies on resistance phenotypes to *Turnip mosaic virus* in five species of Brassicaceae, and identification of a virus resistance gene in *Brassica juncea*. *European Journal of Plant Pathology* 141:647-666.
- Sabokkhiz M. A., Jafarpour B., Shahriari A. and Tarighi S. 2012. Identification of *Turnip mosaic virus* isolated from canola in northeast area of Iran. *African Journal of Biotechnology* 11(80):14553-14560.
- Sanchez F., Wang X., Jenner C. E., Walsh J. A., and Ponz F. 2003. Strains of *Turnip mosaic potyvirus* as defined by the molecular analysis of the coat protein gene of the virus. *Virus Research*. 94:33- 43.
- Shahraeen N. 2012. An overview of oilseed rape (canola) virus diseases in Iran. *International Research Journal of Microbiology* 3:1, 24-28.
- Shahraeen N., Farzadfar S. and Lesemann D. E. 2003. Incidence of viruses infecting winter oilseed rape (*Brassica napus* ssp. *oleifera*) in Iran. *Journal of Phytopathology* 151:614-616
- Shattuck V. I. and Stobbs L. W. 1987. Evaluation of rutabaga cultivars for turnip mosaic virus resistance and the inheritance of resistance. *Horticultural Science* 22:935-937.
- Shukla D. D., Ward C. W. and Brunt A. A. 1994. *The Potyviridae*. CAB Int, Wallingford.
- Spence N. J., Phiri N. A., Hughes S. L., Mwaniki A., Simons S., Odour G., Chacha D., Kuria A., Ndirangu S., Kibata G. N. and Marris G. C. 2007. Economic impact of *Turnip mosaic virus*, *Cauliflower mosaic virus* and *Beet mosaic virus* in three Kenyan vegetables. *Plant Pathology* 56:317-323.
- Strausbaugh C. A., Myers, J. R., Forster R. L., and McClean P. E. 2003. A quantitative method to screen common bean plants for resistance to *Bean common mosaic necrosis virus*. *Phytopathology* 93:1430-6.
- Suh S. K., Green S. K. and Park H. G. 1995. Genetics of resistance to five strains of *Turnip mosaic virus* in Chinese cabbage. *Euphytica* 81:71-77
- Walsh J. A. and Tomlinson J. A. 1985. Viruses infecting winter oilseed rape (*Brassica napus* ssp. *oleifera*). *Annals of Applied Biology*. 107:485-495.
- Walsh J. A and Jenner C. E. 2002. *Turnip mosaic virus* and the quest for durable resistance. *Molecular Plant Pathology* 3:289-300.
- Zahedi Tabarestani A., Shams-Bakhsh M. and Safaei N. 2010. Distribution of three important aphid borne canola viruses in Golestan province. *Iranian Journal of Plant Protection Science* 41:251-259.