

تعیین دز ایجاد کننده‌ی ناباروری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، *Callosobruchus maculatus* (Col.: Bruchidae) پرتو گاما و نسبت

رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی

حمیدرضا ذوالقدریه، شهرام مشایخی، محمد بابائی و حسین اهری مصطفوی
مرکز تحقیقات کشاورزی و پژوهش هستایی، کرج.

Induced sterility by gamma radiation in *Callosobruchus maculatus* (Col.: Bruchidae) and sterile insect release ratio to a normal population

H. R. Zolfaghari, S. Mashayekhi, M. Babaii and H. Ahari Mostafavi
Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine, Karaj, Iran.

چکیده

اثر دزهای مختلف پرتو گاما به منظور نابارورسازی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (*Callosobruchus maculatus* (F.) مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه از دزهای ۰، ۲۰، ۳۵، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ گری^۱ در مرحله‌ی شفیرگی استفاده گردید و پس از جداسازی حشرات کامل خارج شده قبل از جفت‌گیری آنها را در تیمارهای جداگانه به صورت ماده‌ی طبیعی × نر طبیعی، ماده‌ی پرتوبدیده × نر طبیعی، ماده‌ی طبیعی × نر پرتوبدیده و ماده‌ی پرتوبدیده × نر پرتوبدیده تلاقی دادیم. مقایسه‌ی میانگین حشرات کامل ظاهر شده در نسل بعد نشان داد در دز ۲۰ گری، کلیه تیمارها با هم اختلاف معنی دار دارند بهجز، تیمارهای ماده‌ی طبیعی × نر طبیعی با ماده‌ی پرتوبدیده × نر طبیعی در دز ۳۵ گری، کلیه جفت تیمارها با هم اختلاف معنی دار داشتند. بیشترین میزان ناباروری در تیمار ماده‌ی پرتوبدیده × نر پرتوبدیده بود و این تیمار با تیمار ماده‌ی طبیعی × نر پرتوبدیده تفاوت معنی دار نداشت. در دز ۵۰ گری، تیمارهایی که در آن نر یا ماده‌ی پرتوبدیده وجود داشت با تیماری که نر و ماده آن طبیعی بودند، اختلاف معنی دار وجود داشت. در دزهای ۶۰ و ۷۰ گری درصد تغییر تخم‌ها در نسل بعد چه در مورد نزهای نابارور و چه در مورد ماده‌های نابارور به طرز معنی داری کاهش پیدا کرد. بنابراین دزهای ۶۰ تا ۷۰ گری باعث ناباروری در این حشره می‌گردد. رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی در سه حالت رهاسازی نزهای نابارور، ماده‌های نابارور و نرها و ماده‌های نابارور مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد رهاسازی ماده‌های نابارور نقشی در کاهش جمعیت حشره در نسل بعد ایفا نمی‌کند. رهاسازی نزهای نابارور و نرها و ماده‌های نابارور اثر یکسان نشان داد. در نتیجه با توجه به اینکه جداسازی نرها و ماده‌ها از یکدیگر دشوار و وقت‌گیر است، رهاسازی نرها و ماده‌های نابارور توأم‌آ و با نسبت جمعیتی ۱:۱۰:۱:۱ (ماده‌ی طبیعی × نر طبیعی × ماده‌ی نابارور × نر نابارور) بهترین نتیجه را در کاهش جمعیت حشره در نسل بعد به دنبال دارد. واژگان کلیدی: پرتو گاما، سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، ناباروری، نسبت رهاسازی

Abstract

Effects of gamma radiation doses on *Callosobruchus maculatus* (F.) were studied. In this study different doses including 0, 20, 35, 50, 60 and 70 Gy were used in the pupal stage and emerged adults

were separated before mating and crossed in treatments including: normal male × normal female, normal male × irradiated female, irradiated male × normal female and irradiated male × irradiated female. Comparing means (Duncan's test, 0.05) showed that in 20 Gy, all treatments had significant difference, except normal male × normal female and normal male × irradiated female. In 35 Gy, all treatments had significant difference. The most sterility was observed in irradiated male × irradiated female and it was not significantly different with irradiated male × normal female. In 50 Gy, treatments which contained irradiated males or irradiated females had significant difference with treatments containing normal males and females. In 60 and 70 Gy, hatchability percentage in the next generation, both for sterile males and sterile females, reduced population significantly. Therefore, 60 to 70 Gy induce sterility in this insect. Sterile insect release to a normal population was studied in three cases including: sterile male, sterile female and sterile male and female releases. Results indicated that sterile female release had no effect on reducing population in the next generation. Sterile male release and sterile male and female release had identical effects. As a regard to the fact that separating males and females is difficult and time consuming, therefore, it seems that sterile male and female release in the ratio of 10:10:1:1 (irradiated male × irradiated female × normal male × normal female) cause the best result in population reduction in the next generation.

Key words: gamma radiation, *Callosobruchus maculatus*, sterility, release ratio

مقدمه

حبویات با داشتن ۳۰ - ۲۰ درصد پروتئین، پس از غلات ، دومین منع مهم غذائی بشر محسوب می شوند. این گیاهان متعلق به تیره‌ی Fabaceae و زیر تیره‌ی Papilionoideae هستند (Koochaki & Banayan-Aval, 1993). یکی از آفات مهم حبویات حشره‌ی کوچکی است به نام سوسک چهار نقطه‌ای حبویات، (*Callosobruchus maculatus* (Fabricius)، که لارو این حشره از لوپیا چشم بلبلی، نخود، ماش، عدس، باقلاء و غیره تغذیه می‌کند. از میان ارقام مختلف حبویات، لوپیای چشم بلبلی به شدت به این آفت آلوده می‌شود. این امر سبب شده است که در برخی از مناطق ایران در سال‌های اخیر کشاورزان از کشت این محصول رویگردان شوند (Bagheri-Zenouz, 1985). مدت زمان جفت‌گیری این گونه ۳-۶ دقیقه طول می‌کشد و یک بار آمیزش برای تخم ریزی کفایت می‌کند ولیکن چندین مرتبه آمیزش صورت می‌پذیرد. متوسط دوره‌ی زندگی این حشره از زمان تخم گذاری تا مرحله‌ی حشره کامل ۲۳-۲۸ روز به طول می‌انجامد (Khare, 1994). در حال حاضر یکی از روش‌های مؤثر و متداول در مبارزه با آفات انباری استفاده از ترکیبات شیمیایی گازی (Fumigants) است. گروهی از این ترکیبات گاهی باعث بروز عوارض نامطلوبی بر روی محصول گشته به ویژه روی میوه‌های تازه و سبزیجات صدماتی به بافت‌های زندگی آنها وارد می‌آورند و همچنین قوه‌ی نامیه عده‌ای از بذور در انثر گازدهی از بین رفته یا شدیداً کاهش می‌یابد. خطر اشتعال یا انفجار عده‌ای از

سوم گازی را نباید فراموش نمود (Bagheri-Zenouz, 1985). متیل بروماید یکی از سوم گازی رایج است. بر اساس قطعنامه‌ی مونتال کشورهای توسعه یافته موظفند تا سال ۲۰۰۵ و کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۱۵ مصرف این سم را به علت خاصیت از بین برنده‌گی لایه‌ی ازن قطع نمایند (Anonymous, 1999). در آمریکا در سال ۱۹۸۴ مصرف اتیلن دی بروماید در مواد غذائی انباری و محصولات کشاورزی ممنوع گردید، زیرا این ماده مظنون به داشتن خاصیت سرطان‌زا بود (Latifian, 2002; Molins, 2001). در اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی تفکر استفاده از روش نابارورسازی در حشرات توسط E. F. Knipling کار می‌کرد. در اوایل این روش از پرتوهای یون‌ساز جهت نابارورسازی استفاده می‌گردد. اگرچه برخی از مواد شیمیایی نیز خاصیت نابارورسازی دارند اما اکثر آنها سرطان‌زا هستند و همچنین ممکن است تمامی حشرات رهاسده، به‌طور یکنواخت و کامل نابارور نباشند. این حقایق باعث می‌شود که در مقیاس بزرگ نتوان از مواد شیمیایی استفاده نمود. کاربرد پرتوهای یون‌ساز یک روش فیزیکی است و با دقت می‌توان دز تابش پرتو را محاسبه و اعمال نمود. در این روش حشرات در معرض تابش گاما قرار می‌گیرند. پرتو گاما موجب ایجاد آسیب‌های فراوانی به اجزاء ژنتیکی اسپرم می‌گردد. زمانی که نرهای نابارور با ماده‌های طبیعی آمیزش کنند، لقادح حاصل می‌گردد اما اسپرم چنان آسیب دیده که جنین تشکیل نمی‌گردد. اگر نرهای نابارور چندین نسل رهاسازی شوند، جمعیت حشره کاهش بسیاری خواهد یافت (Lindquist, 1992).

مواد و روش‌ها

ابتدا مقداری ماش در دمای ۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۶ ساعت درون آون قرار داده شدند تا هرگونه آلودگی احتمالی آن از بین برود (Howlader & Rahman, 1995). سپس تعداد زیادی از حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای روی آن رهاسازی گردید و به مدت ۲۴ ساعت اجازه داده شد تا تخم ریزی نمایند. بعد از این مدت آنها را از ماش خارج نموده و ماش‌های تخم ریزی شده درون انکوباتور در دمای 29 ± 2 درجه‌ی سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 65 ± 5 درصد به مدت نوزده روز نگهداری شدند. بعد از سپری شدن این مدت و اطمینان از مرحله‌ی

شفیرگی حشره (شکافتن تصادفی تعدادی ماش با اسکالپل)، ماش‌های حاوی شفیره با دزهای ۲۰، ۳۵، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ گری در مرکز تحقیقات کشاورزی و پژوهشی هسته‌ای کرج پرتودهی شد. دو روز بعد، حشرات کامل به محض خروج از ماش‌ها جمع‌آوری شده و نرها از ماده‌ها جدا گردید و در ظروف جداگانه ریخته شد (اندازه نرها از ماده‌ها کوچک‌تر است و همچنین از نظر رنگ، نرها کمی روشن‌تر از ماده‌ها هستند). سپس تیمارهای آزمایشی به صورت نر طبیعی × ماده‌ی طبیعی، نر طبیعی × ماده‌ی پرتودیده، نر پرتودیده × ماده‌ی طبیعی و نر پرتودیده × ماده‌ی پرتودیده آماده شدند. در هر تیمار پنج جفت از این حشرات به همراه ۵۰ گرم ماش ضد عفونی شده قرار داده شد. هر تیمار شامل پنج تکرار بود. پس از آمیزش و تخم ریزی حشرات کامل و سپری شدن عمر آنان، حشرات مرده از پتری‌ها خارج شده و در هر تکرار تعداد تخم‌های گذاشته شده شمارش گردید. پس از ۲۱ روز که حشرات کامل نسل بعد خارج گردیدند تعداد آنان شمارش شده و با تقسیم حشرات کامل خارج شده به تعداد تخم‌ها، درصد ظهور حشرات کامل نسل بعد مشخص گردید.

تکرار بود. پس از آمیزش و سپری شدن عمر این حشرات، آنها را از پتری‌ها خارج نموده و تخم‌های گذاشته شده و حشرات کامل خارج شده از آنها مورد مطالعه قرار گرفت. کلیه‌ی آزمایش‌های مذکور در قالب طرح کاملاً تصادفی و مقایسه‌ی میانگین‌ها با روش آزمون دانکن در سطح خطای ۰/۰۵ انجام گرفت. آزمایش‌های مذکور در مرکز تحقیقات کشاورزی و پژوهشکی هسته‌ای کرج انجام شد و منبع پرتودهی گاماسل، چشمیه کبالت ۶۰، اکتیویته ۱۰۰ کوری و میزان دز ۰/۶۴ گرمی بر ثانیه بود.

نتایج و بحث

مقایسه‌ی میانگین‌ها (آزمون دانکن، ۰/۰۵) نشان داد که در دز ۲۰ گرمی کلیه‌ی جفت تیمارها با هم اختلاف معنی‌دار دارند به جز تیمارهای نر طبیعی × ماده‌ی طبیعی با نر طبیعی × ماده‌ی پرتودیده. این پدیده نشان داد که در دز ۲۰ گرمی ماده‌های پرتودیده با ماده‌های طبیعی یکسان عمل می‌کنند و ناباروری بوقوع نمی‌پیوندد. در دز ۳۵ گرمی، کلیه‌ی جفت تیمارها با هم اختلاف معنی‌دار داشتند. بیشترین میزان ناباروری در تیمار نر پرتودیده × ماده‌ی پرتودیده بود و این تیمار با تیمار نر پرتودیده × ماده‌ی طبیعی تفاوت معنی‌دار نداشت. در نتیجه اثر نابارورشده‌گی بیشتر مرهون پرتو دیدن نرها بود تا ماده‌ها. در دز ۵۰ گرمی، بین تیمارهایی که در آن نر یا ماده‌ی پرتودیده وجود داشت با تیماری که نر و ماده‌ی آن طبیعی بودند، اختلاف معنی‌دار وجود داشت. یعنی با رسیدن به دز ۵۰ گرمی، نقش نرهای پرتودیده با ماده‌های پرتودیده در ایجاد ناباروری یکسان گردید. این پدیده در دزهای ۶۰ و ۷۰ گرمی نیز بوقوع پیوست. با توجه به جدول شماره ۱، دزهای ۶۰ و ۷۰ گرمی قادرند در صد ظهور حشرات کامل در نسل بعد را چه در مورد نرهای نابارور و چه در مورد ماده‌های نابارور بطور معنی‌داری کاهش دهند. این نتیجه با گزارش (Howlader & Rahman 1995) منطبق است. آنها چنین اظهار داشتند که دامنه‌ی دز ناباروری سوسک چینی حبوبات در حدود ۸۰-۱۰۰ گرمی است و در مورد سوسک چهار نقطه‌ای این میزان کمتر می‌باشد. همچنین این میزان دز نسبت به سایر آفات انباری نیز کمتر می‌باشد (Howlader & Rahman, 1995).

جدول ۱. اثر دزهای مختلف و حالات گوناگون آمیزش در تعداد تخم گذاشته شده، تعداد حشرات کامل خارج شده و درصد تفريح تخمها.

Table 1. Effects of different doses and mating situations in the number of laid eggs, number of emerged adults and percentage of egg hatchability.

Average of adults in next generation ± SD	Average of emerged adults ± SD	Average of laid eggs ± SD	Treatments	Doses
48.9±5.7 ^a	186.2±28.8	380.6±42.3	Nm×Nf	20Gy
46.5±6.6 ^a	94.8±19.2	204.4±34.9	Nm×If	
15.0±1.8 ^b	50.2±8.8	336.6±24.0	Im×Nf	
5.1±4.7 ^c	9.6±8.0	158.0±83.8	Im×If	
56.5±13.6 ^a	179.8±35.3	322.4±30.5	Nm×Nf	35 Gy
21.0±13.5 ^b	17.4±11.7	91.2±55.5	Nm×If	
3.6±1.8 ^c	10.4±6.7	362.8±76.9	Im×Nf	
0.5±1.2 ^c	0.6±1.3	66.8±27.6	Im×If	
48.5±24.8 ^a	118.8±61.5	241.8±29.0	Nm×Nf	50 Gy
7.1±7.0 ^b	1.4±1.5	16.4±10.3	Nm×If	
9.8±13.0 ^b	24.2±32.6	254.4±52.5	Im×Nf	
0±0 ^b	0±0	26.6±18.7	Im×If	
62.3±9.5 ^a	194.4±90.7	322±15.36	Nm×Nf	60 Gy
0±0 ^b	0±0	49.8±10.7	Nm×If	
0.62±0.7 ^b	2.6±2.7	446.2±59.7	Im×Nf	
0±0 ^b	0±0	89.6±23.6	Im×If	
36.3±6.3 ^a	146.8±22.4	409.2±61.9	Nm×Nf	70 Gy
0±0 ^b	0±0	7.8±6.2	Nm×If	
0.1±0.1 ^b	0.4±0.5	337.2±47.1	Im×Nf	
0±0 ^b	0±0	1.0±1.2	Im×If	

Means with one common letter are not significantly different in 5% level.

Nm: Normal male

Im: Irradiated male

Nf: Normal female

If: Irradiated female

نتایج نسبت رهاسازی حشرات نابارور (با دز ۷۰ گری) در سه حالت بررسی گردید. در حالت اول فقط نرها نابارور به جمعیت طبیعی افزوده شد. نسبت‌های ۶:۱:۱ تا ۲۰:۱:۱ از لحاظ آماری ارزش یکسان داشتند و تمام آنها با شاهد متفاوت بودند. در حالت دوم فقط ماده‌های نابارور به جمعیت طبیعی افزوده شدند. مشاهده‌ی نتایج این تیمار نشان داد در شاهد دوم را داشت و نسبت‌های ۹:۱:۱ و ۸:۱:۱ رتبه‌ی سوم را داشتند. نسبت ۲۰:۱:۱ رتبه‌ی چهارم را داشت و کمترین میزان تفریخ را نسبت‌های ۱۰:۱:۱ و ۱۵:۱:۱ داشتند. این مشاهدات نشان می‌دهد که نتایج حاصله رابطه‌ی منطقی با پکدیگر نداشته و در نتیجه رهاسازی ماده‌های نابارور در کاهش جمعیت حشره بطور واقعی نمی‌تواند مؤثر باشد. در حالت سوم نرها و ماده‌های نابارور به جمعیت طبیعی افزوده گردیدند. در این حالت کلیه‌ی تیمارهای حاوی نر و ماده‌ی نابارور با تیمار شاهد تفاوت معنی دار داشتند. بین تمامی نسبت‌های رهاسازی اختلاف معنی دار نبود مگر در مورد نسبت ۷:۷:۱. بهترین نسبت رهاسازی در تیمارهای ۱۰:۱:۱ و ۱۵:۱:۱ و ۲۰:۱:۱ حاصل گردید به طوری که میزان تفریخ تخم‌ها به‌طرز چشم‌گیری کاهش یافت.

از آنجایی که رهاسازی نرها نابارور به تنها یی در مقایسه با رهاسازی هم‌زمان نرها و ماده‌های نابارور، اثر یکسان بروز داد، در نتیجه رهاسازی توأم نرها و ماده‌های نابارور در کاهش جمعیت آفت بیشتر می‌تواند مدنظر قرار گیرد، زیرا در این حالت نیازی به جداسازی نرها و ماده‌ها نخواهد بود و در میزان کار صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای خواهد شد. بنابراین در مورد سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات استفاده از دز ۷۰ گری در مرحله‌ی شفیرگی و نسبت رهاسازی ۱۰:۱:۱ (ماده‌ی طبیعی: نر طبیعی: ماده‌ی پرتودیده: نر پرتودیده) می‌تواند نتایج مطلوبی در کاهش جمعیت حشره بوجود آورد (جدول ۲). این آزمایش نشان می‌دهد این روش به‌طرز مناسبی می‌تواند جمعیت حشره را تحت کنترل درآورد. اگرچه آزمایش بایستی در مقیاسی وسیع انجام شود تا معلوم شود که جنبه عملی دارد یا خیر.

(Howlader & Rahman, 1995)

ذوالفقاریه و همکاران: تعیین دز ایجاد کنندهٔ ناباروری در سوسک ...

جدول ۲. تعداد تخم تولید شده و درصد تفریخ تخم‌های ناشی از نسبت و حالات مختلف رهاسازی.

Table 2. Number of laid eggs and the hatchability percentage of eggs resulted from the ratio and situations of release.

Percentage of emerged adults \pm SD	Number of laid eggs \pm SD	Treatments
89.2 \pm 6.4 ^a	44.6 \pm 19.6	Nm ¹ \times Nf ¹
6.2 \pm 9.1 ^b	60.3 \pm 12.7	Im ⁶ \times Nm ¹ \times Nf ¹
14.8 \pm 11.3 ^b	73.3 \pm 4.5	Im ⁷ \times Nm ¹ \times Nf ¹
8.4 \pm 14.6 ^b	55.6 \pm 3.0	Im ⁸ \times Nm ¹ \times Nf ¹
0 \pm 0 ^b	55.6 \pm 8.3	Im ⁹ \times Nm ¹ \times Nf ¹
10.8 \pm 18.7 ^b	32.0 \pm 28.1	Im ¹⁰ \times Nm ¹ \times Nf ¹
3.6 \pm 6.3 ^b	61.6 \pm 20.0	Im ¹⁵ \times Nm ¹ \times Nf ¹
3.2 \pm 2.8 ^b	49.0 \pm 22.3	Im ²⁰ \times Nm ¹ \times Nf ¹
89.2 \pm 6.4 ^{ab}	44.6 \pm 19.6	Nm ¹ \times Nf ¹
73.0 \pm 13.2 ^{bc}	110.3 \pm 19.3	Il ⁶ \times Nm ¹ \times Nf ¹
70.0 \pm 10.1 ^{cd}	95.0 \pm 4.6	If ⁷ \times Nm ¹ \times Nf ¹
69.2 \pm 8.4 ^{cd}	91.6 \pm 11.2	If ⁸ \times Nm ¹ \times Nf ¹
92.6 \pm 0.5 ^a	68.6 \pm 5.0	If ⁹ \times Nm ¹ \times Nf ¹
6.4 \pm 7.1 ^e	312.6 \pm 125.7	If ¹⁰ \times Nm ¹ \times Nf ¹
9.8 \pm 2.3 ^e	492.3 \pm 96.6	If ¹⁵ \times Nm ¹ \times Nf ¹
54.0 \pm 16.6 ^d	126.0 \pm 60.7	If ²⁰ \times Nm ¹ \times Nf ¹
89.2 \pm 6.4 ^a	44.6 \pm 19.6	Nm ¹ \times Nf ¹
7.8 \pm 12.3 ^{bc}	143.6 \pm 31.6	Im ⁶ \times If ⁶ \times Nm ¹ \times Nf ¹
25.5 \pm 18.0 ^b	113.0 \pm 15.6	Im ⁷ \times If ⁷ \times Nm ¹ \times Nf ¹
15.6 \pm 20.9 ^{bc}	90.6 \pm 14.6	Im ⁸ \times If ⁸ \times Nm ¹ \times Nf ¹
24.1 \pm 7.1 ^b	77.0 \pm 1.7	Im ⁹ \times If ⁹ \times Nm ¹ \times Nf ¹
0.5 \pm 0.9 ^c	468.3 \pm 54.0	Im ¹⁰ \times If ¹⁰ \times Nm ¹ \times Nf ¹
1.4 \pm 2.3 ^c	392.3 \pm 91.5	Im ¹⁵ \times If ¹⁵ \times Nm ¹ \times Nf ¹
2.6 \pm 4.5 ^c	254.6 \pm 62.0	Im ²⁰ \times If ²⁰ \times Nm ¹ \times Nf ¹

Means with one common letter are not significantly different in 5% level.

Nm: Normal male
Nf: Normal female

Im: Irradiated male
If: Irradiated female

سپاسگزاری

این پژوهشی تحقیقاتی از طریق طرح ملی تحقیقات شماره ۳۱۳۰۵۳۰۹ و با حمایت شورای پژوهش‌های علمی کشور انجام گردیده است که بدین وسیله قدردانی می‌گردد.

منابع

- Anonymous** (1999) Food and environmental protection newsletter. *International Atomic Energy Agency* 2(2), 12-13.
- Bagheri-Zenouz, E.** (1985) *Les Coleopteres depredateurs de produits alimentaires et industriels*. Vol. 1, pp. 201-203. Edition de Sepehre. [In Persian].
- Howlader, A. J. & Rahman, R.** (1995) Studies on the application of sterile insect technique (SIT) for the suppression of pulse beetle, *Callosobruchus chinensis* (L.) (Coleoptera: Bruchidae). *Nuclear Science and Application* 4(2), 105-110.
- Khare, D. P.** (1994). *Stored grain pests and their management*. pp. 60-67. Kalyani Publishers.
- Koochaki, E. & Banayan-Aval, M.** (1993) *Pulses cultivation*. pp. 17-20. Jahad Daneshgahi Press, Mashad University.
- Latifian, M.** (2002) Application of irradiation for controlling stored-pests of dry date. *Zeitoun Journal* 153, 14-18. [In Persian].
- Lindquist, D. A.** (1992) The development and global impact of the sterile insect technique for insect population management. *Symposium: Application of Area-wide Insect Suppression to the Midwest Landscape*. Ames, Iowa.
- Molins, R. A.** (2001) *Food irradiation: principles and applications*. pp. 113-130. John Wiley & Sons.