

یادداشت علمی

گزارش گونه‌ی *Allobaccha sapphirina* (Dip.: Syrphidae) از ایرانبهنام معتمدی نی^۱ و نایجل وات^۲

۱- مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان، ۲- موزه‌ی تاریخ طبیعی لندن، انگلیس.

Report of *Allobaccha sapphirina* (Dip.: Syrphidae) from Iran**B. Moetamedi Nia¹ and N. Wyatt²**

1. Agricultural Research Center of Baluchestan, P.O. Box 29, Iranshahr, 2. Department of Entomology, The Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD, UK.

Abstract

Allobaccha sapphirina (Wiedemann) is newly reported from Iran. It was collected during a 2002-2003 survey on natural enemies of *Diaphorina citri* Kuwayama (Homoptera: Psyllidae) in Sarbaz, Sistan-Baluchestan province.

در بررسی‌هایی که طی سال‌های ۱۳۸۱-۸۲ جهت جمع‌آوری دشمنان طبیعی پسیل آسیایی مرکبات، *Diaphorina citri* Kuwayama (Homoptera: Psyllidae)، در منطقه‌ی سرباز استان سیستان و بلوچستان انجام شد، لارو مگس‌های سیرفید از کلنی این پسیل بر روی درختان لیموترش جمع‌آوری و جهت خروج حشره‌ی کامل به آزمایشگاه منتقل گردید. حشرات کامل حاصل از این لاروها به شرح زیر مورد شناسایی قرار گرفت که برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود:

***Allobaccha sapphirina* (Wiedemann)**

حشره‌ی نر به طول ۶-۴ میلی‌متر، بدنه باریک و کشیده، پیشانی پوشیده از موهای سفید رنگ، قفس سینه سیاه، بال‌ها قهوه‌ای و دارای موی ریز (microtrichia)، بند دوم شکم در وسط باریک شده و دارای دو نوار عرضی زرد-قرمز می‌باشد که به انتهای نمی‌رسد. لوب‌های زنیتالیا دارای خمیدگی شدیدی می‌باشد. این گونه معمولاً در نواحی Afrotropical و Oriental فعالیت دارد (Vockeroth, 1969; Gilbert, 1986).

منابع

Gilbert, F. S. (1986) *Hoverflies - Naturalists' handbooks*. 66 pp. Cambridge University Press.

Vockeroth, J. R. (1969) A revision of the genera of the Syrphini (Diptera: Syrphidae).

Memories of the Entomological Society of Canada 62, 1-176.