

بررسی اثر کنه کشی اسانس پونه‌ی کوهی (*Mentha longifolia* (Lamiaceae) روی کنه‌ی واروا، (*Varroa destructor* (Acari: Varroidae) و تأثیر آن بر زنبور عسل

اروپایی *Apis mellifera* (Hym.: Apidae)

و حید قاسمی^۱, سعید محramی پور^{۲*} و غلام حسین طهماسبی^۲

۱- گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۲- موسسه‌ی تحقیقات علوم دامی کشور، کرج.

*مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: moharami@modares.ac.ir

Acaricidal activity of essential oil from *Mentha longifolia* (Lamiaceae) against *Varroa destructor* (Acari: Varroidae) and its effect on *Apis mellifera* (Hym.: Apidae)

V. Ghasemi¹, S. Moharramipour^{1&*} and G. H. Tahmasbi²

1. Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2. Animal Science Research Institute, Karaj, Iran.

*Corresponding author, E-mail: moharami@modares.ac.ir

چکیده

کنه‌ی واروا، *Varroa destructor* Anderson & Trueman، یکی از مهم‌ترین آفات زنبور عسل اروپایی، *Apis mellifera* L. در سرتاسر جهان می‌باشد که با تغذیه از همولنف مراحل مختلف رشدی زنبور عسل و همچنین انتقال عوامل بیماری‌زای ویروسی، خسارت اقتصادی بالایی را به صنعت زنبورداری وارد می‌کند. در طی سال‌های اخیر، استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی به منظور کنترل کنه‌ی واروا منجر به ایجاد مقاومت ذر این آفت و آلودگی محصولات کندو شده است. لذا موضوع تحقیق حاضر بررسی میزان سمیت تنفسی اسانس پونه‌ی کوهی *Mentha longifolia* L. بر کنه‌ی واروا و زنبور عسل می‌باشد. بدین منظور کنه‌های بالغ ماده در شرایط اتاق رشد، با دمای 1 ± 25 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 50 ± 5 درصد و تاریکی به مدت ۱۰ ساعت با غلظت‌های مختلف اسانس مورد مطالعه (از $0/5$ تا $3/75$ میکرولیتر بر لیتر هوا) تیمار شدند. همچنین زنبورهای عسل کارگر در شرایط انکوباتور (دمای 32 درجه‌ی سلسیوس و رطوبت نسبی $45-50$ درصد و تاریکی به مدت ۱۰ ساعت) تحت تأثیر غلظت‌های مختلف اسانس پونه‌ی کوهی (از $0/6$ تا $7/25$ میکرولیتر بر لیتر هوا) قرار گرفتند. همه‌ی تیمارها در ۴ تکرار طراحی شدند. تعداد افراد مرده و زنده برای هر تکرار پس از شروع اسانس‌دهی و هر یک ساعت یکبار شمارش شد. نتایج نشان داد که میزان مرگ و میر کنه‌ی واروا و زنبور عسل با افزایش غلظت و زمان اسانس‌دهی افزایش پیدا کرده است. میزان LC₅₀ برای کنه‌ی واروا، 9 و 10 ساعت پس از شروع اسانس‌دهی، به ترتیب $2/05$ و $1/65$ میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد؛ در حالی‌که، میزان LC₅₀ در مورد زنبور عسل در طی 9 و 10 ساعت پس از اسانس‌دهی به ترتیب $5/08$ و $4/76$ میکرولیتر بر لیتر هوا بود که نشان‌دهنده‌ی حساسیت بیشتر کنه‌ی واروا به اسانس پونه‌ی کوهی در مقایسه با زنبور عسل اروپایی است. بنابراین، لازم است تحقیقات بیشتری برای تنظیم غلظت و مدت زمان اسانس‌دهی پونه‌ی کوهی صورت گیرد تا بتوان از آن در برنامه‌های کنترل کنه‌ی واروا در زنبورستان‌ها استفاده نمود.

واژگان کلیدی: کنه‌ی واروا، پونه‌ی کوهی، سمیت تنفسی، زنبور عسل اروپایی

Abstract

Varroa destructor Anderson & Trueman is one of the most important pests of *Apis mellifera* L. world widely. It causes great economic loss to the beekeeping industry through feeding on various developmental stages of bees and by transmission of pathogenic viral agents. Recently, application of chemical pesticides has led to the occurrence of mite resistance and contamination of hive products. Therefore, the objective of the current study is to evaluate fumigant toxicity of essential oil from *Mentha longifolia* L. against varroa mite and honey bee. Adult females of varroa mites were treated with different concentrations of essential oil (from 0.5 to 3.75 $\mu\text{l/l}$ air) at 25°C and 40% RH in darkness for 10 h. Also, worker honey bees were exposed to concentrations of essential oil (from 0.62 to 6.25 $\mu\text{l/l}$ air) in incubator set at 32°C and 45 - 50% RH in dark for 10 h. All experiments were conducted with four replications. The number of dead and live treated animals was counted each hour from commencement of exposure. Results showed that the mortality was increased as concentration and exposure time of the oil increased. Estimated LC₅₀ value of *M. longifolia* treated on *V. destructor* 9 and 10 h after exposure was 2.05 and 1.65 $\mu\text{l/l}$ air, respectively. However, LC₅₀ values of the oil on *A. mellifera* at the same exposure times were 5.08 and 4.76 $\mu\text{l/l}$ air, respectively. These findings indicate that varroa mite is more susceptible than *A. mellifera*. Therefore, more comprehensive experiments are necessary to find appropriate concentration and exposure time of *M. longifolia* essential oil in varroa mite control programs in apiaries.

Key words: *Varroa destructor*, *Mentha longifolia*, Fumigant toxicity, *Apis mellifera*

مقدمه

کنه‌ی واروا، *Varroa destructor* Anderson & Trueman، به عنوان زیان‌آورترین آفت زنبور عسل اروپایی، *Apis mellifera* L. و مهم‌ترین عامل تهدیدکننده‌ی صنعت زنبورداری در سرتاسر دنیا به شمار می‌آید (Anderson & Trueman, 2000). مراحل تولید مثل این کنه درون حجرات شفیرگی زنبورهای عسل طی می‌شود که در این مرحله خسارت جبران‌ناپذیری را به زنبور وارد می‌کند. کنه‌ی واروا با تغذیه از همولنف مراحل شفیرگی و بالغ زنبور عسل باعث کاهش آب و وزن بدن، پایین آمدن سطح پروتئین و کربوھیدرات و نهایتاً مرگ آن می‌شود (Bowen-Walker & Gunn, 2001). این انگل خارجی علاوه بر خسارت مستقیم، با انتقال عوامل ویروسی موجب ایجاد بدشکلی در بالها و کاهش طول عمر زنبورهای عسل کارگر و نر در کندو می‌گردد (De Jong *et al.*, 1982). در سال‌های اخیر، کنترل کنه‌ی واروا توسط سوم شیمیایی به‌ویژه آفت‌کش‌های پایروتروئیدی (تئو-فلووالینات و فلومترین) صورت می‌گیرد. لذا استفاده بی‌رویه و نادرست از این ترکیبات باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل وجود باقیمانده‌ی سوم در فرآورده‌های حاصل از زنبور عسل، آلودگی محیط زیست و از همه مهم‌تر ظهور جمعیت‌های مقاوم کنه‌ی واروا در زنبورستان‌ها شده است (Milani, 1995; Elzen *et al.*, 1998). این مشکلات باعث شده است که محققان به دنبال استفاده از روش‌های کم خطرتر برای کنترل آفت باشند. در این میان می‌توان به کاربرد انسانس‌های گیاهی اشاره کرد. این انسانس‌ها که

از گیاهان معطر استحصال می‌شوند به دلیل داشتن بوی تند و سمیت کم برای پستانداران، عدم تأثیر سوء چشم‌گیر بر محیط زیست و مقبولیت در میان عامه‌ی مردم از جمله ترکیبات بسیار مفید برای کترول آفات به حساب می‌آیند (Isman, 2000). تقریباً انسان ۱۵۰ گونه‌ی گیاهی یا ترکیبات حاصل از آن‌ها علیه کنه‌ی واروا مطالعه شده، که نتایج مختلفی را در پی داشته است (Calderone & Spivak, 1995; Imdorf *et al.*, 1999).

بسیاری از انسان‌های مورد آزمایش نتایج مطلوبی را در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای از خود به جای گذاشته‌اند (Calderone, 1999; Melathopoulus *et al.*, 2000; Ruffinengo *et al.*, 2002). Ariana *et al.* (2002) در ارتباط با بررسی خواص کنه‌کشی برخی از ترکیبات گیاهی علیه کنه‌ی واروا در شرایط کندوچه‌های آزمایشگاهی نشان داد که پاشش غلظت ۲ درصد انسان *Anethum graveolens* L. *Mentha spicata* L. *Zataria multiflora* Boiss زنبور عسل آلوده به این کنه پس از یک هفته، با داشتن حداقل تلفات (۲/۵ درصد) بر زنبور عسل موجب از بین رفتن ۴۳–۵۸ درصد کنه‌های مورد آزمایش می‌شود. Ebrahimi *et al.* (2006) در آزمایش‌های خود نشان دادند که استفاده از ۳۵ گرم کریستال متول به مدت ۲۸ روز در کندوهای آلوده به کنه‌ی واروا موجب از بین رفتن ۵۶/۶۸ درصد کنه‌های تیمار شده می‌گردد. بر همین اساس فرمولاسیون‌های مختلفی که مواد مؤثره‌ی آن‌ها را ترکیبات گیاهی تشکیل داده‌اند به بازار عرضه شده است. فرمولاسیون VAR[®] Apilife که مواد مؤثره‌ی آن را تیمول (۷/۶٪)، اکالیپتوول (۴/۱٪)، متول (۸/۳٪) و کامفور (۸/۳٪) تشکیل داده، طی هشت هفته ۹۷/۷ درصد و در طی چهار هفته ۹۳/۷ درصد اثر کنه‌کشی دارد (Imdorf *et al.*, 1995a). پونه‌ی کوهی، *Mentha longifolia* L. گیاهی زود رشد، یک‌ساله و با برگ‌هایی به رنگ سبز روشن یا تیره تا خاکستری می‌باشد. زنبورها و پروانه‌ها در موسوم گل‌دهی به سمت این گیاه جلب می‌شوند. این گونه‌ی گیاهی همانند سایر گونه‌های خانواده‌ی Lamiaceae دارای خواص دارویی است. انسان گیاه پونه‌ی کوهی به دلیل داشتن فعالیت ضد میکروبی بالا علیه بعضی گونه‌های باکتریایی و مخمراهای پاتوژن انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است (Hajlaoui *et al.*, 2008). تاکنون مطالعه‌ای در ارتباط با خاصیت کنه‌کشی انسان پونه‌ی کوهی روی کنه‌ی واروا صورت

نگرفته است. لذا با توجه به مزایای استفاده از انسن‌های گیاهی در کنترل کنه‌ی واروا، در این تحقیق استفاده از انسن گیاه پونه کوهی به منظور کنترل این آفت مد نظر می‌باشد.

مواد و روش‌ها

جداسازی کنه‌ی واروا از روی بدن زنبور عسل اروپایی و تهیی نمونه‌های گیاهی
 در پژوهش حاضر جداسازی کنه از روی بدن زنبور عسل، با استفاده از گاز دی‌اکسیدکربن و مطابق با روش Ariana *et al.* (2002) صورت پذیرفت. کنه‌های جداسده پس از به هوش آمدن توسط قلم مو به درون پتری‌دیش‌ها منتقل شدند. زنبورهای عسل نیز دو ساعت پس از به هوش آمدن برای انجام آزمایش‌های زیست‌سنگی مورد استفاده قرار گرفتند. گیاه پونه کوهی در بهار سال ۱۳۸۷ از باغات اطراف شهرستان شیروان جمع‌آوری شد. برگ‌های این گیاه پس از جمع‌آوری در محل کاملاً تاریک خشک شده و در پاکت‌های کاغذی در فریزر، در دمای ۲۴–۲۶ درجه‌ی سلسیوس نگهداری شدند.

تهیی انسن

به منظور انسن‌گیری از برگ پونه کوهی، برگ‌ها با استفاده از آسیاب برقی خرد شدند. هر بار ۴۰ گرم از برگ‌های خردشده به همراه ۶۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر با استفاده از دستگاه انسن‌گیری شیشه‌ای مدل Clevenger در دمای ۱۰۰ درجه‌ی سلسیوس به مدت ۴ ساعت انسن‌گیری شد (Negahban *et al.*, 2007). انسن‌های حاصله با کمک سولفات سدیم آب‌گیری شده و تا زمان استفاده در ظروف پلاستیکی به حجم ۲ میلی‌لیتر با روپوش آلومینیومی در یخچال در دمای ۴ درجه‌ی سلسیوس نگهداری شدند (Negahban *et al.*, 2006).

آزمایشات زیست‌سنگی

آزمایش‌های زیست‌سنگی برای ارزیابی خاصیت کنه کشی انسن گیاه پونه کوهی روی کنه‌ی واروا و مقایسه‌ی میزان حساسیت این آفت با میزان خود، زنبور عسل اروپایی، انجام پذیرفت. پس از انجام آزمایش‌های مقدماتی و تعیین حدود پایین و بالای غلظت انسن مورد

مطالعه که موجب ایجاد مرگ و میر بین ۲۰ تا ۸۰ درصد در کنه‌های تیمارشده گردید، آزمایش‌های اصلی انجام پذیرفت. بدین منظور هر ۱۰ عدد کنه‌ی ماده بالغ ۱ تا ۳ روزه که به تازگی از حجره‌های شفیرگی خارج شده بودند، پس از جدا شدن از روی بدن زنبور عسل به درون یک پتری دیش (با قطر دهانه‌ی ۱۸/۴۴ سانتی‌متر و حجم ۸۰۰ میلی‌لیتر) منتقل شدند. کنه‌های داخل پتری دیش با استفاده از میکروپیپت و با کمک کاغذ صافی (واتمن شماره ۱ به قطر ۲ سانتی‌متر) نصب شده در سطح داخلی دهانه‌ی پتری دیش به مدت ۱۰ ساعت در معرض غلظت‌های مختلف ($0/5$ ، $0/72$ ، $1/65$ ، $1/69$ و $2/51$ و $3/75$ میکرولیتر بر لیتر هوا) انسانس گیاه مورد مطالعه که با فاصله‌ی لگاریتمی محاسبه شدند، قرار گرفتند. به‌منظور جلوگیری از هدر رفتن انسانس، در پتری دیش‌ها توسط پارافیلم کاملاً بسته شد. تمامی تیمارها تحت شرایط اتاق رشد با دمای 1 ± 25 درجه‌ی سلسیوس و رطوبت نسبی 40 ± 5 درصد و تاریکی نگهداری شدند. پس از شروع انسانس‌دهی تعداد کنه‌های زنده و مرده به صورت هر یک ساعت یکبار و حداقل تا ۱۰ ساعت ثبت گردید. تیمار شاهد نیز در شرایط مشابه و بدون اعمال انسانس نگهداری شد. تمامی غلظت‌ها و تیمار شاهد ۴ بار تکرار شدند. عدم حرکت در پاهای و کلیسرا کنه‌های تیمارشده و شاهد، به عنوان علایم مرگ در نظر گرفته شد.

برای ارزیابی اثر انسانس پونه‌ی کوهی روی زنبور عسل، آزمایشی مشابه آزمایش فوق انجام پذیرفت. در این آزمایش نیز پس از انجام آزمایش‌های مقدماتی و تعیین حدود پایین و بالای غلظت انسانس مورد مطالعه، تعداد ۱۰ عدد زنبور عسل کارگر صفر تا ۳ روزه، داخل پتری دیش‌هایی به حجم ۸۰۰ میلی‌لیتر در معرض غلظت‌های مختلف ($0/67$ ، $0/53$ ، $0/07$ ، $4/06$ و $5/37$ میکرولیتر بر لیتر هوا) انسانس پونه‌ی کوهی که با فاصله‌ی لگاریتمی محاسبه شده بودند، قرار گرفتند. تیمارها در شرایط انکوباتور (دمای ۳۲ درجه‌ی سلسیوس و رطوبت نسبی ۴۵-۵۰ درصد و تاریکی) نگهداری شدند و تعداد افراد زنده و مرده پس از شروع انسانس‌دهی و هر یک ساعت یکبار و حداقل تا ۱۰ ساعت شمارش شدند. زنبورهایی که قادر به حرکت پاهای و بالهای خود نبودند به عنوان مرده در نظر گرفته شدند.

در هر آزمایش درصد مرگ و میر اصلاح شده طبق فرمول (1925) Abbott و مقادیر LC_{50} به روش (1971) Finney به کمک نرم‌افزار SAS 6.12 محاسبه شد. از تجزیه واریانس یک‌طرفه

(One-way ANOVA) برای بررسی درصد مرگ و میر کنه‌ی واروا و زنبور عسل اروپایی در غلظت‌های مختلف در هر واحد زمانی استفاده شد. قبل از تجزیه‌ی واریانس، داده‌ها با استفاده از جذر آرک‌سینوس (arcsinus) مرگ و میر اصلاح شدند. در صورت وجود اختلاف معنی‌دار، میانگین‌ها با استفاده از آزمون توکی (Tukey's test) در سطح احتمال آماری پنج درصد مقایسه شدند.

نتایج

نتایج حاصل از آزمایش‌های زیست‌سنگی نشان داد که اسانس گیاه پونه‌ی کوهی اثرات قابل توجهی علیه کنه‌ی واروا در پی داشته است. مقادیر LC_{50} شیب خط رگرسیون، عرض از مبدأ و حدود اطمینان ۹۵ درصد مربوط به کنه‌ی واروا و زنبور عسل اروپایی نشان می‌دهد که اسانس پونه‌ی کوهی بر هر دو گونه‌ی مورد آزمایش اثر کشنده‌ی دارد (جدول ۱)، اما میزان تلفات با توجه به غلظت اسانس، مدت زمان اسانس‌دهی و نوع موجود مورد آزمایش تغییر پیدا می‌کند. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشان می‌دهد که مقدار اسانس پونه‌ی کوهی با مقایسه‌ی حدود اطمینان ۹۵ درصد، ۹ و ۱۰ ساعت پس از اسانس‌دهی در کنه‌ی واروا به ترتیب ۵/۰۸ و ۲/۰۵ و ۱/۶۵ میکرولیتر بر لیتر هوا و در زنبورهای عسل کارگر به ترتیب ۴/۷۶ میکرولیتر بر لیتر هوا می‌باشد. مقایسه‌ی حدود بالا و پائین برای مقادیر LC_{50} در هر دو گونه‌ی مورد آزمایش، نشان‌دهنده‌ی عدم هم‌پوشانی و وجود تفاوت معنی‌دار بین آن‌ها است. بر اساس مقادیر LC_{50} و حدود اطمینان برآورده شده، معلوم گردید که کنه‌ی واروا در مقایسه با زنبور عسل اروپایی حساسیت بالاتری نسبت به اسانس پونه‌ی کوهی دارد. شکل ۱ رابطه‌ی لگاریتم غلظت و پرتویت درصد تلفات کنه‌های واروا و زنبورهای عسل تیمارشده با غلظت‌های مختلف اسانس پونه‌ی کوهی را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که با افزایش غلظت اسانس مورد مطالعه، میزان مرگ و میر موجودات مورد آزمایش افزایش پیدا می‌کند.

شکل ۲ نیز نشان می‌دهد که در غلظت ۲/۵ میکرولیتر بر لیتر هوا پس از ۵، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ساعت اسانس‌دهی میزان مرگ و میر در کنه‌های تیمارشده به ترتیب $22/5$ ، $32/5$ ، 40 ، $57/5$ ، $62/5$ و 65 درصد و در زنبورهای عسل کمتر از ۶ درصد بود. با افزایش زمان

اسانس‌دهی تا ۷ ساعت میزان مرگ و میر در غلظت ۳/۱۲ میکرولیتر بر لیتر هوا، در کنه‌ی واروا به ۴۵ درصد و در زنبور عسل به ۷/۵ درصد رسید؛ اما در همین غلظت پس از ۹ ساعت اسانس‌دهی میزان تلفات در کنه‌ی واروا ۵۵ درصد و در زنبور عسل کمتر از ۱۰ درصد بود.

جدول ۱. مقادیر LC_{50} محاسبه شده‌ی اسانس پونه‌ی کوهی، *M. longifolia* روی کنه‌ی واروا، و زنبور عسل اروپائی، *V. destructor*

Table 1. Estimated LC_{50} values of *M. longifolia* essential oil for *V. destructor* and *A. mellifera*.


| Species | Time (h) | n | LC_{50} (95% fiducial limits) ($\mu\text{l/l air}$) | Intercept \pm SE | df | Slope \pm SE |
|----------------------|----------|-----|---|--------------------|----|-----------------|
| <i>V. destructor</i> | 9 | 240 | 2.05 (1.64 – 2.64) | 4.64 \pm 0.12 | 4 | 2.08 \pm 0.41 |
| | 10 | 240 | 1.65 (1.36 – 1.98) | 4.52 \pm 0.12 | 4 | 2.37 \pm 0.42 |
| <i>A. mellifera</i> | 9 | 240 | 5.08 (4.78 – 5.54) | 0.09 \pm 0.72 | 4 | 6.59 \pm 1.04 |
| | 10 | 240 | 4.76 (4.50 – 5.05) | -0.10 \pm 0.71 | 4 | 7.52 \pm 1.04 |

همچنین در غلظت ۳/۱۲ میکرولیتر بر لیتر هوا، افزایش زمان اسانس‌دهی از ۵ ساعت به ۱۰ ساعت منجر به افزایش میزان تلفات کنه‌ی واروا از ۲۵ درصد به ۷۰ درصد شد، در حالی که در زنبور عسل میزان مرگ و میر از ۲/۵ درصد تنها به ۷/۵ درصد رسید. بیشترین میزان تلفات کنه‌ی واروا (۸۵ درصد) پس از ۱۰ ساعت اسانس‌دهی و در غلظت ۳/۷۵ میکرولیتر بر لیتر هوا حاصل شد که در شرایط مشابه میزان مرگ و میر در زنبور عسل حدود ۲۴ درصد بود. این امر نشان‌دهنده‌ی تحمل بالای زنبور عسل اروپائی در مقایسه با این کنه در برابر اسانس پونه‌ی کوهی است (شکل ۲).

بحث

استفاده از اسانس‌های گیاهی برای کنترل کنه‌ی واروا به دلیل افزایش گزارش‌ها مبنی بر مقاومت این آفت به سوم شیمیایی از قبیل تنوفلووالینات، کومافوس و آمیتراز و آلودگی محصولات کندو یک امر ضروری به شمار می‌آید. در طی سال‌های اخیر، آزمایش‌های گستره‌ای به منظور بررسی خواص کنه‌کشی اسانس‌های گیاهی روی کنه‌ی واروا صورت گرفته است که تعدادی از آن‌ها اثرات مطلوبی را در پی داشته‌اند. نتایج حاصل از پژوهش

حاضر نشان می‌دهد که اسانس پونهی کوهی دارای اثر کشنده‌گی روی هر دو گونه‌ی مورد آزمایش بوده و این تأثیر با توجه به غلظت اسانس، زمان اسانس‌دهی و گونه‌ی مورد آزمایش تغییر پیدا می‌کند. بر اساس LC_{50} محاسبه شده برای هر دو گونه‌ی مورد آزمایش در این تحقیق، کنه‌ی واروا در مقایسه با زنبور عسل اروپایی حساسیت بالاتری نسبت به اسانس پونهی کوهی از خود نشان می‌دهد. نتایج آزمایش‌های مختلف‌های نیز نشان می‌دهد که کنه‌ی واروا از حساسیت




شکل ۱. رگرسیون خطی غلظت‌های مختلف اسانس پونهی کوهی روی کنه‌ی واروا و زنبور عسل اروپائی پس از ۱۰ ساعت اسانس‌دهی با حدود اطمینان ۹۵ درصد.

Fig. 1. Regression line plot with 95% fiducial limits for different concentrations of *M. longifolia* essential oil on *V. destructor* and *A. mellifera* 10 h after exposure.

بالاتری در مقایسه با زنبور عسل در برابر اسانس‌های گیاهی مختلف برخوردار است. با افزایش غلظت اسانس پونه‌ی کوهی میزان لرزش در کلیسرها و پاهای کنه‌های تیمارشده افزایش پیدا کرد. همچنین، هیجان و میزان انقباض‌های ماهیچه‌های شکمی در زنبورهای عسل، با افزایش غلظت و زمان اسانس‌دهی افزایش یافت. (Ruffinengo *et al.* (2007) *Heterodera latifolia* Buckley و *Tagetes minuta* L. پس از ۴۸ ساعت اسانس‌دهی به روش پاششی با داشتن تلفات کمتر از ۱۰ درصد در زنبور عسل منجر به مرگ و میر بیش از ۷۰ درصد کنه‌های تیمار شده گردید.

بررسی آزمایشگاهی فوق موید این مطلب است که زنبور عسل در مقایسه با کنه‌ی واروا از تحمل بالاتری در برابر اسانس گیاهان مورد مطالعه برخوردار است که با نتایج حاصل از پژوهش حاضر مطابقت دارد. نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فاکتورهایی از قبیل جثه بزرگ‌تر، وزن بیشتر بدن، میزان اجسام چربی و فعالیت بالای آنزیمهایی که در غیرسمی کردن مواد سمی وارد شده به بدن نقش دارند، از جمله‌ی عوامل کلیدی در متتحمل بودن یک حشره به یک عامل سمی است (Javvi *et al.*, 2005). با توجه به این مطلب، می‌توان تحمل بیشتر زنبور عسل اروپایی را در مقایسه با کنه‌ی واروا نسبت به اسانس پونه‌ی کوهی به عوامل فوق و همچنین وجود کیسه‌های هوایی بزرگ در داخل بدن که امکان عمل تهویی بیشتر را برای این حشره فراهم می‌کند نسبت داد. مطالعات (Ariana *et al.* (2002) نشان دادند که ۲۰۰ پس از اسانس گیاه *Mentha pulegium* L. پس از ۳ ساعت اسانس‌دهی به روش تماسی منجر به از بین رفتن ۲۵ درصد کنه‌های مورد آزمایش گردید که در مقایسه با اسانس مورد مطالعه در تحقیق حاضر اثر کنه‌کشی کمتری روی کنه‌ی واروا دارد. نتایج حاصل از آزمایش حاضر نشان داد که در دو غلظت ۲/۵ و ۳/۱۲ میکرولیتر بر لیتر هوا، پس از ۱۰ ساعت اسانس‌دهی با اسانس پونه‌ی کوهی میزان تلفات در کنه‌ی واروا به ترتیب ۶۵ و ۷۰ درصد و در زنبور عسل ۵ و ۷ درصد بود که این میزان تلفات در زنبورهای تیمارشده از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری با تلفات مشاهده شده در تیمار شاهد نداشت. با افزایش غلظت اسانس تا ۳/۷۵ میکرولیتر بر لیتر هوا، میزان مرگ و میر در کنه‌ی واروا و زنبور عسل به ترتیب به ۸۵ و ۲۴ درصد رسید که با وجود ایجاد مرگ و میر قابل توجه در کنه‌های تیمارشده، تلفات سنگینی بر زنبور عسل وارد شد.



شکل ۲. روند مرگ و میر کنهی واروا و زنبور عسل اروپایی در غلظت‌های مختلف اسانس پونهی کوهی در زمان‌های مختلف (میانگین‌های با حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنی‌دار با استفاده از آزمون توکی در سطح ۵ درصد می‌باشد).

Fig. 2. Percentage mortality of *V. destructor* and *A. mellifera* exposed to essential oil of *M. longifolia* for various periods of time (means with the same letters are not significantly different at $p < 0.05$, Tukey's test).

لذا با تنظیم غلظت و زمان اسانس‌دهی، اسانس پونهی کوهی می‌تواند با داشتن حداقل تلفات بر زنبور عسل (۵ درصد)، نتایج مطلوبی به منظور کنترل کنهی واروا در پی داشته باشد. ترکیبات مونوتربنیوئیدی از قبیل کارواکرول، تیمول، متول، کامفور و اکالیپتول که به طور عمدۀ در اسانس گیاهان مختلف مشاهده می‌شوند، می‌توانند اثرات کشنده‌گی مطلوبی بر کنهی واروا داشته باشند.

در این ارتباط Imdorf *et al.* (1995b) نشان دادند که تیمول، کامفور و متوول بدون داشتن اثرات سوء قابل توجه بر زنبور عسل تلفات چشم‌گیری به کنه‌ی واروا وارد می‌کنند. بر اساس تحقیقات Acantholipia seriphiooides Mold. Ruffinengo *et al.* (2005) اسانس دو گونه‌ی گیاهی *Schinus molle* L. خاصیت کنه‌کشی مطلوبی در کترول کنه‌ی واروا دارد. از آنجا که ترکیبات اصلی اسانس این دو گیاه را تیمول، کارواکرول و ارتوسیمن تشکیل می‌دهد، خواص کنه‌کشی آن‌ها را به وجود ترکیبات فوق نسبت داده‌اند. همچنین Colin *et al.* (1994) نشان دادند که پاشش امولسیون آبی کارواکرول روی کنه‌ی واروا، پس از ۲۴ ساعت منجر به از بین رفتن بیش از ۹۰ درصد کنه‌های تیمارشده می‌شود. Ellis & Baxendale (1997) نیز در مطالعات خود دریافتند که تیمول، متوول، سیترال و کارواکرول تلفات قابل توجهی بر کنه‌ی تراشه‌ای زنبور عسل *Acarapis woodi* Rennie (1998) وارد می‌کند. بررسی‌های Young-Joon *et al.* (1998) نشان داد که کارواکرول خاصیت کنه‌کشی مطلوبی در کترول کنه‌ی دولکه‌ای دارد. بر اساس تحقیقات متعدد انجام شده روی اجزاء ترکیبات اسانس پونه‌ی کوهی، اثبات شده است که ترکیباتی مانند متوول، تیمول، پولگون، ۱ و ۸ سینئول، کارواکرول، متوون، پیپریتون اکساید و سیس - پیپریتون اپوکساید اجزای اصلی ترکیبات اسانس این گیاه را تشکیل می‌دهند; Gulluce *et al.*, 2007; Hajlaoui *et al.*, 2008; Harminder *et al.*, 2008) بنابراین می‌توان خواص کنه‌کشی اسانس پونه‌ی کوهی بر کنه‌ی واروا را به وجود ترکیبات مؤثر موجود در آن از قبیل تیمول، متوول و کارواکرول نسبت داد. بر همین اساس، تولید کنه‌کش‌هایی که اجزای مؤثره‌ی آن‌ها را ترکیبات گیاهی تشکیل می‌دهند، قابلیت جایگزینی با بسیاری از سوم پرخطر شیمیایی را در برنامه‌های کترول تلفیقی آفات زنبور عسل اروپایی دارا هستند. تاکنون، مکانیسم دقیق نحوه‌ی اثر اسانس‌های گیاهی و ترکیبات مربوط به آن‌ها مشخص نشده است. اما مطالعات اخیر در این زمینه نشان می‌دهد که این ترکیبات بر سیستم گیرنده‌های اکتوپامینی بی‌مهرگان اثر دارند (Ennan *et al.*, 1998). گیرنده‌های اکتوپامین به شکلی که در حشرات وجود دارند، از سیستم عصبی مهره‌داران گزارش نشده است. بنابراین با انجام آزمایش‌های بیشتر روی سمتی تنفسی اسانس مورد مطالعه در پژوهش حاضر بر کنه‌ی واروا و زنبور عسل اروپایی، و همچنین ارزیابی آن در شرایط طبیعی، اسانس پونه‌ی کوهی می‌تواند در آینده به عنوان یکی از ترکیبات

کم خطر برای انسان و محیط زیست به منظور کنترل کنه‌ی واروا در زنبورستان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

سپاس‌گزاری

نگارندگان از همکاری کارکنان بخش زنبور عسل مؤسسه‌ی تحقیقات علوم دامی کشور و همچنین آقایان محمد آقایی و علی کیان به منظور در اختیار قرار دادن کندوهای آلوده به کنه‌ی واروا صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل می‌آورند.

منابع

- Abbott, W. S.** (1925) A method for computing the effectiveness of an insecticide. *Journal of Economic Entomology* 18, 265-267.
- Anderson, D. L. & Trueman, J. W. H.** (2000) *Varroa jacobsoni* (Acari: Varroidae) is more than one species. *Experimental and Applied Acarology* 24, 165-189.
- Ariana, A., Ebadi, R. & Tahmasbi, G. H.** (2002) Laboratory evaluation of some plant essences to control *Varroa destructor* (Acari: Varroidae). *Experimental and Applied Acarology* 27, 319-327.
- Bowen-Walker, P. & Gunn, A.** (2001) The effect of the ectoparasitic mite, *Varroa destructor* on adult worker honeybee (*Apis mellifera*) emergence weights, water, protein, carbohydrate and lipid levels. *Entomologia Experimentalis et Applicata* 101, 207-217.
- Calderone, N. W.** (1999) Evaluation of formic acid and thymol-based blend of natural products for the control of *Varroa jacobsoni* in colonies of the honey bee, *Apis mellifera*. *Journal of Economic Entomology* 92, 253-260.
- Calderone, N. W. & Spivak, M.** (1995) Plant extracts for control of the parasitic mite *Varroa jacobsoni* in colonies of the western honey bee. *Journal of Economic Entomology* 88, 1211-1215.
- Colin, M. E., Ciavarella, F., Otero-Colina, G. & Beizunes, L. P.** (1994) A method for characterizing the biological activity of essential oil against *Varroa jacobsoni*. pp. 109-114 in Matheson, A. (Ed.) *New perspectives on varroa*. 164 pp. International Bee Research Association, Cardiff, United Kingdom.

- De Jong, D., De Jong, P. H. & Goncalves, L. S.** (1982) Weight loss and other damage to developing worker honeybees from infestation with *Varroa jacobsoni*. *Journal of Apicultural Research* 21, 165-167.
- Ebrahimi, M. V., Nabian, S., Tahmasbi, G. H. & Bahreini, R.** (2006) The comparison of Thymol, Menthol, and Perizine on varroa mite (*Varroa destructor*) in Dehbakri region of Kerman province, Iran. *Agricultural Science* 17(1), 165-171.
- Ellis, M. D. & Baxendale, F. P.** (1997) Toxicity of seven monoterpenoids to tracheal mites (Acari: Tarsonomidae) and their honey bee (Hymenoptera: Apidae) hosts when applied as fumigants. *Journal of Economic Entomology* 90(5), 1087-1091.
- Elzen, P. J., Eischen, F. A., Baxter, J. B., Pettis, J., Elzen, G. W. & Wilson, W. T.** (1998) Fluvalinate resistance in *Varroa jacobsoni* from several geographic locations. *American Bee Journal* 138(9), 674-676.
- Ennan, E., Beiger, M. & Kende, A.** (1998) Insecticidal action of terpens and phenols to cockroaches: effects of octopamine receptors. *International Symposium on Plant Protection, European and Mediterranean Plant Protection Organization, Gent, Belgium*.
- Finney, D. J.** (1971) *Probit analysis*. 3rd ed. 333 pp. Cambridge University Press, London.
- Gulluce, M., Sahin, F., Sokmen, M., Ozer, H., Daferera, D., Sokmen, A., Polissiou, M., Adiguzel, A. & Ozkan, H.** (2007) Antimicrobial and antioxidant properties of the essential oils and methanol extract from *Mentha longifolia* L. ssp. *longifolia*. *Food Chemistry* 103, 1449-1456.
- Hajlaoui, H., Snoissi, M., Ben Jannet, H., Mighri, Z. & Bakhrouf, A.** (2008) Comparison of chemical composition and antimicrobial activities of *Mentha longifolia* L. ssp. *longifolia* essential oil from two Tunisian localities (Gabes and Sidi Bouzid). *Annals of Microbiology* 58(3), 513-520.
- Harminder, P. S., Daizy, R. B., Sunil, M., Kuldeep, S. D., Surender, Y. & Ravinder, K. K.** (2008) Constituents of leaf essential oil of *Mentha longifolia* from India. *Chemistry of Natural Compounds* 44(4), 528-529.
- Imdorf, A., Bogdanov, S., Ibanez Ochoa, R. & Calderone, N. W.** (1999) Use of essential oils for the control of *Varroa jacobsoni* in honey bee colonies. *Apidologie* 30, 209-229.
- Imdorf, A., Bogdanov, S., Kilchenmann, V. & Maquelin, C.** (1995a) Apilife var: a new varroacide with thymol as the main ingredient. *Bee World* 76(2), 77-83. www.SID.ir

- Imdorf, A., Kilchenmann, V., Bogdanov, S., Bachofen, B. & Beretta, C.** (1995b) Toxic effects of thymol, camphor, menthol and eucalyptol on *Varroa jacobsoni* oud. and *Apis mellifera* L. in a laboratory test. *Apidologie* 26, 27-31.
- Javvi, E., Safar Alizadeh, M. H. & Pourmirza, A. A.** (2005) Studies on the effect of *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* on different larval instars of Colorado potato beetle, *Leptinotarsa decemlineata* (Say), and the role of synergists in enhancement of its efficiency under laboratory conditions. *Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources* 8(4), 187-199.
- Isman, M.** (2000) Plant essential oils for pest and disease management. *Crop Protection* 19, 603-608.
- Melathopoulus, A., Winston, M., Whittington, R., Smith, T., Lindberg, A., Mukai, A. & Moore, M.** (2000) Comparative laboratory toxicity of neem pesticide to honey bees, their mite parasites *Varroa jacobsoni* and *Acarapis woodi*, and brood pathogens *Paenibacillus larvae* and *Ascosporella apis*. *Journal of Economic Entomology* 93, 199-209.
- Milani, N.** (1995) The resistance of *Varroa jacobsoni* Oud. to pyrethroids: a laboratory assay. *Apidologie* 26, 415-429.
- Negahban, M., Moharramipour, S. & Sefidkon, F.** (2006) Insecticidal activity and chemical composition of *Artemisia sieberi* Besser essential oil from Karaj, Iran. *Journal of Asia-Pacific Entomology* 9, 61-66.
- Negahban, M., Moharramipour, S. & Sefidkon, F.** (2007) Fumigant toxicity of essential oil from *Artemisia sieberi* Besser against three stored-product insects. *Journal of Stored Product Research* 43, 123-128.
- Ruffinengo, S., Egularas, M., Cora, D., Bailac, P., Rodriguez, E., Ponzi, M. & Bedascarrasbur, E.** (2002) Biological activity of *Heterotheca latifilia* Buckley (Compositae) essential oil against *Varroa jacobsoni* Oudemans (Acari). *Journal of Essential Oil Research* 14, 462-464.
- Ruffinengo, S., Egularas, M., Floris, I., Faverin, C., Bailac, P. & Ponzi, M.** (2005) LC₅₀ and repellent effects of essential oils from Argentinian wild plant species on *Varroa destructor*. *Journal of Economic Entomology* 98(3), 651-655.
- Ruffinengo, S., Maggi, M., Faverin, C., Rosa, S. B., Bailac, P., Principal, J. & Egularas, M.** (2007) Essential oils toxicity related to *Varroa destructor* and *Apis mellifera* under laboratory conditions. *Zootecnia Tropical* 25(1), 63-69.

- Young-Joon, A., Seong-Baek, L., Hoi-Seon, L. & Gil-Ha, K.** (1998) Insecticidal and acaricidal activity of carvacrol and β -thujaplicine derived from *Thujopsis dolabratata* var. *hondai* Sawdust. *Journal of Chemical Ecology* 24(1), 81-90.

Archive of SID