

تأثیر ماساژ به روشن استروک سطحی پشت بر اضطراب سالمندان

* محمد رضا یگانه خواه^۱، دکتر فرحتاز محمدی شاهبلاغی^۲، دکتر حمید رضا خانکه^۳، دکتر مهدی رهکنر^۴

چکیده

هدف: اضطراب در زندگی امروزی، به خصوص در سالمندان که قدرت تطابق و سازگاری کمتری دارند، می‌تواند باعث عوارض وخیم و جبران ناپذیری در ابعاد سلامت آنان شود. این مطالعه با هدف کاهش میزان اضطراب آشکار این افراد با استفاده از تکنیک ماساژ استروک سطحی پشت «اس.اس.بی.ام» در سالمندان انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه به روش نیمه تجربی در مرکز سالمندان کهربیزک تهران در سال ۱۳۸۵ انجام شد. ۱۰۲ نفر سالمند بر اساس معیارهای ورودی انتخاب و با روش بلوک‌های تبدیل شده تصادفی به دو گروه مساوی مداخله و کنترل تخصیص داده شدند. ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش شامل فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب آشکار اسپیل برگردد.

در گروه مداخله ماساژ «اس.اس.بی.ام» به مدت ۵ روز متوالی، روزی ۵ دقیقه بین ساعت ۷-۳ بعد از ظهر اجرا گردید. میزان اضطراب آشکار هر دو گروه قبل و بعد از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون‌های کای اسکوئر، من وینتی، تی مستقل، کولمگروف- اسمیرنوف و تی زوجی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.

یافه‌ها: میانگین اضطراب آشکار دو گروه مداخله و کنترل قبل از شروع ماساژ «اس.اس.بی.ام» اختلاف معناداری نداشت ($P > 0.05$), در حالی که بعد از ماساژ «اس.اس.بی.ام» اختلاف معناداری بین دو گروه مشاهده شد ($P < 0.05$).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه می‌توان چنین اظهار نمود که با بکارگیری روش ماساژ «اس.اس.بی.ام» امکان کاهش اضطراب و عوارض ناشی از آن در سالمندان وجود دارد. کلید واژه‌ها: اضطراب/ سالمندی / ماساژ استروک سطحی پشت

این پژوهش تحت حمایت مالی و علمی مرکز تحقیقات سالمندی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده است.

- ۱- کارشناس ارشد بهداشت جامعه
- ۲- دکترای پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- ۳- دکترای پرستاری، استاد یار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- ۴- دکترای آمار زیستی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تاریخ دریافت مقاله: ۸۶/۳/۲۰

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۶/۸/۲۰

* آدرس نویسنده مسئول: قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، بیمارستان کامکار، بخش مراقبتها ویژه . ۰۲۵۱-۷۷۲۲۴۴۳

*E-mail:yeganeh3603@yahoo.com



مقدمة

مسئله سالمندی جهان که به دلایل مهمی از جمله کاهش مرگ و میر ناشی از پیشرفت علوم پزشکی، بهداشت، کنترل موالید، آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش نرخ امید به زندگی و طول عمر در سطح جهانی مطرح شده، پدیده نسبتاً نوینی است. از آنجاکه این پدیده در کلیه جنبه های زندگی جوامع بشری، از جمله در طیف گسترده ای از ساختارهای سنتی، ارزشها، هنگارها و ایجاد سازمان های اجتماعی تحولات قابل ملاحظه ای به وجود می آورد، لذا مقابله با چالشهای فرا راه این پدیده و استفاده از تدبیر مناسب در جهت ارتقاء وضعیت جسمی، روحی و اجتماعی سالمندان از اهمیت والائی برخوردار بوده و در دستور کار جامعه پیش المللی قرار دارد(۱).

سالمندان بخاطر قرار گیری در محدوده خاصی از زندگی، در معرض تهدیدات بالقوه‌ای همچون افزایش ابتلا به بیماریهای مزمن، تهابی، انزوا و عدم برخورداری از حمایتهای اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی‌های جسمی و ذهنی در موارد زیادی استقلال فردیشان مورد تهدید قرار می‌گیرد (۲). مطالعات متعددی نشان داده که ۸۰ درصد سالمندان بالای ۶۵ سال به انواع اختلالات جسمی و روانی مبتلا هستند. برخی تحقیقات نیز حکایت از آن دارند که ۸۵ درصد این کسانی که بیماریها در سالمندان جنبه اضطرابی داشته و در نتیجه محرومیت‌ها و عدم اراضی نیازهای دوران پیری، ایجاد می‌شوند (۳).

اضطراب یک مسئله شایع در دوره سالمندی است، زیرا این دوره مملو از انواع احساس کمبودها و ناتوانی‌هایی هاست. به عبارتی سالمندان، بویژه آنهاست که در مؤسسه‌سالمندی زندگی می‌کنند، به علت کاهش اعتماد به نفس، نقصان فعالیت و تحرک، از دست دادن دوستان و نزدیکان، کاهش استقلال مادی و جسمانی و ابتلا به بیماری‌های مزمن، در معرض استرس و اضطراب بیشتری قرار دارند(۴،۵). بر اساس آمار ۱۵ درصد زنان و ۵ درصد مردان سالمند مبتلا به اضطراب می‌باشند(۶). مطالعات متعدد نشان داده که سالمندانی که در مؤسسه‌سالمندی زندگی می‌کنند، نسبت به سالمندانی که به تنها بی در منزل شخصی خود زندگی می‌کنند، دارای اضطراب و استرس بیشتری هستند. عبدالرحمان در سال ۲۰۰۶ با مطالعه‌ای بر روی دو گروه از سالمندان بستره در مؤسسه سالمندی و آنهاست که به تنها بی در منزل شخصی زندگی می‌کنند، نشان داد که اضطراب در گروه اول $۵۸/۳$ درصد و در گروه دوم $۳۶/۶$ درصد می‌باشد(۷). در مطالعه دیگری که لینز و همکارانش در سال ۲۰۰۵ انجام دادند، نشان دادند که شیوع اضطراب در بین سالمندان امریکایی در حدود ۵۰ درصد می‌باشد(۸).

بیقراری، غم و اندوه، بی اشتهايی، افزایش فشارخون، افزایش بی نظمی

تنفس، طپش قلب و اختلال در بیاد آوری مطالب، از علائم و نشانه‌های اضطراب و استرس می‌باشند، بنابراین عدم کنترل اضطراب و استرس می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامتی و بهداشت افراد بگذارد. این عوامل در سالمندان، که قدرت تطابق و سازگاری کمتری دارند، می‌تواند باعث ضایعات پاتولوژیک و سیعی شود^(۹). بنابراین اگر خواستار زندگی بهتر و باکیفیت برای آنها هستیم، می‌بایست به آنها به عنوان انسانی بانیازهای جسمی، روانی و اجتماعی خاص نگریسته و سعی در برطرف نمودن نیازهای آنان داشته باشیم^(۱۰).

امروزه روش‌های متنوعی جهت کنترل اضطراب در دسترس است که پرستاران بعنوان یکی از گروههایی که مستقیماً در این زمینه مسئولیت دارند این روشها را آموزش دیده و جدیدترین دستاوردهای این حیطه را مطالعه می‌نمایند(۱۱). از این میان تکنیک‌های آرامسازی از مهمترین روش‌های غیر دارویی هستنده برای کنترل اضطراب بکار می‌روند، زیرا این روشها از طریق هیپوتالاموس بر روی اعصاب پاراسمپاتیک اثر می‌گذارند و باعث کاهش ضربان قلب، فشارخون، متabolیسم، سرعت تنفس و مصرف اکسیژن می‌شوند. راههای زیادی جهت رسیدن به آرامسازی وجود دارد(۱۲). ماساژ درمانی^۱ یکی از روشهای آرامسازی است که باعث توسعه آرامش، تسکین درد و کاهش اضطراب می‌شود(۱۳).

مساژدرمانی بعنوان عمومی‌ترین اقدام پرستاری با دستکاری عمومی بافت‌های نرم بدن، باعث بازگرداندن تعادل متابولیک بافت‌ها می‌شود (۱۳، ۱۴). علاوه بر این موجب برقراری ارتباط، مراقبت، ابراز محبت و شرکت دادن بیمار در فرایند بهبودی می‌شود. اکثر بیماران ابراز می‌دارند که مساژدرمانی احساس مراقبت و حمایت را در آنان تقویت می‌کند و همچنان ارتباط بین آنها و مراقبندهایشان را تقویت می‌نماید (۱۵).

اشکال متنوعی از حرکات ماساژی وجود دارد که بر روی قسمت‌های مختلف بدن بکار می‌رود. در این مطالعه از استروک سطحی پشت «اس.اس.بی.ام»^۳ جهت کاهش اضطراب سالماندان استفاده شده است. «اس.اس.بی.ام» اولین بار توسط الیزابت(۱۹۶۶) بصورت حرکات آهسته، ملایم و موزون کف دستها روی پشت بیمار با سرعت یکنواخت در حدود ۶۰ حرکت در دقیقه با فشاری ملایم بمدت ۳ تا ۱۰ دقیقه معرفی شده است (۱۶، ۱۳). حرکات بکاررفته در این ماساژ درمانی از نوع استروک سطحی بوده که اثر کاملاً حسی داشته و در آرامسازی سماویان اث سیار مفید است (دارد(۱۷).

تحقیقات زیادی نشان داده اند که ماساژ «اس.اس.بی.ام» یک مداخله



«اس.اس.بی.ام» به مدت ۵ دقیقه در ۵ روز متوالی در پوزیشن نشسته برای افراد گروه مداخله انجام شد. مراحل عملی ماساژ شامل بخش‌های زیر است:

- بیمار روی صندلی ماساژ می‌نشیند و سرش را روی بالشی خم می‌کند.
- انجام حرکات کوچک گردشی با انگشتان شست روی ناحیه گردن.
- انجام استروک سطحی از ناحیه قاعده جمجمه تا ناحیه خاجی باکف یک دست و تکرار عمل در طرف دیگر ستون فقرات باکف دست دیگر در حالیکه همزمان با این عمل، دست اول به سمت قاعده جمجمه حرکت می‌کند.

- انجام استروک در طول تیغه‌های شانه با انگشت شست.
- انجام استروک با انگشتان شست در دو طرف ستون فقرات از ناحیه شانه تاکمر.

- انجام استروک جارویی از ناحیه گردن تا نزدیک استخوان خاجی باکف هر دو دست(۱۲).

مراحل کار در گروه کنترل بجز برنامه ماساژ، در سایر موارد مثل گروه مداخله بود. روز پنجم پس از اتمام مداخله مجدداً پرسشنامه اضطراب آشکار هر دو گروه مساوی مداخله و کنترل تقسیم شدند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: داشتن سن ۹۰-۶۰ سال، گرفتن نمره حداقل ۲۰ از مقیاس

ابزار گردآوری داده‌ها فرم مشخصات دموگرافیک و اطلاعات بیماری و پرسشنامه اضطراب آشکار اسپیل برگر بود. پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اسپیل برگر که^۱ (STAI) نامیده می‌شود، از دو قسمت اضطراب آشکار و اضطراب پنهان تشکیل شده است. بین پرسشنامه‌های اضطراب آشکار و پنهان تفاوت وجود دارد. اضطراب پنهان استعداد کلی پاسخ به بسیاری از موقعیت‌ها با سطح اضطراب بالا است، ولی اضطراب آشکار اختصاصی تر بوده و به اضطراب فرد در یک لحظه خاص اشاره می‌کند(۱۳). در این مطالعه از بخش اضطراب آشکار استفاده شد، زیرا این بخش توانایی اندازه‌گیری سطح اضطراب موقعیتی افراد را در زمان مداخله دارد(۱۱). این پرسشنامه حاوی ۲۰ سؤال کوتاه است که به صورت مثبت و منفی تنظیم شده است و هر سؤال دارای ۴ گزینه است، که به هر گزینه نمره‌ای بین ۱ تا ۴ تخصیص می‌یابد. مهرام (۱۳۷۲) این پرسشنامه را در ایران استاندارد سازی کرد و از طریق فرمول آلفای کرونباخ، پایایی ۰/۹۱ را برای آن محاسبه نمود(۱۴). در مطالعه حاضر برای تعیین پایایی این ابزار از آزمون مجدد استفاده شد، بدین ترتیب که ابتدا پرسشنامه به ۱۵ نفر از سالمندان داده شد و پس از تکمیل پرسشنامه، ده روز بعد مجدداً پرسشنامه جهت پاسخگویی به همان افراد ارائه گردید و ضریب پایایی

روش بررسی

مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بوده و کل نمونه‌های آن، ۱۰۲ نفر سالمند ۹۰-۶۰ ساله مقیم مرکز سالمندان کهریزک بودند که بر اساس معیارهای ورودی انتخاب، و با روش بلوک‌های تبدیل شده تصادفی^۲ به دو گروه مساوی مداخله و کنترل تقسیم شدند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: داشتن سن ۹۰-۶۰ سال، گرفتن نمره حداقل ۲۰ از مقیاس اضطراب آشکار اسپیل برگر، داشتن هوشیاری، شناوایی و گویایی تا حدی که مانع از انجام تحقیق نشود، نداشتن استراحت مطلق، نداشتن عارضه پوستی و استخوانی در ناحیه گردن، پشت و ساکروم، نداشتن بد خیمی نخاعی بر اساس شرح حال ثبت شده در پرونده بیمار توسط پزشک متخصص و نداشتن تب یا درد حاد در هنگام ثبت فرم علامت حیاتی. معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل: عدم همکاری یا فوت سالمند، ترک آسایشگاه به هر دلیلی و بستره شدن در بخش درمانی بود. پس از تعیین گروه‌ها، طبق شرح حال ثبت شده توسط پزشک متخصص، بیماران از نظر بیماری‌های کلیوی، قلبی عروقی، پوستی، اسکلتی و غدد درون ریز وضعیت شناوایی و گویایی بررسی شدند. پس از مراحل فوق طی دو جلسه ۲۰ دقیقه‌ای بطور جداگانه در مورد اهداف، مراحل و مدت مطالعه توضیحات لازم به دو گروه داده و رضایت آنها کسب شد. در ملاقات‌های بعدی اطلاعات دموگرافیک و بیماری افراد از طریق بررسی پرونده‌ها و مصاحبه تکمیل گردید. سپس در روز مطالعه قبل از شروع مداخله، اضطراب آشکار هر دو گروه در ساعت محقق بوسیله پرسشنامه اسپیل برگر بررسی شد. پس از آن هر سالمند هر روز در ساعت معینی (۳-۷) بعد از ظهر) در اتاقی به مساحت ۹ مترمربع در انتهای هر بخش که دارای شرایط معمول ماساژ درمانی (آرام بانور ملایم و درجه حرارت ۲۷ درجه سلسیوس و فارغ از محرك‌های محیطی) بود قرار گرفته و ماساژ

1- Randomize permuted block

2- State- Trait Anxiety Inventory(STAI)



نرم افزار اس.بی.اس.ا.س. و آزمون های کای اسکوئر، من ویتنی، تی مستقل، تی زوجی، کولمگروف - اسمیرنوف و آزمون لون استفاده شد.

یافته‌ها

اکثریت واحدهای مطالعه در هر دو گروه (۷۸٪/۶۰٪) مؤنث بوده و میانگین و انحراف معیار سنی افراد در گروه مداخله و کنترل بترتیب ۷۶/۴۷ درصد گروه سال ۷۴±۲۰ سال بود. ۷۵/۱ و ۷۷/۸۲±۹/۷۷ سال بود. ۷۸/۴۴ درصد گروه مداخله و ۷۸/۴۴ درصد گروه کنترل بیسواند بوده و دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای جنس، سن، میزان تحصیلات، مدت اقامت، تاریخچه فامیلی اضطراب و داروهای مصرفی اختلاف معناداری نداشته، به عبارت دیگر دو گروه مداخله و کنترل همگن بودند (P<0.05) (جدول ۱).

پیرسون بین دو مرحله پاسخگویی محاسبه گردید که با بدست آمدن
۰=۹/۰۱ و آلفای ۸۵۲۴ / پایابی این ابزار نشان داده شد. این پرسشنامه
در اکثر تحقیقات در کشور ما همچون مطالعه ابراهیمی و همکاران
(۱۵)، محمودی عالمی و همکاران (۱۶)، روحی و همکاران (۱۷) و
بسامپور (۱۸) و سایر جوامع بکاربرده شده است که نشان از روابی بالای
این آزمون دارد. جهت کسب تبحر کافی در امر ماساژ درمانی، پس از
مشاورت با یکی از اعضاء هیئت علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی، مراحل ماساژ «اس.اس.بی.ام» به دفعات روی
مانکن تمرین شد.

مطالعه حاضر قبل از انجام توسط کمیته اخلاقی دانشگاه علوم بهزیستی
و توانبخشی و آسایشگاه سالمندان کهریزک تأیید شد و رضایت نامه کتبی
از کلیه افراد شرکت کننده اخذ شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از

جدول ۱ - توزیع نمونه‌های مورد پژوهش بر حسب مشخصات دموگرافیک (n=۱۰۲)

جدول ۱ - توزیع نمونه‌های مورد پژوهش بر حسب مشخصات دموگرافیک (n=۱۰۲)						
متغیر	تعداد	گروه مداخله		گروه کنترل		توزیع همسانی
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	
جنس	مرد	۳۹/۲۲	۲۰	۳۹/۲۲	۲۰	P=۱/۰۰
	زن	۶۰/۷۸	۳۱	۶۰/۷۸	۳۱	df=۱/۰۰
	X ^۲ =۰/۰۰					
مدت اقامت	۴-۱ سال	۵۸/۸۲	۳۰	۵۸/۸۲	۳۰	P=۰/۲۸۰
	۵-۱۰ سال	۲۱/۳۷	۱۶	۲۱/۳۷	۱۶	df=۱۵/۰۰
	>۱۰	۹/۸۱	۵	۹/۸۱	۵	X ^۲ =۱۷/۶۷۰
تحصیلات	بیسوسا د	۷۶/۴۷	۳۹	۷۶/۴۷	۳۹	۷۸/۴۴
	خواندن و نوشتن	۵/۸۸	۳	۵/۸۸	۳	۷/۸۴
	ابتدایی	۱۳/۷۳	۷	۱۳/۷۳	۷	df=۴
سابقه فامیلی اضطراب	راهنمایی	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۱/۹۶
	متوسطه	۳/۹۲	۲	۳/۹۲	۲	۱/۹۶
	دارد	۲۱/۵۷	۱۱	۲۱/۵۷	۱۱	P=۰/۶۴۱
داروی مصرفی	ندارد	۷۸/۴۳	۴۰	۷۸/۴۳	۴۰	۷۸/۵۱
	ضد فشارخون	۵۳/۳۳	۷۲	۵۳/۳۳	۷۲	۵۱/۳۸
	ضد اضطراب	۹/۷۳	۱۳	۹/۷۳	۱۳	۱۱/۸۰
سن	ضد چربی خون	۱/۴۹	۲	۱/۴۹	۲	۳/۴۷
	سایر	۳۵/۰۵	۴۸	۳۵/۰۵	۴۸	۳۳/۳۴
	۶۰-۶۹ سال	۱۹/۶۱	۱۰	۱۹/۶۱	۱۰	۲۹/۴۱
	۷۰-۷۹ سال	۳۱/۳۷	۱۶	۳۱/۳۷	۱۶	۳۹/۲۲
	>۸۰	۴۹/۰۲	۲۵	۴۹/۰۲	۲۵	۳۱/۳۷
	X ^۲ =۳۴/۱۷					

اضطراب نسبتاً شدید دارند. در حالی که بعد از ماساژ «اس.اس.بی.ام» در گروه مداخله انفر (۲/۰۰ درصد) اضطراب خفیف، ۴۰ نفر (۷۸/۴۰ درصد) اضطراب متوسط به بایس و ۱۰ نفر (۶/۰۰ درصد) اضطراب متواتر به بالا

نتایج اطلاعات پرسشنامه اضطراب آشکار اسپیل برگر قبل از مداخله نشان داد که در هر دو گروه، ۱۹ نفر (۳۷/۳۰ درصد) اضطراب متوسط به یا بیشتر، ۲۸ نفر (۵۴/۹۰ درصد) اضطراب متوسط به بالا و ۴ نفر (۸/۰ درصد)



مقادیر فوق بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معناداری وجود داشته است ($P<0.05$) (جدول ۳). در گروه مداخله میانگین اضطراب آشکار بعد از مداخله به صورت معناداری نسبت به قبل از مداخله کاهش یافته ($P<0.05$ ، در حالی که در گروه کنترل این مقدار کاهش معناداری نداشت ($P>0.05$) (جدول ۴).

دارند ولی در گروه کنترل ۱۷ نفر ($33/30$ درصد) اضطراب متوسط به پایین، ۳۲ نفر ($62/70$ درصد) اضطراب متوسط به بالا و ۲ نفر ($3/90$ درصد) اضطراب نسبتاً شدید دارند که نشان دهنده کاهش اضطراب در گروه مداخله است (جدول ۲).

بین میانگین مقادیر اضطراب آشکار دو گروه مداخله و کنترل قبل از ماساژ تفاوت معناداری وجود نداشته ($P>0.05$ ، در حالی که بین میانگین

جدول ۲- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب شدت اضطراب آشکار قبل و بعد از مداخله

درصد	بعد از مداخله			قبل از مداخله			اضطراب
	گروه کنترل		گروه مداخله	گروه کنترل		گروه مداخله	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
۰/۰۰	۰	۲/۰۰	۱	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	خفیف
۳۳/۳۰	۱۷	۷۸/۴۰	۴۰	۳۷/۳۰	۱۹	۳۷/۳۰	متوسط به پایین
۶۲/۷۰	۳۲	۱۹/۶۰	۱۰	۵۴/۹۰	۲۸	۵۴/۹۰	متوسط به بالا
۳/۹۰	۲	۰/۰۰	۰	۷/۸۰	۴	۷/۸۰	نسبتاً شدید
۱۰۰/۱۰۰	۵۱	۱۰۰/۱۰۰	۵۱	۱۰۰/۱۰۰	۵۱	۱۰۰/۱۰۰	جمع کل

جدول ۳- مقایسه میانگین اضطراب آشکار دو گروه مداخله و کنترل باهم به تفکیک قبل و بعد از ماساژ «اس.اس.بی.ام»

مقدار احتمال	آماره تی	انحراف معیار	میانگین	گروه	متغیر	
					قبل از ماساژ	بعد از ماساژ
۰/۹۰۴	۰/۱۲	۵/۰۲	۴۴/۴۵	مداخله	اضطراب	اضطراب
		۴/۷۴	۴۴/۳۳	کنترل		
۰/۰۰۰	-۷/۲۴	۴/۴۷	۳۸/۵۹	مداخله	گروه کنترل	گروه کنترل
		۴/۰۳	۴۴/۶۹	کنترل		

جدول ۴- مقایسه میانگین اضطراب آشکار قبل و بعد از ماساژ «اس.اس.بی.ام» به تفکیک در گروه مداخله و کنترل

مقدار احتمال	آماره تی	انحراف معیار	میانگین	مرحله	متغیر	
					قبل از ماساژ	بعد از ماساژ
۰/۰۰۰	۲۰/۰۵	۵/۰۲	۴۴/۴۵	گروه مداخله	اضطراب	اضطراب
		۴/۴۷	۳۸/۵۹	بعد از ماساژ		
۰/۲۴۵	-۱/۱۷	۴/۷۴	۴۴/۳۳	قبل از ماساژ	گروه کنترل	گروه کنترل
		۴/۰۳	۴۴/۶۹	بعد از ماساژ		

آشکار دو گروه بعد از مداخله را نمی‌توان به تفاوت‌های قبلی آزمودنی‌ها نسبت داد، زیرا اولاً آزمودنی‌ها به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند، ثانیاً مشخصات دموگرافیک گروه‌های داده‌گردانی با هم همسان بودند، ثالثاً اضطراب آشکار دو گروه قبل از مداخله تفاوت معناداری نداشت. نتایج مطالعه حاضر با نتایج تحقیقات

بحث

نتایج پژوهش حاضر این نظریه را که ماساژ «اس.اس.بی.ام» می‌تواند اضطراب سالمندان را کاهش دهد، تأیید می‌کند. نتایج نشان داد که اجرای ۵ دقیقه این ماساژ در ۵ روز متوالی باعث کاهش چشمگیری در اضطراب سالمندان می‌شود. تفاوت‌های مشاهده شده در آزمون اضطراب



اضطرابی از طرف سالمندان و تأکید بیشتر آنها روی مسائل جسمانی، مشکل اضطراب را در پیران کم اهمیت در نظر می‌گیرند، در حالی که اضطراب در سالمندان بیشتر بصورت علائم جسمانی همچون: بی‌خوابی، اختلالات رفتاری، حسی، ادراری، قلبی عروقی و گوارشی ظاهر می‌شود که نیاز به توجه ویژه دارد^(۵,۷). مطالعه حاضر نیز نشان داد که اضطراب در بین سالمندان از شیوع بالای برخوردار است و می‌تواند باعث عوارض جسمانی فراوانی در سالمندان شود.

مطالعات متعددی نشان داده‌اند که ماساژ «اس.اس.بی.ام» یک مداخله مؤثر پرستاری است و باعث کاهش دیسترس، تنفس، خستگی، فشارخون و بهبود خلق و آرامسازی می‌شود^(۲۱). ماساژ درمانی توانایی تغییر پاسخ سمپاتیکی به پاراسمپاتیک را دارد. پاسخ‌های سمپاتیک باعث آمادگی کامل فرد برای برداشت تهدید آور یا چالش برانگیز جهت دفاع یا فرار می‌شود و با افزایش فعالیت قلبی - عروقی و احساس تنش همراه است. بر عکس پاسخ پاراسمپاتیک در حالت استراحت و آرامش ایجاد می‌گردد و با کاهش فعالیت قلبی عروقی و استرس همراه است^(۲۵).

نتیجه‌گیری

مطالعه حاضر ضمن تأیید و حمایت مطالعات مرتبط گذشته، نشان داد که ماساژ «اس.اس.بی.ام» بر روی کاهش اضطراب سالمندان مؤثر است. لذا با توجه به شیوع اضطراب و عوارض آن در سالمندان پیشنهاد می‌شود که از روش ماساژ «اس.اس.بی.ام» در درمان یا کنترل اضطراب در سالمندان مضطرب استفاده نمود. زیرا علاوه بر نداشتن عوارض موجب بهبود کیفیت زندگی سالمندان و اصلاح ارتباط بین پرستار و سالمندان در ارائه مراقبت‌های درمانی می‌شود.

تشکر و قدردانی

از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مسئولین و سالمندان مرکز سالمندان کهریزک و کلیه کسانی که در انجام این مطالعه به ما یاری رسانیدند کمال سپاس را داریم.

۱- بهرامی، ف. رمضانی فرانی، ع. نقش باورهای مذهبی درونی و بیرونی در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان. *فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی*. بهار ۱۳۸۴. دوره ششم. شماره اول. صفحه ۴۳.

۲- وحدانی نیا، م. گشتاسبی، آ. منتظری، ع. مفتون، ف. کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در سالمندان: مطالعه‌ای جمعیتی. *فصلنامه پایش*. بهار ۱۳۸۴. سال چهارم. شماره دوم. صفحات ۱۱۶ و ۱۲۲.

موک و وو (۲۰۰۴)، هالند و پاکورنی (۲۰۰۱) فکوری و جونز (۱۹۸۷)، میک (۱۹۹۳) و لانگ ورس (۱۹۸۲) همخوانی دارد^(۱۶-۲۰).

کارشناسان، اثر بخشی ماساژ درمانی را در کاهش اضطراب از طریق ثوری سلیه بدین صورت تبیین می‌کنند: یکی از وظایف فیزیولوژیک هیپوتالاموس، کاهش و افزایش تحریک سیستم عصب مرکزی است و اضطراب از طریق افزایش تون عضلانی باعث تحریک سیستم هیپوتالاموس و سمپاتیک می‌شود و ماساژ درمانی از طریق کاهش فشار عضلانی، با واکنش‌های اضطرابی مخالفت کرده و موجب آرامسازی می‌شود^(۱۳).

مطالعات متعدد نشان می‌دهند که اضطراب و افسردگی دو بیماری شایع در سالمندان می‌باشند. علاوه بر آن اضطراب ۷-۷ برابر بیشتر از افسردگی در سالمندان دارای اضطراب متوسط به بالا هستند که نشان از شیوع بالای این بیماری در بین سالمندان تحت بررسی در این مطالعه است.

سالمندانی که در مراکز سالمندان زندگی می‌کنند، بدليل از دست دادن توانایی و اختیار خود در انجام کارهای روزمره، استقلال فردی، محیط خصوصی، فعالیت اجتماعی و حمایت‌های عاطفی و همچنین تجربه واقعی منفی، خانه سالمندان را شیوه یک زندان توصیف می‌کنند^(۶). در این مطالعه اکثریت سالمندان علت اقامت خود در این مرکز را وضعیت اقتصادی ضعیف اعلام نمودند. به گفته آنان، محیط سرای سالمندان نسبت به منزل شخصی، محیطی است که باعث تشدید اضطراب و استرس می‌گردد.

بررسی خصوصیات اجتماعی - اقتصادی خانواده‌های ایرانی نشان می‌دهد که اکثریت زنان سالمند بی سواد می‌باشند^(۲۸). در مطالعه حاضر نیز ۷۷/۴۵ درصد از مددجویان زن بی‌سواد بودند.

امروزه بیشتر پرستاران بیان می‌کنند که بدليل عدم وقت کافی برای انجام درمانهای مکمل و تردید در مؤثر بودن آن، کمتر از این درمان‌ها استفاده می‌کنند^(۳۰). این مطالعه نشان داد که ماساژ «اس.اس.بی.ام» در یک مدت زمان کوتاه (به مدت ۵ دقیقه در ۵ روز متوالی) می‌تواند یک مداخله مؤثر پرستاری در کاهش اضطراب باشد.

بیشتر کارشناسان، متخصصین و درمانگرها بدليل ذکر کمتر علائم

منابع:

۳- مؤقری، م.ر. نیکبخت نصرآبادی، ع.ر. بررسی کیفیت ارائه مراقبت‌های توانبخشی معنوی در سالمندان بستری در بخش‌های روانی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران. *فصلنامه پایش*. بهار ۱۳۸۱ . سال دوم. شماره دوم. صفحه ۱۲۲.

4- Chop WC. Social aspect of aging. In: Farrell G, Miller WC. Nursing care of older person. Philadelphia: McGraw Hill Company; 2001: PP: 1115-29.



5- Lang AJ, Stein MB. Anxiety Disorders: How to recognize and treat the medical symptoms of emotional illness. Geriatrics 2001 May;56(5):24-7& 31-4.

۶- سعیی، ع. طب سالخوردگان. چاپ اول. تهران. مرکز نشر دانشگاهی. ۱۳۷۲
صفحات ۲۵ تا ۱۱۴

7- Rahman A.T. Anxiety and depression in lone elderly living at their own homes & going to geriatric clubs versus those living at geriatric homes or anxiety and depression in lone elderly. 2006. pp: 1- 10
<http://www.globalaging.org/health/world/2006/egyptelderly.pdf>

8- Lenze EJ, Mulsant BH, Mohlman J, Shear MK, Dew MA, Schulz R, et al. Generalized anxiety disorder in late life: lifetime course and comorbidity with major depressive disorder. Am J Geriatr Psychiatry 2005 Jan;13 (1):77-80

9- Vinik BH. Psychiatric mental health aspects. In: William R, Mutran E, Kity K. Clinical aspects of aging. Baltimore: Lippincott Company, 2005; PP: 929-1010

10- Hilton C, Ghaznavi F, Zuberi T. Religious beliefs and practices in acute mental health patients. Nursing Standard 2002; 16: 33-36

۱۱- کاظمی ملک محمودی، ش. بررسی تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب کودکان سن مدرسه بستری در بیمارستان کودکان طالقانی گرگان. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری. تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی . سال ۱۳۸۱. صفحه ۹

12- Toth M, Kahn J, Walton T, Hrbek A, Eisenberg D.M. Therapeutic massage intervention for hospitalized patients with cancer: A pilot study. Alternative & complementary therapies Jun 2003; 9(3): 117 -124

13-Mok E, Woo CP. The effects of slow-stroke back massage on anxiety and shoulder pain in elderly stroke patients. Complement Ther Nurs Midwifery 2004 Nov;10(4):209-16.

14- Hulme J. et al. The effect of foot massage on patients perception of care following laparoscopic sterilization as day care patient. J A N. 1999; 30 (2): 460-468

15-Smith MC, et al. Benefits of massage therapy for hospitalized patient: A descriptiveand qualitative evolution. communication 1999; 5(4): 64-74.

16-Holland B, Pokorny M.E. Slow Stroke Back Massage: Its effect on patients in a rehabilitation setting. Rehabil Nurs. 2001 Sep-Oct; 26 (5): 182-6.

۱۷- حسینی، م. درمانهای دستی (۱) ماساژ و فریکشن. چاپ اول. مؤسسه نشر جهاد. ۱۳۷۴. صفحه ۹

18- Meek SS. Effects of slow stroke back massage on relaxation in hospice clients. Image J Nurs Sch. 1993 Spring; 25(1):17-21.

19- Fakouri C, Jones P. Relaxation Rx: Slow stroke back rub. J Gerontol Nurs. 1987 Feb; 13(2):32-5.

20- Longworth JC. Psychophysiological effects of slow stroke back massage in normotensive females. ANS Adv Nurs Sci. 1982 Jul; 4(4):44-61