

بررسی فرایندهای واژی کودکان فارسی زبان ۲ تا ۴ ساله

*طاهره سیما شیرازی^۱، نیره مهدی پور شهریور^۲، آذر مهری^۳، مهدی رهگنر^۳

چکیده

هدف: فرایندهای واژی، تغییراتی است که کودکان به هنگام بیان کلمات در نحوه تلفظ آن ایجاد می‌کنند تا بیان آن‌ها برای ایشان راحت‌تر شود. این پژوهش با هدف بررسی فرایندهای واژی کودکان عادی فارسی زبان ۲ تا ۴ ساله صورت گرفت.

روش بررسی: این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی-تحلیلی است. آزمودنی‌های این پژوهش تعداد ۱۲۸ دختر و پسر ۲۴ تا ۴۸ ماهه تک زبانه فارسی زبان و فاقد هر نوع اختلال شدید شنوایی، بینایی، جسمانی، ذهنی، گفتار و زبان، عاطفی-روانی، ساختاری و کارکردی در تولید کننده‌های گفتاری هستند که به صورت تصادفی ساده‌از مهدکوکدک‌های مناطق مختلف شهر تهران انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، آزمون محقق ساخته فرایندهای واژی، متشکل از ۴۳ واژه یک تا چهار هجایی شامل تمام واژه‌های زبان فارسی است که توسط آن فرایندهای واژی کودکان در مقوله‌های ساخت هجا، جانشینی همخوان، جانشینی واکه، همگونی کامل، جابجایی، و سایر فرایندها جمع آوری و بررسی می‌شود. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری تی مستقل، من ویتنی، تحلیل واریانس یک‌طرفه و کروسکال والیس تحلیل شد.

یافته‌ها: در هیچ یک از فرایندهای واژی، تفاوت معناداری بین دخترها و پسرها مشاهده نشد ($P > 0.05$)، اما فرایندهای واژی با افزایش سن روند رو به کاهش داشتند که این کاهش در فرایندهای ساخت هجا ($P < 0.001$)، جانشینی همخوان ($P < 0.01$)، جانشینی واکه ($P = 0.03$) و همگونی کامل ($P = 0.03$) معنادار بود.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تفاوت جنسی تأثیری بر چگونگی فرایندهای واژی ندارد. اما با افزایش سن فرایندهای واژی رو به کاهش می‌روند که می‌تواند نشانگر رشد ادرآکات واژی و تسلط بیشتر کودکان گروه‌های سنی بالاتر بر نحوه تلفظ لغات باشد.

کلید واژه‌ها: فرایندهای واژی / کودک فارسی زبان / فرایند ساخت هجا / فرایند جانشینی / فرایند همگونی کامل

- ۱- دانشجوی دکترای گفتار درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- ۲- کارشناس ارشد گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- ۳- کارشناس ارشد گفتار درمانی، عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۴- دکترای آمار زیستی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۶/۲۶

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۷/۱۱/۵

*آدرس نویسنده مسئول:
تهران، اوین، بلوار دانشجو، بنیست کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه گفتار درمانی
تلفن: ۰۲۱۸۰۴۳

*E-mail: sm_shirazi@yahoo.com



مقدمه

که هو و استل- گامون در مطالعه خود به بررسی الگوهای حذف هجا در کلمات چند هجایی کودکان انگلیسی زبان پرداختند. تحلیل الگوهای کوتاه‌سازی نشان داد که هجاهای بدون تکیه انتهایی بیشتر از هجاهای بدون تکیه غیرانتهایی حفظ می‌شوند. یافته‌ها از تعامل بین عوامل آهنگی، هجایی و آکوستیکی در تولید کلمات چند هجایی حمایت می‌کند (۶).

همچنین شواهدی از رشد فرایندهای واجی در کودکان استرالیایی سینم ۵ تا ۷ گزارش شده است. طی تحقیقی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک متغیره، تأثیر سنی معناداری برای کاهش خوش و ساده‌سازی سایشی‌ها از ۵ تا ۷ سالگی وجود داشت، اما این تأثیر در حذف روان‌ها دیده نشد. استفاده زیاد از حذف روان‌ها، الگوی انگلیسی استرالیایی جنوی را نشان می‌داد که به صورت واکه شدگی /ا/ انتهایی مشاهده می‌شد (۷).

هوآ و داد اکتساب واجی را در زبان پوتانگوا^۱ (زبان چینی مدرن) مورد مطالعه قرار دادند. موارد مورد بررسی عبارت بودند از: تون، همخوان آغازین هجا، واکه و همخوان پایانی هجا. خطاهای کودکان نشان داد که این کودکان ابتدا تون‌ها را به دست می‌آورند و سپس همخوان‌های انتهایی هجا، واکه‌ها، و در پایان همخوان‌های آغازین هجا به دست می‌آید (۸).

به منظور بررسی آنکه بهترین روش استخراج گفتار در مطالعات فرایند واجی چیست، در تحقیقی، روش مکالمه و روش نامیدن تصاویر مقایسه و مشخص شد که هر دو روش استخراج گفتار ابزارهای بالینی مفیدی برای بررسی فرایندهای واجی می‌باشد، اما برای بدست آوردن نمونه کلی از برون داد گفتاری کودک، تکلیف نامیدن تصاویری که خوب طراحی شده باشد، ممکن است عمیق‌تر سیستم واجی کودک را مورد هدف قرار دهد (۹).

بررسی فرایندهای واجی خاص هر زبان در سینم رشد، جزو تحقیقات بسیار لازمی است که متأسفانه در زبان فارسی بسیار کم به آن پرداخته شده است. از آن جمله، درخشندگی بررسی نظام آوایی گفتار دختران و پسران در دو گروه سنی ۴ و ۵ ساله پرداخت و نتیجه گرفت که رایج‌ترین فرایندهای واجی، کاهش خوش و پیشین شدگی است. با افزایش سن و رشد مهارت‌های گفتاری در کودک، به تدریج از تعداد فرایندهای واجی غیر معمول کاسته می‌شود و هر چه تلفظ یک واژه از نظر الگوی هجایی واجهای به کار رفته در آن پیچیده‌تر باشد، تعداد فرایندهای نیز افزایش می‌یابد (۱۰).

فرایندهای تغییر سیستماتیک صدا است که گروه‌های صدایی یا توالی صدایها را تحت تأثیر قرار داده و منجر به ساده‌سازی تولید می‌شود (۱). در واقع فرایندهای واجی شامل روش‌ها و قواعدی است که کودکان هنگام تلاش در تولید کلماتی که بزرگ‌سالان ادا می‌کنند، برای ساده‌تر کردن تلفظ آن کلمات به کار می‌برند. برای مثال کودک ۳ ساله‌ای که هنوز بسیاری از صدایهای سایشی را به دست نیاورده است، اغلب موقع صدای انسدادی را جانشین این صدایها می‌کند که فرایندهای آن، انسدادی شدگی نامیده می‌شود. فرایندهای واجی ممکن است در سطح واج رخ دهن (نظیر پیشین کردن صدای خلفی یا انفجاری کردن سایشی‌ها) و یا در سطح ساختاری (ساخت هجا) باشند (نظیر حذف هجا در کلمات چند هجایی).

فرایندهای واجی در طول رشد رفته و به تدریج حذف می‌شوند، اما در گفتار برخی کودکان این فرایندها همچنان پابرجا مانده و منجر به اختلال واجی از نوع تأخیری در گفتار ایشان می‌شود. فرایندهای واجی که به طور شایع در متون واج‌شناسی وجود دارند شامل فرایندهای ساخت هجا، جانشینی و همگونی می‌باشند.

در سالهای گذشته پژوهش‌های گسترده‌ای در بسیاری از زبان‌ها در مورد فرایندهای واجی صورت گرفته است که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود.

در سال ۱۹۷۹، در مطالعه‌ای بر روی کودکان ۲ ساله و ۴ ساله، مشخص شد که این کودکان، نسبت به بزرگ‌سالان انفجاری‌های واکدار کمتری را در تمام بافت‌ها به کار می‌برند (۲).

در مطالعه‌ای بر روی فرایندهای واجی هماهنگی و دوگانه سازی، از این دو فرایند به عنوان دو استراتژی قابل دسترس برای اکتساب واجی یاد شده و نشان داده شده که وجود این دو پدیده در سالهای اول زندگی، می‌تواند ناشی از نقص در فهرست آوایی و طبقه بندی صدایی باشد (۳).

«سو» و «داد» با بررسی اکتساب فرایندهای واجی در کودکان کانتونی^۲ زبان، خطاهای واجی کمی را بعد از سن ۴ سالگی در کودکان مشاهده کردند. نتایج به طور ثابت از این فرضیه حمایت می‌کند که زبان محیطی، به کارگیری تمایلات جهانی را در اکتساب واجی تحت تأثیر خود قرار می‌دهد (۴).

در بررسی فرایندهای واجی کودکان ترکیه، فرایندهای شناخته شده عبارت بودند از: دوگانه سازی، حذف هجا، حذف همخوان، همگونی، کاهش خوش، انحراف روان‌ها، انسدادی شدگی، پیش‌کامی شدگی نرم‌کامی، سایشی مرکب شدگی و پسین شدگی (۵).

1- Phonological processes

2- Cantonese

3- Putonghua



ساده انتخاب و در نهایت با توجه به معیارهای ورود (تک زبانه فارسی زبان) و خروج (هر نوع اختلال شدید شنوایی، بینایی، جسمانی، ذهنی، گفتار و زبان، عاطفی-روانی، و ساختاری و کارکردی در تولید کننده‌های گفتاری)، کودکانی که واجد شرایط بودند، به منظور شرکت در مطالعه پذیرفته شدند. به منظور رعایت ملاحظات اخلاقی، هدف از این مطالعه به صورت کامل به مسئولین و مجریان مهدکودک‌ها توضیح داده شد. همچنین هیچ‌یک از آزمودنی‌ها برای شرکت یا ادامه این مطالعه مجبور نبوده و در صورت مشاهده هر نوع مشکل گفتار و زبان به گفتاردرمانی ارجاع داده می‌شدند.

روش جمع آوری اطلاعات عبارت از بررسی پرونده کودک، مشاهده وی، مصاحبه با مسئول و مربی مهد و خود کودک، پرکردن پرسشنامه توسط والدین و اجرای آزمون بود.

آزمون به کار رفته در این پژوهش، آزمون محقق ساخته فرایندهای واجی بود. این آزمون متشکل از ۴۳ کلمه یک تا چهار هجایی است. کلمات این آزمون به گونه‌ای انتخاب شدند که تمام واج‌های زبان فارسی در آن به کار رفته باشد. برای طراحی این آزمون، ابتدا پژوهش‌های قبلی انجام شده در زمینه فرایندهای واجی در زبان‌های دیگر و در زبان فارسی بررسی و راهکارهای ایشان مورد تحلیل قرار گرفت. سپس تعداد واژه‌که تمام واج‌های زبان فارسی در آن به کار رفته باشد انتخاب شد. تلاش بر آن بود که برای هرواج حداقل دو کلمه انتخاب شود که در یکی از آنها واج در موقعیت اول کلمه و در دیگری در موقعیت آخر کلمه باشد. به منظور حصول اطمینان از آنکه کوچکترین گروه سنی آزمودنی‌ها یعنی کودکان ۲۴ تا ۲۸ ماهه نیز قادر به درک واژه‌های مورد نظر هستند، در یک مطالعه آزمایشی بر روی ۱۰ کودک ۲۴ تا ۲۸ ماهه، هر واژه‌ای که آزمودنی‌ها قادر به شناسایی آن نبودند، از مجموعه واژه‌ها حذف شد. در نهایت از میان ۱۶۰ واژه، تعداد ۴۳ واژه که تمام شرایط مورد نظر را دارا بودند انتخاب شدند. تصاویر مرتبط با کلمات از کارت‌های تصویری دیدآموز و همچنین کتاب فرهنگ مصور همخوان‌ها انتخاب شد. در مورد برخی از کلمات که تصویر واضح نداشتند، از اشیاء واقعی و در مورد کلمات مربوط به بدن از نشان دادن آن اندام استفاده شد. این آزمون توسط پنج دانشجوی ترم آخر گفتاردرمانی که در این زمینه آموزش دیده بودند اجرا و نتایج توسط ایشان ضبط و سپس در برگه‌های مربوطه ثبت شد. به منظور افزایش دقت عمل، نتایج ثبت شده هر پژوهشگر، توسط پژوهشگر دیگر بررسی و در صورت وجود مشکل پس از بحث و بررسی بیشتر اصلاح شد.

فرایندهای مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: فرایندهای ساخت

رضابور، طهباز و مهری در مطالعه‌ای به بررسی ۳۰ فرایندهای واجی در ۱۰۰ کودک ۲ تا ۵ ساله شهر تهران پرداختند. آنان فرایندهای واجی را در ۴ طبقه ساخته هجا، همگونی، جانشینی و جابجایی مورد ارزیابی قرار دادند. آنان دریافتند که در بین ۳۰ فرایندهای ۲ گروه جنسی، فرایندهای جانشینی پیشین شدگی بیشترین میانگین را دارا بود. در مجموع از ۳۰ فرایندهای واجی در نظر گرفته شده، ۹ فرایندهای حذف همخوان انتهایی، کاهش هجا، کاهش خوش همخوانی غیر انتهایی، همگونی پسین شدگی، همگونی خیشومی، جانشینی روان، جانشینی از نوع بیواکی، جانشینی واکه و دوگانه‌سازی به طور کامل روند رو به کاهش داشته‌اند. ۱۷ فرایندهای دیگر نیز کمایش با نوساناتی، روند رو به کاهشی را با افزایش سن نشان دادند، اما به طور قطعی نمی‌توان اشاره به کاهش یا افزایش آنها داشت (۱۱).

با بررسی فرایندهای واجی کودکان فارسی زبان، نه تنها می‌توان نوع فرایندهای واجی موجود در میان کودکان فارسی زبان، بلکه همچنین سن وقوع و خاتمه هر یک از این فرایندهای واجی را در هر سن به دست آورد. در دست داشتن جداول استانداردی که فرایندهای واجی را در هر گروه سنی نشان دهد، کمک بسیار ارزندهای به ارزیابی و تشخیص کودکان دارای اختلالات زبان در دوران رشد می‌کند. با استفاده از این جداول می‌توان فهمید که آیا کودک، فرایندهای واجی مناسب با سنش را نشان می‌دهد یا خیر و در صورت پاسخ منفی، آیا مشکل وی از نوع تأخیری است یا فرایندهای خاص خود را دارد.

این پژوهش با این هدف طراحی شده است که فرایندهای واجی شایع بین کودکان طبیعی فارسی زبان را در کودکان ۲ تا ۴ ساله مهدکودک‌های تهران بررسی کند.

روش بررسی

در این پژوهش مقطعي و توصيفي - تحليلي، جامعه هدف دختران و پسران ۲ إلى ۴ ساله فارسی زبان و جامعه در دسترس کودکان همین سنین از مهدکودک‌های تهران بود که از بین آنان ۱۲۸ دختر و پسر ۲ إلى ۴ ساله عادی به صورت تصادفي ساده از مناطق مختلف شهر تهران انتخاب شدند.

در ابتدا لیست مهدکودک‌های مراکز سه گانه بهزیستی شهر تهران (بهزیستی شمیرانات، بهزیستی مرکز و بهزیستی شهر ری) تهیه و سپس به صورت تصادفي ساده تعدادی مهدکودک از هر یک از این مراکز انتخاب شد (در مجموع ۱۹ مهدکودک). پس از آن با مراجعته به هر مهدکودک، فهرست کودکانی که در گروه‌های سنی فوق الذکر بودند تهیه و از میان این فهرست، تعدادی از کودکان به صورت تصادفي



از آزمون پارامتری LSD و در متغیرهایی که توزیع نرمال نداشتند از آزمون نایارامتری دانت¹ استفاده شد.

عافته‌ها

آزمودنی های این پژوهش مرکب از ۶۳ دختر و ۶۵ پسر ۲ الی ۴ ساله بودند که تعداد و درصد آن ها بر حسب سن و جنس در جدول (۱) نشان داده شده است.

در زمینه فراوانی فرآیندهای واجی همانگونه که در جدول (۲) مشاهده می‌شود، در تمام گروه‌های سنی، فرایнд جانشینی همخوان و پس از آن فرایند ساخت هجا، بیشترین و فرایند جابجایی و سایر موارد، کمترین میزان وقوع را در بین فرایندها نشان می‌دهد. فرایند جانشینی واکه در مقایسه با فرایند جانشینی همخوان از درصد وقوع بسیار پایین‌تری برخوردار است. مطابق حاصل میانگین فرایندهای ساخت هجا ($P < 0.001$)، جانشینی همخوان ($P < 0.001$)، جانشینی واکه ($P = 0.003$) و همگونی کامل ($P = 0.031$) با افزایش سن، به طور معناداری کاهش یافته، اما فرآیندهای جابجایی ($P = 0.096$) و سایر موارد ($P = 0.648$) چنین کاهش، معناداری را نشان نمی‌دهند.

هنجا (که منجر به تغییر ساختار هجا می‌شود)، جانشینی همخوان (جانشینی همخوانی به جای همخوان دیگر بدون آنکه همگونی کامل رخ داده باشد)، جانشینی واکه (جانشینی یک واکه به جای واکه دیگر بدون آنکه همگونی کامل رخ داده باشد)، همگونی کامل (یک آواز اثر تأثیرآوای دیگر موجود در بافت، تمام مخصوصات ممیزه آوای دیگر را به خود گرفته و کاملاً شبیه به آن شود)، جابجایی (دو همخوان موجود در واژه بدون آنکه ساختار اولیه واژه به هم بریزد، با یکدیگر جابجا شوند) و سایر فرایندها (موارد احتمالی که در فرایندهای مذکور گنجانده نشود).

برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری اس.پی.اس. نسخه ۱/۱۱ اس. استفاده شد و در صورت توزیع نرمال داده‌ها، برای مقایسه میانگین فرایندها در دو جنس از آزمون پارامتری تی مستقل و برای مقایسه میانگین فرایندها در پنج گروه سنی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و در صورت عدم توزیع نرمال، از آزمون‌های ناپارامتری من- ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. در صورتی که آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه یا کروسکال والیس تفاوت معناداری را نشان ممداد، برای تعیین گوهه‌های سنتی که با یکدیگر اختلاف معنادار دارند

جدول ۱ - توزیع سنی و جنسی آزمودنی‌ها

جنسية	سن	٢٤-٢٨	٢٨-٣٢	٣٢-٣٦	٣٦-٤٠	٤٠-٤٨	جمع						
		تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
ذكور		١٢	١٩٪٤	٩	١٤٪٨	١٤	٢٢٪٢	١٥	٢٣٪٨	١٣	٢٣٪٧	٢٠٪٦٣	٦٣
إناث		٧	١٠٪٦	١٣	١٣٪٦	١٦	٢٤٪٦	٢٠	٢٤٪٨	١٦	٢٤٪٦	٦٥	١٠٠
مجموع		١٩	٤٤٪٨	٢٢	٤٤٪٨	٢٢	٤٣٪٣	٣٠	٤٣٪٨	٢٩	٤٧٪٨	٢٢٪٦٥	١٢٨

جدول ۲ - مقایسه میانگین هر یک از فرایندهای واجه در گروههای سنی

متغير	گروه سنی	تعداد	میانگین	انحراف معیار	مقدار احتمال
فرایند ساخت هجا	۲۴-۲۸	۱۹	۱۱,۳۲	۰,۹۲۶	
	۲۸-۳۲	۲۲	۹,۰۰	۴,۴۸۳	
	۳۲-۳۶	۳۰	۷,۴۰	۴,۹۹۴	<۰,۰۰۱
	۳۶-۴۰	۲۸	۴,۵۷	۳,۰۵۳	
	۴۰-۴۸	۲۹	۱,۳۴	۱,۸۷۶	
	۲۴-۲۸	۱۹	۲۱,۶۸	۷,۸۸۸	
فرایند جانشینی همخوان	۲۸-۳۲	۲۲	۱۷,۹۱	۱۰,۰۵۶	
	۳۲-۳۶	۳۰	۱۵,۰۰	۷,۹۶۳	<۰,۰۰۱
	۳۶-۴۰	۲۸	۱۱,۱۸	۷,۳۰۳	
	۴۰-۴۸	۲۹	۵,۱۰	۳,۲۷۷	



طاهره سیما شیرازی و همکاران

ادامه جدول ۲ - مقایسه میانگین هر بک از فرایندهای واجی در گروههای سنی

	مقدار احتمال	انحراف معیار	میانگین	تعداد	گروه سنی	متغیر
۰/۰۰۳	۱/۶۴۵	۱/۴۷	۱۹	۲۴-۲۸	فرایند جانشینی واکه	
	۱/۱۱۰	۰/۷۷	۲۲	۲۸-۳۲		
	۱/۲۰۲	۰/۹۳	۳۰	۳۲-۳۶		
	۰/۵۷۳	۰/۴۳	۲۸	۳۶-۴۰		
	۰/۷۸۶	۰/۲۴	۲۹	۴۰-۴۸		
۰/۰۳۱	۱/۳۰۳	۰/۹۵	۱۹	۲۴-۲۸	فرایند همگونی کامل	
	۰/۹۰۷	۰/۸۲	۲۲	۲۸-۳۲		
	۱/۰۲۲	۰/۷۰	۳۰	۳۲-۳۶		
	۰/۴۷۶	۰/۱۸	۲۸	۳۶-۴۰		
	۰/۸۹۱	۰/۶۹	۲۹	۴۰-۴۸		
۰/۰۹۶	۰/۵۳۵	۰/۲۱	۱۹	۲۴-۲۸	فرایند جایجایی	
	۰/۳۹۵	۰/۱۸	۲۲	۲۸-۳۲		
	۰/۸۱۹	۰/۴۷	۳۰	۳۲-۳۶		
	۰/۴۱۸	۰/۲۱	۲۸	۳۶-۴۰		
	۰/۱۸۶	۰/۰۳	۲۹	۴۰-۴۸		
۰/۶۴۸	۰/۷۴۹	۰/۳۲	۱۹	۲۴-۲۸	سایر موارد	
	۰/۵۲۸	۰/۲۳	۲۲	۲۸-۳۲		
	۰/۸۷۷	۰/۳۰	۳۰	۳۲-۳۶		
	۰/۳۱۵	۰/۱۱	۲۸	۳۶-۴۰		
	۱/۴۹۱	۰/۳۱	۲۹	۴۰-۴۸		

ماهه با گروه سنی ۲۴ تا ۲۸ ماهه ($P=0/002$) تفاوت معنادار وجود دارد. در فرایند جانشینی واکه بین گروه سنی ۴۰ تا ۴۸ ماهه با گروه سنی ۲۴ تا ۲۸ ماهه ($P<0/001$) و ۳۶ تا ۳۶ ماهه ($P=0/015$)، بین گروه سنی ۳۶ تا ۴۰ ماهه با گروه سنی ۲۴ تا ۲۸ ماهه ($P>0/001$) و بین گروه سنی ۳۶ تا ۴۰ ماهه با گروه سنی ۲۴ تا ۲۸ ماهه ($P=0/001$) تفاوت معنادار وجود دارد. در فرایند همگونی کامل، بین گروه سنی ۴۰ تا ۴۸ ماهه با گروه سنی ۳۶ تا ۴۰ ماهه ($P=0/042$) و بین گروه سنی ۳۶ تا ۴۰ ماهه با تمام گروههای سنی قبل از خود ($P=0/042$) تفاوت معنادار وجود دارد.

به منظور بررسی دقیق‌تر فرایندهایی که کاهش معنادار نشان داده‌اند، از آزمون‌های تعقیبی استفاده شد. همان‌گونه که در جدول (۳) مشخص است، در فرایند ساخت هجا، بین گروه سنی ۴۰ تا ۴۸ ماهه با تمام گروههای سنی دیگر ($P=0/005$) و بین گروه سنی ۳۶ تا ۴۰ ماهه با گروه سنی ۲۴ تا ۲۸ ماهه ($P=0/001$) و ۲۸ تا ۳۲ ماهه ($P=0/005$) اختلاف معنادار مشاهده می‌شود. در فرایند جانشینی همخوان، بین گروه سنی ۴۰ تا ۴۸ ماهه با تمام گروههای سنی دیگر، بین گروه سنی ۳۶ تا ۴۰ ماهه با تمام گروههای سنی قبل از خود و بین گروه سنی ۳۶ تا ۳۶ ماهه با تمام گروههای سنی ماقبل خود وجود دارد.

جدول ۳ - مقایسه فرایندهای واجی به تفکیک گروههای سنی

جانشینی همخوان				ساخت هجا					گروه
۰/۱۰۳	۲۸-۳۲	۳۲-۳۶	۳۶-۴۰	۴۰-۴۸	۲۸-۳۲	۳۲-۳۶	۳۶-۴۰	۴۰-۴۸	گروه
	۰/۰۰۲	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱	۰/۸۲۳	۰/۱۹۳	۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱	
	۰/۱۶۰	۰/۰۰۲	<۰/۰۰۱		۰/۹۱۶	۰/۰۰۵	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱	
	۰/۰۰۴۹	<۰/۰۰۱			۰/۱۴۲	<۰/۰۰۱		۳۲-۳۶	
همگونی کامل								۰/۰۰۱	۳۶-۴۰
۰/۶۶۲	۲۸-۳۲	۳۲-۳۶	۳۶-۴۰	۴۰-۴۸	۲۸-۳۲	۳۲-۳۶	۳۶-۴۰	۴۰-۴۸	گروه
	۰/۳۷۲	۰/۰۰۷	۰/۳۵۵		۰/۰۴۰	۰/۰۹۰	۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱	
	۰/۶۵۵	۰/۰۱۹	۰/۶۳۰		۰/۰۹۶	۰/۲۶۴	۰/۰۰۳	<۰/۰۰۱	
	۰/۰۳۷	۰/۹۶۶			۰/۰۷۷	۰/۰۱۵		۳۲-۳۶	
جانشینی واکه								۰/۰۱۳	۳۶-۴۰

وضعيت تولیدی پسران و دختران شباهت بیشتری به خود می‌گیرد، طبیعی است که در گروههای سنی دارای طیف گسترده‌تر، عدم تفاوت مشاهده شود.

نتیجه‌گیری

یافته کلی پژوهش حاضر این است که فرایندهای واجی در دو گروه جنسی دختر و پسر چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند. به عبارت دیگر تفاوت جنسی تأثیری بر چگونگی فرایندهای واجی ندارد، اما با افزایش سن بسیاری از فرایندها رو به کاهش نهاده و کمتر در گفتار کودکان سنین بالاتر استفاده می‌شود که می‌تواند نشانگر رشد ادراکات واجی و تسلط بیشتر کودکان گروههای سنی بالاتر بر نحوه تلفظ لغات باشد.

همان گونه که گفته شد این مطالعه فقط بر روی کودکان تهرانی و در محیط مهد کودک و با استفاده از تکالیف محقق ساخته انجام شده است و در نتیجه نمی‌توان به تعیین نتایج به کلیه کودکان فارسی زبان پرداخت. اجرای چنین مطالعاتی بر روی تعداد و گروههای وسیع تری از کودکان و در طیف سنی گسترده‌تر مثلاً^۱ ای ۶ سال و نیز استفاده از تکالیف مختلف جهت استخراج نمونه‌های گفتاری بیشتر و متنوع تر می‌تواند نتایج دقیق‌تری به همراه داشته باشد. این پژوهش و پژوهش‌هایی از این دست می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر ساخت همان ارزشی هنگاری که با آن بتوان میانگین درصد وقوع هر یک از فرایندهای واجی، سن ظهور و خاتمه هر یک از فرایندها و هنگار سنی برای هر یک از فرایندها را با آن تعیین نموده و با استفاده از آن در مورد فرایندهای واجی کودکان دارای اختلالات گفتار و زبان به ارزیابی و تشخیص صحیح‌تری دست یافت.

نشکر و قدردانی

این پژوهش با حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده است. از مسئولین و همکاران محترم این معاونت و نیز از جناب آقای دکتر صدرالسادات، جناب آقای دکتر نیلی پور، مسئولین محترم بخش مهدکودک‌های مراکز سه گانه بهزیستی شهر تهران، مسئولین و مربيان محترم مهدکودک‌های شرکت کننده در این پژوهش، کودکان عزیز شرکت کننده در این پژوهش و نیز خانواده‌های ایشان و نیز پژوهشگران محترم این طرح خانم‌ها سوده خرمیان، بنت الهدی عربی و مریم سادات مومن واقفی و آقایان مجتبی کلهر و مجید هادی زاده نهایت سپاسگزاری را داریم.

در این پژوهش، میانگین‌های فرایندهای واجی در دو جنس نیز بررسی شد (جدول ۴). با مشاهده جدول مشخص می‌شود که هیچ‌یک از دو جنس تفاوت معناداری در هیچ‌یک از فرایندها نشان نداده‌اند.

جدول ۴ - مقایسه فرایندهای واجی به تفکیک گروههای جنسی

متغیر	جنس	تعداد	میانگین	انحراف معیار	مقدار احتمال
فرایند ساخت هجا	دختر	۶۳	۷۳۷	۵/۶۹۷	۰/۸۳۸
	پسر	۶۵	۷۱۷	۵/۱۱	
فرایند جانشینی همخوان	دختر	۶۳	۱۳/۹۲	۱۰	۰/۰۵۳۸
	پسر	۶۵	۱۲/۹۲	۸/۷۲	
فرایند جانشینی واکه	دختر	۶۳	۰/۷۲	۱/۱۹۴	۰/۰۹۱۸
	پسر	۶۵	۰/۷۱	۱/۰۰۸	
فرایند جابجایی	دختر	۶۳	۰/۰۲	۰/۰۵۲	۰/۰۹۱۵
	پسر	۶۵	۰/۰۲۳	۰/۰۰	
فرایند همگونی کامل	دختر	۶۳	۰/۳۰	۱/۱۳	۰/۰۶۴۸
	پسر	۶۵	۰/۲۰	۰/۰۶۱	
سایر موارد	دختر	۶۳	۱/۰۵۲	۱/۰۷۹	۰/۰۹۱۳
	پسر	۶۵	۲/۰۲	۲/۰۱	

بحث

با افزایش سن، میانگین هر یک از فرایندهای واجی روند رو به کاهش داشته و کودکان کمتر این فرایندها را به کار برده‌اند. این کاهش در مورد فرایندهای واجی ساخت هجا، جانشینی همخوان، جانشینی واکه و همگونی کامل معنادار است. این نکته می‌تواند نشان دهنده رشد واجی کودک و افزایش مهارت وی در تولید صحیح می‌باشد. مثلاً با افزایش تبحر کودک در تولید همخوان‌های دشواری چون سایشی‌ها، سایشی - مرکب‌ها و غلت‌ها، کودک کمتر از حذف یا جانشینی آن‌ها با همخوان‌های ساده‌تر انسدادی‌ها، واکه‌ها و روان‌ها استفاده می‌کند. کاهش در فرایندهای واجی، کودک کمتر از حذف یا جانشینی آن‌ها با همخوان‌های ساده‌تر انسدادی‌ها، واکه‌ها و روان‌ها استفاده می‌کند. کاهش در فرایندهای واجی، با نتایج بسیاری از پژوهش‌ها (۳، ۴، ۹-۱۲) همخوانی دارد که می‌تواند نشان‌گر تبعیت فرایندهای واجی از یک روند نسبتاً مشابه در بسیاری از زبان‌ها باشد.

در هیچ‌یک از فرایندهای ساخت هجا، جانشینی همخوان، جانشینی واکه، همگونی کامل، جابجایی و سایر موارد هیچ تفاوت معناداری بین دو جنس ملاحظه نشد. البته این یافته پژوهش با یافته مک‌کورماک و نایتون (۱۲) مغایرت دارد، چرا که آنان در مطالعه خود دریافتند که پسران نسبت به دختران به طور معناداری از فرایندهای ساخت هجا مانند حذف هجای ضعیف، حذف همخوان انتهایی و کاهش خوش بیشتر استفاده می‌کنند. البته مطالعه مک‌کورماک و نایتون فقط بر روی کودکان ۲/۵ ساله صورت گرفته بود و با توجه به آنکه با افزایش سن،



منابع:

- 1- Pena – Brooks A, HedgeM N. Assessment & treatment of articulation & phonological disorders in children. Texas: pro-ed, 2000.
- 2- Berntal J E, Bankson N E. Articulation & phonological disorders. 5th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1998.
- 3 - Lleo C. Homonymy and reduplication : on the extended availability of two strategies in phonological acquisition. *Journal of Child Language* 1990; 17(2): 267-78.
- 4- So L K, Dodd B J. The acquisition of phonology by Cantonese-speaking children. *Journal of Child Language* 1995; 22(3): 473 – 95.
- 5- Topbas S. Phonological acquisition of Turkish children: implications for phonological disorders. *Europpean Journal of Disorders of Communication* 1997; 32(4): 377-96.
- 6- Kehoe M, Stoel-Gammon C. Truncation patterns in English-speaking children×s word productions. *Journal of Speech Language Hearing Researches* 1997; 40 (3): 526 – 41.
- 7- James D G H, McCormack P, Butcher A. Children×s use of phonological processes in the age range of five to seven years. In S.McLeod & L.McAllister (Eds.), *Towards 2000: Embracing change, challenge and choice . Proceedings of the 1999 Speech Pathology Australia National Conference* (pp.48-57).Melbourne : Speech Pathology Australia.
- 8- Hua Z, Dodd B. The phonological acquisition of Putonghua (Modern Standard Chinese). *Journal of Child Language* 2000; 27(1): 3- 42.
- 9- Wolk L, Meisler A W. Phonological assessment: a systematic comparison of conversation and picture naming. *Journal of communication Disorder* 1998; 31(4): 291-310.
- 10- Derakhshande F. [Study of phonetic system of 4-5 year old Farsi children in Tehran (Persian)]. M.Sc. thesis. Tehran. Iran university. 1375.
- 11- Rezapour M, Tahbaz S, Mehri A. [Study of phonological processes of 2-3/5 year old Farsi children in Tehran (Persian)], B.Sc. thesis. Tehran. University of Welfare & Rehabilitation Sciences. 1376.
- 12- James D G H. The use of phonological processes in Australian children aged 2 to 7/11 years. *Advance in Speech – Language Pathology* 2001; 2: 109 – 127.