

# نیمرخ رشد زبان دانش آموزان با و بدون اختلال

## فارسایی توجه / بیش فعالی

\* حمید علیزاده<sup>۱</sup>، سارا اکبری<sup>۲</sup>، فریبا یادگاری<sup>۳</sup>

ج ۵

**هدف:** هدف تحقیق حاضر بررسی نیمرخ رشد زبان دانش آموزان با و بدون اختلال رسایه توجه / پیش فعال است.

**روش بررسی:** در این پژوهش مقایسه‌ای مورد-شاهدی، از بین دانش‌آموzan پایه اول ابتدایی شهر قزوین ۳۰ کودک (۱۵ پسر و ۱۵ دختر) با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با نمونه‌گیری ساده و ۳۰ کودک سالم که با گروه مورد همتاسازی شده بودند شرکت کردند. ابزارهای به کار رفته، آزمون رشد زبان (TOLD-P:3) برای ارزیابی زبان و گفتار، مقیاس درجه بندی کانزز برای معلمان به منظور ارزیابی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و آزمون ریون برای ارزیابی هوش بودند. داده‌های حاصل، با روش تحلیل‌وا، بانس، مود، بزس، قرار گرفت.

یافته ها: بین نیمرخ رشد زبان دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و دانش آموزان سالم تفاوت معناداری وجود داشت ( $P<0.001$ )، اما در بین گروه های جنسی در هر یک از گروه های مورد ( $P=0.254$ ) و شاهد ( $P=1.00$ ) تفاوت معنادار آماری وجود نداشت. واژگان تصویری، واژگان ربطی، واژگان شفاهی، درک دستوری، تمایز گذاری کلمه، گوش کردن، سازماندهی، صحبت کردن، معنی شناسی و نحو در گروه مورد به طور معناداری پایین تر از گروه شاهد بود، اما در تقلید جمله، تحلیل واحد و تولید کلمه بـ: دو گـ و تفاوت وجود نداشت.

تیجه‌گیری: کودکان با نارسایی توجه/ بیش فعالی در برخی از جنبه‌های رشد زبان از سطح میان‌نوعی نسبت به کودکان طبیعی خود را داشتند.

**کلیدواژه‌ها:** اختلال نادسایه، توجه-بیش، فعالیه، دشد؛ بار، گفتار

- ۱- دکترای روانشناسی کودکان استثنائی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
  - ۲- کارشناس ارشد کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی
  - ۳- دانشجوی دکترای گفتاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۵/۴

تاریخ پذیرش مقاله: ۲۵/۱۲/۸۸

آدرس نویسنده مسئول:

تهران، بزرگراه همت، دهکده المپیک،  
دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده  
روانشناسی و علوم تربیتی، گروه کودکان  
استثنائی

تلفن: ٤٤٧٣٧٥١٠

\*E-mail: hamidalizadeh1@yahoo.com



## مقدمه

بیش فعالی و کودکان با اختلال ویژه زبان در دست نیست، بنابراین اینکه تا چه اندازه تحلیل نمونه‌های زبانی می‌تواند به فرآیند تشخیص افتراقی در این دو اختلال متداول رشدی کمک کنند امری ناشناخته است. تانوک و شاکار<sup>۳</sup> خاطرنشان کردن که نشانه نارسایی زبان مرتبط با نارسایی توجه / بیش فعالی در بعد زبان بیانی (شکل‌گفتار، حفظ مطلب، قطع مکالمه، صحبت متوالی) و بعد زبان دریافتی (واج‌شناسی، ترکیب، معنا) ظاهر می‌شود<sup>(۲)</sup>.

لودلو و همکاران<sup>۴</sup> الگوهای زبانی کودکان ۶-۲۶ ساله عادی و کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی را مورد بررسی قرار دادند و تفاوت‌هایی را بین دو گروه به دست آورده‌اند. اما از سوی دیگر، بر اساس تحقیقات بیچ و نانسی کوهن به نقل از کاشانی، نیمرخ روان شناختی و زبانی کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و کودکان با اختلال زبانی یکسان است<sup>(۴)</sup>.

اختلالات زبانی درصد قابل ملاحظه‌ای از کودکان به دلیل رفتارهای آزارشی آنان از نظر پنهان می‌ماند، از این رو بررسی مدام زبان در جمعیت کودکان دارای اختلال‌های روان شناختی از جمله اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ضروری است. تقریباً نیمی از کودکان با اختلال زبانی یک اختلال روان‌شناختی با خود دارند و عکس این قضیه هم صادق است، یعنی کودکانی با اختلال روان شناختی، یکی از اختلالات زبانی را نیز نشان می‌دهند. نیمی از کودکانی که اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی داشته و تحت درمان بوده‌اند، اختلالات خفیف تا شدید زبانی نیز دارند که قبلاً این اختلالات تشخیص داده نشده بودند<sup>(۵)</sup>.

با توجه به ناهمگونی یافته‌های پژوهش، ناکافی بودن آنها و نبود پژوهش در ایران، در این پژوهش قصد بر این است که کودکان گروه سنی ۷ ساله عادی و مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی از نظر رشد زبان مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد هدف این پژوهش مقایسه نیمرخ رشد زبان دانش آموزان عادی و دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی است.

## روش بررسی

در این پژوهش مقایسه‌ای مورد شاهدی، جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر پایه اول ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک و دو شهر قزوین (که منطقه‌ای فارس زبان است) درسال تحصیلی ۸۴-۸۳ و حجم نمونه مورد نظر ۶۰ نفر بود که از این تعداد ۳۰ کودک (۱۵ دختر و ۱۵ پسر)

کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی بیش از کودکان عادی در معرض خطر اختلالات زبانی هستند. از جمله، تأخیر در کاربرد اولین واژه‌ها و ترکیب آنها، عملکرد ضعیف در آزمونهای استاندارد (واژه، ترکیب واژه‌ها، روانی خواندن و حافظه کوتاه مدت) و محدودیت‌های گفتاری که باعث بروز مشکلاتی در گفتار پیوسته و مشارکتها و کاربردهای نامناسب گفتاری می‌شود. مطالعات همه گیرشناسی با استفاده از مجموعه آزمونهای زبانی استاندارد نشان داده که در ۳۵ تا ۵۰ درصد کودکانی که اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی دارند، سطوح بالای اختلال زبان دیده می‌شود و بیش از ۹۰ درصد آنها به کلینیک‌های توانبخشی ارجاع داده می‌شوند<sup>(۶)</sup>.

همچنین پژوهش‌های نشان می‌دهد که این میزان بالای نارسایی گفتار و زبان در جمعیت کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی به تنها یکی با تأخیر زبانی عمده در استفاده از نحو یا معنا همراه نیست، ولی رابطه قابل توجهی با سایر اختلالات ارتباطی به ویژه نارسایی سازمان دهنده بیانی، عملی و گفتاری دارد<sup>(۳)</sup>.

بیچمن<sup>۷</sup> و همکاران با استفاده از آزمون‌های روانی- زبانی و مقیاس‌های درجه بندی رفتار، همپوشی قابل ملاحظه‌ای را بین کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و کودکان با اختلال ویژه زبان گزارش نمودند. همچنین چندین گزارش مختلف بیانگر این موضوع است که کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و اختلال ویژه زبان، نیمرخ‌های روان شناختی و زبانی یکسانی نشان می‌دهند. ردموند بیان می‌کند که اطلاعات بسیار اندکی درباره تولید کلامی کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی وجود دارد، ولی با این حال کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در آزمون‌های روانی کلامی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. مهمتر این که هیچ مقایسه مستقیمی از ویژگی‌های محاوره‌ای کودکان با اختلال نارسایی توجه /



در تحقیق حاضر برای تشخیص اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی از مقیاس درجه بندی کانز برای معلمان استفاده شد. نتایج نشان داده که معلمان می‌توانند اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی را در کودکان ۶ تا ۱۳ ساله شناسایی کنند. این مقیاس دارای ۲۸ پرسش است که ۷

سوال برای ارزیابی اختلال بیش فعالی اختصاص داده شده است. پژوهش انجام شده توسط تراتیز و همکاران نشان می‌دهد که این مقیاس در مورد کودکان ۴ تا ۱۲ ساله از اعتبار اندازه‌گیری بالای ۰/۹۰ برخوردار است<sup>(۱)</sup>.

ماتریس‌های پیشرونده یکی از آزمون‌های غیرکلامی هوش عمومی است و دارای سی و شش سوال است که در هریک از آنها طرح یا نقشی داده شده است که قسمتی از آن حذف شده است و آزمون‌نی باشد از بین شش یا هشت قطعه کوچکتر که در پایین طرح اصلی داده شده‌اند، قسمت حذف شده را پیدا کند. در این پژوهش از فرم رنگی سی و شش سوالی که برای کودکان شش تا نه ساله است استفاده شد. اجرای آزمون هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی می‌سر است. ضرایب اعتبار آزمون در گروه‌های مختلف در سنین بالاترین ۰/۹۰ و در سنین پایین تر تا حدودی کمتر و در مجموع از اعتبار لازم برخوردار است<sup>(۱۵)</sup>. همبستگی این آزمون با آزمون‌های هوشی دیگر از قبل نقاشی شکل آدم، مازه‌های پورتئوس، استنفوردبینه، وکسلر و همچنین آزمون‌های گروهی بین ۰/۴۰ تا ۰/۷۵ است، اما همبستگی آن با آزمون‌های کلامی هوش از این مقادیر کمتر است.

توانایی ماتریس‌های پیشرونده در پیش‌بینی موقوفیت تحصیلی بین ۰/۳۵ تا ۰/۶۰ بوده است. روان‌شناسانی که این آزمون را در کشورهای مختلف به کار برده‌اند کارایی آن را به عنوان شاخص هوش عمومی تأیید کرده‌اند.

#### آزمون رشد زبان<sup>(۱)</sup>: TOLD-P:3

این آزمون برای اولین بار در سال ۱۹۷۷ و با نام آزمون رشد زبان انتشار یافت. در سال ۱۹۸۲ یک مجموعه تغییرات مهم در آن به عمل آمد و به TOLD-P تغییر نام یافت. در سال ۱۹۸۸ ویراست دوم TOLD-P تحت عنوان ۲ TOLD-P:2 انتشار یافت. در سال ۱۹۸۸ سازنده‌گان آزمون بر اساس اندوخته‌های تجربی خود و پیشنهادهای افرادی که از TOLD-P:2 استفاده می‌کردند، تغییراتی را در آزمون بوجود آوردند و بدین ترتیب TOLD-P:3 جهت استفاده کودکان ۴ - ۰ تا ۱۱ - ۸ شکل گرفت.

دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان گروه مطالعه و ۳۰ کودک (۱۵ دختر و ۱۵ پسر) عادی از طریق همتاسازی با گروه مورد به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.

با استفاده از مقیاس درجه بندی کانز برای معلمان، دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی شناسایی شدند. با توجه به‌اینکه عواملی همچون هوش، سن، شناوی، دو زبانه بودن، ترتیب تولد، پایگاه اجتماعی - اقتصادی، مشکلات گفتاری، سابقه گفتاردرمانی، بیماری‌ها و داروها بر رشد زبان تأثیر دارد، محقق این عوامل را در دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی مورد بررسی و توجه قرار داد. هوش کودکان با استفاده از آزمون دیون، شناوی با آزمون سنجش غیررسمی شناوی و اظهارات معلم و پایگاه اجتماعی - اقتصادی (سطح تحصیلات والدین) ارزیابی شد. میزان تحصیلات والدین، سن، یک زبانه بودن (فارسی)، ترتیب تولد، مشکلات گفتاری و سابقه گفتاردرمانی، بیماری و مصرف دارو را استفاده از پرسشنامه سابقه دانش آموزان کنترل شد. سپس ۳۰ دانش آموز (۱۵ دختر و ۱۵ پسر) دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی یک زبانه، باشناوی و هوش عادی که بیماری خاصی نداشته و از دارو استفاده نمی‌کردند، مشکلات گفتاری و سابقه گفتاردرمانی در آنان و بستگان شان نبود و از نظر سنی متولد نیمه اول سال ۱۳۷۷ تا نیمه دوم سال ۱۳۷۸ یعنی در محدوده سنی ۶ تا ۷/۵ انتخاب شدند.

میانگین هوش، میانگین سن، میانگین پایگاه اجتماعی - اقتصادی و میانگین ترتیب تولد ۳۰ دانش آموز دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی محاسبه شد. سپس ۳۰ دانش آموز عادی یک زبانه که از نظر جسمی و شناوی سالم بوده، بیماری خاصی نداشته و از دارو استفاده نمی‌کردند، همچنین مشکلات گفتاری و سابقه گفتاری در آنان و بستگانشان نبود و میانگین سن، هوش، پایگاه اجتماعی - اقتصادی و ترتیب تولد و همچنین ترکیب جنسیتی آنها با گروه مطالعه برابر بود انتخاب شدند.

همچنین دختر و پسر هر دو گروه (با و بدون اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی) طوری انتخاب شدند که میانگین سن، میانگین هوش، میانگین پایگاه اجتماعی - اقتصادی و میانگین ترتیب تولد ۱۵ دختر عادی با میانگینهای ۱۵ پسر عادی برابر باشد و میانگینهای ۱۵ پسر دارای اختلال با ۱۵ دختر دارای اختلال با هم برابر باشد و در نهایت میانگینهای ۳۰ دانش آموز عادی با میانگینهای ۳۰ دانش آموز دارای اختلال با هم برابر شد.

پایگاه اقتصادی- اجتماعی (بر اساس تحصیلات والدین) و ترتیب تولد آزمودنی های دو گروه ارائه شده است.

جدول ۲- ویژگی های جمعیت شناختی دو گروه

	پایگاه اقتصادی- اجتماعی	سن	هوش	گروه	ترتیب تولد
با اختلال	۲۲/۱ °	۷- ۱	۱۰۲		۱/۳
بدون اختلال	۲۲/۶ °	۷- ۱	۱۰۴		۱/۲

\* میانگین مجموع تحصیلات والدین آزمودنیها در جدول (۳) نتایج تحلیل واریانس داده های حاصل از آزمون رشد زبان ارائه شده است. چنانچه مشاهده می شود مقدار اف  $18/832$  و مقدار احتمال  $<0.001$  است. یعنی میانگین نمرات استاندارد زبان گفتاری (نیمرخ رشد زبان) در چهار گروه (دخلتان و پسران با و بدون اختلال) تفاوت معناداری دارد و این بدین معنی است که گروه با اختلال نارسانی توجه/ بیش فعالی از گروه بدون اختلال در رشد زبان از سطح پایین تری برخوردارند (جدول ۳).

جدول ۳- نتایج تحلیل واریانس آزمون رشد زبان

منبع تغییرات مجموع مربیات میانگین مجموع مربیات آماره اف مقدار احتمال			
بین گروهی	$2738/333$	$912/778$	$<0.001$
درون گروهی	$2714/267$	$18/832$	$48/469$
کل	$5452/600$		

با توجه به اینکه مقدار F مشاهده  $18/832$  بوده وفرض صفر رد شده است، از آزمون تعقیبی شفه استفاده شده که اطلاعات حاصله نشانگر تفاوت در گروههای با و بدون اختلال است. این آزمون مشخص می کند که بین نیمرخ رشد زبان دانش آموزان با و بدون اختلال تفاوت وجود دارد. اما این تفاوت در بین گروههای جنسی دانش آموزان (با و بدون اختلال) وجود ندارد (جدول ۵).

مطابق نیمرخ کلی نمرات، واژگان تصویری، واژگان ربطی، واژگان شفاهی، درک دستوری، تمایزگذاری کلمه، گوش کردن، سازماندهی، صحبت کردن، معنی شناسی و نحو گروه با اختلال، به طور معناداری پایین تراز گروه بدون اختلال است. اما در تقلید جمله، تحلیل واژی و تولید کلمه دو گروه با و بدون اختلال تفاوتی وجود ندارد. نتیجه گیری می شود که کودکان با نارسانی توجه/ بیش فعالی در برخی از جنبه های رشد زبان از سطح پایین تری برخوردارند. نیمرخ کلی نمرات در زبان و گفتار در دو گروه در شکل شماره ۱ نمایش داده شده است.

در سال ۱۳۸۰ سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور آزمون رشد زبان P:3 TOLD را بر روی ۱۲۳۵ کودک اجرا و جداول هنجاری بر اساس نتایج حاصل از این تعداد را تهیه نموده و در سال ۱۳۸۱ آزمون را به چاپ رسانیده است. این آزمون مبتنی بر یک مدل دو بعدی است که در یک بعد آن نظام های زبان شناختی با مؤلفه های گوش کردن، سازماندهی و صحبت کردن قرار دارد و در بعد دیگر ش مختصات زبان شناختی با مؤلفه های معنا شناسی، نحو و واژه شناسی قرار دارد. الگوی دو بعدی مورد اشاره اساس نظری تهیه ۹ خرده آزمون است. خرده آزمون مربوط به معنا شناسی و نحو که جزء آزمون های اصلی هستند و ۳ خرده آزمون مربوط به واژه شناسی که جزء خرده آزمون های تکمیلی می باشند.

جدول ۱- مدل دو بعدی به کار رفته در ساخت P3  
(حسن زاده و مینایی، ۱۳۸۱)

معنای شناسی	واژگان تصویری	واژگان ربطی	واژگان شفاهی	نمایه های زبان شناختی
نحو	درک دستوری	تقلید جمله	تکمیل دستوری	صحبت کردن
واژه شناسی	تمایزگذاری کلمه	تحلیل واژی	تولید کلمه	گوش کردن

آزمون مورد نظر از اعتبار آزمون بسیار معتبر است و می توان نتایج آن را با اطمینان مورد استفاده قرار داد و همچنین یک آزمون روا، در سنجش زبان است و کاربران می توانند با اطمینان خاطر از آن استفاده نمایند. در تمامی خرده آزمونها جواب درست به هر گویه نمره یک و جواب غلط نمره صفر می گیرد.

جواب به هرگویه باید دقیقاً همان باشد که در آزمون مشخص شده است. اگرآزمودنی به ۵ گویه پشت هم در خرده آزمون های اصلی (۱ الی ۶) پاسخ غلط بگوید، اجرا متوقف می شود. اما در ۳ خرده آزمون تکمیلی (۷ الی ۹) بدون در نظر گرفتن پاسخ کودک تمامی گویه ها اجرا می گردد.

برای تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. از روش های آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد و رسم نمودار و جداول و همچنین برای تحلیل نتایج تحقیق از روش تحلیل واریانس استفاده گردید.

### یافته ها

در جدول (۲) ویژگی های جمعیت شناختی مربوط به هوش، سن،



جدول شماره ۴ - زبان گفتاری شفه

فاصله اطمینان برای میانگین					
حد بالا	حد پایین	مقدار احتمال اختلاف ها	خطای استاندارد	میانگین اختلاف ها	کد(J)
۱۷/۵۹	۲/۹۴	۰/۰۰۲	۲/۰۴	۱۰/۲۷*	پسران بدون اختلال
۷/۰۶	-۷/۵۹	۱/۰۰۰	۲/۰۴	-۷/۲۷	پسران با اختلال
۲۲/۷۹	۸/۱۴	<۰/۰۰۱	۲/۰۴	۱۵/۴۷*	دختران بدون اختلال
-۲/۹۴	-۱۷/۵۹	۰/۰۰۲	۲/۰۴	-۱۰/۲۷*	دختران با اختلال
-۳/۲۱	-۱۷/۸۶	۰/۰۰۲	۲/۰۴	-۱۰/۵۳*	پسران بدون اختلال
۱۲/۵۳	-۲/۱۳	۰/۲۵۴	۲/۰۴	۵/۲۰	دختران بدون اختلال
۷/۵۹	-۷/۰۶	۱/۰۰۰	۲/۰۴	۰/۲۷	دختران با اختلال
۱۷/۸۶	۳/۲۱	۰/۰۰۲	۲/۰۴	۱۰/۵۳*	پسران بدون اختلال
۲۳/۰۶	۸/۴۱	<۰/۰۰۱	۲/۰۴	۱۵/۷۳*	دختران با اختلال
-۸/۱۴	-۲۲/۷۹	<۰/۰۰۱	۲/۰۴	-۱۵/۴۷*	پسران بدون اختلال
۲/۱۳	-۱۲/۰۳	۰/۲۵۴	۲/۰۴	-۵/۲۰	پسران با اختلال
-۸/۴۱	-۲۳/۰۶	<۰/۰۰۱	۲/۰۴	-۱۵/۷۳*	دختران بدون اختلال

دارد که رشد زبانی آنان به صورت طبیعی پیش رود و وقتی تکانشی هستند، احتمال یادگیری آنان از تجربیات عملی کمتر است (۸). تانوک و شاکار معتقدند که آسیب در کارکردهای اجرایی مرتبط با نارسایی توجه / بیش فعالی (برای مثال، محدودیت در انجام فعالیت‌های خود محور و رفتارهای هدف مدار، سازماندهی رفتار و استفاده از طرح‌ها) می‌تواند به عنوان علائم اصلی اختلال‌ها و نیز رشد نشانگان مشترک زبان / یادگیری در این کودکان مورد توجه قرار گیرد. به علاوه، وجود کارکردهای اجرایی می‌تواند نیمرخی واحد از نشانگان زبانی مرتبط با نارسایی توجه / بیش فعالی ایجاد کند که قابل تمیز از نیمرخ‌های مرتبط با زبان، یادگیری و ناتوانی‌های خواندن می‌باشد. شواهد موجود با چندین گزارش مختلف عنوان کرده‌اند که کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی و کودکان با اختلال ویژه زبان نیمرخ‌های روان‌شناختی و زبانی یکسانی را نمایش می‌دهند (۴، ۲). در این پژوهش نیز نیمرخ رشد زبان دانش آموزان با اختلال نارسایی

توجه / بیش فعالی متفاوت از داشت اموزان بدون اختلال است.  
کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی نه تنها نقص های روانشناختی و  
نقص های زبانی دارند، بلکه برخی مشکلات گفتاری نیز دارند که  
جدا از این دو مقوله هستند. مشکلات مضاعف با اشارات و اسنادهای

## جدول ۵- تعیین زیرگروه های همگن زبان گفتاری (آزمون شفه)

کد	N	گروه اول	۰/۵	گروه دوم
دختران با اختلال	۱۵	۹۴/۶۰		
پسران با اختلال	۱۵	۹۹/۸۰		
پسران بدون اختلال	۱۵		۱۱۰/۰۷	
دختران بدون اختلال	۱۵		۱۱۰/۳۳	
مقدار احتمال	۰/۲۵۴		۱/۰۰	


بحث

جونز و همکاران رابطه دو سویه رشد زبان و تکانشگری را مورد بحث قرار دادند(۷). کوهن سوابق پژوهشی مربوط به اختلالات زبان و گفتار را در کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی مورد بررسی قرار داد(۵). آنها الگوی ثابتی از نرخ افزایشی اختلالات زبان/ گفتار در افراد با نارسایی توجه/ بیش فعالی و نرخ افزایشی نارسایی توجه/ بیش فعالی در افراد با اختلالات زبان/ گفتار را پیدا کردند. کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی و اختلال زبان/ گفتار از نظر زبانی یک گروه ناهمگون دارای نقص ها و اشکالاتی با دامنه خفیف تا شدید هستند. طبق نظر کوهن وقتی کودکان بی توجه هستند، کمتر احتمال

روابط متنی بردرک نقش افراد در رویدادها و تأثیر هیجانات و انگیزه‌ها و اهداف آنان در جهت دهی شان مؤثر می‌باشد(۹). در پژوهش حاضر نیز درک دستوری دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی پایین‌تر از دانش آموزان بدون اختلال است(شکل ۱- نیمرخ نمرات).

ضمیری نشان می‌دهد که کودکان با آسیب‌های زبانی و اختلال روان‌ساختنی بیشترین مشکل را در زمینه درک سیستم «فرد» دارند. رابطه بین افراد و رویدادها در روایت‌ها با استفاده از ضمایر فردی ایجاد می‌شود. این ضمایر ما را قادر می‌سازد تا پی‌بریم فردی که در یک متن درباره او سخن گفته می‌شود، همان است که قبل از متن دیگری به او اشاره شده است. توانایی ایجاد زنجیره‌های معنایی بین رویدادها و

شکل ۱ - نیمرخ کلی نمرات در زبان و گفتار در دو گروه



تancoک و شاکار مشکلاتی را در راج شناسی کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی و کودکان عادی بدست آورند(۲). در حالی که بارکلی بیان می کند کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی گزارش کرده اند، اما در پژوهش حاضر تفاوتی در بین دو گروه با و بدون اختلال در این زمینه دیده نشد. این تفاوت در یافته ها می تواند ناشی از تفاوت در آزمون های به کار رفته و همچنین محدود بودن نمونه مورد بررسی باشد(۲).

بارکلی و همکاران بیان نمودند که تولیدات محاوره ای کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی متناسب با انتظارات سنی شان بوده است. همچنین زانتال، لودلو و همکاران، تفاوت های بسیار ناچیزی را بین



نقص زبان و اختلال رفتار با وجود ناتوانی خواندن تعديل می‌گردد. به عبارت دیگر، وجود اختلالات رفتاری در این نمونه از کودکان با نقص‌های زبانی ظاهرآبا مشکلات خواندن و افت تحصیلی بستگی دارد (۱۳، ۱۴). دو پل و استانترنشان دادنده از هرسه کودک با نارسایی توجه / بیش فعالی یک کودک دارای مشکلات خاص یادگیری است، همان طور که بارکلی اظهار می‌دارد شیوع ناتوانی‌های یادگیری در بین گروههای بدون اختلال خیلی پایین‌تر از پایین‌ترین میزان تخمین زده برای تقریباً ۲۰ درصد کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی است (۸). با توجه به آنکه تأثیر تأخیرات دریافتی و بیانی زبان بر افت تحصیلی کاملاً نشان داده شده است (۷، ۲)، نوعی رابطه قوی بین ناتوانی‌ی رشد قابلیت‌های زبان و یادگیری خود کنترلی وجود دارد (۵)، می‌توان پیش‌بینی کرد که نقص‌های زبانی کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی موجب مشکلاتی در خودکنترلی و افت تحصیلی آنان می‌شود. همچنین تأخیر در درونی سازی زبان موجب بروز مشکلات و دشواریها بر فتاوی قانون مدار در این کودکان می‌شود (۱۰، ۳). بر همین اساس در مورد سایر کاربردهای این پژوهش می‌توان گفت که با شناسایی نقص‌های زبان کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی در مراحل اولیه و اصلاح آن از افت تحصیلی این کودکان جلوگیری می‌شود. همچنین با شناسایی نقص‌های زبانی و آموزش درونی سازی زبان، این کودکان می‌توانند خودکنترلی را یاد بگیرند و در رفتار قانون‌مدار با مشکل‌کمتری مواجه شوند (۱).

از محدودیت‌ها و ملاحظه‌های پژوهش حاضر می‌توان به کوچک بودن حجم نمونه، عدم استفاده از روش تصادفی برای انتخاب آزمودنی‌ها به دلیل کم بودن کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی و استفاده از مقیاس درجه بندی کانز برای معلمان اشاره کرد. بنابر این پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های بعدی ضمن در نظر گرفتن محدودیت‌های ذکر شده، بررسی هایی در سایر پایه‌های نیز انجام بگیرد. افزون بر این، پیشنهاد می‌شود رشد زبان در سه زیر نوع اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی مورد پژوهش قرار گیرد.

### نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود تفاوت بین نیمرخ رشد زبان دانش‌آموزان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با دانش‌آموزان عادی است. با توجه به نقش و اهمیتی که استفاده از زبان و گفتار در هدایت تفکر و کنترل رفتار دارد (۱)، می‌توان نتیجه گیری کرد وجود آسیب‌های زبانی و گفتاری در این کودکان احتمالاً با مشکلاتی که این کودکان در کنترل و تفکر دارند رابطه دارد.

در مقایسه با کودکان بدون اختلال، کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی مشکلاتی از قبیل بروز داد کلامی افراطی در طول گفتار خودبخودی و کنار گذاشتن تکلیف دارند و در مقابل برای پاسخ به سئوالات چالش برانگیز در مقایسه با کودکان بدون اختلال تمایل دارند کمتر حرف بزنند. این کودکان همچنین در تکالیف حل مسئله کلامی، رقابت کمتری می‌کنند و در انتقال اطلاعات اساسی تکلیف با همسالانشان در فعالیتهای مشترک توانمندی کمتری دارند. آنان اطلاعات اندک و کمتر سازمان یافته تری را در تکالیفی که مستلزم طرح ریزی و سازمان دهنی کلامی می‌باشد فراهم می‌کنند. از قبیل داستان گویی یا توصیف راهبردهایی که در طول انجام تکلیف بکار می‌برند (۲). پژوهش حاضر بیانگر سازمان دهنی ضعیفتر کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی نسبت به کودکان بدون اختلال است (شکل ۱ - نیمرخ نمرات).

ردموند بیان می‌کند که کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی مشکلاتی را در زبان بیانی دارند. بارکلی تولیدات محاوره‌ای این کودکان متناسب با انتظارات سنتی شان بیان نموده‌اند (۲). کارت و همکاران بیان نمودند که کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی در آزمونهای روانی کلامی بسیار ضعیف عمل کرده‌اند، اگر چه عده‌ای از پژوهشگران به هیچ تفاوتی در این زمینه دست نیافته‌اند. در پژوهش حاضر نیز تفاوتی در تولید کلمه بین دانش‌آموزان با و بدون اختلال مشاهده نشد. (شکل ۱ - نیمرخ نمرات)، اما در زبان بیانی دانش‌آموزان با اختلال در سطح پایین تری بودند. فیشر و همکاران بیان نمودند که تفاوت در یافته‌ها تا اندازه‌ای می‌تواند به علت نوع آزمون بکار رفته در این زمینه باشد. آزمون هایی که در آنها آزمودنی‌ها کلماتی را در مقوله‌های معنایی تولید می‌کنند، نظیر نام‌هایی برای جانوران یا گیاهان آسان‌تر بود و احتمالاً قادر به تفکیک کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی و کودکان گروه کنترل نیستند، در مقایسه با آن دسته از آزمون‌هایی که در آنها از علامت بسیار سازمان یافته و طریفتری نظیر حروف استفاده می‌شود (۱۰).

ردموند بیان می‌کند که کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی مشکلاتی را در معنا نشان می‌دهند (۲). کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی تأخیر در نحو و معنا نشان می‌دهند و در فهم جملات پیچیده نحوی مشکل دارند (۳). پژوهش حاضر نیز نشان می‌دهد که کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی از گروه بدون اختلال در نحو و معنا در سطح پایین تری هستند (شکل ۱ - نیمرخ نمرات).

نوعی رابطه دو جانبه بین زبان و خواندن وجود دارد، به طوری که گنجینه لغات و نحو از سن ۳ تا ۱۱ سالگی در کودکان با ناتوانی‌های خواندن ضعیف می‌گردد (۱۲). نتایج بیانگر آن است که رابطه بین

- 1- Alizadeh H. [Attention deficit hyperactivity disorder (Persian)]. Tehran. Roshd Publication; 2004.
- 2- Redmond S.M. Conversational profiles of children with ADHD, SLI and typical development. *Clinical Linguistics and Phonetics* 2004; 18(2): 107-125.
- 3- Watson S. Perspectives on ADHD: Executive function, working memory, and language disabilities. Published in: *Seminars in Speech and Language* 2003; 25(3): 241-254.
- 4- Mobasher Kashani L. [Cognitive characteristics of 7-11 year old students with ADHD (Persian)]. Thesis for Master of Arts in Psychology. Allameh Tabatabai University; 2002.
- 5- Cohen N.J. Language, social cognitive, and behavioral characteristics of psychiatrically disturbed children with previously identified and unsuspected language impairments. *Journal of Child Psychology & Psychiatry* 1998; 39(6): 853-864.
- 6- Niokamer F, Hamil D. Language development test (bita). Standardization and normalization. Hassanzade S, Minaie A. (Persian translators) Tehran. Iranian Organization for Exceptional Children. 2002.
- 7- Jones C B, Braswell L, Sheridan S. Managing attention deficit hyperactivity disorder in children: A Guide for practitioners. Guilford; 1999.
- 8- Cohen N.J. Overlap of communication impairments and social-emotional problems in infants. *Newsletter of the Infant Mental Health Promotion Project* 2003; 37: 19-21.
- 9- Vallance D, Cohen N.J. Discourse deficits associated with psychiatric disorders and with language impairments in children. *Journal of Child Psychology & Psychiatry* 1999; 40(5): 693-704.
- 10- Barkley A.R. Attention deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. Guilford: in Press; 1999.
- 11- Capla R, Guthrie D. Thought disorder in attention deficit hyperactivity disorder. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* 2001; 40(8): 965-971.
- 12- Cohen N.J. Unsuspected language impairments in psychiatrically disturbed children: developmental issues and associated conditions. *Unsuspected Language Impairments*. Cambridge University: in Press; 1996.
- 13- Redmond S.M. The use of rating scales children who have language impairments. *American Journal of Speech-Language Pathology* 2002; 11: 124-138.
- 14- Breier J.I. Perception of speech and non speech stimuli by children with and without reading disability and attention deficit hyperactivity disorder. *Journal of Experimental Child Psychology* 2002; 82: 226-250.
- 15- Pashasharifi H. [Theories and application of personality and intelligent tests (Persian)]. First edition. Tehran. Sokhan publication; 1997.