

Research Paper: Effect of Different Intensities of Harsh Reliance of Auditory Stimulation on Static Balance in 5-12 Years Old Children With Cerebral Palsy in Tehran City, Iran



Masomeh Esmailpour Nosar¹ , Seyed Ali Hosseini^{1,2} , *Nazila Akbarfahimi¹ , Seyed Farhad Tabatabai Ghomshe³ , Akbar Biglarian^{4,5}

1. Department of Occupational Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
2. Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
3. Department of Ergonomics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
4. Department of Biostatistics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
5. Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.



Citation Esmailpour Nosar M, Hosseini SA, Akbarfahimi N, Tabatabai Ghomshe SF, Biglarian A. [Effect of Different Intensities of Harsh Reliance of Auditory Stimulation on Static Balance in 5-12 Years Old Children With Cerebral Palsy in Tehran City, Iran (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2018; 19(3):194-205. <http://dx.doi.org/10.32598/rj.19.3.194>

doi: <http://dx.doi.org/10.32598/rj.19.3.194>

Funding: See Page 202

Copyright: The Author(s)

Received: 10 Apr 2018

Accepted: 28 Aug 2018

Available Online: 01 Oct 2018

ABSTRACT

Objective control dysfunction is a serious problem in children with Cerebral Palsy (CP). This study aimed to investigate the impact of different intensities, harsh reliance of auditory stimulation on static balance in 5-12 years old children with bilateral spastic cerebral palsy.

Materials & Methods This analytical descriptive study, twenty 5-12 years old children (8 boys and 12 girls, Mean±SD age: 7.10±2.03 y) with cerebral palsy participated. They were selected by the convenience sampling method. Children with CP were included in the study if they had bilateral spastic CP (diagnosed by neurologist), aged 5 to 12 years, had level I and II CP according to Gross Motor Function Classification System (GMFCS), could stand independently without any support for at least 30 seconds, had no history of surgical treatment or received injection of botulinum toxin within six months prior to the study and not a candidate for such, got scores between 1 to 3 according to Modified Ashworth Scales (MAS) in plantar flexors, and understood verbal comments. They were excluded from the study if they had vision or hearing impairments and uncontrolled epilepsy. Modified Ashworth Scales, Force Plate (during eyes open) and SPARCLE questionnaire were employed to assess muscle tone, static balance, and cognition level, respectively. The central of mass signals were collected at a sampling frequency of 100 Hz, over a period of 30 seconds using a single piezoelectric force platform (Model 9286; Kistler, Switzerland, Bioware 4-0-12). All participants were tested in standing position with eyes opened. The participants stood independently, with bare feet, on the markers in the center of the platform with arms at the sides, while looking straight ahead at the spot in front of them. The participants listened to impure auditory stimulation with harsh and low high intensity on a hard surface and soft force plate for three times. The four tasks were 1. Standing on soft surface while listening to impure auditory stimulation with harsh high intensity; 2. Standing on soft surface while listening to impure auditory stimulation with harsh low intensity; 3. Standing on hard surface while listening to impure auditory stimulation with harsh low intensity; and 4. Standing on hard surface while listening to impure auditory stimulation with harsh high intensity. Between the tasks, a break was provided during which they could rest on the chair for at least 5 minutes. Then the process repeated with auditory stimulation harsh low intensity. The average results across the three times were calculated for each participant. The data were filtered and anterior-posterior, phase plane portrait rate and velocity were measured with MATLAB (R2010a). Data normality distribution was tested using Shapiro-Wilk test which revealed the normality in dis-

* Corresponding Author:

Nazila Akbarfahimi, PhD

Address: Department of Occupational Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

Tel: +98 (21) 22180037

E-Mail: na.akbarfahimi@uswr.ac.ir

Keywords:

Auditory stimulation, Static balance, Spastic cerebral palsy

tribution of the data ($P < 0.05$). The independent t test was used to compare the results of anterior-posterior, phase plane portrait rate and velocity for each condition (harsh high intensity on a hard surface, soft force plate, harsh low intensity on a hard and soft surface of force plate). All statistical analyses were performed in SPSS V. 16. The significance level was set at $P < 0.05$ for all tests.

Results The effect of harsh high intensity auditory stimulation on the hard and soft surface of the plate anterior -posterior rate ($P < 0.001$) and velocity ($P < 0.001$) were significant. There was no significant effect of harsh low intensity auditory stimulation on the hard and soft surface of the plate anterior-posterior rate ($P = 0.38$) and velocity ($P = 0.722$).

Conclusion According to this study, the harsh high intensity auditory stimulation on hard and soft surfaces with eyes opened affect the speed rate, anterior-posterior, phase plane portrait page, and static balance in children with bilateral spastic CP. Regarding this result, balance programming may improve the static balance in these children.

بررسی تأثیر تحریک شنیداری ناملاپم با شدت متفاوت بر تعادل ایستای کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۵ تا ۱۲ ساله در تهران

معصومه اسماعیل پور نوسر^۱، سید علی حسینی^{۲،۳}، *نازیلا اکبر فهمی^۱، سید فرهاد طباطبایی قمشه^۲، اکبر بیگلریان^۴

- ۱- گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
- ۲- مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
- ۳- گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
- ۴- گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
- ۵- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: اختلال در کنترل تعادل به عنوان عامل اصلی اختلال در کارکرد کودکان فلج مغزی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر تحریک شنیداری ناملاپم بر تعادل ایستای کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۵ تا ۱۲ سال تهران است.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی ۲۰ کودک فلج مغزی اسپاستیک (۱۲ دختر و ۸ پسر با میانگین سنی $7/10 \pm 2/3$ سال) شرکت کردند. نمونه‌گیری به شکل آسان و از جامعه در دسترس صورت گرفت. در این مطالعه کودکانی با تشخیص فلج مغزی اسپاستیک توسط متخصص مغز و اعصاب، سن تقویمی ۵ تا ۱۲ سال، قرار گرفتن در سطح ۱ یا ۱۱ بر اساس سیستم طبقه‌بندی حرکات درشت، توانایی فهم دستورات شفاهی، توانایی ایستادن مستقل حداقل برای ۳۰ ثانیه، قوام عضلاتی ۱ تا ۳ در ناحیه مچ پا بر اساس معیار تعدیل یافته آشورت، وارد شدند. این کودکان با بروز اختلال بینایی یا شنوایی و حمله تشنجی از مطالعه خارج می‌شدند. ابزارهای استفاده‌شده در این مطالعه شامل صفحه نیرو، پرسش‌نامه اسپارکل و معیار تعدیل یافته آشورت بودند. صفحه نیرو، برای بررسی تعادل ایستا، پرسش‌نامه اسپارکل برای تعیین سطح عملکرد هوشی و معیار تعدیل یافته آشورت برای تعیین میزان شدت تون عضلاتی در کودکان فلج مغزی استفاده شدند. اطلاعات مربوط به تغییرات مرکز توده بدن با دستگاه صفحه نیرو مدل ۹۲۸۶۸ کیستلر ساخت کشور سوئیس تحت فرکانس ۱۰۰ هرتز و نرم‌افزار Bioware ۴-۰-۱۲ اندازه‌گیری شد. تمامی شرکت‌کنندگان در وضعیت ایستاده و با چشم باز ارزیابی شدند. هر کودک با پای برهنه در حالی که دست‌هایش کنار بدنش بود، روی نقاط نشان‌دار شده به مدت ۳۰ ثانیه روی صفحه نیرو می‌ایستاد که یک بار با پوشش سخت و یکبار با پوشش نرم فرش شده بود و به عکس منظرهای نگاه می‌کرد که در فاصله دو متری و دقیقاً روبه‌روی او قرار داشت. سپس تحریک شنیداری ناملاپم با دو شدت متفاوت (بالا و پایین) از پشت سر کودک پخش می‌شد. مدت زمان انجام هر تکلیف ۳۰ ثانیه بود و سه بار تکرار می‌شد. چهار تکلیف شامل ایستادن روی سطح نرم با تحریک شنیداری ناملاپم شدت بالا؛ ایستادن روی سطح سخت با تحریک شنیداری ناملاپم شدت پایین؛ ایستادن روی سطح سخت با تحریک شنیداری ناملاپم شدت بالا؛ و ایستادن روی سطح سخت با تحریک شنیداری ناملاپم شدت پایین بود. کودک اجازه داشت در فواصل مناسب (بعد از هر سه بار تکرار) بین تکالیف استراحت کند. داده‌ها برای هر کودک سه بار، هر بار به مدت ۳۰ ثانیه و با فرکانس ۱۰۰ هرتز ثبت شدند. داده‌ها در نرم‌افزار متلب نسخه R2010a تحت فیلتر پایین‌گذر پردازش شدند. سپس برای مقایسه تأثیر تحریک شنیداری ناملاپم در شدت‌های بالا و پایین بر سطوح نرم و سخت با چشم باز و در حالت ایستاده بدون حرکت، سرعت جابه‌جایی و تصویر سطح پایه در صفحه قدامی خلفی ابتدا نرمالیت‌ده داده‌ها با روش شاپیرو ویلک محاسبه شد. سپس به روش آماری t زوجی در نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ تجزیه و تحلیل شد. سطح معناداری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها $P < 0/05$ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: تأثیر تحریک شنیداری ناملاپم با شدت بالا در هر دو حالت ایستادن روی سطح نرم و سخت بر روی سرعت جابه‌جایی در صفحه قدامی خلفی و تصویر سطح پایه در صفحه قدامی خلفی معنادار بود ($P < 0/001$)، اما تحریک شنیداری ناملاپم با شدت پایین در هر دو حالت بر روی تصویر سطح پایه در صفحه قدامی خلفی ($P = 0/380$) و بر سرعت جابه‌جایی در صفحه قدامی خلفی ($P = 0/722$) تأثیر معناداری بر کنترل تعادل ایستا نداشت.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، تحریک شنیداری ناملاپم با شدت بالا روی سطوح سخت و نرم صفحه نیرو در وضعیت چشم باز در میزان سرعت و تصویر سطح پایه صفحه قدامی خلفی و در برهم خوردن تعادل ایستای کودکان فلج مغزی اسپاستیک دوطرفه تأثیر دارد. بنابراین می‌توان در طراحی برنامه‌های تعادلی تحریکات شنیداری با شدت بالا را بر سطوحی با درجات متفاوت سختی در نظر گرفت.

تاریخ دریافت: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

تاریخ پذیرش: ۰۶ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۷

کلیدواژه‌ها:

تحریک شنیداری، تعادل ایستا، فلج مغزی اسپاستیک

* نویسنده مسئول:

دکتر نازیلا اکبر فهمی

نشانی: تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه کاردرمانی.

تلفن: ۰۳۷ ۲۲۱۸۰۰۳۷ (۲۱) ۹۸+

رایانامه: na.akbarfahimi@uswr.ac.ir

مقدمه

منبع مهمی برای درک وضعیت و حرکت سر در ارتباط با نیروی جاذبه است [۸]. گیرنده‌های شنوایی مسغول آگاه‌سازی فرد از ماهیت حرکات در محیط هستند [۹، ۶]؛ به طوری که پاسخ بیش از حد به محرک‌های شنیداری ممکن است به تغییر تون عضلانی منتهی شود که اغلب در کنترل حالت بدن و هماهنگی پاسخ‌های حرکتی مؤثر است [۱۰، ۶]. این محرکات می‌توانند به صورت قابل پیش‌بینی و غیر قابل پیش‌بینی ظاهر شوند و سبب فعال شدن سیستم دستگاه عصبی خودکار و بروز اختلال در حفظ تعادل ایستا شوند [۱۱، ۶]. این اختلال می‌تواند به دو صورت حرکتی و شناختی بر عملکرد تعادلی فرد مؤثر باشد، تأثیرات حرکتی با افزایش تون عضلانی و بروز رفلکس‌هایی نظیر استارتل و مورو و تأثیرات شناختی با دشواری در توجه و تمرکز مشخص می‌شود [۱۳-۱۱].

کودکان فلج مغزی اسپاستیک تجربه کمی در رد (فیلتریشن) محرکات نامربوط دارند. توجه کارکردی آن‌ها حین انجام تکالیف حرکتی با بیشترین محدودیت همراه است و نیاز به توجه اختصاصی برای انجام عملکردهای شناختی حین کنترل تعادل ایستا دارند [۱۱]. در محیط‌های پرمحرک مشکلات تعادل ایستا در کودکان فلج مغزی افزایش می‌یابد. از آنجایی که حفظ تعادل به تأثیر و کارآمدی پیش‌خورندهایی از درون داده‌های حسی متنوع وابسته است، اهمیت درون‌داده‌های شنیداری از این لحاظ هنوز کاملاً مشخص نشده است [۱۳، ۱۱].

با وجود آنکه اختلال در کنترل تعادل ایستا یکی از مشخصه‌های اصلی فلج مغزی و به عنوان عامل اصلی اختلال در کارکرد این کودکان مطرح است، مطالعات محدودی درباره روش‌های بهبود کنترل تعادل ایستا در این کودکان صورت گرفته است [۱۵، ۱۴]. برنامه‌های درمانی بیشتر در حوزه‌های اسب‌درمانی^۵ [۱۶، ۱۷]، آب‌درمانی^۶ [۱۸]، تکالیف دوگانه^۷ [۲۰، ۱۹]، ترمیل^۸ [۲۲، ۲۱] و چند برنامه تقویتی بود [۲۴، ۲۳]. در بیشتر مطالعات تکالیف دوگانه به بررسی تداخل برنامه‌های شناختی [۲۰] یا برنامه‌هایی با تأکید بر حافظه کاری بینایی و کنترل تعادل ایستا پرداخته شده است [۱۹].

با توجه به علائم گسترده در این کودکان، ضرورت اجرای مداخلات درمانی متعدد، تحقیقات محدود در حوزه تأثیر تحریکات شنیداری در تعادل کودکان فلج مغزی، و نقصان نتایج قطعی پیرامون ارتباط بین تعادل ایستا و تحریکات شنیداری، لزوم اجرای این پژوهش ضروری به نظر رسید. هدف از اجرای پژوهش، بررسی تأثیر تحریک شنیداری ناملازم با شدت متفاوت و سطح اتکا بر تعادل ایستای کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۵ تا ۱۲ ساله است.

فلج مغزی اختلال حرکتی و وضعیتی ناشی از صدمه غیر پیش‌رونده در مغز در حال رشد است که از ضایعه مغزی پیش از تولد، حین تولد یا پس از تولد ناشی می‌شود [۱]. شیوع آن در آمریکا ۲ تا ۲/۵ مورد در هر هزار تولد زنده گزارش شده است [۲، ۳]. محل ضایعه بر رشد و کیفیت الگوهای حرکتی موجود در کودک مبتلا به فلج مغزی تأثیرگذار است [۳]، به طوری که فلج مغزی نوع اسپاستیک نشان‌دهنده آسیب در قشر حرکتی است. ضایعات هسته‌های قاعده‌ای به طور معمول، نوسانات تون عضلانی به صورت دیستونی و اتنوز را به دنبال خواهد داشت. آسیب مخچه منجر به ایجاد عدم هماهنگی حرکتی می‌شود که مشخصه اصلی کودکان فلج مغزی نوع آتاکسیک است [۳]. اسپاستیسیته به طور تقریبی در ۸۰ درصد از افراد فلج مغزی با تغییراتی بر تون عضلانی، قدرت، سفتی و رشد نمایان می‌شود [۴]. اختلال در کنترل حرکتی و وضعیت به عنوان شایع‌ترین اختلال حرکتی در این کودکان است [۵، ۳].

کنترل وضعیت فرایندهای پیچیده و مداومی است که به تنظیم موقعیت بدن در فضا به منظور ثبات و جهت‌یابی اطلاق می‌شود که طی فرایند یکپارچه‌سازی نیروهای درونی و بیرونی و عوامل محیطی انجام می‌گیرد [۶]. ثبات وضعیتی^۱ یا تعادل ایستا^۱ به معنی توانایی حفظ مرکز توده بدن^۲ در محدوده تعادل است. این محدوده، بخشی از فضا است که بدن می‌تواند وضعیتش را در آن بدون تغییر در سطح اتکا، حفظ کند. بنابراین مرز ثابتی ندارد و حدود آن بستگی به نوع فعالیت، بیومکانیک فرد و جنبه‌های مختلف محیطی دارد [۷]. هیچ ساختار منفردی به تنهایی تعادل ایستار را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، بلکه کنترل تعادل ایستا نتیجه اثر متقابل سیستم‌های عضلانی، اسکلتی و عصبی است [۷].

یکی از اجزای سیستم عصبی در کنترل تعادل ایستا، سیستم‌های حسی است که برای درک موقعیت بدن در فضا باید اطلاعات دریافتی از گیرنده‌های حسی سیستم‌های بینایی، سوماتوسنسوری (گیرنده‌های پوستی، مفاصل و عضلات)، وستیبولار و شنوایی را پردازش و سازماندهی کند. هر یک از این سیستم‌ها به عنوان یک مرجع اطلاعاتی ویژه، اطلاعات خاصی را از وضعیت بدن در اختیار سیستم اعصاب مرکزی^۴ قرار می‌دهند [۷].

سیستم سوماتوسنسوری اطلاعات مربوط به وضعیت بدن نسبت به سطح اتکا و ارتباط اجزای مختلف بدن نسبت به همدیگر را برای سیستم اعصاب مرکزی فراهم می‌کند. سیستم بینایی اطلاعات مربوط به وضعیت و حرکت سر را نسبت به اشیای موجود در محیط گزارش می‌دهد. اطلاعات سیستم وستیبولار

5. Hippotherapy
6. Aquatic therapy
7. Dual task
8. Treadmill therapy

1. Postural stability
2. Static balance
3. Center of Mass (COM)
4. Central Nervous System (CNS)

روش بررسی

این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بود که روی ۲۰ کودک اسپاستیک ۵ تا ۱۲ سال شهر تهران انجام شد. برای محاسبه حجم نمونه، مقدار انحراف معیار در مطالعه‌ای مشابه بررسی شد. حجم نمونه با استفاده از انحراف معیار با فرمول زیر محاسبه شد. در این فرمول انحراف معیار $Z_{\alpha/2}$ (ضریب اطمینان ۹۵ درصد) ۲/۸، دقت احتمالی مطلوب d ۰/۱ در نظر گرفته شده است.

$$n = \frac{Z^2 \sigma^2}{d^2} = \frac{2.8^2 * (0.15)^2}{(0.10)^2} = 17.64 \square 18 ; Z = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} + Z_{1-\beta}$$

روش نمونه‌گیری از نوع در دسترس آسان بود. کودکانی با تشخیص فلج مغزی توسط متخصص مغز و اعصاب، دامنه سنی ۵ تا ۱۲ سال، توانایی ایستادن مستقل حداقل به مدت ۳۰ ثانیه، میزان اسپاستیسیته ۱ تا ۳ در مچ پا بر اساس مقیاس اصلاح شده آشورث [۱۴]، نداشتن آسیب بینایی (نیستگاموس، استرابیسم) با تأیید متخصص مغز و اعصاب یا چشم پزشک، شرکت نکردن در برنامه مداخله‌ای مشابه با برنامه‌های مداخله‌ای در این طرح و نداشتن آسیب به عصب هشتم مغزی با تأیید متخصص گوش و حلق و بینی و شنوایی‌شناس و داشتن هوشبهر بالای ۷۰ بر اساس پرسش‌نامه اسپارکل وارد مطالعه می‌شدند. ابزار استفاده‌شده در این مطالعه شامل پرسش‌نامه دموگرافیک، معیار تعدیل‌یافته آشورث، پرسش‌نامه اسپارکل و صفحه نیرو بودند.

معیار تعدیل‌یافته آشورث برای ارزیابی میزان اسپاستیسیته عضلات به کار می‌رود. در مقیاس تعدیل‌یافته آشورث اندام با سرعت ثابت در دامنه کامل حرکت داده می‌شود و قوام از نمره صفر (هنجار) تا چهار (غیر قابل حرکت) درجه‌بندی می‌شود. روایی و پایایی این معیار در مطالعه موتلو^{۱۰} و همکاران تأیید شده است [۲۵]. این اندازه‌گیری در محیطی آرام انجام گرفت در حالی که بیمار نشسته بود. اندازه‌گیری برای هر کودک سه بار تکرار شد و بهترین نمره به دست آمده در سمت درگیر تر ثبت شد. نمره‌دهی به این شرح بود: افزایش نیافتن قوام عضله: ۱. افزایش خفیف قوام عضله با حداقل مقاومت در انتهای دامنه حرکتی^{۱۱} در حین حرکت فلکسیون یا اکستنسیون بخش مبتلا، افزایش خفیف قوام عضله یا گیر کردن با حداقل مقاومت در کمتر از نصف دامنه حرکتی؛ ۲. افزایش قابل ملاحظه قوام عضله در حدی که بخش مبتلا به راحتی حرکت کند؛ ۳. افزایش قابل ملاحظه قوام عضله در حدی که انجام حرکت پاسیو دشوار باشد؛ ۴. سفتی بخش‌های مبتلا در فلکسیون و اکستنسیون.

آن کولور و گروه اسپارکل پرسش‌نامه اسپارکل را به منظور

ارزیابی تخمینی سطح شناختی کودکان طراحی کردند که خانواده‌ها آن را تکمیل می‌کنند و بهره‌هوشی کودکان را در سه سطح (زیر ۵۰، بین ۵۰ تا ۷۰، و بالای ۷۰) طبقه‌بندی می‌کند. این پرسش‌نامه شامل ۶ سؤال است [۲۶].

برای ثبت اطلاعات مربوط به متغیرهای تعادل از دستگاه صفحه نیرو مدل ۹۲۸۶A کیستلر^{۱۲} ساخت کشور سوئیس تحت نرم‌افزار ۱۲-۰-۴ Bioware موجود در آزمایشگاه ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی استفاده شد. صفحه نیرو از جمله تجهیزات آزمایشگاه بیومکانیک است که به اندازه‌گیری نیروهای عکس‌العمل زمین به کف پای فرد و ثبت اجزای بیومکانیک تعادل ایستا و پویا می‌پردازد [۲۷]. این صفحه نیرو چهار حسگر در چهار گوشه صفحه مستطیل شکل ۹۰×۶۰ سانتی‌متری دارد. از آنجایی که حسگرهای این دستگاه از نوع پیزو الکتریک ۸ است با هر بار ایستادن روی دستگاه، کالیبریشن خودبه‌خود انجام می‌شد.

هر کودک با پای برهنه در حالی که دست‌هایش کنار بدنش بود، روی نقاط نشان‌دار شده به مدت ۳۰ ثانیه روی صفحه نیرو می‌ایستاد که یکبار با پوشش سخت و یکبار با پوشش نرم فرش می‌شد و به عکس منظره‌ای نگاه می‌کرد که در فاصله دو متری و دقیقاً روبه‌روی او قرار داشت. سپس تحریک شنیداری ناملازم با دو شدت متفاوت (کم و زیاد) که بر اساس نتایج تست آستانه دردناکی شنیداری توسط ادیولوژیست طراحی شده بود، از پشت سر کودک از طریق اسپیکری که در فاصله ۵۰ سانتی‌متری او قرار داشت پخش می‌شد. چهار تکلیف شامل ایستادن روی سطح نرم با تحریک شنیداری ناملازم شدت بالا، ایستادن روی سطح نرم با تحریک شنیداری ناملازم شدت پایین، ایستادن روی سطح سخت با تحریک شنیداری ناملازم شدت بالا، و ایستادن روی سطح سخت با تحریک شنیداری ناملازم شدت پایین بود.

مدت زمان انجام هر تکلیف ۳۰ ثانیه بود و سه بار تکرار می‌شد. کودک اجازه داشت در فواصل مناسب (بعد از هر سه بار تکرار) بین تکالیف استراحت کند. داده‌ها برای هر کودک سه بار، هر بار به مدت ۳۰ ثانیه و با فرکانس ۱۰۰ هرتز ثبت شد. داده‌ها در نرم‌افزار متلب نسخه R۲۰۱۰a تحت فیلتر پایین‌گذر پردازش شدند. سپس برای مقایسه تأثیر تحریک شنیداری ناملازم در شدت‌های بالا و پایین بر سطوح نرم و سخت با چشم باز و در حالت ایستاده بدون حرکت، سرعت جابه‌جایی و تصویر سطح پایه^{۱۳} در صفحه قدامی خلفی به روش آماری t زوجی در نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ تجزیه و تحلیل شدند. منظور از تصویر سطح پایه، انحراف معیار مجموع واریانس سرعت و نوسان است [۲۸]. کمیته اخلاق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی این مطالعه را تأیید کرده است.

12. Kistler
13. Phase plane

9. Force plate portrait
10. Mutlu
11. Rang of Motion (ROM)

یافته‌ها

متغیرها توزیع نرمال داشتند. همان‌گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، تحریک شنیداری ناملاپم با شدت بالا روی سرعت جابه‌جایی در صفحه‌قدامی خلفی معنادار بود ($P < 0/001$)، اما تحریک شنیداری ناملاپم با شدت پایین تأثیری در کنترل تعادل ایستا نداشت ($P > 0/001$) (جدول شماره ۲). همچنین تحریک شنیداری ناملاپم با شدت بالا روی تصویر سطح پایه در صفحه‌قدامی خلفی معنادار بود ($P < 0/001$). تحریک شنیداری ناملاپم با شدت پایین حین ایستادن بر سطوح سخت و یا نرم، تأثیری در تعادل ایستا نداشت ($P > 0/001$) (جدول شماره ۳).

مطالعه حاضر روی ۲۰ کودک مبتلا به فلج مغزی با میانگین سنی $7/10 \pm 2/03$ سال در سطوح ۱ و ۲ سیستم طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت^{۱۴} انجام شد. ۷۵ درصد از شرکت‌کنندگان در سطح II سیستم طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت و شدت اسپاستیسیته در ۶۰ درصد از آنان در سطح یک معیار آشورت تعدیل یافته بود (جدول شماره ۱). بر اساس آزمون شاپیرو ویلک

14. Gross Motor Function Classification System (GMFCS)

جدول ۱. مشخصات جمعیت‌شناختی شرکت‌کنندگان در مطالعه

میزان	متغیر
سن	۷/۱۰±۲/۰۳ سال
وزن	۲۶/۷۸±۱۳/۸۸ کیلوگرم
شدت درگیری (مقیاس GMFCS)	سطح I سطح II
میزان سفتی عضلاتی بر اساس مقیاس آشورت	۱ ۲ ۳
هوشیهر بر اساس پرسش‌نامه اسپارکل	بالای ۷۰ بین ۵۰ تا ۷۰ زیر ۵۰
جنسیت	دختر پسر

توانبخشی

جدول ۲. میزان سرعت جابه‌جایی در وضعیت‌های مختلف شنیداری و سطوح متفاوت (N=۲۰)

تکلیف	میانگین	انحراف معیار ادغام‌شده	ملاک آزمون	درجه آزادی	P
تحریک شنیداری ناملاپم شدت بالا	۰/۰۰۹ ۰/۰۷۵	۰/۰۲۹	۹/۶۱۳	۲۰	<۰/۰۰۱
تحریک شنیداری ناملاپم شدت پایین	۰/۰۰۸ ۰/۰۷۴	۰/۰۴۶	۰/۵۷۳	۲۰	۰/۷۲۲

توانبخشی

جدول ۳. میزان تصویر پایه در وضعیت‌های مختلف شنیداری و سطوح متفاوت (N=۲۰)

تکلیف	میانگین	انحراف معیار ادغام‌شده	ملاک آزمون	درجه آزادی	P
تحریک شنیداری ناملاپم شدت بالا	۰/۰۷۵ ۰/۰۰۶	۰/۰۳۹	۷/۷۱۵	۲۰	<۰/۰۰۱
تحریک شنیداری ناملاپم شدت پایین	۰/۰۸۱ ۰/۰۷۱	۰/۰۴۹	۰/۸۹۹	۲۰	۰/۳۸

توانبخشی

بحث

در این مطالعه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد میانگین عملکرد تعادلی کودکان مبتلا به فلج مغزی حین انجام تحریک شنیداری ناملازم (شدت بالا)، با چشم باز روی سطح نرم یا سخت متفاوت بوده است. مطالعه هاتزیتاکی^{۱۵} و همکاران در سال ۲۰۰۲ نشان داد بین درک حرکتی با کنترل تعادل ایستا و پویا در کودکان رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که میزان مرکز فشار در محور قدامی خلفی و داخلی خارجی در مدت زمان ۵ ثانیه به حداکثر مقدار خود می‌رسد [۲۹].

واک^{۱۶} و همکاران در سال ۲۰۰۷ در مطالعه‌ای تأثیر تحریکات شنیداری ریتمیک را روی عملکردهای راه رفتن ۲۵ فرد مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک ۶ تا ۲۵ سال با توانایی راه رفتن بررسی کردند. شرکت‌کنندگان در سه گروه کنترل، گروه با هدایت درمانگر و گروه خودکنترل تقسیم شدند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد در مسافت ۱۰ متری به ترتیب دو متر را با شتاب و دو متر را کم‌شتاب در حین پخش سه موزیک جاز، مارش و ملایم راه بروند.

پس از سه هفته نتایج بدین شرح بود که پهنای گام در هر سه گروه بهبود معنی‌داری داشت، اما تنها در گروه با هدایت درمانگر تفاوت معنی‌داری در شتاب و قرینگی دیده شد. گرچه تفاوت درون گروهی در گروه خودکنترل دیده شد، اما این تغییر به اندازه گروه با هدایت درمانگر در سطوح خودآنگیزی گزارش نشد [۱۱]. نتایج مطالعات واک و همکاران نشان داد تحریکات شنیداری ریتمیک روی عملکردهای راه رفتن کودکان فلج مغزی مؤثر بوده است. آنان معتقد بودند فاکتورهای شخصی نظیر عملکرد شناختی، قابلیت‌های جسمانی و حمایت والدین و مراقبان، نقش مهمی در طراحی و آموزش کاربردی در این زمینه دارد [۱۱]. گرچه واک و همکارانش در این مطالعه الگوهای راه رفتن کودکان و فاکتورهای فردی و شخصی (تاریخچه جراحی، شکستگی، کانتراچر و ...) افراد را اندازه‌گیری نکرده بودند.

تزادل^{۱۷} و همکاران در سال ۲۰۰۱ در مطالعه‌ای تأثیر قطع و برقراری مجدد اطلاعات حسی را بر کنترل وضعیت بررسی کردند [۳۰]. از این رو ۱۶ آزمودنی در دو گروه سنی با میانگین سنی گروه اول ۲۴/۸ سال و گروه دوم ۶۸ سال به مدت ۲۵ ثانیه در حالی که هر یک از حالات حذف و برقراری مجدد حس‌های بینایی و عمقی را تجربه می‌کردند، روی صفحه نیرو می‌ایستادند. آزمودنی‌ها باید به یک تحریک شنیداری غیرمنتظره به صورت شفاهی پاسخ می‌دادند.

نتیجه مطالعه نشان داد در زمان برقراری مجدد اطلاعات حسی

عمقی هر دو گروه سنی با افزایش سرعت جابه‌جایی مرکز فشار مواجه شدند که در سالمندان بیشتر بود و بعد از گذشت ۱۰ ثانیه سرعت کاهش یافت. اما در حالت چشم‌پسته بازگشت سرعت جابه‌جایی مرکز فشار به میزان پایه وجود نداشت؛ به عبارتی با وجود درون‌دادهای بینایی آزمودنی‌ها نتوانستند در زمان ۱۰ ثانیه با وزن‌گذاری مجدد درون‌دادهای حسی و برقراری مجدد حس عمقی، موجب افزایش نیاز به توجه در فرایند کنترل تعادل ایستا شوند که این حالت در سالمندان بارزتر بود [۳۰]. محققان علت این تغییرات را اهمیت ویژه درون‌دادهای حس عمقی در فرایند کنترل تعادل ایستا دانسته‌اند. در واقع با حذف اطلاعات بینایی فرد با کاهش کثرت اطلاعات حسی روبه‌رو می‌شود که عاملی برای افزایش نیازهای توجهی کنترل تعادل ایستا محسوب می‌شود [۱۳].

نتایج مطالعه حاضر نشان داد کودکان فلج مغزی بیشترین مشکلات را در ایستادن و انجام هم‌زمان تکلیف دیگر روی سطح نرم در مقایسه با سطح سخت نشان می‌دهند. بسیاری از مشکلات تعادل ایستا تحت تأثیر مشکلات تعادلی و بسیاری تحت تأثیر عوامل محیطی است [۱۱]. محققان به این نتیجه دست یافتند که تنظیم ثبات وضعیت تنها به عوامل محیطی وابسته نیست و به توانایی هر فرد در پردازش اطلاعات نیز وابسته است [۳۱، ۳۲]. در واقع تحریک شنیداری تأثیر ناپایداری روی کنترل وضعیت دارد و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد؛ مثل: سن افراد، وضعیت فیزیولوژیکی، نوع تحریک ارائه‌شده به آزمودنی و نوع تکلیف تعادلی و وضعیت تکلیف ثانویه (تکلیف شناختی) [۳۲]. [۱۱، ۱۹، ۳۱]. به نظر می‌رسد دلیل متفاوت بودن نتایج مطالعه حاضر نیز همین عوامل باشد.

سیستم حسی پیکری، سیستم مرکزی را با اطلاعات وضعیت و حرکت بدن با توجه به سطح اتکا تجهیز می‌کند [۷، ۵]؛ به علاوه درون‌دادهای سراسر بدن و وضعیت سگمان‌های بدنی نسبت به هم را نیز به مغز مخابره می‌کند. در شرایط طبیعی، هنگام ایستادن روی سطحی سخت و صاف، گیرنده‌های حسی پیکری، فراهم‌کننده اطلاعاتی درباره وضعیت و حرکت بدن با توجه به سطح افق هستند. در حالی که اگر فردی روی سطحی که نسبت به بدنش متحرک است یا سطحی بایستد که در راستای افقی نیست، این حس دیگر نمی‌تواند درک صحیحی از موقعیت افقی بدن داشته باشد. در این شرایط حس سوماتوسنسوری موقعیت بدن را تشخیص نمی‌دهد و اطلاعات دریافتی از آن قابل اعتماد و مفید نیست [۷، ۵]. متفاوت بودن نتایج حاصل از مطالعه شاید به دلیل شرایط سنی شرکت‌کنندگان و پیچیدگی استراتژی‌های کنترل وضعیت در این سن باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود مطالعات بعدی تأثیر تحریک شنیداری در وضعیت‌های دشوار تعادلی و مدت زمان واکنش در حین دادن تحریکات شنیداری را بررسی کند.

15. Hatzitaki
16. Kwak
17. Tesadel

نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد میانگین عملکرد تعادلی کودکان مبتلا به فلج مغزی تحت تأثیر تحریک شنیداری ناملاپم با شدت متفاوت (بالا و پایین) و جنس سطح اتکا (نرم یا سخت) متفاوت است. به طوری که تحریک شنیداری ملاپم با شدت پایین تأثیری در بر هم خوردن تعادل ندارد. بنابراین در نظر داشتن این عوامل در طراحی، برنامه مداخله‌ای تکلیف دوگانه بر مبنای تحریک شنیداری و یا انجام مطالعاتی در خصوص استفاده از رویکرد یکپارچگی حسی و کنترل حرکتی و بهبود کنترل تعادل ایستا مفید است.

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

در این مطالعه اصول اخلاقی لازم در پژوهش‌های علمی رعایت شد. پس از ارائه توضیحات کافی در خصوص نحوه اجرای مطالعه، از والدین کودکان واجد شرایط برای ورود به مطالعه رضایت کتبی گرفته شد. به والدین کودکان اطمینان داده شد اطلاعات مربوط به آنان محرمانه باقی خواهد ماند. محققان متعهد شدند گرچه این مداخله هیچ عوارضی ندارد، اما در صورت بروز هر مشکلی در روند مطالعه مسئول حل مشکل به شکل رایگان خواهند بود. این مطالعه هیچ هزینه مالی برای شرکت‌کنندگان نداشت.

حامی مالی

این مقاله از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه اسماعیل‌پور نوسر در گروه کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به راهنمایی جناب آقای دکتر سید علی حسینی و سرکار خانم دکتر نازیلا اکبر فهمی گرفته شده است. این مقاله حامی مالی ندارد.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از تمام کسانی که در انجام این تحقیق ما را یاری کردند و همچنین سرکار خانم مهندس هدی نبوی، مسئول آزمایشگاه ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای حمایت و اجرای آزمون تشکر و قدردانی می‌شود.

References

- [1] Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: The definition and classification of cerebral palsy April 2006. *Developmental Medicine and Child Neurology*. 2007; 109:8-14. [PMID]
- [2] Odding E, Roebroek ME, Stam HJ. The epidemiology of cerebral palsy: Incidence, impairments and risk factors. *Journal Disability and Rehabilitation*. 2006; 28(4):183-91. [DOI:10.1080/09638280500158422] [PMID]
- [3] Case-Smith J, O'Brien JC. *Occupational therapy for children and adolescents*. New York: Elsevier Health Sciences; 2014.
- [4] Soleimani F, Vameghi R, Rassafiani M, Akbar Fahimi N, Nobakht Z. Cerebral palsy: Motor types, gross motor function and associated disorders. *Iranian Rehabilitation Journal*. 2011; 9:21-31.
- [5] Akbar Fahimi N, Hosseini SA, Rassafiani M, Farzad M, Haghgoo HA. The reactive postural control in spastic cerebral palsy children. *Iranian Rehabilitation Journal*. 2012; 10(1):66-74.
- [6] Melzer I, Damry E, Landau A, Yagev R. The influence of an auditory-memory attention-demanding task on postural control in blind persons. *Clinical Biomechanics*. 2011; 26(4):358-62. [DOI:10.1016/j.clinbiomech.2010.11.008] [PMID]
- [7] Shumway-Cook A, Woollacott MH. *Motor control: Translating research into clinical practice*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
- [8] Maurer C, Mergner T, Bolha B, Hlavacka F. Vestibular, visual, and somatosensory contributions to human control of upright stance. *Neuroscience Letters*. 2000; 281(2-3):99-102. [DOI:10.1016/S0304-3940(00)00814-4]
- [9] Shumway-Cook A, Woollacott M. Attentional demands and postural control: The effect of sensory context. *Journals of Gerontology-Biological Sciences and Medical Sciences*. 2000; 55(1):M10-16. [DOI:10.1093/gerona/55.1.M10]
- [10] Magnusson M, Johansson K, Johansson BB. Sensory stimulation promotes normalization of postural control after stroke. *Stroke*. 1994; 25(6):1176-80. [DOI:10.1161/01.STR.25.6.1176] [PMID]
- [11] Kwak EE. Effect of rhythmic auditory stimulation on gait performance in children with spastic cerebral palsy. *Journal of Music Therapy*. 2007; 44(3):198-216. [DOI:10.1093/jmt/44.3.198] [PMID]
- [12] Nobahar Ahari M, Nejati V, Hosseini SA. Attentional Demands of balance under Dual Task conditions in young adults. *Iranian Rehabilitation Journal*. 2012; 10(16):66-71.
- [13] Melzer I, Benjuya N, Kaplanski J. Age-related changes of postural control: Effect of cognitive tasks. *Gerontology*. 2001; 47(4):189-94. [DOI:10.1159/000052797] [PMID]
- [14] Shumway-Cook A, Hutchinson S, Kartin D, Price R, Woollacott M. Effect of balance training on recovery of stability in children with cerebral palsy. *Developmental Medicine and Child Neurology*. 2003; 45(9):591-602. [DOI:10.1017/S0012162203001099] [PMID]
- [15] Novak I, Mcintyre S, Morgan C, Campbell L, Dark L, Morton N, et al. A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: State of the evidence. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2013; 55(10):885-910. [DOI:10.1111/dmcn.12246] [PMID]
- [16] Champagne D, Corriveau H, Dugas C. Effect of hippotherapy on motor proficiency and function in children with cerebral palsy who walk. *Physical & Occupational Therapy in Pediatrics*. 2017; 37(1):51-63. [DOI:10.3109/01942638.2015.1129386] [PMID]
- [17] Deutz U, Heussen N, Weigt-Usinger K, Leiz S, Raabe C, Polster T, et al. Impact of hippotherapy on gross motor function and quality of life in children with bilateral cerebral palsy: A randomized open-label crossover study. *Thieme E-Books & E-Journals-Neuropediatrics*. 2018; 49(3):185-92. [DOI:10.1055/s-0038-1635121] [PMID]
- [18] Gorter JW, Currie SJ. Aquatic exercise programs for children and adolescents with Cerebral Palsy: What do we know and where do we go. *International Journal of Pediatrics*. 2011; 2011: 712165. [DOI: 10.1155/2011/712165] [PMID] [PMCID]
- [19] Reilly DS, Woollacott MH, van Donkelaar P, Saavedra S. The interaction between executive attention and postural control in dual-task conditions: children with cerebral palsy. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*. 2008; 89(5):834-42. [DOI:10.1016/j.apmr.2007.10.023] [PMID]
- [20] Samuel A, Solomon MJ, Mohan D. Postural sway in dual-task conditions between spastic diplegic cerebral palsy and typically developing children. *International Journal of Health and Rehabilitation Sciences*. 2013; 2(2):91-7.
- [21] Grecco LA, Tomita SM, Christovão TC, Pasini H, Sampaio LM, Oliveira CS. Effect of treadmill gait training on static and functional balance in children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. *Brazilian journal of physical therapy*. 2013; 17(1):17-23. [DOI:10.1590/S1413-35552012005000066]
- [22] Sharif-Moradi K, Farah-Pour N. [Comparison of the balance performance of the children with spastic cerebral palsy before and after exercise therapy program (Persian)]. *Archives of Rehabilitation*. 2006; 7(1):22-8.
- [23] Ebrahimi Etri A, Asghari L. Comparison of two exercise methods on motor performance and balance in children with spastic cerebral palsy. *Journal of Rehabilitation*. 2012; 13(1):79-87.
- [24] Ismailiyan M, Marandi S, Ghardashi Afousi A, Movahedi A, Esfarjany F. Effect of progressive resistance and balance training on upper trunk muscle strength of children with cerebral palsy: A case study. *Journal of Rehabilitation*. 2016; 17(1):84-93. [DOI:10.20286/jrehab-170182]
- [25] Mutlu A, Livanelioglu A, Gunel MK. Reliability of Ashworth and modified Ashworth scales in children with spastic cerebral palsy. *BMC Musculoskeletal Disorders*. 2008; 9(1):44. [DOI:10.1186/1471-2474-9-44] [PMID] [PMCID]
- [26] Colver A. Study protocol: SPARCLE: A multi-centre European study of the relationship of environment to participation and quality of life in children with cerebral palsy. *BMC Public Health*. 2006; 6(1):105. [DOI:10.1186/1471-2458-6-105] [PMID] [PMCID]
- [27] Pavão SL, dos Santos AN, Woollacott MH, Rocha NACF. Assessment of postural control in children with cerebral palsy: A review. *Research in Developmental Disabilities*. 2013; 34(5):1367-75. [DOI:10.1016/j.ridd.2013.01.034] [PMID] [PMCID]

- [28] Riley PO, Benda BJ, Gill-Body KM, Krebs DE. Phase plane analysis of stability in quiet standing. *Journal of Rehabilitation Research and Development*. 1995; 32(3):227-35. [PMID]
- [29] Hatzitaki V, Zlfi V, Kollias I, Kioumourtzoglou E. Perceptual-motor contributions to static and dynamic balance control in children. *Journal of Motor Behavior*. 2002; 34(2):161-70. [DOI:10.1080/00222890209601938] [PMID]
- [30] Teasdale N, Simoneau M. Attentional demands for postural control: the effects of aging and sensory reintegration. *Gait & Posture*. 2001; 14(3):203-10. [DOI:10.1016/S0966-6362(01)00134-5]
- [31] Deviterne D, Gauchard GC, Jamet M, Vançon G, Perrin PP. Added cognitive load through rotary auditory stimulation can improve the quality of postural control in the elderly. *Brain Research Bulletin*. 2005; 64(6):487-92. [DOI:10.1016/j.brainresbull.2004.10.007] [PMID]
- [32] Kim SJ, Kwak EE, Park ES, Cho SR. Differential effects of rhythmic auditory stimulation and neurodevelopmental treatment/ bobath on gait patterns in adults with cerebral palsy: A randomized controlled trial. *Clinical Rehabilitation*. 2012; 26(10):904-14. [DOI:10.1177/0269215511434648] [PMID]