

بررسی قدرت گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور در افتراق پلورال افیوژن

اگزوداتیو از ترانسسوداتیو

دکتر ابراهیم رضی *، دکتر طاهره صالحی **، سید غلامعباس موسوی **، محمدرضا افضل ***

خلاصه:

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت شناخته شده پلورال افیوژن، سال‌ها قبل جهت تشخیص علل آن از معیارهای Light استفاده می‌گردد که براین اساس به دو دسته تقسیم می‌شوند. نکته اصلی معیار Light این است که در بعضی موارد بیماران با تشخیص بالیستی ترانسسوداتیو به اشتباه اگزوداتیو تلقی می‌گردند. در این موارد استفاده از گرادیان آلبومین مایع پلور و سرم برای تشخیص صحیح کمک کننده است (۱). این مطالعه نیز به منظور بررسی قدرت گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور در بیماران مبتلا به پلورال افیوژن انجام گرفت.

مواد و روشها: این مطالعه توصیفی بر روی ۷۶ بیمار مبتلا به افیوژن پلور مراجعه کننده به بیمارستان شهدید بهشتی کاشان طی سال ۱۳۷۷ صورت پذیرفت. آسپرایسیون مایع جنب در حالت نشسته جهت اندازه گیری LDH، پروتئین و آلبومین انجام شد و تیز هم زمان میزان LDH، پروتئین و آلبومین سرم ناشتا ای بیماران اندازه گیری گردید و حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی روش گرادیان آلبومین نسبت به معیار آنها تعیین شد.

یافته ها: طبق معیار آنالیز ۴۱ بیمار (۵۴ درصد) ترانسسوداتیو و ۳۵ بیمار (۴۶ درصد) اگزوداتیو بودند. در روش گرادیان آلبومین، ۴۵ بیمار (۵۹ درصد) ترانسسوداتیو و ۳۱ بیمار (۴۱ درصد) اگزوداتیو بودند. بدین ترتیب ۶ مورد اختلاف وجود داشت که طبق معیار Light مایع پلور اگزوداتیو ولی براساس معیار گرادیان آلبومین ترانسسوداتیو بودند. نظر از این موارد، بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تحت درمان با مردمی نداشتند، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی گرادیان آلبومین نسبت به معیار آنها در تشخیص پلورال افیوژن اگزوداتیو به ترتیب ۹۳/۵، ۸۲/۹، ۹۵ و ۸۶/۶۶ درصد بودند.

نتیجه گیری: حساسیت معیارهای Light در تشخیص پلورال افیوژن اگزوداتیو از روش گرادیان آلبومین بیشتر ولی ویژگی گرادیان آلبومین از معیار Light بیشتر است. بیماران، در بیمارانی که از نظر بالیستی حادثه می‌شود مایع پلور ترانسسوداتیو باشد ولی طبق معیارهای Light در گروه اگزوداتیو طبقه‌بندی می‌گردد؛ گرادیان آلبومین کمک کننده می‌باشد.

وازگان کلیدی: پلورال افیوژن، گرادیان آلبومین مایع پلور و سرم، پلورال افیوژن اگزوداتیو، پلورال افیوژن ترانسسوداتیو

* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کاشان، گروه داخلی

** دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کاشان، دانشکده بهداشت

*** دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کاشان، دانشکده پرستاری و مامایی

مقدمه


تحقیقات به عمل آمده در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ که توسط Metintas (۲) و هم‌چنین Roth (۳) و غیره انجام شده است، حساسیت معیار Light را برای موارد اگزودا از ۹۸-۱۰۰ درصد و ویژگی آن را ۸۱-۸۳ درصد ذکر می‌کنند و گرادیان آلبومین حساسیتی برابر ۶۳-۹۵ و ویژگی برابر ۸۱-۱۰۰ دارد که حساسیت معیار Light در افتراق پلورال افیوژن اگزوداتیو از روش گرادیان آلبومین بیشتر، ولی ویژگی گرادیان آلبومین از معیار Light بیشتر است. به همین منظور، این تحقیق جهت بررسی قدرت گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور در بیماران مبتلا به افیوژن پلور، بر روی ۷۶ بیمار مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال ۱۳۷۷ انجام گرفت.

مواد و روشها

پژوهش حاضر با روش کارآزمایی بالینی (Clinical trial) از نوع تشخیصی صورت پذیرفت. نمونه‌های مورد مطالعه کلیه بیماران بالاتر از ۱۴ سالی هستند که به هر دلیلی به جز آمپیم و هموتوراکس ضربه‌ای، به پلورال افیوژن مبتلا شده‌اند که به طور مستمر انتخاب گردیدند. ۷۶ نفر با این مشخصات به بیمارستان مراجعه نموده‌اند و در این مطالعه شرکت داده شده‌اند. تشخیص افیوژن مایع پلور براساس شرح حال، معاینه فیزیکی، عکس قفسه سینه، سونوگرافی و در مواردی سی‌تی اسکن ریه بوده است. همه بیماران در حالت ناشتا در وضعیت نشسته با روش دق، ماتیته و سطح مایع مشخص شد و سپس از اولین یا دومین فضای بین دندان‌ای زیر سطح مایع در خط زیر بغلی خلفی، بدون استفاده از بی‌حس کننده موضعی پس از تمیز کردن پوست، از قسمت فوکانی فضای بین دندان‌ای که پایین‌تر از سطح مایع پلور بود با سرنگ ۱۰

پلورال افیوژن یکی از بیماری‌های شایع است که علل گوناگون دارد. اولین قدم تشخیصی در پلورال افیوژن تعیین اگزوداتیو یا ترانسوداتیو بودن مایع است. افتراق این دو نوع از نظر انجام اقدام‌های درمانی مناسب و تعیین پیش‌آگهی بسیار مهم است. در نوع اگزوداتیو، بستر مویرگی پلور، ریه یا بافت اطراف به علت مشکلات پاتولوژیک نظری بدخیمی ریه، پنومونی، پارگی مری آسیب دیده است، در حالی که در نوع ترانسوداتیو پرده‌های پلور و سرهای آن سالم است ولی مشکلاتی در اثر تغییرات فشار هیدروستاتیک، فشار انکوتیک و ... موجب تجمع مایع پلور در پلور می‌شود (۱). در طول ۲۵ سال گذشته معیارهای Light شایع‌ترین شیوه افتراق این دو نوع پلورال افیوژن بوده است (۱) که در آن از میزان LDH سرم، مایع پلور و نیز پروتئین سرم و مایع پلور استفاده می‌گردد (۱). در سال‌های اخیر معیارهای بیوشیمیایی دیگری جهت افتراق این دو پدیده پیشنهاد شده است. از جمله این معیارها سطح کلسترول مایع پلور بیش از ۶۰ میلی‌گرم در دسی لیتر (۲،۳)، سطح کلسترول مایع پلور بیش از ۴۵ میلی‌گرم در دسی لیتر (۴)، گرادیان آلبومین مایع پلور و سرم مساوی یا کمتر از ۱/۲ گرم در دسی لیتر (۵) و نسبت بیلی‌روین مایع پلور به سرم بیش از ۶/۰ (۶) است. با این حال، هنوز معیارهای Light بهترین شیوه افتراق می‌باشد اما این معیار در بعضی موارد یک پلورال افیوژن ترانسوداتیو را به عنوان اگزودا ارزیابی می‌کند. در این موارد اگر مريض به طور بالینی یک افیوژن ترانسوداتیو دارد، گرادیان آلبومین باید اندازه‌گیری شود. در صورتی که گرادیان آلبومین بیشتر از ۱/۲ گرم در دسی لیتر باشد احتمالاً پلورال افیوژن ترانسوداتیو است (۱).

در این نمودار فراوانی پلورال افیوژن بر حسب علت بیماری نشان داده شده است که شایع ترین علت پلورال افیوژن نارسایی قلبی (۴۵ درصد) و سپس پاراپنومونیک افیوژن (۲۳ درصد) می باشد. در گروه ترانسوداتیو از مجموع ۴۱ بیمار مورد مطالعه ۳۱ نفر (۷۵/۶ درصد) نارسایی قلبی داشتند (شایع ترین علت در این گروه). در گروه اگزووداتیو از مجموع ۳۵ بیمار، ۱۵ مورد (۴۲/۸ درصد) پاراپنومونیک افیوژن و ۱۳ مورد (۳۷/۴ درصد) به بدخیمی مبتلا بودند. همچنانی از مجموع ۷۶ بیمار، ۵۸ نفر افیوژن مایع پلور در طرف راست و ۱۸ نفر افیوژن مایع پلور در طرف چپ داشتند. طبق روش گرادیان آلبومین ۴۵ بیمار (۵۹ درصد) ترانسودا و ۳۱ بیمار (۴۱ درصد) اگزوودا بودند. طبق معیارهای Light، ۴۱ بیمار (۵۴ درصد) ترانسودا و ۳۵ بیمار (۴۶ درصد) اگزوودا بودند (نمودار ۲).




نمودار ۲ - مقایسه فراوانی بیماران پلورال افیوژن بر حسب نوع مایع بر طبق معیار Light و گرادیان آلبومین

میلی لیتری حاوی ۰/۵ میلی لیتر هپارین وارد فضای پلور شده و ۱۰-۲۰ میلی لیتر مایع کشیده شد و هم‌زمان نمونه خون بیمار گرفته شد. LDH، آلبومین و پروتئین مایع پلور و سرم اندازه گیری گردید. سپس براساس معیارهای Light و گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور تقسیم بندی اگزوودا و ترانسودا به عمل آمد و حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مشتبه و منفی این روش تعیین شد.

یافته ها

از ۷۶ بیمار تحت بررسی، ۴۱ نفر (۵۴ درصد) مرد و ۳۵ نفر (۴۶ درصد) زن در سنین ۱۸-۹۸ سال بود. شایع ترین علل افیوژن مایع پلور عبارتند: از نارسایی قلبی (۴۵ درصد)، پاراپنومونیک افیوژن (۲۳ درصد)، بدخیمی (۲۱ درصد) (نمودار ۱).



نمودار ۱ - توزیع فراوانی ۷۶ بیمار مبتلا به پلورال افیوژن مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان بر حسب علت بیماری طی سال ۱۳۷۷

حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت (PPV) و منفی (NPV) گردایان آلبومین در مورد مایع پلور اگزوداتیو در این مطالعه به ترتیب برابر $82/9$ ، $95/1$ ، $93/5$ و $86/66$ درصد بودند و این میزان در مورد مایع پلور ترانسوداتیو به ترتیب برابر $95/1$ ، $82/9$ ، $86/7$ و $93/5$ درصد می‌باشد.

بحث

همان گونه که در مقدمه نیز ذکر شد در سال‌های اخیر مطالعه‌های مختلفی در زمینه پلورال افیوزن به عمل آمده است و معیارهای مختلفی جهت انتراق مایع پلور ترانسودا از اگزودا بیان شده است. به عنوان نمونه می‌توان به مطالعه Roth و همکاران وی (۳) اشاره کرد که در آن از مجموع ۵۹ بیمار مورد مطالعه، طبق معیارهای Light، 41 مورد اگزوداتیو و 18 مورد ترانسوداتیو بودند و با معیار گردایان آلبومین با حد مرزی $1/2$ گرم در دسی لیتر شخص شدکه 5 نفر از بیماران طبق معیار Light اگزوداتیو و طبق معیار گردایان آلبومین ترانسوداتیو بودند. علت پلورال افیوزن هر 5 بیمار نارسایی قلبی بود که تحت درمان با مدر بودند. بنابراین، طبق معیار گردایان آلبومین ترانسوداتیو طبقه‌بندی شدند و هر 5 بیمار به درمان با مدر تراپی جواب دادند. Roth و همکاران، این موارد را پسدو اگزودا نامیدند (۳). در این مطالعه اکثر موارد اختلاف تقسیم‌بندی بین روش Light و گردایان مربوط به بیماران مصرف کننده مدر می‌باشد. احتمالاً مدرها باعث افزایش سطح پروتئین مایع پلور به طور نسبی می‌شوند و در نتیجه میزان بیشتری از پروتئین غیرآلبومنی در فضای پلور تجمع می‌یابد و به دنبال آن گردایان آلبومین بیش از $1/2$ گرم در دسی لیتر می‌شود ولی اگر طبق معیارهای

موارد اختلاف این دو روش عبارت بودند از 6 بیمار که طبق معیار Light به عنوان اگزودا طبقه‌بندی شدند و براساس گردایان آلبومین ترانسودا تلقی شدند. از این 6 بیمار، 4 مورد نارسایی قلبی داشتند که تحت درمان با مدر بودند. هم‌چنین یک مورد پاراپنومونیک افیوزن و یک مورد سرطان پستان مشاهده گردید. در این مطالعه طبق معیار Light، 2 مورد مایع پلور ترانسوداتیو وجود داشت که بر طبق معیار گردایان آلبومین اگزودا بودند که هر دو مورد هیپوآلبومنی داشتند (جداول ۱ و ۲).

جدول ۱ - مقایسه پلورال افیوزن اگزوداتیو بر طبق معیار گردایان آلبومین با معیار Light

		تشخیص اگزودا با معیار گردایان آلبومین	
		تشخیص اگزودا با معیار Light	تشخیص اگزودا با معیار گردایان آلبومین
جمع	منفی	مثبت	مثبت
۳۱	۲	۲۹	۲
۴۵	۳۹	۶	۳۹
۷۶	۴۱	۳۵	۴۱
		جمع	جمع

$$\text{درصد } 82/9 = \text{حساسیت} \quad \text{درصد } 95/1 = \text{ویژگی}$$

$$\text{NPV} = 86/7 \quad \text{PPV} = 93/5 \quad \text{درصد } 93/5 = \text{درصد مایع پلور}$$

$$\text{کارآیی eff} = 89/5$$

جدول ۲ - مقایسه پلورال افیوزن ترانسوداتیو بر طبق معیار گردایان آلبومین با معیار Light

		تشخیص ترانسودا با معیار گردایان آلبومین	
		تشخیص ترانسودا با معیار Light	تشخیص ترانسودا با معیار گردایان آلبومین
جمع	منفی	مثبت	مثبت
۴۵	۶	۳۹	۶
۳۱	۲۹	۲	۲۹
۷۶	۴۱	۳۵	۴۱
		جمع	جمع

$$\text{درصد } 95/1 = \text{حساسیت} \quad \text{درصد } 82/9 = \text{ویژگی}$$

$$\text{NPV} = 93/5 \quad \text{PPV} = 86/7 \quad \text{درصد } 86/7 = \text{درصد مایع پلور}$$

بنابراین، نتیجه گرفته می شود که معیار Light برای جدایی پلورال افیوژن اگزوداتیو از ترانسوداتیو بهترین روش می باشد و گرادیان آلبومین در بیمارانی که تحت درمان با مدر می باشند مفید است.

نتیجه گیری

حساسیت معیارهای Light از روش گرادیان آلبومین در تشخیص پلورال افیوژن اگزوداتیو بیشتر است و بنابراین بهترین معیار اختراق مایع پلور اگزوداتیو از ترانسوداتیو است ولی گرادیان آلبومین از ویژگی بیشتری در مقایسه با معیارهای Light جهت تشخیص پلورال افیوژن اگزوداتیو برخوردار است. از این رو، در بیمارانی که از نظر بالینی به نظر می رسد مایع پلور ترانسودا است ولی طبق معیارهای Light اگزودا گزارش شده است. پیشنهاد می گردد گرادیان آلبومین اندازه گیری شود و در صورتی که گرادیان آلبومین بیشتر از $1/2$ گرم در دسی لیتر بود، مایع به عنوان ترانسوداتیو در نظر گرفته شود.

اندازه گیری شود نسبت پروتئین مایع پلور به سرم Light بالا است و مایع اگزودا تلقی می شود. در این مطالعه حساسیت و ویژگی معیارهای Light در تشخیص مایع پلور اگزودا به ترتیب 100 و 72 درصد بوده و حساسیت و ویژگی گرادیان آلبومین به ترتیب 95 و 100 درصد است. بنابراین، گرادیان آلبومین پلور و سرم در موارد مایع پلور اگزوداتیو (بر طبق معیار Light) و شک بالینی ترانسوداتیو - به خصوص هنگامی که بیمار مدر دریافت می کند - کمک کننده می باشد (۳).

به همین ترتیب مطالعهای توسط Metintas به عمل آمد که حساسیت و ویژگی مایع پلور اگزوداتیو بر طبق گرادیان آلبومین به ترتیب 63 و 81 درصد بود و بر طبق معیار Light حساسیت و ویژگی آن به ترتیب 100 و 81 درصد بود (۲).

مطالعه Burgess بیانگر آن است که در این مطالعه نیز حساسیت و ویژگی مایع پلور اگزوداتیو بر طبق معیارهای Light به ترتیب 98 و 83 درصد و حساسیت و ویژگی گرادیان آلبومین به ترتیب 87 و 92 درصد بود (۴).

References:

1. Light RW., Diagnostic principles in pleural disease. Eur Respiratory J. 1997; 10: 476-481.
2. Metintas M. Alatas O. Alatas F., Comparative analysis of biochemical parameters for differentiation of pleural exudates from transudates lights criteria, cholesterol, bilirubin, albumin gradient, alkaline phosphatase, creatine kinase and uric acid. Clin Chim Acta. 1997; 264: 149-162.
3. Roth BJ. O'meara TF. Cragun WH., The serum effusion albumin gradient in the evaluation of

pleural effusion. Chest 1990; 98: 546-549.

4. Burgess LJ. Mari FJ. Taljwrd., Comparative analysis of the biochemical parameters used to distinguish between pleural transudates and exudates. Chest 1995; 107: 1604-1609.