

بررسی فراوانی گنوكوک در بیماران مبتلا به سرویسیت و مقاومت داروئی آن در

مراجعین به درمانگاه تخصصی زنان در کاشان، نیمه اول سال ۱۳۸۰

دکتر زهره طبی^۱، دکتر احمد خورشیدی^۲، دکتر مریم علینقی پور^۳، زهره سادات^۴، حسین اکبری^۵

خلاصه

ساخته و هدف: با توجه به شیوع نسبتاً بالای عفونت سرویسیت و عوارض مهیّه پرون PID که مسکن است منجر به نازایی گردد، همچنین عدم اطلاع از وضعیت فراوانی سرویسیت گنوكوکی و مقاومت دارویی آن در این منطقه، تحقیق جهت تعیین فراوانی آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی شهر کاشان در نیمه اول سال ۱۳۸۰ انجام پذیرفت.

مواد و روشها: پژوهش حاضر به روش توصیفی بر روی بیماران مبتلا به سرویسیت انجام شد. پس از معاینه بالینی و تأیید سرویسیت، نمونه‌گیری از آندوسرویسیت و کشت در محیط تایرمارین انجام شد و حساسیت آنتی‌بیوتیکی آنها تعیین گردد. میزان الودگی سرویسیت با گنوكوک و الگوی مقاومت دارویی آنها تعیین شد و با خصوصیات دموگرافیک در پرسشنامه ثبت و اطلاعات با آمار توصیفی ارائه گردید.

یافته‌ها: از ۳۱۵ مورد دخانم مبتلا به سرویسیت ۲ نفر (۰/۶٪) مبتلا به سرویسیت گنوكوکی بودند که هر دو مورد کمتر از ۲۵ سال داشتند. شروع فعالیت جنسی هر دو مورد زیر ۲۰ سال بود و هر دو مورد علامت ادراری از قبیل سوزش و تکror ادرار را ذکر می‌کردند. یک مورد مقاومت به وانکومایسین و یک مورد مقاومت به سفتراکسون دیده شد.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: شیوع گنوكوک در مبتلایان به سرویسیت جامعه مورد بررسی، جدی و مسئله دار نیست و نیست. بیماران مورد نظر به داروهای رایج حساس می‌باشند، لذا تگرایی خاصی مطرح نیست.

وازگان کلیدی: سرویسیت، گنوكوک، PID.

۱- دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه زنان

۲- دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه میکروبیولوژی

۳- دانشگاه علوم پزشکی کاشان - گروه مامایی

۴- دانشگاه علوم پزشکی کاشان - گروه آمار

میسر می شود. آندوسروپیکس بیشترین مکان برای کشت مثبت در زنان به حساب می آید (۶).

در صورت عدم درمان مناسب سرویسیت سمعک است عفونت صعود کند و منجر به *PID* و در نهایت منجر به نازابی، آرتربیت، آندوکاردیت و آبسه های لگنی گردد (۳).

با توجه به فراوانی سرویسیت گنوكوکی در مناطق مختلف دنیا و خطراتی از قبیل نازابی، آندوکاردیت، آرتربیت و با توجه به تفاوت هایی که در آمارهای کشورهای مختلف موجود می باشد، به منظور تعیین شیوع گنوكوک در بیماران مبتلا به سرویسیت و نیز تعیین میزان مقاومت داروئی آن، این تحقیق روی مراجعین به درمانگاه های تخصصی زنان شهرستان کاشان در نیمه اول سال ۱۳۸۰ انجام گرفت.

مواد و روش ها

این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود. نمونه گیری از بیماران مبتلا به سرویسیت مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی زنان بیمارستان شبیه خوانی و کلینیک های خصوصی شهر کاشان انجام شد. زنان متاهل که در سینین ۴۵-۱۵ سال قرار داشته و مبتلا به سرویسیت با علامت ترشح واژینال با خونریزی پس از تماس جنسی بوده و در یک ماه اخیر هیچ آنتی بیوتیکی مصرف نکرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. فرم جمع آوری اطلاعات مربوط به کلیه بیماران شامل موارد زیر بود: میزان تحصیلات، سن ازدواج، تعداد زایمان، تعداد، دفعات مقاربت در هفته، سابقه سقط، خونریزی نامرتب قاعده گی، خونریزی پس از تماس جنسی، درد موقع نزدیکی، درد موقع قاعده گی.

مقدمه

به التهاب ابی تلیوم و استرومای سروپیکس سرویسیت گویند. بسته به نوع ابی تلیوم در گیر علت آن فرق می کند. ابی تلیوم اکتوسروپیکس در اثر میکرو اور گانیسم هایی که مسئول واژینت هستند، دچار التهاب می شود (مثل تریکومونا، کاندیدیا و ویروس هرپس سیمپلکس)، در مقابل نیسرا گنوره، کلامیدیا تراکومایتیس و باکتریهای هوایی و بیهوایی ابی تلیوم غده ای آندوسروپیکس را آلوده می سازند و مسئول آندوسروپیکس موکوسی چرکی می باشند (۱).

گنوره یک عفونت شایع باکتریال (کوکسی گرم منفی) است که از طریق جنسی یا قبل از تولد از مادر به کودک منتقل می شود. در صورت صعود عفونت به قسمت فوقانی دستگاه تناسلی منجر به التهاب نوله های فالوب خواهد شد. که یکی از شایعترین علل نازابی زنان در دنیا می باشد. شیوع عفونت گنوره در ایالات متحده آمریکا رو به کاهش است و در بسیاری از کشورهای صنعتی تایید شده است (۲).

گنوره یکی از شایع ترین بیماری های پر سروصدای در آمریکا می باشد و هر سال حدود یک میلیون مورد جدید گزارش می شود (۳). در کشور چین میزان عفونت گنوكوک در بیماران مبتلا به سرویسیت ۳/۲-۱۲/۸ درصد گزارش شده است (۴).

در ایالات متحده آمریکا میزان عفونت اولیه سروپیکس با نیسرا گنوره را ۱۱/۶٪ گزارش نموده اند (۵).

تشخیص دقیق گنوره با کشت میکرو اور گانیسم در محیط های کشت اختصاصی نظری آگار، تایر - مارتین

بود. در زنانی که سن ازدواج آنها بالای ۲۰ سال بود چنین عارضه‌ای وجود نداشت.

۶۲ بیمار (۱۹/۷٪) علائم ادراری یا سوزش ادرار را اعلام داشتند. ۲ نفر مبتلا به سرویسیت و گنوکوک نیز دارای علائم بالینی عفونت ادراری. سوزش و تکرر ادراری بودند.

تمام بیماران مبتلا به سرویسیت دارای ترشح چرکی موكوسی از آندوسرویکس بودند و در دو مورد بیمار سرویسیت گنوکوکی یکی هیرتروفوی سرویکس و دیگری التهاب سرویکس وجود داشت. از بیماران مبتلا به سرویسیت ۲۴ نفر (۰/۷/۶٪) یکبار در هفته مقاریت داشته و از میان ۲۳۷ نفر که تعداد مقاریت ۱-۲ بار در هفته داشتند یک نفر مبتلا به سرویسیت گنوکوکی بود. از میان ۵۴ نفر دیگر (۰/۱۷/۲٪) دیگر که تعداد مقاریت ۳-۴ بار در هفته داشتند یک نفر مبتلا به سرویسیت گنوکوکی بود.

هیچ یک از بیماران مبتلا به سرویسیت گنوکوکی سابقه سقط یا درد موقع نزدیکی را ذکر نمی‌کردند. از ۳۱۵ بیمار مبتلا به سرویسیت ۲۵ نفر (۰/۸٪) خونریزی پس از تماس جنسی داشتند که هیچ کدام سرویسیت گنوکوکی نداشتند.

۱۱ نفر (۳/۵٪) سابقه ترشح چرکی در همسر را ذکر می‌کردند ولی هیچ کدام از نظر عفونت با گنوکوک مثبت نبودند. هیچ کدام از بیماران مبتلا به سرویسیت گنوکوکی سابقه علائم ادراری در همسر و عفونت چشمی نوزاد را ذکر نکردند.

یک مورد از مبتلایان به سرویسیت گنوکوکی به وانکومایسین و یک مورد به سفتریاکسون مقاوم بودند. هر دو مورد مبتلا به سرویسیت گنوکوکی به بقیه داروها حساس بودند.

بحث

روش جلوگیری از بارداری، علائم ادراری، سابقه عفونت قبلى دستگاه تناسلی، سابقه عفونت چشمی نوزاد، سابقه علائم ادراری و ترشح چرکی در همسر، نمای ظاهری سرویکس در معاشه بالینی و سابقه مصرف دارو و میزان بهبودی.

پس از معاشه بالینی بیمار توسط متخصص زنان و زیمان و تایید سرویسیت، نمونه‌گیری از آندوسرویکس به روش استریل انجام و در محیط کشت تایر-مارتن کشت داده شد. پس از تایید عفونت گنوکوکی ماکروسکوبی و میکروسکوبی توسط متخصص میکروبیولوژی، حساست آنتی‌بیوتیکی به روش Kirby-baer با استفاده از آنتی‌بیوتیکهای سپروفلوکساسین، کوتربیومکازول، پنی‌سیلین، اربترومایسین، سفترياکسون، کلامفینیکل و وانکومایسین تعیین گردید و در پرسشنامه مربوطه ثبت شد.

اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی ارائه گردید.

یافته‌ها

از ۳۱۵ خانم مبتلا به سرویسیت ۲ نفر (۰/۰/۶۳٪) مبتلا به سرویسیت گنوکوکی بودند که سن هر دو مورد آنها کمتر از ۲۵ سال بود. در واقع از ۱۶ نفر مبتلایان به سرویسیت که کمتر از ۲۰ سال سن داشتند، ۱ نفر (۰/۷/۲٪) و از ۷۸ نفر خانم تا ۲۵ ساله نیز ۱ نفر (۰/۱/۳٪) از نظر گنوکوک مثبت بود. در ۲۲۱ نفر بقیه که بیشتر از ۲۵ سال سن داشتند، فرد مبتلا دیده نشد.

سن شروع فعالیت جنسی در این تحقیق سن ازدواج آنها تلقی شد. من شروع فعالیت جنسی در ۲۰ مورد مبتلا کمتر از ۲۰ سال بود. تعداد ۲۵۲ نفر (۸۰٪ نمونه‌های مورد بررسی) سن ازدواج کمتر از ۲۰ سال داشتند که ۲ مورد آنها (۰/۰/۷۹٪) مبتلا.

روش جلوگیری از بارداری در ابتلا بیمار به عفونتهای مقاربته موقت می‌باشد به طوری که در استفاده کنندگان از کاندوم هیچ مورد از بیماری مقاربته گزارش نشده است و کاندوم به صورت ۱۰۰ درصد از انتقال گنوکوک، کلامیدیو و HIV جلوگیری می‌کند (۶).

در این مطالعه هر دو مورد مبتلا به سرویست گنوکوکی علائم ادراری همراه از قبیل سوزش ادرار و تکرار ادرار را ذکر کردند که عفونت همزمان چند دستگاه با گنوره گزارش شده است (۷).

نمای سرویکس در بیماران مبتلا به سرویست گنوکوکی در یک مورد علاوه بر ترشح موکوسی - چرکی از آندوسرویکس التهاب بود و در مورد دیگر هپرترووفی سرویکس وجود داشت. در این تحقیق از بیماران مبتلا به سرویست گنوکوکی حساسیت دارویی به عمل آمد که یک مورد به وانکومایسین و دیگری به سفتریاکسون مقاوم و به داروهای دیگر حساس بودند. در تحقیقی که در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط مراد نژمانا و همکارانش در اندونزی و به عمر آمد از ۴۰ بیمار مبتلا به عفونت گنوکوکی سرویکس تمام موارد به تراسایکلین مقاوم و به سیروفنوکسازین و سفتریاکسون حساس بودند (۸).

در پایان می‌توان گفت شیوع گنوکوک در مبتلایان به سرویست منطقه کاشان جدی و مستله‌دار نیست. بعلاوه این عارضه نسبت به داروهای رایج حساس می‌باشد. لذا نگرانی از این لحاظ در منطقه وجود ندارد.

نتایج به دست آمده در این پژوهش بر روی ۳۱۵ نمونه مورد مطالعه نشان داد که میزان فراوانی گنوکوک در بیماران مبتلا به سرویست ۶۳٪ بود. در پژوهشی که توسط Luo-L در سال ۱۹۹۹ در چین بر روی ۱۸۰۰ خانم مبتلا به سرویست انجام شد. ۳/۲-۱۲/۸ درصد از نظر گنوکوک مثبت بودند (۴). در پژوهش دیگری که توسط Oh-MK همکاران در سال ۱۹۹۶ در آمریکا در مورد شیوع سرویست گنوکوکی انجام شد، از ۲۱۶ خانمی که از نظر جنسی فعال بودند میزان عفونت اولیه سرویکس با کلامیدیاتراکوماتیس ۲۳/۲٪ و با گنوکوک ۱۱/۶٪ بود (۵).

دلیل این گوناگونی و تفاوت آمار می‌تواند به علت رعایت موازن شرع مقدس اسلام و عدم وجود شرکای جنسی متعدد باشد. از ۹۴ بیمار مبتلا به سرویست زیر سن ۲۵ سال ۲ مورد مبتلا به عفونت گنوکوکی بودند و با افزایش سن کاهشی در میزان ابتلا به سرویست دیده می‌شود، به طوری که سنین ۴۰ سالگی و بالاتر فراوانی سرویست به ۱۱/۷٪ می‌رسد. در نتایج ذکر شده است که سرویست پیشتر در سنین اوائل دوران باروری (۱۵-۲۴) سال دیده می‌شود.

عفونت گنوکوکی علاوه بر داشتن ارتباط با سن پائین در افراد زیر شایعتر می‌باشد: جمعیتهای شهری، گروههای پائین که از نظر اجتماعی- اقتصادی متعدد می‌باشند، افرادی که دارای شرکای جنسی متعدد، زنانی که اولین مقاربت خود را در سنین پائین تری تجربه می‌کنند، زنانی که شرکای جنسی آنها دارای ترشحات پیشابری‌هی یا مبتلا به سوزاک هستند (۷).

References:

- 1- David E. Spore, Jonathan S. Verk Novak,s Gynecology 12th ed Valtimor williams & wilins 1996 page 429-443.
- 2- Maclell, Coulas, and Vannett.s Pricilis and Pracits of ininfectious dieseses fifth edition churchill liningstone 2000 volume 4 (page: 2422-2455).
- 3- Jarry J. Copeiland Texthbook of Gynecology 2th ed Philadelphia saunders company 2000 : 77-797.
- 4- Luo L, WV SZ, Chen J, Yeying, Li, Gao B, Luo J Stuey on genital tract chlamydia trachomatis and gondoicoccal infection in Han and Minority (Naxi and Dai) Women in chian. *Obestet. Gynecol. Res* 1999 jun 25 (3): 221-230.
- 5- Oh MK, clond GA Fleenor M. risk for gonococcal and chlamydial cervisitis in adilescent females. *Indicentee and recurerence in a prospective cohort study*. *Addesc Health* 1996 Apr; 18 (4): 270-275.
- 6- Jawetz, Melnick, adelberg,s Medical Microbiology. Twnty – first edition midle- east editon norwalk, connectiactesan mateo califounia 1998. 262-264.
- 7- Kenneth j. yan, Ruth e tuomala Kistner.s gynecology & women. health seventh edition phicaldelphia Mosby 199. 455-465.
- 8- Muroad lesmana, carlos l. leron, invitior antibiotic susrptibility of nisseria gonorrhiea in Jakarta, indonesia. *Antimicrobial agent and chimo therapy* jan 2001 35-362.