

بررسی فراوانی تریکوسترونژیلوس در لوله گوارش گوسفتند و بزهای ذبح شده در کشتارگاه کاشان، سال ۱۳۸۱

صغر علی طلاری^۱، محسن اربابی^۲

خلاصه

سابقه و هدف: با توجه به نقش احتمالی انگل‌های لوله گوارش حیوانات اهلی در انتقال آلدگی به انسان، شیوع متفاوت آنها و عدم اطلاع از وضعیت آلدگی نشخوار کنندگان در کشور، این مطالعه به منظور تعیین فراوانی آلدگی به *Trichostrongyloidae* در لوله گوارش دامهای ذبح شده در کشتارگاه کاشان، سال ۱۳۸۱ صورت پذیرفت.

مواد و روش‌ها: تحقیق به روش توصیفی و تصادفی بر روی ۱۵۸ دام که در کشتارگاه کاشان ذبح شدند، انجام گرفت. کلیه قسمتهای لوله گوارش حیوان جدا و در ظرف فرمالین ۱۰ درصد قرار داده شد، سپس جهت تشخیص آلدگی انگل به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده پزشکی کاشان منتقل گردید. اطلاعات مربوط به دامها از قبیل: جنس، نوع دام، محل آناتومیک و شدت آلدگی در فرم اطلاعاتی ثبت شد. داده‌های فرم اطلاعاتی طبق‌بندی و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: از ۱۵۸ دام مورد آزمایش ۸۰ راس گوسفتند و ۷۸ راس بز بودند. آلدگی کرمی در گوسفتندان ۸۷/۵ درصد و در بزها ۸۳/۳ درصد بود، ضمن آنکه آلدگی به تریکوسترنژیلوس آ در کلیه نمونه‌ها در جنس ماده پیشتر از جنس نر و بیشترین شدت آلدگی به یک انگل ۳۲/۹ درصد بود. بیشترین موارد آلدگی در روده باریک گوسفتندان و بزها، نماتودیروس نواراتیانوس با شیوع ۷۳/۷ و ۶۴ درصد و در شکمبه و نگاری، مارشالاژیا مارشالی به میزان ۸۰ و ۸۳ درصد بود.

نتیجه‌گیری: آلدگی به تریکوسترنژیلوس آ در دامهای مورد مطالعه از شیوع بالایی برخودار بود. با توجه به نقش احتمالی انگل‌ها در انتقال آلدگی به انسان باید اقدامات کنترلی و درمانی صورت گیرد. همچنین تحقیقات بیشتر در خصوص روش‌های پیشگیری و کنترل آلدگی توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: تریکوسترونژیلوس، گوسفتند، بز، کشتارگاه کاشان

۱- دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی، گروه انگل شناسی

۲- مری، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی، گروه انگل شناسی

پاسخگو: دکتر صفرعلی طلاری

کاشان، کیلومتر ۵ جاده راوند، بیمارستان شهید بهشتی

در ایران شیوع آلدگی به انواع تریکوسترنژیلوس در گوسفتندان ۱۷-۵۸ درصد و در بزها ۲۲-۳۵٪ درصد، آلدگی به نماتودیروسهای در گوسفتندان ۷۲-۱۰ درصد و در بزها ۷۶-۲٪ و آلدگی کرمی شکمبه و نگاری در گوسفتندان ۸۶ درصد و در بزها ۳۸٪ درصد گزارش شده است (۳ و ۴ و ۵ و ۶).

آلدگی به انگل‌های فوق می‌تواند موجب بی‌اشتهاای، کاهش رشد، کاهش تولیدات دامی، توقف رشد اسکلت بندی و در صورت آلدگی شدید باعث تلف شدن دام گردد (۴ و ۷).

با توجه به تنوع آب و هوایی و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف ایران، محققین و سازمانها بدون هماهنگی و اطلاع کافی از عملکرد سایر همکاران و مؤسسات، در زمینه‌های خاصی از بیماریهای مشترک، اقداماتی صورت داده‌اند که متأسفانه نتایج کاملی دربرنداشته است. برای جلوگیری از زئونوزها لازمست از

مقدمه

بسیاری از انگل‌های خانواده تریکوسترنژیلوس بین انسان و حیوان، مشترک هستند و انتشار جهانی دارند. قابلیت انتقال برخی از این انگل‌ها از حیوانات گیاهخواری مثل گوسفتند، بز و گاو به انسان وجود دارد. انگل‌های این خانواده، موجوداتی کوچک، قادر به دهان و یا با دهان کوچک بدون تاج برگدار و فاقد دندان می‌باشند. در کرمهای نر کیسه جفتگیری رشد زیادی کرده و از دو قطعه جانبی و یک قطعه میانی تشکیل شده است. عده انگل‌های این خانواده در روده باریک گوسفتند، بز، گاو، گاویش، شتر، اسب و سایر مهره‌داران وجود دارند. مهمترین جنسهای انگلی این خانواده تریکوسترنژیلوس، اوسترتاژیا، نماتودیروس، نماتودیرلا، کوپریا، مارشالاژیا، کاملوسترونژیلوس، همونکوس، پاراکوپریا و میستوسایروس می‌باشند (۱ و ۲).

می شد. کرمها پس از جداسازی و شمارش در فرمالین ۱۰ درصد فیکس می شدند.

نماتودها با لاکتوفنل آزوکارمین شفاف و اجزای مختلف کرم با استفاده از کامروالوسیدا اندازه گیری می گردید. تخم کرمهاش جدا شده از محتویات روده با استفاده از میکروسکوپ نوری شناسایی و شدت آلدگی توسط متخصص انگل شناسی و با استفاده از کلیدهای تشخیصی شناسایی (۸) تعیین می شد. داده های فرم اطلاعاتی طبقه بندی و نتایج به صورت آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی گزارش گردید.

نتایج

از ۱۵۸ دام مورد آزمایش ۸۰ رأس (۵۰/۶ درصد) گوسفند، ۷۸ رأس (۴/۴۹ درصد) بز بودند. از مجموع گوسفندان مورد بررسی ۶۷ رأس ماده (۷/۸۳ درصد) و ۱۳ رأس نر (۳/۱۶) درصد) و از بزها ۶۶ رأس (۶/۸۴ درصد) ماده و ۱۲ رأس (۴/۱۵ درصد) نر بودند.

شیوه آلدگی کرمی در گوسفندان ۸۷/۵ درصد و در بزها ۸۳/۳ درصد بود. جدول ۱ توزیع فراوانی آلدگی دامهای مورد مطالعه به انگلهای روده ای را نشان می دهد.

شرابط خاص هر یک از آنها، داشتن میزانهای مختلف، راههای انتقال، اختلاف در پراکنده‌گی و... اطلاعات کافی موجود باشد. با توجه به عوامل مختلف فوق، این بررسی به منظور تعیین شیوع انگلهای خانواده تریکوسترنیزیلوس در روده باریک دامهای ذبح شده در کشتارگاه کاشان در سال ۱۳۸۱ انجام پذیرفت.

مواد و روش‌ها

این مطالعه توصیفی با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، روی ۱۵۸ نشخوارکننده که در کشتارگاه کاشان ذبح شده بودند، انجام پذیرفت. حجم نمونه با شیوع ۳/۸۸ درصد و با اطمینان ۹۵ $N=2pq/d^2$ درصد و خطای قابل قبول $0/05$ با توجه به فرمول تعیین گردید. پس از هماهنگی با مسوولین کشتارگاه و ارائه آموزش‌های لازم به تیم تحقیق، هر ماه ۲ بار به کشتارگاه مراجعه و پس از کالبدگشایی حیوان کلیه قسمتهای لوله گوارش حیوان جدا می گردید. اطلاعات مربوط به نمونه‌ها از قبیل جنس، نوع دام و محل آناتومیک، در فرم اطلاعاتی ثبت می شد. در آزمایشگاه، روده در تست استیل به وسیله قیچی روده براز و محتویات آن از الک نمره ۴۰ عبور داده می شد مایع عبور داده شده از الک رسوب گیری و به وسیله استریو میکروسکوپ از نظر آلدگی انگلی بررسی

جدول ۱ - توزیع فراوانی انگل های جدا شده از لوله گوارش دامهای مورد مطالعه در کشتارگاه کاشان، سال ۱۳۸۱

نوع دام	$N=80$				نوع انگل
	گوسفند	روده باریک	شکمبه و نگاری	جمع	
نژاد	نژاد	نژاد	نژاد	نژاد	نژاد
۲۶	۳	۲۳	۳۹	۸	۳۱
(۳۳/۳)	(۳/۸)	(۲۹/۵)	(۴۸/۷)	(۱۰)	(۳۸/۷)*
۲۹	۹	۲۰	۴۴	۱۵	۲۹
(۳۷/۲)	(۱۱/۵)	(۲۵/۶)	(۵۵)	(۱۸/۷)	(۳۶/۲)
۲۲	-	۲۲	۲۸	-	۲۸
(۲۸/۲)		(۲۸/۲)	(۳۵)		(۳۵)
۶	۴	۲	۲۶	۱۲	۱۴
(۷/۷)	(۵)	(۲/۵)	(۳۲/۵)	(۱۵)	(۱۷/۵)
۲۴	۲۴	-	۴۷	۴۷	-
(۳۰/۷)	(۳۰/۷)		(۵۸/۷)	(۵۸/۷)	
۱۸	۱۸	-	۲۹	۲۹	-
(۲۳)	(۲۳)		(۳۶/۲)	(۳۶/۲)	
۶۵	۶۵	-	۶۴	۶۴	-
(۸۲/۳)	(۸۳/۳)		(۸۰)	(۸۰)	
۳۰	۳۰	-	۳۶	۳۶	-
(۳۸/۵)	(۳۸/۵)		(۴۵)	(۴۵)	
۵۰	-	۵۰	۵۹	-	۵۹
(۶۴)		(۶۴)	(۳/۷)		(۳/۷)
۳۹	-	۳۹	۳۱	-	۳۱
(۵۰)		(۵۰)	(۳۸/۷)		(۳۸/۷)
۱۰	-	۱۰	۸	-	۸

(۲۰)	(۲۰)	(۱۰)	(۱۰)
۵۵ (۷۰/۵)	۵۵ (۷۰/۵)	-	۲۲ (۲۷/۵)
۷	۷	-	۳ (۳/۷)
(۱۰)	(۱۰)	-	(۳/۷)
۵۴ (۶۹/۲)	۵۴ (۶۹/۲)	-	۵۸ (۷۲/۵)
۴۱ (۵۲/۵)	۴۱ (۵۲/۵)	-	۳۵ (۴۳/۷)
۲۹ (۳۷/۲)	۲۹ (۳۷/۲)	-	۴۳ (۵۳/۷)

* اعداد داخل پرانتز بیانگر درصد می باشد .

آکسی ای به میزان ۵۸/۷ درصد و در بزرها مربوط به تریکوسترنزیلوس ویرتیوس به میزان ۳۷/۲ درصد بود.

Torina و همکارانش در ایتالیا از ۷۲ گوسفند مورد بررسی ۲۳ گونه انگل جدا کردند که ۷۸ درصد آلدگی مربوط به تریکوسترنزیلید بود (۹). طی مطالعه Fritsche در گامبیا که بر روی ۱۵۴ گوسفند و بزر انجام گردید ۱۶ گونه انگل جدا شد. ۹۷ درصد دامها آلدگی داشتند و شیوع آلدگی به تریکوسترنزیلوسها در مطالعه همونکوس کونتورتوس ۷۷ درصد و انواع کوپریا ۴۵ درصد بود (۱۰). با مطالعه Bonföh و همکارانش در توگو که بر روی ۱۱۹ گوسفند و بزر انجام گردید، شیوع تریکوسترنزیلوسها را ۹۹ درصد، همونکوس کونتورتوس ۸۲ درصد، کوپریا ۴۳ درصد و ازو فاگوستوم ۴۰ درصد به دست آمد (۱۱).

مطالعه Colwell در liberta نشان داد که در فصل تابستان ۸۰ درصد گوسفندان به کرمهای روده ای آلد هستند (۱۲). طی مطالعه fakae در نیجریه آلدگی انگلی در دامها به همونکوس کونتورتوس ۱/۸۷ درصد و ترکوسترنزیلوسها و کوپریا ۱۷/۲ درصد بود (۱۳). مطالعه Valcarcel در اسپانیا در سال ۱۹۹۹ آلدگی به انواع نماتودها در بزرها را ۹۳ درصد و بیشتر در جنس ماده و فصل تابستان و پاییز گزارش نمود (۱۴).

Theodoridis و همکارانش با مطالعه بر روی لوله گوارش ۱۰۲ گوسفند و بزر، آلدگی گوسفندان را به انواع کرمها ۹۶ درصد و بزرها را ۱/۹۳ درصد گزارش کردند (۱۵). Uriarte در اسپانیا در سال ۲۰۰۳ نشان داد که ۷۰ درصد گوسفندان به همونکوس کونتورتوس آلد هاند و بیشترین موارد آلدگی در فصل تابستان می باشد (۱۶). مطالعه Azazy که بر روی دستگاه گوارش ۴۸ گوسفند و بزر در جده عربستان انجام گرفت، شیوع نماتودها در گوسفندان و بزرها را به ترتیب ۴۷/۹ و ۸/۴ درصد گزارش کرد (۱). اسلامی و همکاران در سال ۱۹۷۶ بیشترین موارد آلدگی انگلی روده ای در گوسفندان و بزرها را

نتایج تحقیق نشان داد در کلیه دامهای مورد مطالعه، آلدگی روده باریک به نماتودها در جنس ماده بیشتر از جنس نر بود. همچنین یک انگل بیشترین شدت آلدگی (۳۲/۹ درصد) کمترین و چهار انگل بیشتر، شدت آلدگی ۲/۵ درصد را ایجاد کرده بودند (جدول ۲)

جدول ۲ - توزیع شدت آلدگی به نماتودهای لوله گوارش دامهای مورد مطالعه در کشتارگاه کاشان، سال ۱۳۸۱

دام آلد	شلت آلدگی	درصد	تعداد
یک انگل	۵۲	۳۲/۹	
دو انگل	۳۴	۲۱/۵	
سه انگل	۱۶	۱۰/۲	
چهارانگل و بیشتر	۴	۲/۵	
بدون انگل	۵۲	۳۲/۹	
جمع	۱۵۸	۱۰۰	

بحث

تحقیق همچنین نشان داد که آلدگی در ۱۵۸ دام مورد بررسی شیوعی برابر با ۷۹/۷ درصد داشت. تعداد ۱۶ گونه کرمی جدا شد که بیشترین موارد آنها ۶ گونه تریکوسترنزیلوس بودند. آلدگی در گوسفندان ۸۳/۳ درصد، در بزرها ۸۷/۵ درصد و شیوع آلدگی در جنس ماده بیشتر از جنس نر برآورد گردید.

در این پژوهش بیشترین موارد آلدگی در روده باریک گوسفندان و بزرها مربوط به نماتودیروس Θآرایتانوس با شیوع ۷/۷ و ۶۴ درصد و کمترین آنان در گوسفندان نماتودیروس فیلیکولیس به میزان ۱۰ درصد و در بزرها تریکوسترنزیلوس اسکریابینی به میزان ۲/۵ درصد بود. همچنین بالاترین آلدگی به تریکوسترنزیلوسها در گوسفندان مربوط به تریکوسترنزیلوس

شیوع بالای آلدگی انگلی در شکمبه و نگاری دامها موجب عوارضی از قبیل: بی اشتہایی، کاهش رشد، اسهال، کاهش وزن و کاهش فرآوردهای دامی نظیر شیر و پشم می‌شود. از طرفی کاهش آلبومین خون در برخی موارد منجر به مرگ می‌شود، لذا شناخت آلدگیهای انگلی در مناطق مختلف کشور می‌تواند در امر پرورش دامها مؤثر واقع شود و از زیانهای اقتصادی ناشی از آلدگی دامها جلوگیری کند.

در این بررسی ۲۸/۷ درصد گوسفندان و ۲۰/۵ درصد بزها به انگلهاهی مشترک و غیرمشترک آلدود بودند و شدت آلدگی در آنها نشاندهنده بیشترین شیوع آلدگی به یک انگل به میزان ۹/۳۲ درصد و کمترین آن به چهار انگل بیشتر به میزان ۲/۵ درصد بود.

شیوع بالای آلدگی انگلهاهی مشترک و شدت آنها در دامهای مورد مطالعه را مربوط به شرایط متفاوت جغرافیایی، آب، هوایی و اکولوژیک، آداب و رسوم مردم، وضعیت بهداشتی حیوانات، آلدگی احتمالی آب آشامیدنی، سیر تکاملی ساده انگل، نیاز ما عدم نیاز به میزبان واسط و نقش احتمالی حیوانات اهلی در بروز عفونتهای انسانی و امکان انتقال عفونت از انسان به حیوان دانسته‌اند.

نتیجه‌گیری

با توجه به اهمیت بهداشتی و اقتصادی آلدگی انگلی در دامها، بررسیهای اپیدمیولوژیک بیشتری در مناطق مختلف کشور ضروری است. همچنین برای تعیین بهترین روش‌های پیشگیری و کنترل آلدگی توصیه می‌شود آموزش‌های لازم از طریق مسؤولین دامپزشکی به دامداران داده شود.

تقدیر و تشکر

از معاونت و شورای محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به پاس تأمین بودجه، مسؤولین محترم کشتارگاه کاشان و همکاران محترم گروه انگل شناسی به خاطر همکاری در انجام تحقیق تشکر می‌شود.

نماتودیروس ئوآراتیانوس با شیوع ۷۶ و ۶۳/۳ درصد گزارش کردند (۵) مطالعه قادریان (سال ۱۹۷۵) در نقاط مختلف ایران نشان داد که آلدگی دام مربوط به انواع تریکوسترنژیلوسها در اصفهان ۶۷، در خوزستان ۷۱ و در سواحل دریای خزر ۷ درصد می‌باشد و در کلیه مناطق، آلدگی در جنس ماده بیشتر از جنس نر بود (۱۷).

با توجه به شیوع بالای آلدگی انگلی روده‌ای در نمونه‌های مورد مطالعه به نظر می‌رسد که انگلها موجب عدم جذب مواد غذایی در سرتاسر روده و آسیب شدید می‌شوند. عوارض ناشی از بی اشتہایی باعث از دست دادن پروتئین در روده کاهش رشد، شیر و پشم می‌گردد. در آلدگیهای شدید با توجه به نوع دام و جیره غذایی گاهی اوقات، مرگ دام آلدود نیز اتفاق می‌افتد.

یافته دیگر تحقیق نشان داد که بیشترین موارد آلدگی انگلی در شکمبه و نگاری گوسفندان و بزها مربوط به مارشالازیا مارشالی به میزان ۸۰ و ۸۳/۳ درصد و کمترین آنها در گوسفندان مربوط به استرالازیا استرالازی به میزان ۳/۷ درصد و در بزها مربوط به تریکوسترنژیلوس کاپریکولا به میزان ۳/۸ درصد بود.

نتایج حاصل از این تحقیق با مطالعات اسلامی و همکاران (۱۳۵۴) که بر روی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان ایران انجام گرفته و بیشترین موارد آلدگی انگلی در شکمبه و نگاری گوسفندان و بزها را مربوط به مارشالازیا به میزان ۸۶ درصد و ۸۷/۳ درصد گزارش نموده است، مشابهت دارد (۳). Azazy (92-1991) در جده عربستان بیشترین آلدگی در شکمبه و نگاری را مربوط به مارشالازیا مارشالی گزارش کرده است (۱). در بررسی Beveridge و همکاران وی (۱۹۸۲) که بر روی دستگاه گوارش ۳۷۶ گوسفند از مناطق مختلف جنوب استرالیا انجام گرفت، بیشترین موارد آلدگی مربوط به تریکوسترنژیلوس آکسی ای و تریکوسترنژیلوس سیرکومسینیکتا گزارش شده است (۲)، اما بررسی Rehbein و همکاران (۱۹۹۶) که بر روی ۱۳۶ گوسفند در فوئای آلمان انجام گرفته بیشترین آلدگی در شکمبه و نگاری را مربوط به استرالازیا به میزان ۶۸/۴ درصد گزارش کرده است (۱۸).

References:

- el-Azazy OM. Seasonal changes and inhibited development of the abomasal nematodes of sheep and goats in Sudi Arabia. *Vet Parasitol.* 1995; 58: 91-98.
- Beveridge I, Ford GE. The trichostongyloid parasites of sheep in South Australia and their region distribution. *Aust Vet J* 1982; 59: 177-179.
- اسلام علی، فیضی عبدال... بررسی کرم‌های دستگاه گوارش بز در ایران. نامه دانشکده دامپزشکی، ۱۳۵۴؛ ۳۱: ۶۸-۷۷.
- Coop RL, Skeye AR. Subclinical trichostronylosis in growing lambs produced by continuous larvae doing, The effect on performance and certain plasma constituents. *Res Vet Sci.* 1976; 21: 253-258.

5. Eslami A, Nabavi L. *Species of gasterointestinal nematodes of sheep from Iran.* Bull, Soc, Path, Exot. 1976; 69: 92-95.
6. Eslami A, Fakharzadegan F. *The nematodes and tube digestive bovis in Iran.* Rev Elev Vet 1972; 26: 309-12.
7. Eslami A, Meydani M. *Gasterointestina nematodes of wild sheep (ovis orientalis) from Iran.* J Wild Dis. 1976; 158: 263-265.
8. Soulsby EJL. *Helminths, Arthropodsand Protozoa of domesticated animals.* 7th ed: Bailliere Tindall, 1992. 212-246.
9. Torina A, Dara S, Marino A.M.F. *Study of gastrointestinal nematodes in Sicilian sheep and goats.* Ann. N.Y. Acad. Sci., 1026: 187-194, 2004.
10. Fritsche, T, Kaufmann, J & Pfister, K. *parasite spectrum and seasonal epidemiology of gastrointestinal nematodes of small ruminants in The Gambia.* Veterinary Parasitology, 49: 271-283,2003.
11. Bonfoh, B, Zinsstag, J. *A livestock-based international Agricultural Research Institute dedicated to serve the West-African Region .* Infection in Med, 4: 201-203, 2001.
12. Collwell DO, Goater CP, and Jacobson KM. *Prevalence and intensity of gastrointestinal.* Can Vet J. 2002; 43: 775-772.
13. Fakae BB. *The epidemiology of helminthosis in small ruminants under the traditional husbandry system in eastern Nigeria.* Vet Res Commun. 1990; 14: 381-91.
14. Valcarcel F, Gracia C, and Romero C. *Prevalence and seasonal pattern of caprine trichostongyles in a dry area of central Spain.* Zentralbl Vet. 1999; 46: 673-81.
15. Theodoridis Y, Himonas SC, And Papazahariadou M. *Helminthes parasites of digestive tract of sheep and goats in Macedonian region.* 2000; 51: 195-199.
16. Uriarte J, Liorente MM, and Valderrabano J. *Seasonal changes of gastrointestinal nematode burden in sheep under an intensive grazing system.* Vet Prasital. 2003; 118: 79-92.
17. Ghadirian E, and Arfaa F, Present status of trichostongyliasis in Iran. Am J Trop Med Hyg. 1975; 24: 935-41.
18. Rehbein S, Kollmansberger M, Visser M, Winter R. *Helminth burden of slaughter sheep in upper Bovaria. Species spectrum, infestation extent and infestation intensity.* Berl Munch Tirarztl Wochenschr. 1999;109: 161-167.