

ارزیابی سطح سرمی آنتی بادی *Anti HBs* در پرسنل درمانی واکسینه شده علیه هپاتیت *B* در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

منصوره مؤمن هروی^{*}، علیرضا شریف^۱، سید غلامعباس موسوی^۲

خلاصه

سابقه و هدف: کارکنان بهداشتی، درمانی همواره در معرض خطر ابتلا به هپاتیت *B* می‌باشند. این مطالعه با هدف تعیین سطح سرمی آنتی بادی *Anti HBs* در پرسنل درمانی واکسینه شده علیه هپاتیت *B* و تأثیر فاکتورهای مؤثر بر آن انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: مطالعه به روش توصیفی روی ۱۲۸ نفر از پرسنل درمانی بیمارستان شهید بهشتی کاشان که همگی به طور کامل علیه هپاتیت *B* واکسینه شده بودند، در سال ۱۳۸۱، انجام گرفت. از افراد نمونه خون گرفته و تیتر سرمی آنتی بادی *Anti HBs* به روش *ELISA* اندازه‌گیری شد.

نتایج: افراد مورد مطالعه شامل ۷۷ زن (۶۰/۱٪) و ۵۱ مرد (۳۹/۹٪) بودند. تیتر سرمی آنتی بادی *Anti HBs* در ۷۳ مورد (۵۷٪) بالای 100 IU/lit (good responder)، در ۳۳ مورد (۲۵/۸٪) بین $10-100\text{ IU/lit}$ (low responder) و در ۲۲ مورد (۱۷/۲٪) سطح آنتی بادی زیر 10 IU/lit (non responder) بود. درصد افراد مؤثر و $۸۴/۳$ درصد افراد مذکور responder و $۱۸/۲$ درصد افراد مؤثر و $۱۵/۷$ درصد افراد مذکور non responder بودند. بین جنس و سن و سطح سرمی آنتی بادی رابطه معنی‌دار آماری یافت نشد اما بین مدت زمان گذشته از آخرین دوز واکسن و سطح سرمی آنتی بادی رابطه معنی‌دار آماری وجود داشت.

نتیجه‌گیری: آنتی بادی *Anti HBs* در اکثریت پرسنل واکسینه شده در سطح مؤثر وجود داشت و با گذشت زمان با کاهش سطح آنتی بادی همراه بود. به نظر می‌رسد بررسی تیتر *Anti HBs* یک تا سه ماه بعد از اتمام واکسیناسیون اولیه جهت اطمینان از پاسخ‌دهی به واکسن، در پرسنل درمانی ضروری باشد.

واژگان کلیدی: کاشان، آنتی بادی علیه هپاتیت *B*، پرسنل بیمارستان، واکسیناسیون

۱- استادیار گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تاریخ دریافت مقاله: ۸۳/۱۰/۳

۲- مربي گروه آمار و بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تاریخ تایید مقاله: ۸۴/۱۱/۲۵

* نویسنده مسؤول: منصوره مؤمن هروی

آدرس: کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، بیمارستان شهید بهشتی، گروه عفونی

پست الکترونیک: momenheravi_M@kaums.ac.ir

هپاتیت *B* در مبارزه با عفونت ویروسی هپاتیت *B* و پیشگیری از عوارض عفونت مزمن مثل سیروز و کارسینوم هپاتوسلولر جایگاه ویژه‌ای دارد. عوامل متعددی در میزان تأثیر واکسن هپاتیت *B* دخالت دارند از جمله شیوع عفونت، سن، ساختار ژنتیکی، وضعیت ایمنی فرد و بیماریهای زیستی‌ای، سیگاری بودن، چاقی، تفاوت‌های موجود بین واکسن‌ها و بالاخره محل و روش تزریق واکسن (۱، ۲). استراتژی واکسیناسیون علیه هپاتیت *B* بر اساس اختلافات جغرافیایی و اپیدمیولوژی هپاتیت *B* اتخاذ می‌شود. سازمان بهداشت جهانی به کشورهایی که شیوع عفونت در آنها متوسط به بالا می‌باشد توصیه کرده است در چارچوب برنامه ملی واکسیناسیون، کودکان را از بدو تولد علیه هپاتیت *B* واکسینه نمایند (۲). در مورد بالغین، واکسیناسیون برای افراد در معرض

مقدمه

عفونت حاد هپاتیت *B* و عوارض مزمن آن از مشکلات مهم بهداشتی جهان محسوب می‌شود. بیش از ۲ میلیارد نفر از مردم جهان شواهدی از عفونت قبلی یا کنونی با این ویروس را دارند. ۴۰۰ میلیون نفر از آنها ناقل مزمن هپاتیت *B* می‌باشند که ۲۵ تا ۳۰ درصدشان به دلیل بیماری کبدی زودتر از معمول فوت می‌کنند. هپاتیت *B* پس از سل و مalaria شایع ترین بیماری عفونی و مسری است. سالانه حدود ۵۰ میلیون نفر به تعداد افراد آلوده در دنیا افزوده می‌شود. در ایران رقم مبتلایان ۳ درصد کل جمعیت کل را شامل می‌شود (حدود ۲ میلیون نفر) که از این تعداد حدود ۳۰۰-۴۰۰ هزار نفر دچار هپاتیت مزمن *B* می‌باشند. ایران جزو مناطق با شیوع متوسط جهان محسوب می‌شود (۱). واکسن

دربافت آخرین دوز واکسن بر حسب سال محاسبه و به سه گروه زیر ۳ سال، بین ۳-۵ سال و بالای ۵ سال تقسیم شد. سپس نتایج آزمایش هر یک از افراد بر اساس تیتر آنتی‌بادی به دست آمده به سه گروه تقسیم گردید: سطح آنتی‌بادی بیش از 100IU/lit ، سطح آنتی‌بادی بین $10-100\text{IU/lit}$ و سطح آنتی‌بادی زیر 10IU/lit به ترتیب به عنوان پاسخ مثبت (ایمن)، *good responder*، پاسخ مثبت ضعیف (ایمن) *low responder* و عدم پاسخ (غیر ایمن) *non responder* در نظر گرفته شد. در پایان اطلاعات با استفاده از آزمون کای دو و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

از ۱۲۸ فرد مورد مطالعه ۵۱ نفر (۳۹/۹٪) مرد و ۷۷ نفر (۶۰/۱٪) زن بودند. از کل افراد ۷۳ نفر (۵۷٪) با سطح آنتی‌بادی بیش از 100IU/lit *good responder* تلقی شدند. ۳۳ نفر با سطح آنتی‌بادی بین $10-100\text{IU/lit}$ *non responder*، 10IU/lit *low responder* و 10IU/lit *non responder* محسوب گردیدند. از افراد مذکور و ۴۱ نفر (۵۳/۲٪) افراد مؤنث ۳۲ نفر (۶۲/۷٪) افراد مذکور و ۱۱ نفر (۲۱/۶٪) افراد مذکور و ۲۲ نفر (۲۸/۶٪) افراد مؤنث *low responder* بودند. ۸ نفر (۱۵/۷٪) افراد مذکور و ۱۴ نفر (۱۸/۲٪) افراد مؤنث در گروه *non responder* قرار گرفتند. در این مطالعه بین سطح آنتی‌بادی و جنس افراد واکسینه شده رابطه معنی دار آماری مشاهده نگردید. (جدول شماره ۱)

جدول ۱- توزیع فراوانی سطح سرمی *Anti HBs Ab* بر حسب سن، جنس و زمان آخرین واکسیناسیون در پرسنل واکسینه شده بیمارستان بهشتی کاشان طی سال ۱۳۸۲

<i>P.value</i>	جمع			<i>Anti HBs Ab (IU/lit)</i>		متغیرها
		(Non responder) >10	(Responder) ≤ 10			
۰/۲۷۴۴	۱۲۲(۱۰۰)	۲۰(۱۶/۴)	۱۰۲(۸۳/۶)*	>40		سن (سال)
	۶(۱۰۰)	۲(۳۳/۳)	۴(۶۶/۷)	<40		
۰/۷۱۴	۵۱(۱۰۰)	۸(۵/۷)	۴۳(۸۴/۳)	مذکور		جنس
	۷۷(۱۰۰)	۱۴(۱۸/۲)	۶۳(۸۱/۸)	مؤنث		
۰/۰۰۲	۴۱(۱۰۰)	۱(۲/۴)	۴۰(۹۷/۶)	>3	فاصله زمانی از	واکسن (سال)
	۸۷(۱۰۰)	۲۱(۲۴/۱)	۶۶(۷۵/۹)	<3	واکسن (سال)	

* تعداد و (درصد) می‌باشد.

۱۰۲ نفر (۸۳/۶٪) افراد تیتر آنتی‌بادی بیشتر یا مساوی 10IU/lit داشتند (*responder*) و در گروه ۴۰ سال به بالا ۴ نفر (۶۶/۷٪)

خطر همچون بیماران همودیالیزی، هموفیلی‌ها و افرادی که باید مرتبأ فرآورده‌های خونی دریافت کنند، معتادان تزریقی، مردان همجنس باز و افراد هتروسکسوال بی‌بند و بار، کارکنان مراکز نگهداری عقب‌ماندگان ذهنی، زندانیان و زندانیان، تماس‌های خانوادگی با ناقلين مزمن یا مبتلایان به عفونت حاد هپاتیت *B* و کارکنان حرف پزشکی و پرایپزشکی که با خون بیماران سر و کار دارند توصیه می‌شود (۱، ۲). از آنجا که تاکنون مطالعه مشابهی در کاشان صورت نگرفته بود این مطالعه به منظور بررسی سطح سرمی *Anti HBs* در بالغین واکسینه شده و فاکتورهای مؤثر بر آن و مقایسه آن با مطالعات انجام شده در سایر مناطق ایران به منظور دستیابی به اطلاعات پایه در کشورمان صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها


این مطالعه توصیفی بر روی ۱۲۸ پرسنل واکسینه شده علیه هپاتیت *B* در بیمارستان شهید بهشتی طی سال ۱۳۸۱ انجام پذیرفت. این افراد سه نوبت واکسن هپاتیت *B* از نوع *DNA*-*Recombinant Herberbiotec* ساخت شرکت *Kishor* کوشا دریافت کرده بودند. از هر یک این افراد ۵ سی‌سی خون و ریدی گرفته شد و به آزمایشگاه ارسال گردید. در آزمایشگاه پس از *Mono Bind Anti HBs* با کیت جداسازی سرم تیتر آنتی‌بادی با کیت *ELISA* اندازه‌گیری شد. پرسشنامه‌ای که حاوی سؤالاتی در زمینه جنس، سن، وزن، قد، سابقه مصرف سیگار و تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن بود از طریق مصاحبه با هر یک از پرسنل تکمیل گردید. فاصله واکسیناسیون از زمان

از کل افراد مورد مطالعه ۱۲۲ نفر (۹۵/۳٪) سن زیر ۴۰ سال و ۶ نفر ۴۰ سال و بیشتر داشتند. در گروه زیر ۴۰ سال

بحث

در این مطالعه میزان تیتر مؤثر آنتی بادی Anti HBs (بالای 10IU/lit)، $82/2$ درصد و سطح آنتی بادی غیر مؤثر (زیر 10IU/lit) حدود $17/2$ درصد به دست آمد. در مطالعات مختلف میزان مؤثر بودن واکسن، متفاوت گزارش شده است. در مطالعه شریفی در یزد که بر روی 272 پرسنل درمانی انجام شد میزان تأثیر واکسن $58/8$ درصد گزارش گردید (۳). در مطالعه حاجی باقری در سنتدج میزان تأثیر واکسن در 100 پرسنل مورد مطالعه، 67 درصد به دست آمد (۴) و در مطالعه لامعی در ارومیه روی 45 دانشجوی پزشکی 100 درصد افراد سطح آنتی بادی بالای 10IU/lit داشتند (۵). عوامل متعددی در میزان تأثیر واکسن هپاتیت B دخالت دارند، از جمله آنها شیوع عفونت، سن، ساختار ژنتیک، وضعیت ایمنی فرد و بیماریهای زمینه‌ای، سیگاری بودن، چاقی، تفاوت‌های موجود بین واکسن‌ها و بالاخره محل و روش تزریق واکسن می‌باشد. علت تفاوت نتایج ما با سایر مطالعات می‌تواند در رابطه با این عوامل تأثیرگذار باشد (۱، ۲). در این مطالعه بین سن واکسینه شده‌ها و میزان تأثیر واکسن رابطه معنی‌دار آماری مشاهده نگردید. در مطالعه *Lok* و همکاران سن به عنوان عامل مؤثر در تعیین میزان پاسخ به واکسن هپاتیت B تلقی شده است به طوری که در سنین پایین‌تر بیشترین میزان پاسخ سرمی به واکسن به دست آمده است با افزایش سن تیتر آنتی بادی کاهش می‌یابد که در دهه چهارم به 86 درصد و در دهه ششم به 47 درصد می‌رسد (۶). علت اختلاف نتیجه مطالعه ما احتمالاً به دلیل توزیع سنی نابرابر و قرار گرفتن اکثر افراد مورد مطالعه در گروه سنی زیر 40 سال باشد. بنابراین انجام مطالعات دیگر در گروه‌های مختلف سنی می‌تواند اهمیت سن را مشخص نماید. در این مطالعه بین جنس و سطح سرمی آنتی بادی رابطه معنی‌دار آماری به دست نیامد که مشابه نتایج مطالعه حاجی باقری و *Minana* و *Shaw* مصطفوی‌زاده می‌باشد (۴، ۱۰). در مطالعه *Shaw* و *Minana* میزان پاسخ سرمی در مردان پایین‌تر ($7/11$) و در مطالعه شریفی کارایی واکسن در زنان به طور معنی‌داری بیش از مردان بوده است (۳). جهت تعیین ارتباط جنس و تأثیر واکسن مطالعات بیشتری نیاز است. در مطالعه ما بیشترین درصد افراد non responder در گروه افراد با BMI بالای 25 قرار داشتند. ولی امکان بررسی رابطه BMI با سطح سرمی آنتی بادی به دلیل تعداد بسیار کم افراد این گروه از نظر آماری وجود نداشت. در مطالعه حاجی باقری رابطه معنی‌دار آماری بین BMI و سطح سرمی آنتی بادی یافت نشده است (۴)، در حالی که در مطالعه *Shapiro* و *Shaw* میزان پاسخ سرمی در افراد چاق پایین‌تر گزارش شده است (۷، ۹). در پژوهش

بودند. در این مطالعه بین سطح آنتی بادی و سن افراد رابطه معنی‌دار آماری مشاهده نگردید ($p > 0.2744$). 5 نفر ($83/3$) از افراد با BMI زیر 20 ، 53 نفر ($85/5$) از افراد با BMI بین $20-25$ و 48 نفر ($80/8$) افراد با BMI بالای 25 kg/m^2 بودند. بیشترین درصد افراد non responder در گروه با BMI بالای 25 قرار داشت ولی به علت تعداد بسیار کم افراد این گروه، امکان بررسی آماری رابطه BMI با سطح آنتی بادی وجود نداشت. در رابطه با سطح سرمی آنتی بادی و فاصله زمانی آخرین دوز واکسن 41 نفر ($32/9$) کمتر از 3 سال، 9 نفر ($7/7$) بین $3-5$ سال و 87 نفر ($68/5$) سال یا بیشتر از زمان آخرین دوز واکسن آنها می‌گذشت. $97/6$ درصد افرادی که کمتر از 3 سال از زمان آخرین واکسن آنها می‌گذشت responder بودند، در حالی که این میزان در افرادی که 3 سال و بیشتر از زمان آخرین واکسن آنها می‌گذشت $75/9$ درصد بود، یعنی بیشترین افراد بدون پاسخ به واکسن در گروهی قرار داشتند که از زمان آخرین آخرين تزریق واکسن آنها بیش از سه سال می‌گذشت به طوری که بین سطح سرمی آنتی بادی و مدت زمان گذشته از زمان آخرین واکسیناسیون رابطه معنی‌دار آماری مشاهده گردید ($p < 0.002$).
(نمودار شماره ۱)



نمودار ۱- توزیع فراوانی تیتر آنتی بادی Anti HBs از زمان آخرین واکسیناسیون در افراد مورد مطالعه بر حسب سال

در این مطالعه 5 نفر ($3/9$) از پرسنل (همگی مرد) سیگاری بودند که یک نفرشان تیتر آنتی بادی بیش از 100IU/lit ، 3 نفر تیتر آنتی بادی بین $10-100\text{IU/lit}$ و 1 نفر تیتر آنتی بادی زیر 10IU/lit داشت ولی امکان بررسی ارتباط بین سطح سرمی آنتی بادی و مصرف سیگار به علت تعداد کم افراد سیگاری محدود نبود.

واکسینه شده در سطح مؤثری وجود داشت. بین جنس و سن با سطح آنتی‌بادی رابطه معنی‌دار آماری مشاهده نگردید ولی گذشت زمان با کاهش سطح آنتی‌بادی همراه بود. با توجه به در معرض خطر بودن پرسنل درمانی، کاهش تیتر آنتی‌بادی با گذشت زمان و عدم اطمینان از ایجاد سطح مؤثر آنتی‌بادی بعد از واکسیناسیون اولیه، تصمیم‌گیری در مورد ایمونیزاسیون پرسنل درمانی را به هنگام خدمات شغلی دشوار می‌سازد، لذا به نظر می‌رسد بررسی تیتر Anti HBs یک تا سه ماه بعد از اتمام واکسیناسیون اولیه جهت اطمینان از پاسخ‌دهی به واکسن در پرسنل درمانی، ضروری باشد.

حاضر سطح سرمی آنتی‌بادی و مدت زمان گذشته از آخرین دوز واکسن ارتباط معنی‌دار آماری مشاهده گردید. در مطالعه شریفی تأثیر واکسن در کسانی که کمتر از یک سال از آخرین واکسن آنها می‌گذشت ۸۰/۲ درصد و در افرادی که بیش از سه سال فاصله وجود داشت ۱۹/۶ درصد به دست آمد که نشان می‌داد با گذشت زمان سطح سرمی به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد (۳). در مطالعه Lemon روی مردان همجنسي باز واکسینه شده، آنتی‌بادی ۱۵ درصد افراد بعد از گذشت ۵ سال غیرقابل اندازه‌گیری بود (۸). تیتر آنتی‌بادی Anti HBs با گذشت زمان بعد از واکسیناسیون افت می‌کند (۱۲، ۱۳).

نتیجه‌گیری

در این مطالعه آنتی‌بادی Anti HBs در اکثریت پرسنل

References:

- ابراهیمی دریانی ناصر. هپاتیت ویروسی و اتوایمیون. چاپ اول. تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، نشر طیب. ۱۳۷۸، صفحه ۱۶.
- Hiroshi Kawai. Stephen M. Acute vital hepatitis. In: Mandell Douglas and Bennett's principles and practice of infectious diseases. 6th ed. USA: Churchill Livingstone: 2005. 1674-1675.
- شریفی محمدرضا، قریشیان سید محمود. ارزیابی اثر واکسیناسیون هپاتیت B پرسنل بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد ۱۳۸۱: سال پنجم، شماره ۱؛ صفحه ۱۰.
- حاجی‌باقری کتابیون، رحیمی آرش، منصوری فر شهرام. بررسی سطح سرمی آنتی‌بادی ضد آنتی‌زن سطحی ویروس هپاتیت B (Anti HBs) و عوامل مرتبط با آن در پرسنل واکسینه شده بیمارستان توحید سنتنچ. مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان. ۱۳۸۰: سال پنجم، شماره بیستم؛ صفحات ۵۶ تا ۵۴.
- لامعی ابوالفتح، صادقی علی. ایمونوژنیتی واکسن هپاتیت B در شیرخواران و بالغین جوان و سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۳۸۱: سال نهم، شماره اول و دوم؛ صفحات ۱۱ تا ۱۷.
- Lok A. Li X. Prevalence of isolated antibody to hepatitis B core antigen in an area endemic for hepatitis B virus infection: implication in hepatitis B vaccination programs. *Hepatology* 1988; 8: 766-770.
- Shaw EF. Guess HA. Roets JM. Effect of anatomic injection site, age and smoking on the immune response to hepatitis B vaccine. *New Engl Med* 1989; 7: 425-430.
- Lemon SM. Thomas DJ. Vaccines to prevent viral hepatitis. *New Engl Med* 1997; 336: 196-201.
- Shapiro CN. Margolis HS. Impact of hepatitis B virus infection on women and children. *Infect Dis Clin North Am* 1992; 6: 75-91.
- مصطفوی زاده کامیار، صالحی حسن. سطح آنتی‌بادی سطحی ویروس هپاتیت B به دنبال واکسیناسیون بعد از یک دوره ۵-۶ ساله در کودکان تازه وارد به دیستان در شهرستان شهرکرد. مجله پژوهش در علوم پزشکی اصفهان ۱۳۸۲: سال ششم، شماره سوم؛ صفحات ۱۹۴ تا ۱۹۶.
- Minana JS. Ganuza MG. Millian PF. Fernandez MP. Hepatitis B vaccine immunoresponsiveness in adolescents: a revaccination proposal after primary vaccination. *Vaccine* 1996; 14: 103-106.
- Hadler SC. Francis DP. Maynard JE. Long term immunogenicity and efficacy of hepatitis B vaccine in homosexual. *N Engl J Med* 1986; 315: 209-214.
- Poland GA. Hepatitis B immunization in health care workers, dealing with vaccine nonresponse. *Am J Prev Med* 1998; 15: 73-77.