

شیوع و علل قرمزی چشم در مراجعین به بیمارستان شهید رهنمون یزد در دو فصل تابستان و زمستان سال ۱۳۸۳

*
محمد رضا بشارتی ، محمد رضا شجاع

خلاصه

سابقه و هدف: قرمزی چشم علامت اصلی التهاب چشم و یکی از شایع ترین شکایات بیماران سربایی است که می‌تواند نشانه طیف وسیعی از بیماری‌های چشمی از کنڑکتیویت خفیف تا عفونت‌ها و بیماری‌های تهدیدکننده بینایی و یا تروما باشد. اکثر بیماری‌های چشمی که با قرمزی چشم ظاهر می‌نمایند نسبتاً خوش خیم هستند اما افتراق بین علت‌های جدی و پرخطر از موارد خود محدودشونده، مشکل است و گاهی عدم تشخیص و اشتباه در درمان می‌تواند منجر به عوارض جدی بینایی گردد. با توجه به اهمیت موضوع و تناقضات موجود در خصوص شیوع بیماری، این مطالعه به منظور تعیین شیوع و علل قرمزی چشم در مراجعین به کلینیک شهید رهنمون یزد در سال ۱۳۸۳ صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: تحقیق به روش Case Series روی ۴۰۰ بیمار مبتلا به قرمزی چشم طی دو فصل تابستان و زمستان (در هر فصل ۲۰۰ نفر) صورت گرفت. ملاک قرمزی چشم تغییر رنگ چشم و افزایش عروق ملتجمه یا اپیاسکلرا بود که با مشاهده و معاینه با اسلیت لامپ تعیین گردید. اطلاعات از طریق مصاحبه، معاینه کلینیکی و تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری گردید و با استفاده از آزمون کای دو مورد قضایت آماری قرار گرفت.

نتایج: بیماران از نظر سنی در سه گروه کمتر از ۱۵ سال (۱۸٪)، ۱۵-۳۹ سال (۵۱٪) و بالای ۴۰ سال (۳۰٪) قرار گرفتند. از نظر توزیع جنسی ۵۹ درصد مبتلایان را مردان و ۴۱ درصد را زنان تشکیل می‌دادند. شایع ترین علل قرمزی چشم به ترتیب کنڑکتیویت (۳۵٪)، تروماتیک (۲۲٪) و تغییرات دژنراتیو ملتجمه (ناخنک و پینگاکولا) (۱۵٪) بودند. شایع ترین علت قرمزی چشم در هر دو جنس کنڑکتیویت بود (۰/۰۱٪). شایع ترین علایم همراه با قرمزی چشم، سوزش چشم (۹۱٪)، اشک‌ریزش (۸۵٪) و خارش چشم (۶۸٪) بود (۰/۰۱٪). تفاوتی بین علل قرمزی چشم در رابطه با فصل مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: قرمزی چشم در مردها شایع‌تر از زنان است ولی تفاوتی از نظر فصلی ندارد. شایع ترین علل قرمزی چشم به ترتیب کنڑکتیویت، تروما و تغییرات دژنراتیو ملتجمه بود. آموزش صحیح جهت تشخیص علل پرخطر قرمزی چشم در آینده می‌تواند سبب کاهش عوارض جدی بینایی گردد.

وازگان کلیدی: قرمزی چشم، فصل، کنڑکتیویت، بیماری‌های سیستمیک، شیوع و علل

تاریخ دریافت مقاله: ۷/۲۷/۸۴

دانشیار گروه چشم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

تاریخ تایید مقاله: ۱۱/۱۱/۸۴

* نویسنده مسؤول: محمد رضا بشارتی

آدرس: یزد، بلوار طالقانی، ساختمان پزشکان رازی، بیمارستان شهید رهنمون

پست الکترونیک: mrbesharaty@yahoo.co.uk

بیماری‌های پلک می‌باشند (۵). توانایی در افتراق سریع علل مختلف قرمزی چشم مهم است. علایمی چون درد، فتوفوبي و کاهش حدت بینایی معمولاً نشانه حالات شدید چشمی یا یک بیماری سیستمیک می‌باشند. بیماری‌های سیستمیک همراه با اسکلریت شامل آرتیت روماتوئید، وگنر، لوپوس، نفروس، هرپس زوستر و توکسوبلاسموز می‌باشند (۶، ۷). قرمزی چشم بدون فتوفوبي، درد یا اختلال بینایی اکثراً ناشی از یک کنڑکتیویت ساده می‌باشد (۸). علایم تهدیدکننده بینایی شامل کاهش ناگهانی

مقدمه

قرمزی چشم علامت اصلی التهاب و نسبتاً بدون خطر کنڑکتیویت ساده می‌باشد (۱، ۲). کنڑکتیویت یا قرمزی چشم علامت مشترک اختلالات گوناگون چشمی است که باستی تشخیص افتراقی آنها را در نظر داشت (۳). کنڑکتیویت، اپیاسکلریت و اسکلریت التهاب قسمت خارجی کره چشم می‌باشند که بعضی از این التهابات بالقوه شدید می‌باشند (۴). شایع ترین علل قرمزی چشم به جز تروما، کنڑکتیویت، آلرژي و

یک ماه، یک ماه تا ۳ ماه و بیشتر از ۳ ماه بررسی شد. وسائل مورد نیاز برای معاینه شامل چراغ قوه جهت معاینه مردمک‌ها، چارت اسنلن جهت تست حدت بینایی، افتالموسکوپ، کاغذ فلوروسئین و اسلیت لامپ بود. معاینه شامل ارزیابی تمام نواحی چشم از جمله پلک‌ها و ابروها بود. ملاک قرمزی چشم تغییر رنگ چشم و افزایش عروق ملتجمه یا اپی‌اسکلرا می‌باشد که با مشاهده و معاینه با اسلیت لامپ تعیین گردید. در این مطالعه علاوه بر متغیرهای دموگرافیک، محل قرمزی چشم، طول مدت قرمزی، نحوه شروع قرمزی، علایم همراه با قرمزی چشم، بیماری‌های سیستمیک همراه، یافته‌های کلینیکی چشمی و علل منجر به قرمزی چشم از طریق مصاحبه و معاینه کامل کلینیکی چشم جمع آوری و در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. داده‌های فرم اطلاعاتی طبقه‌بندی و نتایج به صورت آمار توصیفی گزارش گردید و با استفاده از آزمون آماری کای دو مورد قضایت قرار گرفت.

نتایج

از مجموع ۴۰۰ بیمار تحت بررسی، ۲۳۶ نفر مرد (۵۹٪) و ۱۶۴ نفر زن (۴۱٪) بودند. شایع ترین گروه سنی بیماران را گروه ۱۵ تا ۳۹ سال با ۲۰۶ نفر (۵۱٪) تشکیل می‌دادند. علل قرمزی چشم در گروه‌های سنی مختلف در جدول شماره ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- توزیع فراوانی مبتلایان به قرمزی چشم در مراجعین به

بیمارستان شهید رهنمون بیزد در سال ۱۳۸۳

جمع	علل	سن	کمتر از سال	۱۵-۳۹ سال	۴۰- ۷۱(۳۴/۵)	۲۳(۱۸/۹)	۱۴۳ (۳۵/۷)
	کنژکتیویت				۴۹(۳۸)*	۷۱(۳۴/۵)	۲۳(۱۸/۹)
	ترووما				۸(۱۱/۱)	۷۱(۲۹/۶)	۱۹(۱۰/۶)
	تغییرات دُنراپیو ملتحمه			۱(۱/۴)	۲۵(۱۲/۱)	۳۴(۲۷/۸)	۶۰ (۱۵)
	درگیری پلک			۶(۸/۳)	۲۱(۱۰/۲)	۲۱(۱۷/۲)	۴۸ (۱۲)
	درگیری سیستم اشکی			۰(۰)	۷(۳/۴)	۱۳(۱۰/۷)	۲۰ (۵)
	درگیری قرنیه			۴(۵/۶)	۷(۳/۴)	۴ (۳/۳)	۱۵ (۳/۸)
	درگیری اسکلرا			۴(۵/۶)	۸(۳/۹)	۲(۱/۶)	۱۴ (۳/۵)
	درگیری عنیه			۰(۰)	۶(۲/۹)	۶(۴/۹)	۱۲ (۳)
جمع		۷۲(۱۰۰)	۲۰۶(۱۰۰)	۱۲۲(۱۰۰)	۴۰۰	*	

* تعداد و (درصد) می‌باشد.

دید، درد چشم، فتوفوبي و وجود قرمزی حلقه‌ای اطراف قرنیه (Ciliary flash) می‌باشد (۱۰). در حالی که برخی علایم می‌توانند خیلی نگران‌کننده باشند، بیماران دچار کنژکتیویت، اکثراً بینایی خوب و بازگشت کامل و بدون پیامد دائمی دارند (۱۱). موارد خوش‌خیم قرمزی چشم توسط پزشک عمومی ارزیابی و درمان می‌شوند در حالی که علل پرخطر باید سریعاً به چشم پزشک ارجاع شوند (۱۲). یکی از علل شایع عدم تشخیص قرمزی چشم سندرم خشکی چشم می‌باشد. سندرم خشکی چشم ممکن است بیانگر سندرم شوگرن یا استفاده از دارو، با عوارض مهم چشمی و سیستمیک گردد (۱۳). تشخیص افتراقی صحیح سبب ارائه درمان مناسب اولیه برای بیماران و کمک به تعیین مورد نیاز جهت ارجاع می‌نماید (۱۴). علل قرمزی چشم در نقاط مختلف جهان به طور متفاوتی گزارش شده است. در مطالعه Karki مهمنتین علت، کنژکتیویت (۱۵) و در مطالعه Michelson شایع‌ترین علت خونریزی خود به خود ملتحمه بود (۱۳). کنژکتیویت عموماً همراه با اختلال بینایی و درد چشم نمی‌باشد. کراتیت، زخم قرنیه، التهاب داخل چشم و گلوكوم حاد حالات غیر شایع ولی اغلب شدید هستند که نیاز به معاینه و درمان توسط پزشک دارد. با توجه به اهمیت موضوع، عوارض ناشی از آن، تناقضات موجود در خصوص شیوع و علل بیماری و عدم آگاهی از وضعیت آن در منطقه، این مطالعه به منظور تعیین شیوع و علل قرمزی چشم در مراجعین به کلینیک چشم پزشکی شهید رهنمون بیزد در سال ۱۳۸۳ صورت گرفت.

مواد و روش‌ها

این مطالعه به صورت Case Series در ۴۰۰ بیمار مبتلا به قرمزی چشم طی دو فصل تابستان و زمستان (در هر فصل ۲۰۰ نفر) صورت گرفت. علل احتمالی قرمزی چشم به ترتیب شیوع، در ۸ گروه مورد بررسی قرار گرفت. شامل: کنژکتیویت (آلرژیک، باکتریال یا ویرال)، تغییرات دُنراپیو ملتحمه (ناخک و پینگاکولا)، التهاب قرنیه (کراتیت)، گرفتاری اسکلرا (اسکلریت و اپی‌اسکلریت)، درگیری سیستم اشکی (دکرایوسیستیت و خشکی چشم) محل قرمزی چشم به پنج ناحیه تمپورال، نازال، فوکانی، تھانی و تمام چشم تقسیم شد و علل قرمزی چشم بر حسب این نواحی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طول مدت قرمزی چشم از زمان شروع تا تشخیص علت در ۴ گروه: کمتر از یک هفته، یک هفته تا

پلک (۱۶/۶ درصد) بود. قرمزی چشم در دو فصل تابستان و زمستان مورد بررسی قرار گرفت که ارتباط معنی دار آماری بین فصل و علل قرمزی چشم به دست نیامد که نتایج آن در جدول شماره ۲ نشان داده شده است.

شایع ترین علت قرمزی چشم به ترتیب در مردان: کنژکتیویت (۳۳/۱ درصد)، ترومما (۲۹/۷ درصد) و تغییرات دژنراتیو ملتحمه (۱۳/۱ درصد) و در زنان: کنژکتیویت (۱۳/۱ درصد)، تغییرات دژنراتیو ملتحمه (۱۷/۷ درصد) و در گیری (۳۹/۶ درصد).

جدول ۳- توزیع فراوانی مبتلایان به قرمزی چشم مراجعه کننده به بیمارستان شهید رهنمون بزد به تفکیک فصل و جنس سال ۱۳۸۳

علل	فصل		جنس		P.value	NS
	زمستان	تابستان	مرد	زن		
کنژکتیویت	۶۹(۳۴/۵)	۷۴(۳۷)	۷۸(۳۳/۱)	۶۵(۳۹/۶)		NS
ترووما	۴۵(۲۲/۵)	۴۳(۲۱/۰)	۷۰(۴۹/۷)	۱۸(۱۱)		NS
تغییرات ملتحمه دژنراتیو	۳۳(۱۶/۵)	۲۷(۱۳/۰)	۳۱(۱۳/۱)	۲۹(۱۷/۷)		NS
بیماریهای پلک	۲۴(۱۲)	۲۴(۱۰/۲)	۲۴(۱۴/۹)	۲۴(۱۷/۷)		NS
بیماریهای سیستم اشکی	۱۲(۶)	۸(۴)	۹(۴/۸)	۱۱(۷/۷)		NS
ابتلاء قرنیه	۷(۳/۵)	۸(۴)	۱۳(۵/۵)	۲(۱/۲)		NS
گرفتاری اسکلرا و اپی اسکلرا	۵(۲/۵)	۹(۴/۵)	۴(۱/۷)	۱۰(۷/۱)		NS
بیماریهای عنیبه و گلوكوم	۵(۲/۵)	۷(۳/۵)	۷(۳)	۱۶۴(۱۰۰)		NS
جمع	۲۰۰(۱۰۰)	(۱۰۰)۲۰۰	۲۳۶(۱۰۰)	۱۶۴(۱۰۰)		

NS: معنی دار نمی باشد.

* تعداد و (درصد) می باشد.

تغییرات دژنراتیو ملتحمه (۱۰ درصد) دیده شد در حالی که در در گیری عنیبه اصلاً وجود نداشت ($P<0.01$). فتوفوبي در در گیری اسکلرا (۸۵/۷ درصد) و در گیری عنیبه (۸۳/۳ درصد)، شایع تر از در گیری پلک (۲۷/۱ درصد) و کنژکتیویت (۳۲/۹ درصد) بود ($P<0.01$). تاری دید در در گیری عنیبه، ۷۵ درصد و در در گیری پلک، ۱۶/۷ درصد بود ($P<0.01$). یافته تحقیق نشان داد شایع ترین علل چشمی همراه با قرمزی چشم به ترتیب کنژکتیویت ۴۶/۵ درصد، ناخنک ۱۲/۵ درصد، کراتیت ۱۲ درصد، بلفاریت ۹/۳ درصد و پینگاکولا ۸ درصد بود. کاهش حدت بینایی، خونریزی زیر ملتحمه، نقص اپی تلیال قرنیه، خشکی چشم، اپی اسکلریت، یووئیت، داکریوسیستیت، تغییر شکل پلک، هایفما،

علايم چشمی همراه با قرمزی چشم هنگام مراجعه به ترتیب عبارت بود از: سوزش چشم (۹۱/۳ درصد)، اشکریزیش (۵۸/۸ درصد)، خارش چشم (۶۸/۸ درصد)، احساس جسم خارجی (۴۰/۳ درصد)، فتوفوبي (۴۰ درصد)، درد (۳۹/۸ درصد)، تاری دید (۲۷ درصد) و ترشح چركی (۲۴ درصد). ۱۰۰ درصد بیماران علامت درد نیز داشتند. اسکلریت در بیماری عنیبه مشاهده شد. ($P<0.01$). در بررسی علل قرمزی چشم بر حسب علاييم همراه، اسکلریت و گرفتاري عنیبه و قرنیه ۱۰۰ درصد با درد همراه بودند. ($P<0.01$) شایع ترین علامت در در گیری پلک، تغییرات دژنراتیو ملتحمه و کنژکتیویت، سوزش چشم بود. خارش نیز در در گیری پلک (۹۵/۸ درصد)، کنژکتیویت (۸۳/۹ درصد) و در

درگیری پلک، سیستم اشکی و تغییرات دژنراتیو ملتحمه اکثرً بیش از یک ماه وجود داشتند. علل قرمزی چشم بر حسب نحوه شروع (تدریجی یا ناگهانی) نیز بررسی شد. تغییرات دژنراتیو ملتحمه ۹۳/۳ درصد، درگیری سیستم اشکی ۹۰ درصد و درگیری پلک ۷۹/۲ درصد شروع تدریجی داشتند. علل تروماتیک ۹۷/۷ درصد، درگیری عنیه ۵۸/۳ درصد و کنترکتیویت ۵۶/۶ درصد شروع ناگهانی داشتند. از نظر بیماریهای سیستمیک همراه، آرتیت روماتوئید ۶ مورد در درگیری اسکلرا و ۲ مورد در درگیری عنیه دیده شد. دیابت ۸ مورد در درگیری پلک و ۲ مورد در درگیری عنیه و ۸ مورد همراه با سایر علل بود، فشارخون بالا ۴ مورد در درگیری سیستم اشکی، ۳ مورد در تغییرات دژنراتیو ملتحمه و ۷ مورد همراه با سایر علل دیده شد. یک مورد بیماری التهابی روده و یک مورد وگر نیز وجود داشت ولی موردی از لوپوس در این مطالعه دیده نشد. از بین ۴۰۰ بیمار با قرمزی چشم، ۴۰ مورد سابقه آلرژی فصلی چشم دیده شد که در کنترکتیویت ۲۸ مورد (۷۰ درصد)، تغییرات دژنراتیو ملتحمه، درگیری سیستم اشکی و پلک هر کدام ۳ مورد (۷/۵ درصد)، درگیری قرنیه ۲ مورد (۵ درصد) و تروما ۱ مورد (۲/۵ درصد) بود.

بحث

در این مطالعه، شایع‌ترین علت قرمزی چشم کنترکتیویت (باکتریال، ویرال و آلرژیک) بود که ۳۵/۸ درصد موارد را شامل می‌شد. در مطالعه Karki شایع‌ترین علت، کنترکتیویت بیان شد که انواع باکتریال یا ویرال آن شایع‌تر از نوع آلرژیک گزارش شد (۱۵). در مطالعه Passaro (۱۶) علت قرمزی چشم در ۲۰۰ دانشجو به طور همزمان، اپیدمی کنترکتیویت تشخیص داده شد. در تحقیق Jorm (۱۷) در مرکز نگهداری شبانه‌روزی اطفال در سیدنی کنترکتیویت شایع‌ترین اپیدمی بعد از اسهال بود. در مطالعه ما اپیدمی کنترکتیویت وجود نداشت و انواع کنترکتیویت باکتریال، ویرال و آلرژیک به شکل اسپورادیک مراجعه می‌نمودند. علل تروماتیک، دومین علت شایع قرمزی چشم بود (۲۲ درصد موارد) که در سه گروه بلانت تروما (٪۹)، سوختگی شیمیایی (٪۲/۸) و اجسام خارجی (٪۱۰/۳) مورد بررسی فرار گرفت. در مطالعه Laroche (۱۸) از ۲۲۲ مورد بیمار با ترمای چشم، ۵۱ درصد بلانت تروما، ۲۸ درصد ترمای نافذ و ۵ درصد به علت سوختگی شیمیایی و جسم خارجی دچار قرمزی چشم شده بودند در حالی که در مطالعه ما میزان بلانت تروما خیلی شایع‌تر بود، شاید به این علت که موارد ترمای نافذ بیشتر به اورژانس مراجعه داشتند. در مطالعه Nirmalan (۱۹) در هند و مطالعه Desai-P

گل‌مژه، افزایش فشار داخل چشم و اسکلریت دیگر یافته‌های همراه با قرمزی چشم را شامل می‌شوند که فراوانی یافته‌های کلینیکی در جدول ۳ ارائه شده است

جدول ۳- توزیع فراوانی یافته‌های کلینیکی (Signs) در بیماران

مراجعه کننده

یافته‌های کلینیکی	تعداد	درصد
کنترکتیویت	۱۸۶	۴۶/۵
ناخنک	۵۰	۱۲/۵
کراتیت	۴۸	۱۲
بلفاریت	۳۷	۹/۳
پسگوکولا	۳۲	۸
کاهش حدت بینایی	۳۱	۷/۸
خونریزی زیر ملتحمه	۲۹	۷/۳
دفکت اپی تیال قرنیه	۲۹	۷/۳
چشم خشک	۱۵	۳/۸
کاهش رفلکس مردمک	۱۲	۳/۳
اپی اسکلریت	۱۲	۳
بوونیت	۱۲	۳
داکریوسیستیت	۱۰	۲/۵
مالفورماسیون پلکی	۹	۲/۳
سلول در اتاق قدامی	۹	۲/۳
هایپنما	۶	۱/۵
گل‌مژه	۶	۱/۵
افزایش فشار چشم	۵	۱/۳
چسبندگی عنیه	۵	۱/۳
(KP) رسوپ سلول در آندوتلیوم قرنیه	۴	۱
شالازیون	۴	۱
اسکلریت	۲	۰/۵

بیشترین محل قرمزی چشم درگیری تمام چشم (۵۹/۸ درصد) و ناحیه نازال (۱۸/۸ درصد) و کمترین محل قرمزی، ناحیه فوقانی (۳/۸ درصد) و تحتانی چشم (۳ درصد) بود. بیشترین محل قرمزی چشم در کلیه علل مورد بررسی، تمام گلوب بود ولی در تغییرات دژنراتیو ملتحمه قسمت نازال شایع‌ترین محل قرمزی را تشکیل داد. در اکثر موارد (۴۶ درصد) در گروه کمتر از یک هفته قرار می‌گرفت. در این بررسی حداقل طول مدت قرمزی ۵ ماه و حداقل آن، کمتر از چند ساعت بود. از نظر طول مدت قرمزی، علل قرنیهای و تروماتیک ۱۰۰ درصد موارد در کمتر از یک هفته، درگیری عنیه ۶۶/۷ درصد، کنترکتیویت ۳۹/۹ درصد، درگیری اسکلرا ۵۰ درصد موارد بین یک هفته تا یک ماه و

۵۸/۳ درصد بیماران با اسکلریت و ۲۳/۵ درصد بیماران با اپی اسکلریت مشاهده شد. در مطالعه ما نیز از ۲ مورد اسکلریت، هر دو کاهش بینایی داشتند، در حالی که از ۱۲ مورد اپی اسکلریت تنها در ۳ مورد کاهش بینایی خفیفی ایجاد شده بود. کاهش بینایی در اسکلریت به دلیل وسعت گرفتاری ساختمان‌های چشم می‌باشد و وجود آن همراه با درد جزو علایم افتراق آن از اپی اسکلریت می‌باشد. درد چشم و کاهش بینایی دو علامت هشداردهنده چشمی هستند و به جز در مواردی که اطمینان به تشخیص علل خوش‌خیم وجود دارد بایستی بیماران به چشم‌پزشک ارجاع شوند. در مطالعه Alepek (۲۷) طی بررسی ۲۴۳ بیمار با اسکلریت، ۴۶ درصد بیماریهای سیستمیک همراه داشتند که شایع‌ترین آنها آرتیریت روماتوئید بود. همچنین در مطالعه دیگری توسط وی (۲۸) بر روی ۶۹ بیمار مبتلا به اسکلریت و اپی اسکلریت در ۳۶ درصد بیماران، بیماریهای سیستمیک همراه مشاهده شد. عوارض چشمی شامل یووئیت (۱۱/۴)، درگیری قرنیه (۱۵٪) و گلوكوم (۷/۸٪) وجود داشت. در مطالعه ما، دو مورد اسکلریت دیده شد که همراه با آرتیریت روماتوئید بودند. از ۱۲ مورد اپی اسکلریت، ۴ مورد همراه با آرتیریت روماتوئید بود که این مطالعه نیز مانند مطالعات دیگر همراهی اسکلریت با بیماریهای سیستمیک بافت همبندی — عروقی را نشان می‌دهد. در بررسی Akduman (۲۹) در ۷۸ بیمار مبتلا به آرتیریت روماتوئید جوانان، ۷ نفر به یووئیت مبتلا بودند. در مطالعه ما نیز از ۸ مورد یووئیت، ۲ مورد همراهی با آرتیریت روماتوئید دیده شد که همانند مطالعه فوق، ارتباط بین یووئیت و آرتیریت روماتوئید را نشان می‌دهد. در تحقیق Wolf (۳۰) در ۵۱ بیمار با یووئیت ناشی از آرتیریت روماتوئید جوانان ۲۲ درصد کاهش بینایی، ۴۶ درصد کاتاراکت، ۳۰ درصد کراتوپاتی، ۲۷ درصد گلوكوم وجود داشت. در مطالعه ما از ۸ مورد یووئیت، ۴ مورد کاهش بینایی و ۲ مورد کراتوپاتی وجود داشت. با توجه به یافته‌های فوق بیماران مبتلا به یووئیت که معمولاً سیر مزممی دارند نیازمند به پیگیری و کنترل عوارض احتمالی در سال‌های بعد می‌باشند.

نتیجه‌گیری

قرمزی چشم تظاهر بیماریهای مختلف چشمی می‌باشد، هر چند شایع‌ترین علت آن کثکتیویت است ولی بایستی علل مهمتری مانند اسکلریت، یووئیت و گلوكوم و همراهی آن با بیماریهای سیستمیک که پروگنوز بیماری را بدتر می‌کند، مدنظر داشت تا با تشخیص و درمان به موقع از عوارض بینایی آنها پیشگیری کرد. مهمترین وظیفه پزشک عمومی در مواجهه با Red

(۲۰) در لندن بلانت تروما شایع‌ترین علل تروماتیک قرمزی چشم بود. ترومای بلانت در مطالعات مختلف شیوع بالاتری نسبت به سایر ترومایها دارد و میزان عوارض آن بسته به محل تحقیق، شغل، شرایط زندگی و عوامل محیطی متفاوت می‌باشد. عوارض چشمی بلانت تروما، در مطالعه ما شامل کاهش حدت بینایی (۱۱/۱ درصد)، هایفنا (۱۶/۷ درصد)، یووئیت (۱۱/۱ درصد) و کراتیت (۱۱/۱ درصد) بود. در مطالعه Jans (۲۱) و همکاران در پاکستان بر روی ۳۶ بیمار با ترومای بلانت و هایفنا، ۶۲ درصد کاهش حدت بینایی، ۴۱/۷ درصد افزایش فشار چشم و ۱۹ درصد موارد منجر به کوری مشاهده گردید. در مطالعه Kunimoto (۲۲) فاکتورهای مساعد کننده اصلی کراتیت شامل ترومای (۲۱/۲ درصد)، بیماری چشمی (۱۷/۷ درصد) و بیماریهای سیستمیک (۱۵/۹ درصد) بیان شد. با توجه به شیوع بالای عوارض ترومای بلانت همراه با قرمزی چشم مثل هایفنا درمان به موقع و پیگیری بیماران امری بدیهی به نظر می‌رسد. سومین علت شایع قرمزی چشم (تحقیق ما، تغییرات دئنراتیو ملتحمه شامل پینگاکولا و ناخنک ۱۵ درصد) بود. ناخنک یک بیماری شایع اکستنال چشم در سراسر جهان می‌باشد که به خصوص جوامع مناطق حاره و تحت حاره را مبتلا می‌کند. کار کردن در فضای بیرون، تماس با اشعه ماورای بنسن و فاکتورهای محیطی ریسک فاکتورهای مهم گسترش ناخنک می‌باشند. در مطالعه Wuk (۲۳) در چین شیوع ناخنک در بیماران با قرمزی چشم ۳۳/۰۱ درصد بود که در زنان شایع‌تر از مردان و به عنوان شایع‌ترین علت قرمزی چشم در جمعیت بالای ۵۰ سال شناخته شد. در مطالعه ما بیشترین محل قرمزی چشم ناشی از ناخنک و پینگاکولا در قسمت نازال (۵۸/۳ درصد) بود. بیشترین سن ابتلا به ناخنک ۴۰ سال و بالاتر (۲۷/۹ درصد) بود، ضمناً در جنس مؤنث بیشتر (۱۷/۷ درصد) مشاهده شد که با توجه به آب و هوای گرم و خشک استان بیزد و وزش زیاد بادهای گرم شیوع بالای ناخنک قابل توجیه می‌باشد. در مطالعه Panchapak (۲۴) در استرالیا بر روی ۳۵۶۴ بیمار بالای ۴۹ سال ناخنک در ۷/۳ درصد و پینگاکولا در ۶۹/۵ درصد مشاهده گردید که به طور قابل توجهی در مردان بیشتر از زنان بود. در مطالعه Jobs (۲۵) بر روی ۱۳۴ بیمار مبتلا به اسکلریت و اپی اسکلریت عوارض چشمی در ۱۳/۵ درصد بیماران با اپی اسکلریت و ۵۸/۸ درصد بیماران با اسکلریت دیده شد. هیچ کدام از بیماران با اپی اسکلریت کاهش بینایی نداشتند در حالی که در ۱۵/۹ درصد بیماران با اسکلریت کاهش بینایی ایجاد شد. در مطالعه مشابه توسط Cuchacovich (۲۶) در شیلی روی ۶ بیمار مبتلا به اسکلریت و اپی اسکلریت کاهش بینایی در

چشم پر شک دارند شامل سلولیت اریبت، هایفما، اسکلریت،
یووئیت، گلوکوم حاد زاویه بسته و زخم قرنیه می باشند.

eye، تعیین علل بالقوه خطیر قرمزی چشم جهت ارجاع فوری به
چشم پر شک می باشد. حالات کلینیکی که نیاز به ارجاع فوری به

References:

- 1- Leibowitz HM. Pratt MV. Flagstad IJ. Berrospi AR. Kundsir R. Human conjunctivitis. II. Treatment. *Arch Ophthalmol* 1976; 94: 1752-1756.
- 2- Schaller UC. Klauss V. From Conjunctivitis to glaucoma. When is a red eye an alarm signal?. *MMW Fortschr Med* 2002; 144: 30-33
- 3- Ruppert SD. Differential diagnosis of pediatric conjunctivitis (red eye). *Nurse Pract* 1996; 21: 12, 15-18, 24 Passim.
- 4- Robin H. Conjunctivitis, episcleritis and scleritis. *Rev Part* 1999; 49:1969-1975.
- 5- Gaston H. Managing the red eye. *Practitioner*. 1999; 233: 1566-1572.
- 6- Whitman J. Cunningham RD. The red eye. Why it happens, what to do, when to refer. *Postgrad Med* 1983; 74: 65-71.
- 7- batterbury B. The acute Red eye. *Ophthalmology*. London, Churhill Livingstone, 1999; 96-97.
- 8- Bertolini J. Pelucio M. The red eye. *Emerg Med Clin North Am* 1995; 13: 561-579.
- 9- Howes DS. The red eye. *Emerg Med Clin North Am* 1988; 6: 43-56.
- 10- Hara JH. The red eye: diagnosis and treatment. *Am Fam Physician* 1996 Dec; 54: 2423-2430.
- 11- Jacson WB. Differentiating conjunctivitis of diverse origins. *Surv Ophthalmol* 1993; 38: 91-104.
- 12- Beaver HA, Lee AG. The management of the red eye for the generalist. *Compr Ther* 2001; 27: 218-227.
- 13- Michelson PE. Red eye unresponsive to treatment. *West J Med* 1997; 166: 145-147.
- 14- Greenberg MF. Pollard ZF. The red eye in childhood. *Pediatr Clin North Am* 2003; 50: 105-124.
- 15- Karki DB. Shrestha CD. Shrestha S. Acute haemorrhagic conjunctivitis: an epidemic in August/September 2003. *Kathmandu Univ Med J* 2003; 1: 234-236.
- 16- Passaro DJ. Scott M. Dworkin MS. A university conjunctivitis out break, *Epidemiol Infect* 2004; 132: 761-764.
- 17- Jorm LR. Capon AG. Communicable disease out breaks in long day centers in Western Sydney occurrence and risk factors. *Child Health* 1994; 30: 151-154.
- 18- Laroche GR. MC Intyre. Schertzer RM. Epidemiology of sever eye injuries in childhood. *Ophthalmology* 1988; 95: 1603-1607.
- 19- Nirmalan PK. Kats J. Tielseh JM. Robin Al. Ocular trauma in Indian Population. *Ophthalmology* 2004; 111: 1778-8.
- 20- Desai P. Mac Ewenc J. Baines P. Minassia Dc. Epidemiology of ocular trauma in Scotland hospital. *J Epidemiol Community Health* 1996; 50: 436-441.
- 21- Jans. Khans. Mohammad S. Hyphema due to blunt trauma, *J Coll Physicians Surg Pak* 2003; 137: 389-401.
- 22- Kunimoto Dy. Sharmas. Reddy MK. Keratitis in children. *Ophthalmology* 1998; 105: 252-257.
- 23- Wu K HEM XUJ, Pterygium in aged population in Doumen Country. *China Yan ke Xue Bao* 2005; 18: 181-184.
- 24- Panchapak J. Horjhan F. Mitchell, Prevalence of Ptrygium and pinguecula. Aust NZJ ophtalmol. 1998 May; 26 Suppl 1: 25-5. *Orv Hetil* 1999; 140: 1631-1633.
- 25- Jabs DA. Mudum A. Dunn JP. Marsh MJ. Episcleritis and scleritis. *Am J ophthalmol* 2000; 130: 469-476.
- 26- Cuchavich TM. Pachecop Merino G. Gallarolop. Clinical Feautures and response to systemic treatment of scleritis and Episcleritis. *Rev Med chil* 2000; 128: 1205
- 27- Akpek EK. Thorn JE. Qazi FA. Evaluation of patient with scleritis for systemic disease. *Ophthalmology* 2004; 111: 501-506.
- 28- Akpek EK. UYHS, Christen W. Gurdal C. Foster C. Severity of Episcleritis and systemic disease association. *ophthalmology* 1999; 106: 729-731.
- 29- Akduman L. Kaplan HD. Tychsenl A. Oneset of uveitis more than a decade after onset of arthritis. *J Pediatr Ophthalmol Strabismus* 1997; 34: 101-6.
- 30- Wolf Md. Lichter PR. Ragsdalee CG. Prognostic factor in uveitis of JRA. *Ophthalmology* 1997; 94: 1242-1248.