

معرفی یک مورد بیماری ADEM واریانی از مالتیپل اسکلروزیس با تظاهر بالینی کما و صرع استاتوس

*^۱
مهردخت مزده^۲ ، لیلا رضابی

خلاصه

سابقه و هدف: یک بیماری اتوایمیون است که در آن به دنبال محركی ناشناخته، واکنشی ایمونولوژیک در میلین فعال می‌شود و مشابه فراوانی با مالتیپل اسکلروزیس (MS) دارد. میزان بروز انسیدانس آن نامعلوم است. در کشورهای در حال توسعه در زمینه عفونت‌های تنفسی فوکانی آتیپیک رخ می‌دهد و سایر عوامل اتیولوژیک آن ناشناخته است. بزرگسالان جوانان و بچه‌ها بیشتر به آن مبتلا می‌شوند. علایم سیستمیک آن تب، بی‌حالی، سرد درد و تهوع و استفراغ است که زودتر از علایم نورولوژیک ظاهر می‌شود اما علایم بر جسته آن تسریع در ایجاد نظاهر اولیه عصبی شامل کما، همی‌پارزی، تشنج، فلچ اعصاب کرانیال و ادامه تب می‌باشد، لذا یکی از علل کمای ناگهانی و غیر مترقبه در بزرگسالان جوان بیماری ADEM است. در برخورد اولیه با این بیماران ممکن است تشخیص نادیده گرفته شود. در این مقاله به معرفی یک مورد بیمار مبتلا به ADEM مراجعه کننده به بیمارستان سینا همدان در سال ۸۴ پرداخته می‌شود.

معرفی مورد: بیمار دختر مجرد ۲۲ ساله‌ای بود که با کمای بسیار ناگهانی و سریع و به دنبال آن صرع استاتوس به بیمارستان آورده شده بود. سابقه پزشکی و دارویی او منفی بود. در معاينه سیستمیک به جز تب مختصر، نکته دیگری نداشت. در معاينه نورولوژیک علایم درگیری راه کورتیکوس‌پایانال دورطرفه وجود داشت. بعد از باز نمودن راه هوایی و کنترل صرع استاتوس و درخواست آزمایش‌های معمول CT، اسکن و بررسی مایع مغزی نخاعی انجام شد که طبیعی بودند. با انجام MRI تصاویر هیپر‌سیگنال متعدد در کورتکس و ساب کورتیکال هر دو نیمکره دیده شد ولی ناحیه کورپوس کالوزوم سالم مانده بود. با تشخیص ADEM کورتیکوتراپی با دوز بالا به مدت ۱۰ روز شروع شد که منجر به بهبودی بیمار گردید و جهت فیزیوتراپی ترخیص گردید.

بحث: ضایعات ماده سفید مغز مسحوق کمای نورولوژیک بیمار بود زیرا علل متابولیک، عفونی، توکسیک، ترومای، ضایعات واسکولار (فقدان علایم لاترالیزه) و ضایعات فضای‌گیر، مادرزادی و تکاملی در این بیمار رد شد. وجود تب و تشنج و فقدان هوشیاری، فقدان الیگوکلونال باند در نمونه CSF. سالم ماندن کورپوس کالوزوم، عدم وجود ضایعه جدید در MRI بعد از حمله کلینیکی اول، کوتاه بودن دوره شروع علایم و شدت زیاد علایم اولیه، از بیماری‌های دمیلینیزان تشخیص ADEM (برخلاف MS) را تأیید می‌کند.

نتیجه‌گیری: در هر بیمار بزرگسال جوان با کمای نورولوژیک سریع و ناگهانی که علل متابولیک و زمینه عفونی و توکسیک و ترومای را نداشت و از نظر ضایعات فضای‌گیر و تکاملی مادرزادی مغز منفی بود باید به فکر بیماری التهابی دمیلینیزان باشیم چون عدم درمان به موقع منجر به فوت خواهد شد.

واژگان کلیدی: ADEM، کما، بیماری‌های دمیلینیزان

۱- استادیار گروه مغز و اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

تاریخ دریافت مقاله: ۸۴/۱۱/۵

۲- دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

تاریخ تایید مقاله: ۸۵/۲/۲

* نویسنده مسؤول: مهردخت مزده

آدرس: همدان، بیمارستان سینا، بخش نورولوژی

پست الکترونیک: mazdeh_m2007@yahoo.com

نامعلوم است و در گذشته به طور شایع در بچه‌هایی که به عفونت‌های سرخک، سرخجه، آبله و آبله‌مرغان آلوده بودند دیده می‌شد ولی امروزه با کنترل این بیماریها در زمینه عفونت‌های تنفسی فوکانی آتیپیک رخ می‌دهد، البته هنوز سایر عوامل


مقدمه

ADEM یک بیماری اتوایمیون مشابه مالتیپل اسکلروزیس (MS) است که در اثر یک محرك ناشناخته، واکنشی ایمونولوژیک با میلین، فعل می‌شود. انسیدانس واقعی بیماری،

مبینی بر سابقه بیماری خاص، مصرف داروی خاص و یا سابقه فامیلی وجود نداشت. علایم حیاتی بیمار در بد و ورود $BP=117/70\text{ mmHg}$, $PR=70\text{ min}$, $RR=13\text{ min}$ و $T=38^\circ\text{ C}$ بود. بیمار $GCS=4$ داشت ولی در معاینه سر و گردن، شکم و لگن مشکلی نداشت. جهت معاینه نورولوژیک، با توجه به کمای بیمار معایناتی که امکان پذیر بود انجام شد: رفلکس مردمک به نور و رفلکس *consensual* وجود داشت، مردمک‌ها سایز نرمال و پاسخ ضعیف به نور داشتند، فوندوسکوپی طبیعی بود و رژیدیتی و ردور گردن وجود نداشت. اندام‌ها در وضعیت دسربره و رفلکس بابنیکی دوطرفه مثبت بود. جهت وی عمل لوله گذاری راه هوایی انجام و لوله معده جهت لاواز ترشحات و ارزیابی توکسیکولوژی گذارده شد. بیمار با دو رگ محیطی مناسب و بعد از گرفتن نمونه خون جهت بررسی الکتروولیتها و قند و *CBC* و دریافت گلوکز هیپرتونیک ۵۰ درصد ($50\text{ SiSi وریدی آهسته}$) به *ICU* منتقل شد. در بررسی گازهای شریانی، اسیدوز تنفسی مشاهده شد و برای فاز استاتوس صرع به دلیل عدم پاسخ‌دهی کامل بعد از تجویز دیازپام تا سقف 150 mg , میدازولام با دوز 0.07 mg/kg تزریق و تشنج کنترل شد، اما حرکات لرزشی نسبتاً شدید در اندام تحتانی دو طرف باقی ماند که با نگاه داشتن عضو هم برطرف نمی‌شد.

یافته‌ها

در آزمایش‌های به عمل آمده قند خون، الکتروولیت‌ها ($p\text{-Na}, \text{Ca}$, k , Na , Cl , K , Ca , Na , Cl), نیتروژن اوره، خون، کراتینین و آنتالیز ادرار در محدوده نرمال بودند. روز دوم بستره، آزمون بررسی چربی و تست‌های انعقادی، آزمون بررسی چربی و *ESR* به عمل آمد که همگی نرمال گزارش شدند. جهت بیمار تست‌های تیروئید و بررسی فونکسیون پروتئین *C* و *S* درخواست شد که جواب‌ها نرمال بود. *CT* اسکن مغزی بیمار که بعد از پایدار ماندن علایم حیاتی (۴ ساعت بعد از بستره) انجام شد، نرمال بود. (تصویر شماره ۱)




تصویر ۱ - *Brain CT Scan* مقطع آنکریال: نرمال


اتیولوژیک آن ناشناخته است (۱، ۲). شیوع در بزرگسالان جوان و بچه‌ها بیشتر است و ۴۵ درصد موارد به دنبال واکسن یا بعد از عفونت ویرال اگزانتماتو ایجاد می‌شود (۳، ۵). علایم به صورت تب، بیحالی، سردرد، تهوع و استفراغ است که زودتر از علایم عصبی ایجاد می‌شود اما علامت بر جسته آن، تسریع در ایجاد ظاهر اولیه عصبی شامل کما، همی‌پارزی و تشنج و فلج اعصاب کرانیال و ادامه تب می‌باشد (۵، ۶، ۷، ۸، ۹). در اغلب موارد تشخیص بیماری به علت نرمال بودن *CT* اسکن، مایع مغزی نخاعی و نوار *MRI* مغزی با یافته‌های غیر اختصاصی (۲، ۱۰، ۱۱) به وسیله صورت می‌گیرد. ضایعات دمیلینه متشر و مولتی فوکال در ماده سفید مشابه مالتیپل اسکلروزیس و عدم درگیری کورپوس کالوزوم بر خلاف مالتیپل اسکلروزیس وجود دارد (۷، ۱۲). تشخیص قطعی با بیوپسی مغز است، که در پاتولوژی آن مناطقی فاقد میelin و یا بر جایی اکسونها در همان ناحیه دمیلینه دیده می‌شود. درمان با دوز بالای کورتون و در صورت شکسته با پلاسمافرژیس و ایمنوگلبولین وریدی است (۱۳). پروگنوز بیماری در دراز مدت مطلوب است، احتمال عود هم با بروز مشکلات نوروسایکیاتری وجود دارد و در صورت عدم تشخیص، شناسن مرگ و میر به ۱۰ درصد می‌رسد (۷). در مطالعات متعدد به عفونت‌های ویرال نظر اوربیون، آنفلوانزا *A* و *B*, هیاتیت و هرپس سیمپلکس، مونونوکلیتوز عفونی، سایتوگالوویروس و حتی ایدز و نیز تزریق واکسن‌هایی مثل واکسن هاری، *DPT*, آبله مرغان، فلح اطفال، سرخک، هپاتیت *B* و آنفلوانزا قبل از بروز بیماری اشاره شده است (۳، ۵). سابقه عفونت قبلی در *MS* ۱۴ درصد و در *ADEM* ۴۵ درصد ذکر شده است (۴). در اکثر مطالعات، نقص بینایی، سایکوز حاد، آتاکسی، دیس ارتی و میلوپاتی علاوه بر ادامه تب، آنسفالوپاتی، همیپارزی، تشنج و فلج اعصاب کرانیال گزارش شده است (۷، ۸). در مطالعات دیگری به درگیری تالاموس تا ۴۰ درصد بیماران اشاره شده است (۱۵، ۱۶). پروگنوز بد در *ADEM* با سن بالا، جنس زن، درگیری نخاع و اعصاب محیطی، ابتلای قبلی به سرخک و افزایش شدت بروز بیماری در آغاز، مرتبط می‌باشد (۱۷).

معرفی بیمار

دختر ۲۲ ساله مجرد ساکن همدان به علت کاهش سطح هوشیاری ناگهانی و سپس کمای سریع الوقوع به اورژانس آورده شد. بیمار در حین جارو کردن منزل به طور ناگهانی و غیرمتقبه دچار کنفوزیون شده و به سرعت در کما رفته و بلاfacial دچار حمله صرع استاتوس شده بود. در سابقه پزشکی او، نکته خاصی



تصویر ۳- Brain MRI مقطع آگزیال نمای T2 تصاویر هایپرسیگنال متعدد در لوب فرونتوپاریتال و پاراونتریکولار




تصویر ۴- Brain MRI مقطع آگزیال نمای T2 تصاویر هایپرسیگنال در لوب فرونتال سمت چپ (Balo)

با شک به بیماریهای دمیلینیزان نوع ADEM

کورتیکوتراپی با دوز بالا (۵ روز اول ۱۸ و ۳ روز بعد ۰/۵g و ۳ روز دوم ۲۵۰mg) داخل ۵۰۰ سی سی سرم قندی٪/۵، به صورت انفузیون وریدی شروع شد، سپس دارو به فرم خوراکی تبدیل و از مقدار آن کاسته شد. روز دهم بستری، بیمار شروع به گاز گرفتن لوله تراشه نمود و چشم خود را با محرك دردنگ باز کرد، روز دوازدهم با GCS=14 و صدای هیپوفون و تغذیه از طریق دهانی به بخش منتقل شد. در طول مدت بستری در ICU فیزیوتراپی چهار اندام و قفسه سینه به صورت پاسیو، هپارین با دوز پیشگیری برای جلوگیری از خطر ترومبو فلیت و آنتی بیوتیک مناسب به جهت استعداد ابتلا به عفونت های بیمارستانی ناشی از

بررسی مایع مغزی نخاعی بیمار از نظر قند، پروتئین و تعداد سلول ها نرمال و جواب های اسمیروسوستیلوژی و کشت از نظر تب مالت، سل و عفونت های قارچی نیز که با تأخیر آماده شد منفی بود، بررسی الیگو کلونال باند در نمونه CSF نیز منفی شد. جواب سم شناسی ترشحات معده منفی بود و جهت بیمار آزمون CH50, C3, C4, VDRL, ANCA، تست های تشخیصی لوپوس و آنتی بادی علیه ایدز و توکسoplasmoma درخواست گردید که تماماً نرمال گزارش شد، PPD بیمار بعد از ۴۸ ساعت منفی و عکس پرتاپل قفسه سینه بیمار نرمال بود. در نوار مغزی روز اول بعد از اتمام صرع استاتوس امواج سوزنی و شارپ پراکنده و در نوار مغزی بعدی که روز چهارم انجام شد امواج مغزی با فعالیت آهسته وجود داشت. در تصویربرداری با روش تشیدی مغناطیسی (MRI) که روز دوم انجام شد تصاویر هایپرسیگنال متعدد در نمای T₂ در کورتکس و ناحیه ساب کورتیکال هر دو نیمکره دیده شد که بزرگترین آنها در منطقه فرونتال سمت چپ بود ولی ناحیه کورپوس کالوژوم سالم بود. (تصویر ۲ تا ۴)



تصویر ۲- Brain MRI مقطع ساژیتال نمای T2 تصاویر هایپرسیگنال متعدد در لوب فرونتال و پاریتال

سرکوس (که شایع ترین عامل پارازیتی در گیرکننده CNS است) رد شد، از طرفی ائوزینوفیلی در خون یا CSF مشخصه این بیماری است که در بیمار فوق منفی بود. تشخیص انگل اکینوکوس هم که می‌تواند کیست مولتی لوکال کمپلکس در CT اسکن ظاهر کند (۲۱)، برای بیمار منفی است. ضایعات پری و نتریکولار با منشاء اسکولار بیشتر تعابیل به پریفرال دارند، ولی در ADEM این گونه نیست. به دلیل نداشتن تابلوی استروک، تاریخچه قبلی ترومبوز یا زایمان با جنین مرده و تست‌های آزمایشگاهی نرمال تشخیص سندرم آنتی فسفولیپید آنتی‌بادی نیز رد می‌شود (۲۲). تشخیص‌های افتراقی دیگر برای ADEM انسفالیت ویرال و سندرم بعد از مalaria می‌باشند، که در مورد اول فقدان عالیم فوکال و سیستمیک از قبل و عدم فاصله بین عالیم سیستمیک تا عالیم نورولوژیک به ضرر تشخیص است، در مورد دوم هم بهبودی اخیر از بیماری مalaria لازم است. تب، فقدان هوشیاری و تشنج با رد همه موارد بالا تشخیص بیماری ADEM را تقویت می‌کند. از طرفی فقدان الیگوکلونال باند CSF، عدم وجود ضایعه جدید در MRI بعد از حمله اولیه در MRI، ۲ ماه بعد از تشخیص، کاهش تعداد ضایعات را نشان می‌داد، عدم درگیری کورپوس کالوزوم، کوتاه بودن دوره شروع عالیم و شدت زیاد عالیم اولیه تشخیص MS را نفی می‌کند.

نتیجه گیری

ADEM یک بیماری التهابی مونوفازیک سیستم CNS است که به همراه MS، بخشایی از یک طیف بیماری التهابی دمیلیته را تشکیل میدهد. این بیماری، در کشورهای در حال توسعه یک بیماری نورولوژیک شایع احتمالاً به دنبال عفونتهاي اکتسابی می‌باشد، لذا قرار دادن آن در لیست تشخیصی کمای سریع و ناگهانی در بزرگسالان جوان توصیه می‌شود چون عدم درمان به موقع و سریع و یا درمان ناکافی منجر به فوت خواهد شد. ضمناً بعد از ابقای بیمار توصیه به تزریق بتاگفون نمی‌شود، لازم به ذکر است از محدودیتهای مطالعه بر روی بیماران مبتلا به ADEM بیوپسی مغز است که در صورت رضایت همراهان بیمار میسر خواهد بود، لذا انجام مطالعات بیشتر در این زمینه برای تعیین پیش‌آگهی و روش‌های سریعتر تشخیصی پیشنهاد می‌گردد.

References:

- 1- Murthy SNK. Faden HS. Cohen ME. Acute disseminated encephalomyelitis in children. *Pediatrics* 2002; 110: 103-106.
- 2- Murthy JM. Yangala R. Meena AK. Acute disseminated encephalomyelitis: clinical and MRI study from south India. *J Neurol Sci* 1999; 165: 133-138.

لوله تراشه و معده تجویز شد. تب بیمار تا ۵ روز اول کورتیکوتروپی همچنان بین ۳۸/۳ تا ۳۸/۸ متفاوت بود، پس از آن شروع به کاهش نمود و روز دوازدهم دمای بدن به $T=37^{\circ}C$ رسید. بیمار با ادامه کورتون خوارکی و فیزیوتراپی ترخیص شد. ۲ ماه بعد در MRI مجدد، ابتورمالیتی ماده سفید به طور واضح کمتر شده بود.

بحث

با توجه به ارزیابی علل کمای نورولوژیک و رد مسائل متابولیک و عفونی، ضایعات تروماتیک، مسمومیت‌ها همچنین نداشتن عالیم لترالیزه به نفع ضایعه عروقی، فوندوسکوبی طبیعی و رد ضایعات فضایگیر و ضایعات تکاملی مغز، تشخیص به سمت ضایعات درگیرکننده ماده سفید مغز می‌رود. از علل درگیری ماده سفید مغز می‌توان بیماریهای دمیلیتیان، اندوکاردیت باکتریال، عفونت CNS ناشی از قارچ‌ها، سل و پارازیت‌ها (مثل سیستی سرکوزیس)، اکلامپسی، اسفلالپاتی HIV و SSPE، اسفلالپاتیک میتوکندریال، لوکودیستروفی، لوکوانسفلالپاتی، ارترواسکلروتیک تحت حد، سن بالای ۶۵ سال، واسکولیت‌های اتوایمیون، گلیوم مولتی فوکال، نوروسارکوئیدوز و لوپوس را مد نظر قرار داد. که در دو مورد اخیر نورولوپاتی کرانیال علامت بر جسته این بیماریهای سیستمیک می‌باشد، از طرفی چون در MRI کورپوس کالوزوم سالم مانده بود تشخیص گلیوماتوزیس سربزی نیز غیرمحتمل است. با توجه به یافته‌های نرمال در ادرار، ESR طبیعی و عدم کاهش وزن و ضایعات پوستی در هفته‌های اخیر تشخیص اندوکاردیت باکتریال نیز رد می‌شود (۱۸). فقدان بیماریهای Immune-compromise، پیوند اعضا و سابقه دیابت، تشخیص عفونت قارچی در سیستم عصبی مرکزی را هم رد می‌کند (۱۹). قند نرمال در CSF. رادیوگرافی نرمال قفسه سینه، عدم سابقه بیماریهای مخاطره‌آمیز سیستم ایمنی و تست ایدز منفی به ضرر تشخیص گرانولوماتیک سلی در پارانشیم مغزی بود، از طرفی تست PPD در ۸۵ درصد بیماران با درگیری سیستم عصبی مرکزی مثبت است (۲۰) در بیمار فوق منفی بود. به دلیل عدم وجود کیست‌های کلسيفيه به صورت rim و فيبروتیک با نمای خوش‌های در CT اسکن مغز، تشخیص عفونت مغزی با عفونت پارازیتی نظر سیستی

- 3- Litvak AM. Sands IJ. Cibel H. Encephelitis complicating measles:report of 56 cases with follow up studies in 32. *AM J Dis Child* 1943; 65: 265-295.
- 4- Miller HG. Evans MJ. Prognosis in acute disseminated encephalomyelitis :with a note of neuromyelitis optica. *Q J Med* 1953; 22: 247-279.
- 5- Stuve Q. Zamuil SS. Pathogenesis, diagnosis and treatment of acute disseminated encephalomyelitis. *Curr Opin Neurology* 1999; 12: 395-401.
- 6- Murthy JMK. Yangala R. Meena AK. Clinical electrophysiological and magnetic resonance imaging study of disseminated encephalomyelitis. *J Assoc Physicians India* 1999; 47: 280-283.
- 7- Schwarz MA. Knauth M. Acute disseminated encephalomyelitis;a follow up study of 40 adult patients. *Neurology* 2001; 56:1313-1318.
- 8- Apak RA. Kase G. Anlar B. Acute disseminated encephalomyelitis in childhood: report of 10 cases. *J Child Neurol* 1999; 14: 198-201.
- 9- Dale RC. de Sousa C. Chong WK. Acute disseminated encephalomyelitis, multi phasic disseminated encephalomyelitis and multiple sclerosis in children. *Brain* 2000; 123: 2407-2422.
- 10- Scully RE. Mark EJ. Mcneely WF. Case records of the Massachusetts General Hospital, case 37-1995. *N Engl J Med* 1995; 333: 1485-1492.
- 11- Hollinger P. Sturzenegger M. Mathis J. Acute disseminated encephalomyelitis in adults: a reappraisal of clinical CSF, EEG and MRI findings. *J Neurol* 2002; 249: 320-390.
- 12- Straub J. Chofflon M. Delavelle J. Early high-dose intravenous methylprednisolone in acute disseminated encephalomyelitis: a successful recovery. *Neurology* 1997; 49:1145-1147.
- 13- Kanter DS. Horensky D. Sperling RA. plasma pheresis in fulminant acute disseminated encephalomyelitis. *Neurology* 1995; 45: 824-827.
- 14- Pradhan S. Gupta RP. Shashank S. Intravenous immunoglobulin therapy in acute disseminated encephalomyelitis. *J Neurol Sci* 1999; 165: 56-61.
- 15- Caldmeier KS. Smith RR. Harris TM. MRI in acute disseminated encephalomyelitis. *NeuroRadiology* 1994; 36: 216-220.
- 16- Singh S. Alexander M. Korah IP. Acute disseminated encephalomyelitis : MR imaging features. *AJR Am J Roentgenol* 1999; 173: 1101-1107.
- 17- Hynson JL. Kornberg AJ. Coleman LT. Clinical and neuro radiology features of acute disseminated encephalomyelitis in children. *Neurology* 2001; 56: 1308-1312.
- 18- Salgado AV. Furlan AJ. Keys TF. Nichols TR. Beck GJ. Neurologic complications of endocarditis: a 12-year experience. *Neurology* 1989; 39: 173-178.