

بررسی چگونگی بیان ایزوفورم‌های PI3K در سلول‌های دودمانی سرطان پروستات انسانی از نوع PC3 و DU145

زهرا سهیلی^{*}، زربن مینوچهر^۲، شهرام سمیعی^۳، زهرا عطایی^۴، مهناز کواری^۴، علی طالیان^۵

خلاصه

سابقه و هدف: دو دودمان سلولی از سرطان پروستات، PC3 و DU-145، بسیار متابستاتیک هستند ولی از نظر بیان ژن سرکوب‌گر PTEN مشابه نیستند. سلول‌های DU145 (Phosphatase and Tensin homolog) را بیان می‌کنند ولی سلول‌های PC-3 فاقد ژن PTEN هستند. محصول ژن PTEN عملکرد (phosphoinositide-3 kinase) PI3K را بی‌اثر می‌سازد. بیان افزایش یافته ژن PI3K موجب تخریب غشای پایه، نوزایی عروق و مهاجرت سلولی می‌گردد. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه الگوی بیان ایزوفورم‌های PI3K بین این دو نوع دودمان سلولی جهت یافتن دلیلی برای قدرت بالای متابستازی سلول‌های DU145 بوده است.

مواد و روش‌ها: محتوای RNA کل از هر دو نوع سلول استخراج گردید و mRNA مربوط به ایزوفورم‌های PI3K به وسیله روش-PCR با آنزیم‌های مختلف رونویسی معکوس و در شرایط متفاوت انکوپاسیون بررسی گردید.

نتایج: داده‌ها نشان دادند هر دو نوع سلول زیر واحد کاتالیتیک P110α و پروتئین p85^۱ را از دسته II، ایزوفورم C₂ PI3K-C₂ را از دسته III خانواده ایزوفورم‌های PI3K بیان می‌کنند ولی از نظر نوع ایزوفورم‌های بررسی شده بین دو نوع سلول تفاوتی مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: از آنجا که برای سلول‌های DU145 در مقایسه با سلول‌های PC3 در الگوی بیان ایزوفورم‌های PI3K اختلافی مشاهده نشد، پیشنهاد می‌گردد به وسیله روش‌های کمی مقدار بیان هر یک از ایزوفورم‌ها تعیین شود. بدیهی است مشاهده هر گونه اختلاف در مقدار بیان ژن‌های تعیین شده می‌تواند به نوعی با قدرت تهاجمی سلول مرتبط باشد.

وازگان کلیدی: فسفاتیدیل اینوزیتول-۳-کیناز (PI3K)، سرطان پروستات، دودمان سلولی

- استادیار گروه بیوشیمی پژوهشگاه علوم پایه پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتک و زیست فناوری.
- استادیار گروه فرآوردهای بیولوژیک پژوهشگاه صنعت و معدن پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتک و زیست فناوری.
- مسئول بخش کیت سازی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.
- کارشناس بخش کیت سازی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.
- معاونت فنی و کنترل کیفی، مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.

* نویسنده مسؤول: زهرا سهیلی سهیلی.

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران، کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندس ژئوتک و زیست فناوری.

پست الکترونیک: Zahra@nrcgeb.ac.ir

تلفن: ۰۲۱ ۴۴۵۸۰۳۷۹

دورنوبیس: ۰۲۱ ۴۴۵۸۰۳۹۹

تاریخ دریافت: ۸۵/۲/۶

تاریخ پذیرش نهایی: ۸۵/۷/۱۶

مقدمه
کنترل سرطان می‌باشدند [۳]. سلول‌های سرطانی این توانایی را کسب می‌کنند که مرزهای بافتی را بشکنند و به بافت‌های مجاور و دور مهاجرت کنند. این فرآیند (متاستاز) بدترین وجه سرطان است [۴]. از میان انواع پروتئین‌ازهایی که در توسعه تومورها دخالت دارند می‌توان از MMP ها (Matrix metalloproteinase) نام برد [۵، ۶]. مهار رگ‌زادی و مهار تخریب غشای پایه و ماتریکس

سرطان پروستات شایع‌ترین نوع بدخیمی در مردان است و دومین رتبه را در میان علت‌های مرگ وابسته به سرطان دارد [۱، ۲]. توقف رگ‌زادی و مهاجرت سلولی در تومور، تشید و القای مرگ سلولی به وسیله آپوپتوز و دست‌کاری راه‌های انتقال پیام در سلول، تعدادی از استراتژی‌های جدید و امیدوارکننده در درمان و

هستند. راه انتقال پیام P13K به طور ذاتی انکوژنیک است و در بسیاری از انواع سرطان‌های انسانی دچار افزایش بیان می‌گردد. این افزایش بیان مدیون افزایش مقدار P13K یا هدف پایین دست آن AKT (سرین - ترئونین کیتاز) و یا کاهاش و فقدان عملکرد تنظیم‌کننده منفی آن (PTEN) می‌باشد [۱۰]. PTEN یکی از ژن‌های تومور ساپرسور انسانی است و یک نوع فسفاتاز است که فراوان‌ترین جهش‌ها را در آن در انواع سرطان می‌باییم [۱۱]. PTEN موجب آناتاگونیزه شدن علایم پایامی P13K می‌گردد [۱۲]، [۱۳]، [۱۴]. با توجه به اطلاعات ارایه شده تجربه‌آور خواهد بود، اگر بدایم که در سلول‌های دودمانی DU145 که از متاستاز تومور پروستات به مغز جدا شده و بسیار متاستاتیک و غیر حساس به آندرودژن هستند وجود mRNA و پروتئین PTEN آشکار گردیده است [۱۵]. قصد ما از این مطالعه بررسی سهم احتمالی فعالیت راه DU145 P13K در قابلیت متاستاز در دو نوع دودمان سلولی (دارای PTEN فعال) و سلول دودمانی PC3 (فاده‌زن PC) از سرطان پروستات است. به همین جهت در این مقاله ما به بررسی ایزوفورم‌های P13K پرداخته‌ایم و انواع ایزوفورم‌های موجود در هر دو نوع سلول را تعیین و مقایسه نموده‌ایم.

مواد و روش‌ها

محیط کشت RPMI1640 از شرکت Gibco خریداری شد. سرم جنبی گوساله از شرکت Gibco تهیه شده و در فریزر نگهداری می‌شد. تمام ظروف پلاستیکی کشت از شرکت Nunc تهیه شده بودند. رنگ‌های متبیل گرین (sigma) و تریپان‌بلو (sigma) جهت شمارش کل سلول و سلول‌های زنده تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفتند. لام Neubauer PO GmbH شمارش سلولی مورد استفاده قرار گرفت. سلول‌های DU145، PC3 از بانک سلولی پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتکنیک و تکنولوژی زیستی تهیه شدند. (منبع اصلی این سلول‌ها ATCC بوده است). پاساژ سلولی: جهت پاساژ سلولی از محیط کشت کامل FCS و RPMI ۱۰٪ استفاده می‌شد. به این ترتیب که بسته به نوع آزمایش و ظروف کشت مورد نظر 10^4 سلول زنده PC3 و یا PBS DU-145 در هر cm^2 از ظروف کشت وارد می‌گردید. بافر و محلول تریپسین - EDTA برای جدا کردن سلول‌ها از کف ظروف کشت مورد استفاده قرار می‌گرفت سپس شمارش سلولی و تعیین بقای سلولی انجام شده و سلول‌ها با دانسیته مناسب کشت داده می‌شدند. در تمامی موارد و آزمایشات حداقل تعداد پاساژهای انجام شده بیش از ۱۱ پاساژ نبود و مجدداً از سلول‌های فریز شده استفاده می‌گردد.

خارج سلولی یک روش درمانی با ارزش و نوین برای درمان تومورهای جامد و پیشگیری از تهاجم سلول‌های توموری است. اهداف ویژه چنین پروژه‌هایی شامل مهار کننده‌های گیرنده‌های کیتازی فاکتورهای رشد و MMP ها هستند [۷]. در راه‌های انتقال پیام برای تولید و فعال‌سازی MMP ها نقش و جایگاه P13K بسیار مهم می‌باشد. به طوری که داده‌ها حاکی از تعدیل فعالیت ژلاتینازها به واسطه مسیر P13K هستند [۸]. اگر چه بیشتر مطالعات مسیر انتقال پیام P13K در مورد نوع کلاسیک P110- P85 (که اکنون به عنوان دسته I خانواده P13K شناخته شده است) انجام شده، طی ۱۰ سال گذشته معلوم شده که ابرفamil EC2.7.1.137 از یک خانواده بزرگ از آنزیم‌هایی که از نظر ساختمانی شبیه هستند ولی سوبسترهاشی فسفاتیدیل اینوزیتول آنها متفاوت است، تشکیل شده‌اند. نحوه تنظیم اعضای این خانواده که احتمالاً مسؤول اشتغال عملکرد در آنها است نیز متفاوت می‌باشد. از اطلاعات حاصل از پروژه تراالف ڈنوم به نظر می‌رسد که هشت نوع زیر واحد کاتالیتیک متفاوت P13K قادر به فسفریله کردن لیپیدهای اینوزیتول هستند. این هشت عضو بر اساس ساختار پروتئین، ویژگی سوبسترای لیپیدی و زیر واحدهای تنظیمی به سه دسته متفاوت قابل تقسیم هستند دسته I شامل P13K- α , P110 β , P110 γ و P110 δ ، دسته II شامل P110 α , P110 β , P110 γ و P110 δ ، دسته III شامل P13K-C α β , C α γ و P13K-C α β . اینواع محصولات لیپیدی که به وسیله این آنزیم‌ها حاصل می‌شوند (3,4) P $_2$, (3,4,5) P $_3$, (3,4,5) P $_2$, (3,4,5) P $_3$ هستند که به شیوه‌های مختلف در انتقال پیام‌های داخل سلولی مشارکت دارند. به عنوان مثال ایزوفورم‌های δ و γ در مهاجرت سلولی نقش دارند، ایزوفورم‌های دسته I در اعمال حرکت سلولی، تعیین اندازه سلول و بقا و تکثیر سلولی دخالت دارند. علاوه بر این محصولات لیپیدی حاصل از فعالیت آنزیم‌های این دسته موجب ابیجاد قطبیت در سلول‌های پستانداران شده و در مکانیزم‌های تهاجمی لوکوسیت‌ها دارای عملکرد هستند. ایزوفورم‌های دسته II اساساً به غشا و ساختارهای غشایی وابسته‌اند و پیام‌های انتگرینی فاکتورهای رشد و سیتوکالین‌ها، فعالیت این دسته را تحریک می‌کند. ایزوفورم‌های دسته III در ترافیک داخل سلولی مواد و مولکول‌ها نقش داشته و با غشاء‌های داخلی در ارتباط هستند [۹]. محصولات لیپیدی آنزیم‌های ابرفamil P13K راه‌های انتقال پیام متنوع و بی‌شماری را داخل سلول کنترل می‌نمایند. بخشی از این اشتغال تبعیجه طیف وسیع پروتئین‌های تاثیرپذیر از لیپیدهای P13K بوده و در سطحی دیگر، تنوع حاصل از وجود انواع ایزوفورم‌های P13K مسؤول این تنوع در عملکرد

مورد شرکت Bio-Rad Superscript ۴۰°C انتخاب شد. برای هر واکنش ۰.۲۵ μl مهارکننده RNase با غلظت ۱۰ μM dNTP (Roche) و ۰.۷ mM dNTP (Promega) استفاده شده است.

آزمایش PCR از cDNA های ساخته شده: ۰.۱۰ μl از cDNA های ساخته شده: ۰.۲۰ μl مخلوط آغازگرهای مستقیم و معکوس با غلظت ۱۰ μM و ۰.۰۵ μM MgCl₂ از شرکت Calbiochem و Merck و ۰.۱۰% Glycerol از شرکت Biotoools Spain آنزیم Taq از شرکت Roche F و R مربوط به ایزوفورم‌های PI3K [۱۶]، توسط آغازگرهای F و R مربوط به ایزوفورم‌های PI3K [۱۷] انتخاب شده است.

F: GAGGCCAGAGCAAGAGAGG R: GGCCAGCCAGGTCCAGAC

قطعات حاصل از این آغازگرهای به ترتیب دارای

اندازه‌های ذیل هستند:

Actin: 368bp, P110α: 432bp, P110β: 432bp, P110γ: 346bp, PI3K-C2: 381bp, Vps34p: 353bp, p85: 425bp, p55: 336bp, p50: 271bp.

استخراج RNA کل: سلول‌های DU145, PC3 کشت داده شدند. پس از اینکه سلول‌ها در حدود ۷۵٪ کف ظروف را پوشانده بودند جهت استخراج RNA کل از آنها استفاده شد. استخراج RNA کل به کمک RNA Tri Pure Isolation Reagent از شرکت Roche و طبق دستور بروشور ضمیمه انجام گرفت سپس ژل الکتروفورز RNA بر روی ژل آگاروز ۱٪ و با فر ۰.۵ × TBE با ولتاژ ۵v/cm انجام شد تا سلامت نمونه‌های استخراج شده مشخص شود.

آزمایش رونویسی معکوس، ساخت cDNA: جهت انتخاب بهترین شرایط ساخت cDNA با حداقل واکنش غیر اختصاصی و بازدهی بالا از سه نوع آنزیم رونویسی معکوس MMLV-H⁻ شرکت AMV Promega و شرکت Bio-Rad Superscript واکنش رونویسی ۳۰ معکوس انجام شده و مدت زمان واکنش ساختن برای cDNA و ۶۰ دقیقه در نظر گرفته شد. به عنوان آغازگر واکنش از Random hexamer های ساخته شده توسط سازمان انتقال خون استفاده گردید. درجه حرارت مناسب جهت عملکرد H⁻ MMLV با غلظت ۰.۱ μl، ۴۰°C و در مورد AMV ۴۸°C در


جدول ۱- تراالف مربوط به آغازگرهای F و R ایزوفورم‌های PI3k

αp110	Forward	5'-CTGTGTGGGACTTATTGAGGTGGTGC-3'
	Reverse	5'-GGCATGCTGCGAATAGCTAGATAAGC-3'
βp110	Forward	5'-GAAGATTGCAAGCAGTGATAGTGC-3'
	Reverse	5'-CCTATCCTCCGATTACCAAGTCGTC-3'
γp110	Forward	5'-GCTGAAAACCTGCAGAATTCTCAAC-3'
	Reverse	5'-CGTCTTCACAATCTGATCATTCC-3'
PI3K-C2	Forward	5'-GCAGGTTCCCTCAGTCCTACTCCAGGC-3'
	Reverse	5'-GCCAGTCAGCTGATACCATTAAACCG-3'
Vps34p	Forward	5'-CGGGATCCAAGCCCTTCCTCCACC-3'
	Reverse	5'-CCAGTACTGGGCAAACCTGTGAATCTG-3'
p85	Forward	5'-GCTCTCTCAAACCTCCAGCAAAATCTG-3'
	Reverse	5'-GAAGCCRTATTTCCATCTCGRTG-3'
p55	Forward	5'-GCTCAGCCAAGGAAACTCTTGC-3'
	Reverse	5'-CCAGTACTGGGCAAACCTGTGAATCTG-3'
p50	Forward	5'-ATGCATAACCTGCAAACACTGC-3'
	Reverse	5'-CCAGTACTGGGCAAACCTGTGAATCTG-3'

(94°C 1min, 55°C 0.5min, 72°C 1min) & 1x(72°C 5min). دستگاه ترمال - سایکلر مورد استفاده دستگاه Techne بود.

شرایط سیکل‌های PCR برای β - actin (94°C 1min, 55°C 1min) & 1x(72°C 5min) و مشخصات سیکل‌های تکثیر برای PI3K 30x


آزمایشگاه استخراج RNA کل از هر دو نوع سلول انجام شد. همان طور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود ژل الکتروفورز RNA های استخراج شده از هر دو نوع سلول سلامت و کیفیت مناسب RNAها را نشان می‌دهد.




شکل ۱- RNA کل سلول

در این آزمایشات برای انتخاب بهترین شرایط از سه آنزیم AMV و MMLV و Superscript برای رونویسی معکوس استفاده شد. ژل الکتروفورز محصولات RT-PCR حاصل از استخراج شده از سلولهای DU145 و PC3 به وسیله آغازگرهای PI3K در شکل های ۲ تا ۶ نشان داده شده است.

نتایج
برای محاسبه زمان دو برابر شدن جمعیت سلولی P.D.T (population doubling time) به عنوان یک شناسه از سلول منحنی رشد سلول رسم شد (نمودارهای شماره های ۱ و ۲).




نمودار ۱- منحنی رشد سلولهای DU145




نمودار ۲- منحنی رشد سلولهای PC3


محاسبات میانگین آزمایشات انجام شده برای سلولهای DU145 P.D.T متعادل ۲۷ ساعت و برای PC3 متعادل ۳۸ ساعت را نشان می‌دهند. پس از سازگار شدن سلول‌ها با شرایط




شکل ۲- ایزوفورم‌های PI3K در سلولهای DU145. مدت زمان عمل آنزیم ۳۰ دقیقه




شکل ۳- ایزوفورم‌های PI3K در سلول‌های DU145، مدت زمان عمل آنزیم ۶۰ دقیقه



شکل ۴- ایزوفورم‌های PI3K در سلول‌های PC3 و DU145 که به وسیله آنزیم superscript رونویسی معکوس از RNA آنها انجام شده است



شکل ۵- ایزوفورم‌های PI3K در سلول‌های PC3، مدت زمان عمل آنزیم ۳۰ دقیقه




شکل ۶- ایزوفورم‌های PI3K در سلول‌های PC3، مدت زمان عمل آنزیم ۶۰ دقیقه

بحث

در این مطالعه دو نوع سلول دودمانی سرطان پروستات که بسیار تهاجمی بوده و از متاستاز سلول‌های سرطانی به مغز و DU145 مغز استخوان اولین گزارش داده‌اند، سلول‌های PC3 و DU145 جهت تعیین چگونگی بیان ایزوفورم‌های PI3K مورد آزمون قرار گرفتند. برای این مطالعه از سه نوع آنزیم رونویسی معکوس گرفتند. این بررسی‌ها از جهت استفاده شد و شرایط زمانی مختلف انکوباسیون RNA الگو و آنزیم مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی‌ها از جهت بهینه‌سازی شرایط آزمایش و اخذ نتیجه بهتر از آزمایش‌های PCR لازم به نظر می‌رسید. در این آزمایشات بیان هشت ایزوفورم γ و β و α . P50, 55, 85, P110 آزمایشات شدن دادند که در هر دو نوع سلول PC3 و DU145 ایزوفورم‌های P85, P110 α , P13K-C₂, P13K-C₁, Vps34p بیان می‌شوند. بنابراین الگوی بیان ایزوفورم‌های مورد بررسی در سلول‌های PC3 و DU145 یکسان بوده و تفاوتی در بیان انواع مورد مطالعه مشاهده نگردید و نیز برای هر سه آنزیم مورد استفاده این الگو یکسان بوده و در تمام انکوباسیون‌ها همان ایزوفورم‌ها مشاهده شدند. با این که مطالعات با مهارکننده‌های PI3K در *in vitro* نشان داده‌اند که عملکرد ایزوفورم‌های این آنزیم برای تحرك سلولی و متاستاز لازم است [۱۸] تا کنون هیچ‌گونه بررسی از نوع ایزوفورم‌های موجود در سلول‌های سرطان پروستات و نقش آنها در قدرت تهاجمی این سلول‌ها انجام نشده است. ولیکن محققان نشان داده‌اند که مسیر PI3K در سلول‌های کارسینومای پروستات انسانی مهمترین مسیر انتقال پیام برای اغلب فاکتورهای رشد می‌باشد [۱۹]. فعال شدن مزمن مسیر PI3K منجر به رشد متاستاتیک سلول‌ها می‌گردد ولی تا کنون مکانیسم آن روش نشده است [۲۰]. با این وجود این مسیر برای توسعه روش‌های درمانی یک زمینه بسیار مورد توجه بوده است [۲۱]. محققان قویا پیشنهاد می‌کنند، ایزوفورم‌های دسته II موجب اختلال در مرگ برنامه‌ریزی شده سلول گردیده و عامل حیاتی برای بقای سلول سرطانی هستند [۲۲]. به تازه‌گی یک NOK: Novel Oncogene with Proline-rich Kinase-domain (Kinase-domain) شناسایی شده است که تنها در پروستات به فراوانی یافت می‌شود. NOK از طریق فعال کردن مسیر PI3K موجب تومورزاگی و متاستاز سلول‌های پروستاتی می‌گردد [۲۳]. تحقیق حاضر اولین گزارش از بررسی الگوی بیان ایزوفورم‌های خانواده PI3K در سلول‌های PC3 و DU145 است و تا کنون گزارش دیگری در این مورد ارایه نگردیده است. با توجه به اینکه سلول‌های DU145 واجد ژن تومور ساپرسور PTEN هستند که

همان طور که مشاهده می‌شود برای هر دو آنزیم AMV و MMLV نتیجه انکوباسیون به مدت زمان ۶۰ دقیقه از انکوباسیون به مدت زمان ۳۰ دقیقه بسیار بهتر می‌باشد. ژل الکتروforeز محصولات PCR-RT از استخراج شده از سلول‌های DU145 و PC3 و به وسیله آغازگرهای PI3K و آنزیم Superscript (شکل شماره ۴) نشان می‌دهد عملکرد این آنزیم برای واکنش رونویسی معکوس مناسب است. برای سلول‌های PC3 استفاده از محصول واکنش رونویسی معکوس به وسیله آنزیم AMV در مدت زمان ۳۰ دقیقه برای آزمایش تعدادی بنده‌های اضافه و غیراختصاصی را نیز نشان داده است این نتیجه در شکل‌های ۵ و ۶ مشاهده می‌شود. آزمایش RT-PCR از RNA‌های استخراج شده از سلول‌ها به وسیله آنزیم‌های رونویسی معکوس AMV و MMLV و آغازگرهای اکتین در شکل شماره ۷ نشان داده شده است.



شکل ۷- RT-PCR بنا اکتین از سلول‌های DU145 و PC3

نتیجه کار با آنزیم MMLV قابل قبول بوده و باندهای مربوط به اکتین به صورت تکباند مشاهده می‌شوند. با توجه به نتایج حاصله از آنزیم MMLV و مدت زمان انکوباسیون ۶۰ دقیقه برای انجام تمام آزمایشات بعدی و RT-PCR تمام ایزوفورم‌ها و اکتین استفاده شد. با تکرار حداقل سه بار آزمایش، نتایج نشان دادند که ایزوفورم کاتالیتیک α P110 و ایزوفورم تنظیمی P85 از دسته I خانواده PI3K و ایزوفورم از دسته II Vps34p از دسته III خانواده PI3K در هر دو نوع سلول بیان می‌شوند و هیچ‌گونه اختلافی از نظر نوع ایزوفورم‌های مورد بررسی در این سلول‌ها مشاهده نگردید. در این آزمایشات بیان ژن‌های P50, 55, γ و β و P110 برای هر دو نوع سلول مشاهده نشد.

سلول‌های اپی‌تیالی غدد پستانی انسان نیز نشان داده شده است [۲۶، ۲۷].

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج تحقیقات سایر محققین که شرح آن داده شد و مطالعات انجام شده در این تحقیق در صورتی که تحقیقات آنی ما برای کمیت سنجی انواع ایزوفورم‌ها نشان‌دهنده مقدار بیان تغییر یافته برخی ایزوفورم‌ها در سلول‌های PC3 و DU145 باشد می‌توان به وسیله مهار کردن ژن کاندید توان تهاجمی سلول‌ها را کنترل نمود و بدین ترتیب دریچه جدیدی از امید برای کنترل پدیده متاستاز این بدرتین وجه سرطان، گشوده خواهد شد.

تشکر و قدر دانی

این تحقیق بخشی از طرح مصوب شماره ۲۱۸ پژوهشگاه ملی مهندسی ژئوتک و زیست فناوری بوده و بودجه آن توسط این پژوهشگاه تامین گردیده است. همکاری صمیمانه سازمان انتقال خون ایران، مرکز تحقیقات و به خصوص آقای دکتر احمد قره باعیان معاون محترم آموزشی و پژوهشی سازمان انتقال خون ایران در اجرای این تحقیق قابل تقدیر است.

عمل P13K را آتناگونیزه می‌کند. انتظار می‌رفت که این سلول‌ها از نظر توان تهاجمی کنترل شده و از نظر قدرت متاستاز نسبت به سلول‌های PC3 ضعیف‌تر باشند به همین علت الگوی بیان ایزوفورم‌های PI3K در این سلول‌ها و در مقایسه با سلول‌های PC3 (که قادر تومور ساپرسور PTEN بوده و عملکرد PI3K از کنترل آتناگونیستی این ژن خارج شده است) بررسی گردید ولی هیچ گونه اختلافی مشاهده نشد. در مرحله بعد به وسیله روش‌های کمی مقدار بیان ایزوفورم‌های PI3K در این دو نوع سلول تعیین خواهد شد. بدینهی است مشاهده هر گونه اختلاف در مقدار بیان ژن‌های ایزوفورم‌های تعیین شده می‌تواند نشان‌دهنده نوعی ارتباط بین ایزوفورم مربوطه و توان متاستاتیکی سلول باشد چنانکه بررسی‌های جدید محققین نشان داده است که در سلول‌های DU145 .PI3K در قدرت تهاجمی سلول نقش عمده‌ای دارد [۲۴]. در این رابطه گزارشات نشان می‌دهند هیالورون از ماتریکس خارج سلولی و گیرنده‌های سلول‌های سرطانی پروستات در راه‌های انتقال پیام با ایزوفورم P110 α به گونه‌ای در ارتباط که منجر به متاستاز می‌گردد [۲۵]. این در حالی است که ویژگی‌های سرطان‌زاوی ایزوفورم‌های جهش یافته β و P110 α در

References:

- [1] Davies MA. Kim SJ. Parikh NU. Dong Z. Bucana CD. Gallick GE. Adenoviral-mediated expression of MMAC/PTEN inhibits proliferation and metastasis of human prostate cancer cells. *Clin Cancer Res* 2002; 8: 1904-1914.
- [2] Ross S. Spencer SD. Holcomb L. Tan C. Hongo J. Devaux B. et al. Prostate stem cell antigen as therapy target: tissue expression and in vivo efficacy of an immunoconjugate. *Cancer Res* 2002; 62:2546-2553.
- [3] Jalkut MW. Reiter RE. Role of prostate stem cell antigen in prostate cancer research. *Curr Opin Urol* 2002; 12: 401-406.
- [4] Ruoslahti E. Fibronectin and its integrin receptors in cancer. *Adv Cancer Res* 1999; 76:1-20.
- [5] Uria JA. Lopez-Otin C. Matrilyn-2, a new matrix metalloproteinase expressed in human tumors and showing the minimal domain organization required for secretion, latency, and activity. *Cancer Res* 2000; 60: 4745-4751.
- [6] Stetler-Stevenson WG. Liotta LA. Kleiner DE Jr. Extracellular matrix 6: role of matrix metalloproteinases in tumor invasion and metastasis. *FASEB J* 1993; 7:1434-1441.
- [7] Cherrington JM. Strawn LM. Shawver LK. New paradigms for the treatment of cancer: the role of anti-angiogenesis agents. *Adv Cancer Res* 2000; 79: 1-38.
- [8] Kubiatowski T. Jang T. Lachyankar MB. Salmons R. Nabi RR. Quesenberry PJ. et al. Association of increased phosphatidylinositol 3-kinase signaling with increased invasiveness and gelatinase activity in malignant gliomas. *J Neurosurg* 2001; 95: 480-488.
- [9] Vanhaesebroeck B. Ali K. Bilancio A. Geering B. Foukas LC. Signalling by PI3K isoforms: insights from gene-targeted mice. *Trends Biochem Sci* 2005; 30: 194-204.
- [10] Jiang BH. Jiang G. Zheng JZ. Lu Z. Hunter T. Vogt PK. Phosphatidylinositol 3-kinase signaling controls levels of hypoxia-inducible factor 1. *Cell Growth Differ* 2001; 12: 363-369.
- [11] Yamada KM. Araki M. Tumor suppressor PTEN: modulator of cell signaling, growth, migration and apoptosis. *J Cell Sci* 2001; 114: 2375-2382.
- [12] Roux P. PTEN: a tumor suppressor with original properties. *Bull Cancer* 1999; 86: 522-525.

- [13] Hang YE, Wu X, Suzuki H, Reiter RE, Tran C, Vessella RL, et al. Inactivation of the tumor suppressor PTEN/MMAC1 in advanced human prostate cancer through loss of expression. *Proc Natl Acad Sci USA* 1998; 95: 5246-5250.
- [14] McMenamin ME, Soung P, Perera S, Kaplan I, Loda M, Sellers WR. Loss of PTEN expression in paraffin-embedded primary prostate cancer correlates with high Gleason score and advanced stage. *Cancer Res* 1999; 59: 4291-4296.
- [15] Yang Y, Niu J, Guo L. The effects of antisense insulin-like growth factor-I receptor oligonucleotide on human cord blood lymphocytes. *J Mol Endocrinol* 2002; 28: 207-212.
- [16] Foster FM, Traer CJ, Abraham SM, Fry MJ. The phosphoinositide (PI) 3-kinase family. *J Cell Sci* 2003; 116: 3037-3040.
- [17] Fruman DA. Towards an understanding of isoform specificity in phosphoinositide 3-kinase signalling in lymphocytes. *Biochem Soc Trans* 2004; 32: 315-319.
- [18] Wymann MP, Marone R. Phosphoinositide 3-kinase in disease: timing, location, and scaffolding. *Curr Opin Cell Biol* 2005; 17: 141-149.
- [19] Lin J, Adam RM, Santesteban E, Freeman MR. The phosphatidylinositol 3'-kinase pathway is a dominant growth factor-activated cell survival pathway in LNCaP human prostate carcinoma cells. *Cancer Research* 1999; 59: 2891-2897.
- [20] Leenders F, Mopert K, Schmiedeknecht A, Santel A, Czauderna F, Aleku M, et al. PKN3 is required for malignant prostate cell growth downstream of activated PI 3-kinase. *The EMBO Journal* 2004; 23: 3303-3313.
- [21] Hawkins PT, Anderson KE, Davidson K, Stephens LR. Signalling through Class I PI3Ks in mammalian cells. *Biochem Soc Trans* 2006; 34: 647-662.
- [22] Kang S, Song J, Kang J, Kang H, Lee D, Lee Y, et al. Suppression of the alpha-isoform of class II phosphoinositide 3-kinase gene expression leads to apoptotic cell death. *Biochem Biophys Res Commun* 2005; 329: 6-10.
- [23] Liu L, Yu XZ, Li TS, Song LX, Chen PL, Suo TL, et al. A novel protein tyrosine kinase NOK that shares homology with platelet-derived growth factor/fibroblast growth factor receptors induces tumorigenesis and metastasis in nude mice. *Cancer Res* 2004; 64, 3491-3499.
- [24] Zeng ZZ, Jia Y, Hahn NJ, Markwart SM, Rockwood KF, Livant DL. Role of focal adhesion kinase and phosphatidylinositol 3'-kinase in integrin fibronectin receptor-mediated, matrix metalloproteinase-1-dependent invasion by metastatic prostate cancer cells. *Cancer Res* 2006; 66: 8091-8099.
- [25] Lin SL, Chang D, Ying SY. Hyaluronan stimulates transformation of androgen-independent prostate cancer. *Carcinogenesis* 2007; 28:310-320.
- [26] Zhao JJ, Liu Z, Wang L, Shin E, Loda MF, Roberts TM. The oncogenic properties of mutant p110alpha and p110beta phosphatidylinositol 3-kinases in human mammary epithelial cells. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2005; 102: 18443-18448.
- [27] Zhao JJ, Cheng H, Jia S, Wang L, Gjoerup OV, Mikami A, et al. The p110alpha isoform of PI3K is essential for proper growth factor signaling and oncogenic transformation. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2006; 103: 16296-16300.