

بررسی میزان بروز و هزینه‌ی ضربه‌های خفیف مغزی در کاشان، ۱۳۸۴-۱۳۸۳

اسماعیل فخاریان^۱ ، محمد رضا فاضل^۲ ، همایون نابش^۱ ، زهرا نوابی^۳

خلاصه

سابقه و هدف: ضربه به سر یکی از عوامل مهم مرگ و میر در حوادث است. آمار نشان می‌دهد اغلب این افراد دچار آسیب خفیف هستند. این مطالعه به منظور بررسی میزان بروز، نحوه‌ی درمان و هزینه‌ی ضربه‌های خفیف مغزی در یک دوره‌ی دو ساله در شهرستان کاشان انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها: ۴۲۹۰ بیمار با ضربه‌ی مغزی طی سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۸۴ وارد مطالعه شدند. خصوصیات بیماران شامل سن، جنس، نوع حادثه، سطح هوشیاری، و علایم همراه، علل حادثه، پرتوکل اداره‌ی آسیب‌دیدگان و هزینه ثبت گردید. مصدومین دچار ضربه‌ی خفیف با (Glasgow Coma Scale Score) GCSS= ۱۴-۱۵ علوم پزشکی کاشان ۵۰۰,۰۰۰ نفر در نظر گرفته شده و میزان بروز تعیین شد.

نتایج: ۳۸۹۶ نفر (۹۰/۸ درصد) ضربه‌ی مغزی خفیف داشتند. نسبت مرد به زن ۱: ۳/۵ بود. میانگین سنی بیماران ۱۳/۱۹±۲/۷ سال و شایع‌ترین گروه سنی ۲۹-۲۰ (۲۱/۹ درصد) و ۱۹-۱۰ (۲۷/۹ درصد) بودند. بیش از ۶۵ درصد مصدومین در سنین زیر ۳۰ سال قرار دارند. حوادث ترافیکی (۸۷/۳ درصد) شایع‌ترین عامل آسیب‌زا بود. از ۱۶۲۹ نفر (۴۸ درصد) از بیماران تصویر جمجمه گرفته شد، که ۸۷/۸ درصد نرمال و ۱۲/۲ درصد دارای شکستگی بودند. از ۴۰۰ بیمار (۱۰/۳ درصد) سی‌تی اسکن مغزی انجام شد، که ۱۱۸ مورد آنها غیرطبیعی بوده و هزینه‌ی بستری این بیماران به طور متوسط ۳۱۶۶۵۴ ریال به ازای هر شب می‌باشد. میزان بروز آسیب‌های مغزی در هر سال ۴۲۹ نفر در هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت بود که رشدی معادل ۶۵ درصد را در کمتر از یک دهه در این مرکز نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری: نسبت مرد به زن افزایش نشان داد و سن سوانح و حوادث در این منطقه پایین می‌باشد. با توجه به طبیعی بودن حدود ۹۰ درصد یافته‌های گرافی جمجمه پیشنهاد می‌شود کلیه آسیب‌دیدگان پس از طی مراحل اولیه درمان، سی‌تی اسکن شوند و در صورت طبیعی بودن مرخص شوند. به این ترتیب می‌توان حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های مستقیم درمان را کاهش داد.

واژگان کلیدی: تروما، ضربه‌ی خفیف مغزی، GCSS، نحوه‌ی درمان، هزینه

- ۱- استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات تروما
- ۲- استادیار گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات تروما
- ۳- پزشک عمومی مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

*نویسنده مسؤول: اسماعیل فخاریان

آدرس: کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، بیمارستان شهید بهشتی

پست الکترونیک: efakharian@gmail.com

تلفن: ۰۹۱۳ ۱۶۱ ۴۲۹۴

دورنویس: ۰۳۶۱ ۵۵۵۸۷۵۵

تاریخ دریافت: ۸۶/۱/۲۸

تاریخ پذیرش نهایی: ۸۶/۸/۲۶

مقدمه


پرداخت شده در کشور آمریکا بر اساس گزارش سال ۲۰۰۳ مرکز کنترل بیماری‌ها برای آسیب‌دیدگی تروما ۵۶ میلیارد دلار بوده است [۵]. هفتاد تا ۹۰ درصد آسیب‌های مغزی از نوع خفیف می‌باشد [۶]. در سال ۱۹۹۸ در آمریکا ۱۲۱۵۰۰۰ مورد ترومای مغزی ثبت شده است که ۲۲۰۰۰ نفر از آنان بستری شده‌اند. در سال ۲۰۰۳ این ارقام به ۱۵۶۵۰۰۰ رسیده که ۱۲۲۴۰۰۰ مورد ترومای خفیف بوده و ۲۹۰۰۰ بستری شده‌اند. آمار کاهش ۲۲ درصد در آسیب‌های مغزی یکی از شایع‌ترین انواع تروما و مفهمه ترین علت مرگ و میر در آسیب‌دیدگان حوادث مختلف است [۳-۴]. آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی حاکی از مرگ بیش از یک میلیون نفر و آسیب‌دیدگی ۵۰ میلیون نفر در حوادث ترافیکی در سراسر جهان می‌باشد. برآورد شده است که در ۲۰ سال آینده این ارقام ۶۵ درصد رشد خواهند کرد [۴]. هزینه‌ی

درصد) در سال ۱۳۸۳ (۴۱۷ نفر به ازای ۱۰۰۰۰ نفر) و ۲۲۰۵ نفر (۴۱ درصد) در سال ۱۳۸۴ (۴۴۱ نفر به ازای ۱۰۰۰۰ نفر) (۵۱ درصد) بودند. ۳۸۹۴ نفر (۹۰/۸ درصد) در گروه ضربه‌ی مغزی خفیف قرار گرفتند، اکثر آسیب‌دیدگان را مردان تشکیل می‌دهند که شامل نفر مرد (۷۶ درصد) و نفر زن (۲۶ درصد) بود. ۲۸۸۳ میانگین سنی بیماران ۱۹ ± ۱۳ سال بوده و بیشترین تعداد بیماران در گروه سنی ۲۰-۲۹ سال و ۶۵٪ درصد مصدومان در گروه سنی زیر ۳۰ سال قرار داشتند (حدول شماره‌ی ۱).

جدول ۱- توزیع سنی و فراوانی گروههای سنی دچار ترومای خفیف سر، ۱۳۸۴-۱۳۸۳، کاشان

| دراصد | فراوانی | دامنه‌ی سنی (سال) |
|-------|---------|-------------------|
| ۱۶/۶ | ۶۴۶ | ۱-۹ |
| ۲۱/۲ | ۸۲۰ | ۱۰-۱۹ |
| ۲۷/۹ | ۱۰۸۶ | ۲۰-۲۹ |
| ۱۲/۰ | ۴۸۰ | ۳۰-۳۹ |
| ۸ | ۳۱۳ | ۴۰-۴۹ |
| ۵ | ۱۹۲ | ۵۰-۵۹ |
| ۳/۶ | ۱۴۴ | ۶۰-۶۹ |
| ۵/۲ | ۲۰۱ | >۷۰ |
| ۱۰۰ | ۳۸۹۶ | جمع |

عوامل آسیب‌زا را شامل می‌شوند (نمودار شماره‌ی ۱).



- نمودار ۱- توزیع فراوانی عوامل منجر به ترومای خفیف سر، ۱۳۸۴، کاشان

از ۱۶۲۹ نفر (۴۸ درصد) از بیماران گرافی جمجمه گرفته شد، که نتایج آن در حدول شماره ۴، ۲ آمده است

مرگ و میر را نشان می‌دهد، اما تغییری در میزان بستری رخ نداده است [۸]. در کشور سوئد سالانه ۱۷۰۰۰ آسیب‌دیدهی ضربه‌ی مغزی بستری می‌شوند (۱۹۰ نفر به ازای ۱۰۰۰۰ نفر) و هزینه‌ی مستقیم آنها حدود ۷/۶ میلیون دلار در سال، یا ۸۴۰۰۰ دلار به ازای ۱۰۰۰۰ نفر برآورد شده است [۹]. در ایران با وجود گزارشات مبنی بر افزایش تلفات ناشی از سوانح ترافیکی که در رسانه‌ها اعلام می‌شود آمار دقیق و رسمی در مورد ضربه‌های مغزی وجود ندارد. علی‌رغم اهمیت و شیوع آسیب‌های مغزی و میزان هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم که به سادگی قابل ارزیابی نمی‌باشد، هنوز راهبرد مشخص و یکپارچه‌ای در برخورد و درمان آسیب‌دیدگان ضربه‌ی مغزی خفیف و میزان بروز آن وجود ندارد و این عامل در برآورده زینه‌های درمانی این گروه نقش بسزایی دارد [۱۰]. از آنجا که در کشور ما ترکیب بسیار شایع است و اطلاع دقیقی از پراکندگی و شدت و نیز هزینه‌های بیمارستانی آن وجود ندارد این مطالعه جهت تعیین میزان پیدایش و هزینه‌های ضربه‌ی مغزی خفیف در کاشان طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۳ انجام شد و ایندیکت می‌رود با به کارگیری اطلاعات به دست آمده علاوه بر کاهش آمار حوادث در کشور در آینده‌ی نزدیک، هزینه‌های مترتب به آن را نیز کاهش دهیم.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه‌ی توصیفی از ابتدای فروردین ۱۳۸۳ میلادی آسیب‌دیدگان بستری شده در مرکز جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان شامل ۴۲۹۰ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، نوع حادثه، سطح هوشیاری، علل حادثه، علایم همراه، بروتکل اداره‌ی مصدومین، هزینه‌ی بستری و نیز اطلاعات پاراکلینیکی شامل گرافی جمجمه، سی‌تی اسکن، و وضعیت بیمار در پرسشنامه مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه ثبت گردید. هزینه‌های مربوط به بستری Glasgo Coma Scale (GCSS= 14 – 15 در مصدومین با ۱۵ – ۱۶ در مبتلایان)، ضربه‌ی مغزی خفیف و بدون ترومای همراه که به مدت یک شب بستری بودند از پرونده‌ی آنان استخراج گردید. جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۵۰۰،۰۰۰ نفر در نظر گرفته شده و بروز و شاخص‌های توصیف مورد بررسی قرار گرفت.

نماج


۴۲۹۰ مورد طی دوره‌ی ۲۴ ماهه بستری شده‌اند (۴۲۹ نفر
به ازای ۱۰۰۰۰ نفر در سال). از این تعداد ۲۰۸۵ نفر

مرگ و میر نیز ثابت بوده است [۱۵، ۷]. به علاوه در مطالعه‌ی قبلی جمعیت منطقه حدود ۴۰۰ نفر محاسبه شده بود. این افزایش در مرکز را می‌توان تا حدی به ارایه خدمات بهتر و متعاقب آن ارجاع بیشتر از شهرهای اطراف و نمونه‌گیری دقیق‌تر نسبت داد. اما بی‌تردید بخشی از آن نیز ناشی از رشد سوانح و حوادث و به ویژه حوادث ترافیکی بوده و لزوم بررسی اپیدمیولوژیک دقیق و در دوره‌ی زمانی طولانی تری را مطرح می‌نماید. نسبت مرد به زن ۳/۵ است. در مطالعه‌ی قبلی این نسبت ۲/۵ [۱۲] بوده، در سایر بررسی‌ها ۱/۳ [۱۷] و ۳/۱ [۱۳] گزارش شده است. این تفاوت‌ها می‌توانند ناشی از شرایط فرهنگی، نوع اشتغال و فعالیت‌های پرخطر از جمله استفاده از موتورسیکلت باشد. به هر حال در مطالعات مختلف مردان نسبت بالاتری را داشته‌اند. میانگین سنی بیماران ۲۷±۱۹/۱۳ سال است، و بیش از ۶۵ درصد مصدومین در سنین زیر ۳۰ سال قرار دارند. با توجه به اینکه در اغلب منابع سن شایع تروما بین ۲۰ تا ۴۰ سال ذکر می‌شود [۴] به نظر می‌رسد در این منطقه سن درگیری با سوانح و حوادث در حال کاهش است که این خود یک هشدار است چرا که هزینه‌ی نگهداری و درمان و تعداد سال‌های ناتوانی و سرباری فرد با کاهش سن افزایش می‌یابد، به علاوه محدوده سنی ذکر شده بیشترین زمان یادگیری و آموزش مهارت‌ها در فرد می‌باشد. استفاده از موتورسیکلت توسط کودکان و نوجوانان، عدم توجه به مقررات راهنمایی و ضریب پایین ایمنی در خانه و اماکن عمومی می‌تواند از علل این موضوع باشد. حوادث ترافیکی عامل اصلی آسیب در ۶۸/۵ درصد مصدومین است. در یک بررسی در آمریکا آسیب‌های خفیف مغزی بیشتر به علت سقوط از ارتفاع رخ داده‌اند. ۳۹ درصد و حوادث ترافیکی ۱۹ درصد موارد را شامل می‌شده است [۱۶]. از ۱۶۲۹ نفر (۴۸ درصد) از بیماران رادیوگرافی جمجمه انجام شده، که ۲۰۰ مورد (۵ درصد) شکستگی داشتند. از ۴۰۰ بیمار (۱۰/۲ درصد) نیز سی‌تی اسکن سرانجام گرفته که در ۱۱۸ مورد (۲۹ درصد) غیرطبیعی بوده است. در سایر مطالعات آمار سی‌تی اسکن غیرطبیعی کمتر از ۵ درصد گزارش شده است [۱۸، ۹]. اما تعداد کل سی‌تی اسکن‌های انجام شده بیشتر می‌باشد. در یک مطالعه در آمریکا مشخص شد که از ۴۴/۳ درصد از بیماران دچار ضربه‌ی مغزی خفیف سی‌تی اسکن انجام می‌شود [۶]. این یافته‌ها از دو دیدگاه قابل تجزیه و تحلیل است، اول آنکه می‌باید معیارهای دقیق‌تری برای مصدومین دچار ضربه‌ی به سر تعريف کرده و آن دسته از افراد که علایم آسیب به مغز دارند بسترهای شوند و سایر افراد پس از چند ساعت مراقبت ترخیص شوند. البته این شیوه ممکن است پیامدها طبی – قانونی برای مراکز

جدول ۲- توزیع فراوانی یافته‌های گرافی جمجمه در ترومای خفیف سر، کاشان ۱۳۸۳-۱۳۸۴

| تصویر جمجمه | فراآنی | درصد |
|-----------------------|--------|------|
| طبعی | ۱۴۲۹ | ۸۷/۷ |
| شکستگی خطی | ۱۴۲ | ۸/۷ |
| شکستگی فرو رفته | ۴۹ | ۳ |
| شکستگی خطی و فرو رفته | ۹ | ۰/۶ |
| جمع | ۱۶۲۹ | ۱۰۰ |

از ۴۰۰ بیمار (۱۰/۳ درصد) سی‌تی اسکن مغزی انجام شد، که ۱۱۸ (۲۹ درصد) مورد آنها غیرطبیعی بود (نمودار شماره-۲).



نمودار ۲- توزیع فراوانی یافته‌های سی‌تی اسکن در ترومای خفیف سر، کاشان ۱۳۸۳-۱۳۸۴

از ۳۸۹۴ بیمار آسیب دیده ضربه‌ی سر خفیف ۲۶۷۶ بیمار ضربه‌ی سر تنها و بدون آسیب دیگر اندام‌ها داشتند. هزینه‌ی بستری بیمارانی که یک شب بستری و تحت مراقبت بوده‌اند به طور متوسط ۳۱۶۶۵۴ ریال به ازای هر بیمار بر اساس مقادیر سال ۱۳۸۴ می‌باشد.

بحث

میزان بروز آسیب‌های مغزی در هر سال ۴۲۹ نفر در هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت به دست آمد. این میزان در استرالیا بین ۱۰۰ تا ۳۷۷ و در فرانسه ۲۸۱ [۱۰]، در اسپانیا ۹۱ [۱۱]، در کانادا و آمریکا ۹۰ [۸، ۵] و در سوئد ۱۹۰ [۹] و در بررسی در همین مرکز در سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶، ۲۵۸ مورد [۱۲] در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت بوده است. این رقم از بزرگترین ارقام اشاره شده در سایر منابع در سال‌های اخیر بیشتر است و در همین مرکز نیز رشدی معادل ۶۵ درصد را در کمتر از یک دهه نشان می‌دهد. در دو سال مورد بررسی هم رشد ۵/۴ درصد بوده است. این در حالی است که در آمریکا از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۸ تعداد ضربات مغزی خفیف ثابت و

مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که هزینه‌ی گروهی که سی‌تی اسکن شده‌اند ۳۲ درصد کمتر از گروه دیگر بوده است [۱۷، ۱۸]. نتایج مشابهی در مروری بر روی هزینه‌های بستری در مقایسه با سی‌تی اسکن در زمان ورود بر روی ۴۱۲۶ بیمار هم دیده شد. این در حالی است که در پیگیری تفاوتی در پیامد بیماران وجود نداشت [۹].

نتیجه‌گیری

در پایان پیشنهاد می‌شود حداقل در مراکز جراحی اعصاب کشور، انجام تصویر ساده‌ی جمجمه به عنوان شیوه‌ی رایج متوقف شده و با انجام سی‌تی اسکن پس از اقدامات اولیه در مورد آسیب‌دیده تصمیم‌گیری به عمل آید. به نظر می‌رسد این شیوه منجر به کاهش اشغال تخت بیمارستان، کاهش هزینه‌های درمان، افزایش ضریب اطمینان تشخیص، و حتی بهبود در درمان آسیب‌دیدگان شود.

تشکر و قدردانی

این تحقیق با استفاده از منابع مالی و پژوهشی و حمایت مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شده است.

References:

- [1] Lee KK, Seow WI, Ng I. Demographical profiles of adult severe traumatic brain injury patients: implications for health care planning. *SMJ* 2006; 74:1:31-6.
- [2] Thurman DJ, et al. Traumatic brain injury in the United States: A public health perspective. *J Head Trauma Rehabil* 1999;14:6:602-15.
- [3] Nappens R, Brambrink AM. Traumatic brain injury in children, clinical implication. *Exp Toxicol Pathol* 2004; 56:13-25.
- [4] World report on road traffic injury prevention: Summary. WHO, Geneva; 2004. p. 1-2.
- [5] Gerberding JL, Binder S. Report to Congress on Mild Traumatic Brain Injury in the United States: Steps to Prevent a Serious Public Health Problem. National Center for Injury Prevention and Control, part of the Centers for Disease Control and Prevention, September 2003.
- [6] Bazarian JJ, McClung J, Cheng YT, Flesher W, Schneider SM. Emergency department management of mild traumatic brain injury in the USA. *Emerg Med J* 2005; 22: 473-7.
- [7] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Incidence rates of hospitalization related to traumatic brain injury- 12 states, 2002. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2006; 55: 201-204.
- [8] Ruthland-Brown W, Langlois JA, Thomas KE, Xi YL. Incidence of traumatic brain injury in the United States, 2003. *J Head Trauma Rehabil* 2006; 21: 6: 544-548.
- [9] Geijerstam J-L af, Britton M, Marke L-A. Mild head injury: observation or computed tomography? Economic aspects by literature review and decision analysis. *Emerg Med J* 2004; 21: 54-58.
- [10] Fortune N, Wen X. The definition, incidence and prevalence of acquired brain injury in Australia. Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) cat. no. DIS 15. Canberra: AIHW, 1999.
- [11] Elie E, Terri A. Epidemiology and primary prevention of traumatic brain injury. In: Lo J, Horn ND eds: Medical rehabilitation of traumatic brain injury. Philadelphia, Haney and Belfus: 1996. p. 1-28.
- [12] Krause JF, MaArthur DL. Epidemiology of brain injury. In: Evans RW (ed): Neurology and trauma, WB. Saunders: 1996: 6-7.
- [۱۳] فخاریان اسماعیل، تقاضی محسن، مسعود سیدعلی. بررسی اپیدمیولوژی ضربه‌های سر در منطقه‌ی کاشان. *فصلنامه علمی پژوهشی فیض* ۱۳۸۲، سال هفتم، شماره ۲۵: صفحات ۶۴ تا ۷۰

درمانی و کارکنان شاغل در صورت وقوع عارضه برای آسیب- دیده‌ی در برداشته باشد. دوم اینکه در برخورد با این آسیب‌دیده به جای انجام تصویر ساده‌ی جمجمه که حتی در صورت غیرطبیعی بودن وجود یا عدم وجود ضایعه‌ی مغزی را رد نمی‌کند، پس از انجام اقدامات اولیه‌ی درمانی آسیب‌دیدگان توسط سی‌تی- اسکن مورد بررسی قرار گرفته و فقط کسانی که نکته‌ی مشکوکی در آن دارند بستری شوند و بقیه‌ی بیماران با توصیه‌های مربوط به عوارض احتمالی ترجیح گردند. اگر چه در نگاه اول به نظر می- رسد این شیوه‌ی هزینه‌های درمانی را افزایش دهد اما با محاسبه‌ی هزینه‌ی انجام شده برای هر بیمار که بر اساس اعداد سال ۱۳۸۴ در این مرکز حدود ۳۲۰۰۰ ریال می‌باشد، جایگزین کردن این روش علاوه بر حذف تصویر جمجمه و سایر اقدامات روزمره‌ی معمول برای موارد بستری، از ضریب اطمینان تشخیصی بسیار بالا برای تعیین ضایعات احتمالی مغزی برخوردار است و هزینه‌ی انجام آن نیز در سال ۱۳۸۵ در این مرکز ۱۵۰۰۰ ریال بوده است. این مبلغ از نصف هزینه‌ی بستری نیز کمتر بوده و هزینه‌های غیرمستقیم را هم کاهش می‌دهد. به علاوه ممکن است سبب تشخیص زودتر و بهبود پیامد درمان نیز گردد، که نیاز به بررسی در مطالعه‌ی دیگری دارد. در مطالعه‌ای بر روی ۲۶۰۲ آسیب‌دیده در سوئد هزینه‌های انجام سی‌تی اسکن در زمان بستری و تحت نظر نگهدارش بیماران

[14] ابریشمکار سعید، جیواد ناهید. بررسی اپیدمیولوژی ضربه‌های مغزی در مراجعین به بیمارستان آیت... کاشانی شهر کرد از تیر ۱۳۷۹ تا تیر ۱۳۸۰. *مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد*، ۱۳۸۲؛ دوره پنجم، شماره ۴، صفحات ۲۷ تا ۳۲.

[15] Chen HY, Chang HY, Shin SF, Hsu CC, Lin YH, Shin YT. The regional differences in prevalence, medical expenditure and risk factor for injury in Taiwanese teenagers. *PMC Public Health* 2006;6:107;1471-1479.

[16] Adekoya N, Majumder R. Fatal traumatic brain injury, West Virginia, 1989-1998. *Public Health Rep* 2004; 119;5:486-92.

[17] Norlund A, Marke LA, af Geijerstam JL, Oredsson Sven, Britton M. Immediate computed tomography or admission for observation after mild head injury: cost comparison in randomized controlled trial. *BMJ* 2006; 333:469-472.

[18] af Geijerstam JL, Oredsson S, Britton M. Octopus Study Investigators. Medical outcome after immediate computed tomography or admission for observation in patients with mild head injury: randomised controlled trial. *BMJ* 2006;333: 465.