

مطالعه بیوشیمیایی و پاتولوژیکی اثر پیش‌گیرانه مصرف ویتامین A بر عوارض کبدی ناشی از مصرف داروی آزاتیوپرین در موش صحرایی

*^۱ بهرام عمماوغلى تبريزى ، داريوش مهاجرى ، يوسف دوستار ، ساعد برادران علیزاده ، علی خدادادى ، فرزين فرج زاده اهرى
^۲ ^۳

خلاصه

سابقه و هدف: آزاتیوپرین یک داروی تضعیف کننده سیستم ایمنی می‌باشد استفاده از آزاتیوپرین موجب ایجاد عوارضی چون سمت مغز استخوان، لوله گوارش، کبد و پانکراس می‌شود. سمت کبدی ایجاد شده توسط این دارو، به واسطه یک ضایعه اکسیداتیو می‌باشد. ویتامین A یک ویتامین محلول در چربی است و عملکرد آنتی اکسیدانی دارد. با توجه به نوع عارضه ایجاد شده توسط داروی آزاتیوپرین در بافت کبد، بر آن شدید تا اثر حفاظتی ویتامین A در مقابل این دارو را بررسی نمایم.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق، تعداد ۴۰ سرموش صحرایی نر نژاد ویستار را به ۴ گروه ۱۰ تایی تقسیم نمودیم. به گروه شاهد، فقط سالین نرمال داده شد. گروه دوم و سوم روزانه و به مدت ۷ روز ویتامین A را به صورت داخل عضلانی دریافت نمودند و گروه چهارم با شرابیطه یکسان با ۳ گروه دیگر، ۷ روز سالین نرمال دریافت کرد. در روز ۷ به هر دو گروه ۳ و ۴ میزان ۱۵mg/kg داروی آزاتیوپرین به صورت داخل صفاقی و تک دوز تزریق شد. بعد از گذشت ۲۴ ساعت از تزریق دارو، از تمامی حیوانات خون‌گیری شده و سپس نمونه پاتولوژی از بافت کبد آنها تهیه گشته، مورد مطالعه بیوشیمیایی و پاتولوژیکی قرار گرفتند.

نتایج: میانگین وزن خرگوش‌های گروه آزاتیوپرین برخلاف سه گروه دیگر که در پایان آزمایش افزایش داشت، کاهش یافته بود. میانگین مقادیر سرمی پارامترهای بیلی روین تام، آلانین آمینو ترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز و آنزیم فسفاتاز قلبی در گروه آزاتیوپرین نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌دار نشان داد.

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که استفاده از ویتامین A می‌تواند عوارض حاصل از تجویز داروی آزاتیوپرین در بافت کبد را کاهش دهد.

وازگان کلیدی: ویتامین A، آزاتیوپرین، سمت کبدی، موش صحرایی

- ۱- استادیار کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
- ۲- استادیار پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
- ۳- دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

* نویسنده مسؤول: بهرام عمماوغلى تبريزى

آدرس: تبریز خیابان طالقانی، کوی آزادی بن بست بلوری، پلاک ۴۸

پست الکترونیک: bahram_tabrizi1353@yahoo.com

تلفن: ۰۹۱۴ ۱۱۴ ۴۵۶۰

دورنویس: ۰۴۱۱ ۶۳۷ ۳۹۳۵

تاریخ دریافت: ۸۸/۲/۲۱

تاریخ پذیرش نهایی: ۸۸/۶/۱۸

_____ فصلنامه علمی - پژوهشی فیض، دوره سیزدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸، صفحات ۱۸۰-۱۸۷

مقدمه
کورتیکواستروئیدها، بهترین انتخاب برای جلوگیری از رد عضو پیوندی می‌باشد [۹]. علی‌رغم استفاده وسیع از این دارو، این نکته به اثبات رسیده است که آزاتیوپرین، علاوه بر ایجاد سرکوب لنفوسيت‌ها در بیمار [۱۰]، باعث ایجاد سمت در مغز استخوان و دستگاه گوارش و کبد می‌شود [۱۱-۱۳]. مشخص شده است که این دارو با ایجاد یک ضایعه اکسیداتیو، موجب

آزاتیوپرین یک داروی تضعیف کننده سیستم ایمنی است [۱۱,۱۲] و در دامپزشکی و پزشکی جهت درمان بیماری‌های نظری (Inflammatory bowel diseases) IBD [۱۳-۱۵]، لوسومی لنفوبلاستی حاد [۱۶،۱۷]، آرتریت روماتوئید [۱۸]، کولیت اولسراتیو [۱۹] مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این دارو همراه با

ساعت تاریکی و در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری کردیم. سپس از حیوانات تمامی گروه‌ها به میزان ۱/۵ سی سی و از طریق ورید دمی نمونه خونی اخذ شد و آنها را مشابه با آنچه در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد، مورد ارزیابی قراردادیم. به گروه اول به عنوان گروه شاهد، فقط سالین نرمال داده شد. گروه دوم و سوم روزانه و به مدت ۷ روز با دوز ۱۵ mg/kg و به صورت تزریق داخل عضلانی، ویتامین A دریافت نمودند و به گروه چهارم با شرایطی یکسان با ۳ گروه دیگر ۷ روز سالین نرمال تزریق شد. در روز ۷ به هر دو گروه ۳ و ۴ میزان ۱۵ mg/kg داروی آزاتیوپرین به صورت داخل صفاقی و تک دوز تزریق شد و به دو گروه دیگر با شرایطی یکسان با این دو گروه، حال در داروی آزاتیوپرین به صورت داخل صفاقی تزریق شد. بعد از گذشت ۲۴ ساعت از تزریق داروی آزاتیوپرین، بعد از وزن کشی، حیوانات توسط اتر بیوهوش و از آنها از طریق ورید دمی خون‌گیری انجام شده و سپس نمونه پاتولوژی از کبد اخذ شد. از نمونه‌های خونی بعد از لخته شدن، و ساتریفیوژ با دور ۲۵۰۰ به مدت ۱۰ دقیقه، سرم جدا شده و پارامترهای بیوشیمیابی شامل بیلی روین تام، آلانین آمینو ترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز، فسفاتاز قلیابی، پروتئین تام، آلبومین، لاکتات دهیدرووژناز، کلسترول، HDL، کلسیم، فسفر و تری گلیسرید توسط کیت تشخیصی زیست شیمی و با دستگاه اسپکتروفوتومتری Biowave اندازه گیری شدند. نمونه‌های بافتی در فرمالین ۱۰ درصد فیکس شده و سپس از آنها مقاطع پاتولوژی تهیه گشت که بعد از انجام رنگ آمیزی هماتوکسین و انژوزین، از لحاظ آسیب‌های سلولی از جمله تغییرات دژنرایو، مرگ سلولی و تغییرات آمامی با هم مقایسه شدند. برای مقایسه میانگین وزن موش‌های مورد آزمایش از آزمون Paired t-Test استفاده گردید و برای بررسی اختلاف بین گروه‌ها از آزمون آماری آنالیز واریانس (ANOVA) و نیز برای مقایسه میانگین پارامترهای بیوشیمیابی بین گروه‌های تیمار و شاهد از آزمون تعقیبی LSD (پس از معنی دار شدن آزمون F در تجزیه واریانس) استفاده شد. تمام آتالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۳ صورت پذیرفت. اختلاف آماری معنی دار به صورت $P < 0.05$ در نظر گرفته شده است.

نتایج

مطالعه بیوشیمیابی: نتایج حاصل از مطالعه میانگین وزنی حیوانات در گروه‌های مختلف به صورت میانگین وزن ابتدایی و میانگین وزن نهایی در جدول ۱ نشان داده شده است. بررسی میانگین وزنی این حیوانات مشاهده می‌شود که وزن

سمیت کبدی می‌شود [۱۲۸]. آزاتیوپرین موجب تولید رادیکال آزاد در اندام‌ها و بافت‌های بدن می‌گردد که یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده سمیت در ارگان‌ها می‌باشد [۱۴۷]. Watanabe و همکارانش ثابت کردند که مصرف خوارکی آزاتیوپرین موجب افزایش آلkalین فسفاتاز و گاما گلوتامین ترانس پپتیداز در کبد گشته و همچنین، مصرف این دارو موجب نکروز مرکز لوپولی و پرولیفراسیون میتوکندری و شبکه آندوپلاسمی خشن می‌شود [۱۵]. Sun و همکارانش نشان دادند که استفاده از داروی آزاتیوپرین موجب تغییر در میزان آنزیم‌های کبدی و افزایش آلانین آمینو ترانسفراز و آلkalین فسفاتاز و مالونیل دی آلدید و کاهش میزان گلوتاتیون می‌شود [۱۶]. امروزه استفاده از آنتی اکسیدان‌ها جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های همچون سرطان یا بیماری‌های پروستات و بیماری‌های قلبی عروقی همواره توصیه می‌شود. Cesar و همکارانش برای کاهش عوارض داروی فوق در بافت کبد، از N-Acetyl-L-Cysteine استفاده کردند که در پایان به این نتیجه رسیدند که این ترکیب قادر است نقش محافظتی در بافت کبد داشته باشد [۱۱]. Amin و Hamza Hibiscus Rosmarinus را در مقابل عوارض کبدی حاصل از داروی آزاتیوپرین بررسی کردند آنها به این نتیجه رسیدند که این گیاهان قادرند عوارض دارو در کبد را کاهش دهند [۱۰]. ویتامین A یکی از ویتامین‌های محلول در چربی می‌باشد که دارای اثر آنتی اکسیدانی مطلوبی بوده [۱۷-۱۹] و نتایج به دست آمده از تحقیقات پژوهش‌گران بیان‌گر این نکته است که استفاده از این دارو می‌تواند نقش بسیار مناسبی در کاهش و از بین بردن رادیکال‌های آزاد داشته باشد [۱۸]. Noyan و همکارانش نشان دادند که ویتامین A قادر است عوارض کبدی ناشی از CCl₄ در موش صحرایی را کاهش داده و یک نقش محافظتی در این مورد ایفا کند [۲۰]. به علت اینکه سمیت کبدی ایجاد شده توسط داروی آزاتیوپرین اکسیداتیو بوده و ناشی از تولید رادیکال‌های آزاد می‌باشد بر آن شدیدم تا اثر ویتامین A در مقابل سمیت کبدی حاصل از تجویز داروی آزاتیوپرین را مورد بررسی قرار دهیم.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق ۴۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به ظاهر سالم را انتخاب و آنها را به ۴ گروه ۱۰ تایی تقسیم کرده و بعد از وزن کشی هر گروه توسط ترازوی دیجیتالی، آنها را به مدت یک هفته جهت عادت کردن به محیط در ۱۲ ساعت روشناگی و ۱۲

آسپارتات آمینو ترانسفراز، آنزیم فسفاتاز قلایی، پروتئین تام، آلبومین، لاکتات دهیدروژنانز، کلسترول، HDL، کلسیم، فسفر و تری گلیسرید را در گروههای مورد بررسی نشان می دهد.

خرگوشهای گروه آزیتوپرین در پایان آزمایش کاهش یافته ($P=0.046$) و این در حالی است که وزن حیوانات سه گروه باقیمانده افزایش معنی دار یافته است. جدول شماره ۲ میانگین پارامترهای بیوشیمیابی بیلی روین تام، آلانین آمینو ترانسفراز،

جدول شماره ۱- مقادیر مربوط به میانگین وزن ابتدایی و نهایی حیوانات گروه های مختلف
 $(\bar{X} \pm SE, n=10)$

P	میانگین وزن ابتدایی (gr)		میانگین وزن نهایی (gr)	گروه ها
	شاهد (Control)	آزیتوپرین (AZA)		
0.021	۱۶۱/۰۲ ± ۴/۰۴	۱۵۳/۰۵ ± ۵/۰۱		
0.046	۱۵۱/۹۸ ± ۵/۰۰	۱۵۷/۸۶ ± ۳/۱۶		
0.032	۱۵۹/۰۷ ± ۳/۰۶	۱۵۰/۰۰ ± ۵/۰۹	A ویتامین (Vit A)	
0.040	۱۶۰/۹۹ ± ۵/۰۷	۱۵۲/۰۵ ± ۴/۹۶	A آزیتوپرین + ویتامین (AZA + Vit A)	

جدول شماره ۲- مقادیر مربوط به پارامترهای بیوشیمیابی بافت کبد $(\bar{X} \pm SE, n=10)$


P (ANOVA)	گروههای آزمایش				پارامترهای بیوشیمیابی
	(AZA+Vit A)	(Vit A)	(AZA)	(Control)	
0.016	۰/۲۹ ± ۰/۰۵	۰/۲۳ ± ۰/۰۶	۰/۳۸ ± ۰/۰۲	۰/۲۲ ± ۰/۰۵	Total Bilirubin(mg/dL) P (LSD)
0.048	۱۸/۷۵ ± ۱/۸۹	۱۹/۶۰ ± ۱/۰۰	۳۹/۰۰ ± ۰/۰۰	۱۹/۵۰ ± ۱/۲۹	ALT (U/L) P (LSD)
0.024	۴۰/۵۰ ± ۶/۳۵	۳۷/۰۰ ± ۰/۰۰	۴۹/۰۰ ± ۳/۴۶	۳۸/۰۰ ± ۱/۲۹	AST (U/L) P (LSD)
0.037	۳۷/۹۵ ± ۰/۶۶	۳۶/۸۸ ± ۰/۴۴	۸۳/۰۰ ± ۱/۴۱	۳۶/۷۵ ± ۰/۰۰	ALP (U/L) P (LSD)
0.089	۴/۲۸ ± ۰/۴۳	۴/۰۱ ± ۰/۷۶	۴/۰۸ ± ۰/۵۶	۳/۹۵ ± ۰/۵۶	Albumin(gr/dl) P (LSD)
0.106	۷۸۸ ± ۵۱/۲۰	۷۰۰/۲۲ ± ۱۱/۰۰	۷۲۸ ± ۳/۱۵	۷۰۷/۷۲ ± ۳۹/۱۴	LDH (U/L) P (LSD)
0.091	۷۱/۴۷ ± ۱۱/۱	۵۷/۷۸ ± ۷/۷۰	۷۷/۸۷ ± ۲۲/۴۵	۵۷/۴۵ ± ۸/۷۰	Chol (mg/dl) P (LSD)
0.088	۳۷/۷۵ ± ۰/۸۶	۳۷/۱۱ ± ۱/۹۹	۳۸/۲۵ ± ۵/۰۶	۳۷/۱۲ ± ۱/۹۳	HDL (mg/dL) P (LSD)
0.097	۱۰/۹۱ ± ۰/۵۰	۱۰/۶۴ ± ۰/۴۰	۱۱/۳۱ ± ۰/۰۳	۱۰/۰۳ ± ۰/۴۲	Ca (mg/dL) P (LSD)
0.264	۷/۴۵ ± ۰/۱۲	۷/۲۰ ± ۰/۱۰	۷/۲۰ ± ۰/۰۸	۷/۱۵ ± ۰/۹۴	P (mg/dL) P (LSD)
0.057	۷۰/۴۲ ± ۳۴/۰۸	۶۵/۴۴ ± ۱۰/۳۲	۵۸/۳۲ ± ۱۷/۴۵	۶۶/۴۰ ± ۱۳/۰۹	Tg (mg/dL) P (LSD)
0.095	۷/۲۶ ± ۰/۳۳	۷/۱۸ ± ۰/۲۰	۷/۶۱ ± ۰/۶۰	۷/۲۶ ± ۰/۱۷	Total Pr (gr/dL) P (LSD)

* نتایج آزمون تعقیبی LSD مربوط به تمام پارامترهای بیوشیمیابی، حاصل از مقایسه گروههای مورد بررسی با گروه شاهد می باشد.


مطالعه بافت شناسی روی بافت کبد گروههای مورد مطالعه انجام پذیرفت. پارامترهای هیستولوژیکی در این ارگان در گروه شاهد نرمال بودند. مطالعات هیستوپاتولوژیکی در گروه مورد تجویز داروی آزاتیوپرین، طیفی از تغییرات را نشان داد که می‌توان آنها را از آسیب بافتی متوسط تا شدید به صورت زیر بررسی کرد:

- ۱) نقاط تصادفی دُزنه شده و نکروتیک، ۲) احتقان و دیلاته شدن عروق، ۳) دُزتراسیون و نکروز ناحیه پری پورتال، ۴) نکروز و تخریب شدن دیواره‌های عروق، ۵) انباشته شدن سلول‌های کوپفر با فعالیت فاگوسیتی در اطراف فضاهای پری پورتال، ۶) نواحی وسیع از نکروز تجزیه‌ای در بخش‌های مرکزی لوبول‌های کبدی، ۷) نفوذ لنفوسيت‌ها و گرانولوسیت‌ها در نواحی پورتال، ۸) پراکندگی وسیع نکروز تجزیه‌ای و خونریزی (شکل‌های ۱-۳).

مطالعات هیستوپاتولوژیکی بافت کبد در گروه تیمار شده با ویتامین A همراه با داروی آزاتیوپرین، درجه متوسطی از تغییرات دُزتراتیو و نکروتیک همراه با درجه متوسطی از تغییرات هیدروپیک را نشان داد که در مقایسه با تغییرات حاصل از داروی آزاتیوپرین به تنهایی در بافت کبد، دارای شدت کمتری بودند (شکل ۴).




شکل شماره ۳- تصویر بافت شناسی از کبد حیوانات گروه آزاتیوپرین که افزایش و هایپرپلازی مجاري صفراوي را نشان می دهد. (هماتوكسیلين - ائوزين، درشت نمایي $\times 400$).




شکل شماره ۴- نمای هیستولوژیکی از کبد حیوانات گروه آزاتیوپرین همراه با ویتامین A که درجه متوسطی از تغییرات دُزتراتیو و نکروتیک (فلش‌های ضخیم) را نشان می دهد. درجه متوسطی از Blabing هسته-ها (فلش‌های نازک) و Blabing شدید سیتوپلاسمی (سر فلش‌ها) که در حال تبدیل شدن به دُزتراسیون هیدروپیک هستند، در شکل مشخص است. (هماتوكسیلين - ائوزين، درشت نمایي $\times 400$).

میانگین سرمی بیلی رویین تام در گروه آزاتیوپرین نسبت به گروه شاهد افزایش آماری معنی‌داری را نشان می‌دهد ($P=0.03$) در صورتی که میانگین سرمی بیلی رویین تام در گروه آزاتیوپرین همراه با ویتامین A اختلاف آماری معنی‌داری با گروه شاهد نشان نمی‌دهد و در مقایسه گروه ویتامین A با گروه شاهد، اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. در بررسی آنزیمهای آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز و فسفاتاز قلبی‌سرم در گروه آزاتیوپرین نسبت به گروه شاهد، افزایش آماری معنی‌داری مشاهده می‌شود، درحالی‌که بررسی میانگین سرمی آنزیمهای ALT و AST در گروه شاهد با گروههای دریافت کننده ویتامین A به تنهایی و گروه تیمار شده با آزاتیوپرین همراه با ویتامین A، اختلاف آماری معنی‌داری به دست نیامد. در بررسی میانگین سرمی پارامترهای بیوشیمیایی پروتئین تام، آلبومین، لاکتات دهیدروژناز، کلسترول، HDL، کلسمیم، فسفر و تری گلیسرید در بین گروه‌های تیمار شده با آزاتیوپرین، آزاتیوپرین به علاوه ویتامین A و ویتامین A به تنهایی با گروه شاهد، اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده نشد.

مطالعه هیستوپاتولوژیکی:



شکل شماره ۱- تصویر بافت شناسی از کبد حیوانات گروه آزاتیوپرین که تغییرات نکروتیک هپاتوسیت‌ها و تراکم سلول‌های کوپفر با فعالیت فاگوسیتی در فضای پری پورتال (فلش‌ها) را نشان می دهد. (هماتوكسیلين - ائوزين، درشت نمایي $\times 400$).



شکل شماره ۲- نوک فلش تخریب نکروتیک دیواره ورید پورتال در کبد حیوانات گروه آزاتیوپرین را نشان می دهد (هماتوكسیلين - ائوزين، درشت نمایي $\times 400$).

می باشد. در نتیجه افزایش مقادیر این آنزیم می تواند در بیماری های مختلفی وجود داشته باشد. با تجویز داروی آزاتیوپرین، مقدار این آنزیم در سرم، افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد. با اینکه این میزان در محدوده طبیعی ذکر شده در متابو است، اما می تواند ناشی از آسیب ایجاد شده توسط داروی آزاتیوپرین در بدن باشد. از آنجا که آنزیم لاتکتات دهیدروژناز که در آسیب های عضلانی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، در این بررسی تغییر معنی داری نداشته است و توام با آنزیم AST میزان آنزیم ALT نیز افزایش نشان می دهد، پس می توان به آسیب کبدی بیشتر مشکوک شد. در تجویز هم زمان ویتامین A، مقادیر این آنزیم تغییرات معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان نداد که می تواند ناشی از خاصیت آنتی اکسیدانی این داروها در برابر داروی آزاتیوپرین باشد. با بررسی نتایج حاصل از این تحقیق مشخص می شود که آنزیم فسفاتاز قلیابی در گروه آزاتیوپرین دارای اختلاف آماری معنی داری نسبت به سه گروه دیگر می باشد. از آنجا که این آنزیم دارای ایزو آنزیم های مختلفی می باشد نمی توان به طور قطع اختلاف آن را وابسته به کبد دانست ولی از آنجا که میزان کلسیم و فسفر در این تحقیق اختلاف آماری معنی داری را بین گروه ها نشان نداد، و با توجه به اینکه ایزو آنزیم های کبدی و استخوانی از عمله ترین ایزو آنزیم های فسفاتاز قلیابی می باشند، می توان افزایش آن را ناشی از مشکل کبدی دانست. با بررسی مقادیر سرمی فسفاتاز قلیابی در گروه آزاتیوپرین همراه با ویتامین A، اختلاف آماری معنی داری با مقادیر این آنزیم در گروه شاهد مشاهده نشد که نشان از نقش حفاظتی آن بر عوارض داروی Salvia Amin و Hamza تاثیر دو گیاه Hibiscus Rosmarinus و داروی آزاتیوپرین می باشد. بررسی کردند که نتایج نشان داد این گیاهان می توانند عوارض کبدی دارو را کاهش دهند [۱۰]. و Cesar همکارانش برای کاهش عوارض داروی فوق در بافت کبد، از N-Acetyl-L-Cysteine استفاده کردند و در پایان به این نتیجه رسیدند که این ترکیب قادر است نقش محافظتی در بافت کبد داشته باشد و می تواند مقادیر سرمی آنزیم های کبدی را کاهش دهد [۱۱]. در تحقیقی که توسط عمداو غلی تبریزی و همکاران انجام شده است، تزریق ویتامین E نیز می تواند اثرات اکسیدانی ناشی از این دارو را بر طرف نماید و افزایش آنزیم های کبدی متعاقب تجویز دارو را کاهش دهد [۲۱]. تحقیقات دیگری در این خصوص انجام نشده است. میانگین سرمی بیلی رو بین در گروهی که تنها داروی آزاتیوپرین را دریافت کرده است، نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری را نشان می دهد. از آنجایی که این دارو در

بحث

امروزه بروز بیماری هایی از قبیل سرطان و بیماری های خود ایمنی در جهان شایع شده و رو به افزایش است. برای مقابله با این بیماری ها لازم است از داروهایی استفاده شود که علاوه بر جلوگیری از پیشرفت بیماری، تأثیرات سوء کمتری در عملکرد طبیعی اندام ها و سلول های مختلف بدن فرد بیمار داشته باشد. از جمله داروهایی که امروزه مصرف زیادی دارد، داروی آزاتیوپرین می باشد که در بیماری هایی نظیر ایمuno Inflammatory bowel diseases (IBD) لوسومی لنفوبلاستی حاد، آرتیت روماتوئید، کولیت اولسراپیو، IgA nephropathy Autoimmune hepatitis پوستی تجویز می شود. داروی آزاتیوپرین دارویی است که می تواند از سنتز مجدد بازهای پورینی جلوگیری کرده و مانع همانند سازی در سلول ها گردد که این عمل به واسطه عدم سنتز RNA صورت می گیرد. سمیت ایجاد شده به دنبال استفاده از این دارو در اندام هایی از جمله مغز استخوان و کبد و دستگاه گوارشی و پانکراس به اثبات رسیده است [۱۲، ۱۳]. سمیت این دارو بیشتر در اثر تولید رادیکال های آزاد در بدن و اندام های بیمار است. مطالعه حاضر جهت بررسی اثر حفاظتی ویتامین A در برابر عوارض داروی آزاتیوپرین در بافت کبد موش صحراوی صورت پذیرفت که بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، افزایش وزن در گروه شاهد و گروه تیمار با ویتامین A و گروه تیمار درمان شده با آزاتیوپرین توام با ویتامین A، نشان دهنده سلامت جسمی و کاهش اثرات سمهی دارو توسط ویتامین A بوده و در نتیجه آن، رشد حیوانات به صورت طبیعی انجام گرفته است، در حالی که کاهش وزن در گروه دریافت کننده آزاتیوپرین به تنها یک می تواند ناشی از اثرات سمهی دارو در کبد و سایر ارگان ها باشد که نتیجه آن به صورت کاهش در وزن ظاهر شده است. با بررسی نتایج حاصل از این تحقیق مشخص شد که استفاده از داروی آزاتیوپرین، سبب افزایش مقادیر آنزیم های ALT و AST می گردد. ALT یا آلتین آمینو ترانسفراز یک آنزیم سیتوپلاسمی است که بررسی مقدار آن در بیماری های کبدی ارزش تشخیصی زیادی نسبت به سایر اندام ها دارد. افزایش این آنزیم می تواند دلیلی بر آسیب کبدی متعاقب تجویز دارو باشد. افزایش آنزیم ALT بعد از تجویز داروی آزاتیوپرین، توسط Sun گزارش شده است [۱۶]. در استفاده هم زمان ویتامین A توام با دارو، تغییرات معنی داری در میزان ALT نسبت به گروه شاهد مشاهده نگردید که می تواند ناشی از اثرات آنتی اکسیدانی و محافظتی این دارو در برابر اثرات سوء داروی آزاتیوپرین باشد. AST یا آسپارتات آمینو ترانسفراز دارای ایزو آنزیم های مختلفی از قبیل عضلانی، کبدی، پانکراسی

نکروتیک همراه با درجه متوسطی از تغییرات هیدروپیک را نشان داد که در مقایسه با تغییرات حاصل از داروی آزادیوپرین به تهابی در بافت کبد، دارای شدت کمتری بودند و به طور کلی نتایج حاصله از مطالعات پاتولوژیکی در این مطالعه تائید کننده نتایج بیوشیمیایی می‌باشند. در بررسی که توسط Madhyastha و همکاران انجام شد، اثر حفاظتی ویتامین A در برابر عوارض داروی Methotrexate اثبات شده است [۲۲]. اما مطالعاتی که نقش حفاظتی این ویتامین را در برابر عوارض اکسیدانی داروی آزادیوپرین نشان دهد، انجام نشده است.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد با توجه به اینکه سمیت داروی آزادیوپرین در بافت‌های مختلف به اثبات رسیده است، تا حد امکان سعی شود در موارد کاملاً ضروری از این دارو استفاده گردد و در صورت لزوم همزمان با مصرف دارو، از ویتامین‌ها یا داروی‌های آنتی اکسیدان از جمله ویتامین A استفاده شود.

کبد متاپولیزه و سیس دفع می‌شود و می‌تواند روی سیستم آنتی اکسیدانی بدن و به خصوص بافت کبد اثر بگذارد، شاید دلیل آفزایش میزان بیلی روین و آنزیم‌های کبدی ناشی از آسیب بافت کبد باشد. مصرف همزمان ویتامین A با داروی آزادیوپرین می‌تواند تا حدی این افزایش را جبران کند؛ چرا که این ویتامین آنتی اکسیدان قوی بوده و با مصرف همزمان آن، میانگین سرمی بیلی روین در این گروه‌ها نسبت به گروه شاهد، اختلاف آماری معنی‌داری را نشان نداد. میانگین مقادیر سرمی کلسترول، LDH، پروتئین تام، آلبومین، HDL، کلسمیم، فسفر و تری گلیسرید در این تحقیق تغییرات معنی‌داری نسبت به گروه شاهد نشان نداد. نتایج به دست آمده از مطالعات هیستوپاتولوژیکی نیز نشان داد که مصرف همزمان ویتامین A با داروی آزادیوپرین، عوارض کبدی ناشی از استعمال دارو را به نسبت زیادی کاهش می‌دهد. بر طبق این مطالعات میزان نواحی نکروتیک و از بین رفتن سلول‌های کبدی در گروه آزادیوپرین و ویتامین A نسبت به گروه آزادیوپرین بسیار کمتر بوده و بیشتر نزدیک به گروه شاهد می‌باشد. بافت کبد حیوانات این گروه تنها درجه متوسطی از تغییرات دژنراتیو و

References:

- [1] Aarbakke J, Janka-Schaub G, Elion GB. Thiopurine biology and pharmacology. *Trends Pharmacol Sci* 1997; 18(1): 3-7.
- [2] Czaja Aj. Drug therapy in the management of type 1 autoimmune hepatitis. *Drugs*. 1999; 57(1): 49-68.
- [3] Ludwig D, Stange EF. Efficacy of azathioprine in the treatment of chronic active Crohn's disease: prospective one-year follow-up study. German Imurek Study Group. *Z Gastroenterol* 1999; 37(11): 1085-91.
- [4] MRaza M, Ahmad M, Gado A, Al-Shabanah OA. A comparison of hepatoprotective activities of aminoguanidine and N-acetylcysteine in rat against the toxic damage induced by azathioprine. *Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol* 2003; 134(4): 451-6.
- [5] Pearson DC, May GR, Fick G, Sutherland LR. Azathioprine for maintaining remission of Crohn's disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2000; (2): CD000067.
- [6] Kerstens PJ, Boerbooms AM, Jeurissen ME, de Graaf R, Mulder J, van de Putte LB. Radiological and clinical results of longterm treatment of rheumatoid arthritis with methotrexate and azathioprine. *J Rheumatol* 2000; 27(5): 1148-55.
- [7] Kader HA, Mascarenhas MR, Piccoli DA, Stouffer NO, Baldassano RN. Experiences with 6-mercaptopurine and azathioprine therapy in pediatric patients with severe ulcerative colitis. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 1999; 28(1): 54-8.
- [8] Sood A, Midha V, Sood N, Kaushal V. Role of azathioprine in severe ulcerative colitis: one-year, placebo-controlled, randomized trial. *Indian J Gastroenterol* 2000; 19(1): 14-6.
- [9] Di Iandro D, Sarzo G, Marchini F. New immunosuppressive treatment in kidney transplantation. *Clin Nephrol* 2000; 53(4): suppl 23-32.
- [10] Amin A, Hamza AA. Hepatoprotective effects of Hibiscus, Rosmarinus and Salvia on azathioprine-induced toxicity in rats. *Life Sci* 2005; 77(3): 266-78.
- [11] César M, María D, Fernández M, Jesús A, Oscar E, Tomás O, et al. Azathioprine Acts upon Rat Hepatocyte Mitochondria and Stress-Activated Protein Kinases Leading to Necrosis: Protective Role of N-Acetyl-L-cysteine. *Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics Fast Forward* 2004; 104: 269-86.
- [12] Lee AU, Farrell GC. Mechanism of azathioprine-induced injury to hepatocytes: roles of glutathione depletion and mitochondrial injury. *J Hepatol* 2001; 35(6): 756-64.
- [13] Sweetman SC, Blake PS, Parsons AV (eds). Martindale's In: the Complete Drug Reference. 33rd Ed. London: Pharmaceutical Press; 2002. p. 470-572.

- [14] Park SW, Lee SM. Antioxidant and prooxidant properties of ascorbic acid on hepatic dysfunction induced by cold ischemia/reperfusion. *Eur J Pharmacol* 2008; 580(3): 401-6.
- [15] Watanabe A, Hobara N, Tobe K, Endo H, Nagashima H. Biochemical and morphological study on hepatotoxicity of azathioprine in rat. *Acta Med Okayama* 1979; 33(1): 5-14.
- [16] Sun C, Chen D, Qu Z, Hao J, Wang J. [Protective effects of radix Salviae miltiorrhizae on azathioprine hepatotoxicity in rats]. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi* 1996; 21(8): 496-8, 512.
- [17] El-Sokkary GH. Melatonin and vitamin C administration ameliorate diazepam-induced oxidative stress and cell proliferation in the liver of rats. *Cell Prolif* 2008; 41(1): 168-76.
- [18] Gonzalez-Reyes S, Martinez L, Martinez-Calonge W, Fernandez-Dumont V, Tovar JA. Effects of antioxidant vitamins on molecular regulators involved in lung hypoplasia induced by nitrofen. *J Pediatr Surg* 2006; 41(8): 1446-52.
- [19] Lee WY, Lee JS, Lee SM. Protective effects of combined ischemic preconditioning and ascorbic acid on mitochondrial injury in hepatic ischemia/reperfusion. *J Surg Res* 2007; 142(1): 45-52.
- [20] Noyan S, Cavusoglu I, Minbay FZ. The effect of vitamin A on CCl₄-induced hepatic injuries in rats: a histochemical, immunohistochemical and ultrastructural study. *Acta Histochem* 2006; 107(6): 421-34.
- [21] Amouoghli Tabrizi B, Mohajeri D, Mousavi G, Farajzade F, Khodadadi A, Alizade S.B, Reihani B. Biochemical and Pathological Study of Protective Effect of Vitamin E in Azathioprine-Induced Hepatotoxicity in Rat. *J Bio Sci* 2009; 9(4): 339-44.
- [22] Madhyastha S, Bairy KL, Somayaji SN. Protective Effect of Vitamin A on Methotrexate Induced Micronuclei. *Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics* 2007; 6(1): 1-4.