

Omentopexy in rabbit for the repair of diaphragmatic defect reduces the adhesion of viscera to propylen mesh

Hosseinpour M¹, Davood-Abadi A², Golestani N^{2*}

1- Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran

2- Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran

Received April 27, 2010; Accepted August 21, 2010

Abstract:

Background: The use of synthetic mesh for the repair of major congenital diaphragmatic hernia may cause visceral adhesion to prosthesis and ongoing complications. In present study the use of propylen mesh for the repair of diaphragmatic hernia and its role in eliminating of visceral adhesion to repair site is evaluated.

Materials & Methods: This experimental study was carried out on 20 adult New Zealand rabbits (age: 6 months) assigned randomly into two equal groups. In one group, after laparotomy a defect (size: 1×1 cm) was created on the diaphragm. The suture was then repaired by sterile propylen mesh and nylon suture (thickness: 3/0 - 4/0). In another group, omentum was fixed on the mesh using a nylon suture (thickness: 3/0). After 30 days the two groups were operated and the visceral adhesion to repair site was compared using Mazuji scale.

Results: Nine (90%) out of 10 rabbits with propylen mesh repair had visceral adhesion to the repair site. On classifying the grade of adhesion among the cases, one, three, four and two rabbits were assigned the “0”, “I”, “II”, and “III” grades, respectively. On the other hand, 4 (40%) out of 10 rabbits, in which the diaphragm was repaired by propylen mesh and omentopexy method, visceral adhesion (grade “I”) was seen to the site of repair. The rest of animals displayed no such adhesion ($P=0.015$).

Conclusions: Omentopexy reduces the visceral adhesion to propylen mesh.

Keywords: Propylen mesh, Diaphragmatic defect, Omentopexy

*** Corresponding Author.**

Email: nas_golestani @ yahoo.com

Tel: 0098 913 304 8966

Fax: 0098 361 555 8900

Conflict of Interests: No

Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences, Autumn, 2010; Vol 14, No 3, Pages 229-233

امنیت‌پردازی باعث کاهش چسبندگی احتشاء به مش پروپیلن در ترمیم نقصهای دیافراگماتیک خرگوش می‌شود

مهرداد حسین پور^۱، عبدالحسین داودآبادی^۲، ناصر گلستانی^{۳*}

خلاصه

سابقه و هدف: استفاده از مشهای مصنوعی در ترمیم فقط های دیافراگماتیک بزرگ، چسبندگی احتشاء به این پروتزا و عوارض بعد از آن را به دنبال دارد. هدف از انجام این مطالعه استفاده از امتنوم جهت پوشاندن مش پروپیلن در ترمیم فقط دیافراگمی و بررسی اثر آن در کاهش چسبندگی احتشاء به محل ترمیم است.

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۲۰ سر خرگوش نر سفید نیوزلندی ۶ ماهه به دو گروه مساوی ۱۰ تابی تقسیم شدند. در گروه اول پس از لایاروتومی، در روی دیافراگم یک نقص به ابعاد ۱×۱ سانتی متر ایجاد شده و محل نقصه با مش پروپیلن استریل و نخ نایلون ۳/۰ ترمیم شد. در گروه دوم امتنوم در روی محل نقص ترمیم شده با مش، به جدار دیافراگم فیکس شد. ۳۰ روز بعد مجدداً در هر دو گروه جراحی صورت گرفت و میزان چسبندگی احتشاء به محل در هر دو گروه بر اساس مقیاس مازوجی مقایسه شد. در نهایت داده ها با آزمون فیشر دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: از ۱۰ خرگوشی که دیافراگم آنها با مش پروپیلن به تنها بی ترمیم شده بود، ۹ خرگوش (۹۰ درصد) دارای چسبندگی احتشاء به محل ترمیم بودند. از نظر شدت چسبندگی در این گروه یک خرگوش با درجه I، چهار خرگوش با درجه II و دو خرگوش با شدت چسبندگی درجه III بودند. از ۱۰ خرگوشی که دیافراگم آنها با استفاده از مش پروپیلن به همراه امنیت‌پردازی ترمیم شده بود، ۴ خرگوش (۴۰ درصد) دارای چسبندگی احتشاء به محل ترمیم بودند که درجه چسبندگی آنها I بود و سایرین هیچ گونه چسبندگی نداشتند ($P=0.015$).

نتیجه گیری: استفاده از امتنوم در ترمیم فقط دیافراگماتیک چسبندگی احتشاء به مش پروپیلن را کاهش می‌دهد.

واژگان کلیدی: مش پروپیلن، نقص دیافراگم، امنیت‌پردازی

فصلنامه علمی - پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۹، صفحات ۲۲۳-۲۲۹

دیافراگم تحت عمل جراحی قرار گیرند [۳]. ترمیم جراحی این نقصهای به صورت نزدیک کردن لبه های دیافراگم با نخ های غیر قابل جذب می باشد [۴]. در مواردی مشاهده می شود که این نقصهای دیافراگم بسیار بزرگ بوده و یا اینکه آژنه ای دیافراگم وجود دارد که در این حالات جراحان اطفال مجبور به استفاده از مواد صناعی جهت پوشاندن نقص دیافراگم هستند [۵]. رایج ترین پروتزهایی که امروزه جهت موقعیت های داخل صفاقی مورد استفاده قرار می گیرد، پروتزهای Poly Tetra Fluro (PTFE) با Ethylene می باشد. با این که واکنش بافتی این مش ها حداقل بوده، اما در تمام موارد هنوز شناسن چسبندگی وجود دارد و در ضمن میزان عود حدود ۱۰-۵۰ درصد است [۶،۱]. PTFE با بافت های اطراف ادغام نشده و با اتصال محکم به ساختارهای داخل صفاقی همراه نیست؛ لذا عوارض ناشی از چسبندگی احتشاء به آن کمتر می باشد. مش های پروپیلن دارای واکنش بافتی شدیدتری می باشند و واکنش های آلرژیک شدیدتری دارند [۶،۲]. مشکل عمده ای که در استفاده از این مواد وجود دارد واکنش بافتی این مواد و چسبندن احتشاء شکم به آنها می باشد که می تواند باعث انسداد چسبنده روده باریک و نیاز به عمل جراحی مجدد

مقدمه

فقط های دیافراگماتیک مادرزادی یکی از آنومالی های بد تولد می باشد که با شیوع ۱ در ۵۰۰۰ تولد زنده مشاهده می شود [۱]. علت ایجاد آن عدم تکامل پرده پلوروپریتونال بین حفره شکم و قفسه سینه می باشد و در نتیجه احتشاء شکمی به داخل قفسه سینه حرکت کرده و مانع رشد و تکامل ریه ها می شوند [۲]. در بد تولد این آنومالی خود را به صورت سیانوز و دیسترس تنفسی نشان می دهد [۲،۱]. اکثر موارد (۸۰-۹۰ درصد) فقط های دیافراگماتیک در سمت خلفی - طرفی چپ مشاهده می شود. در هر حال نوزادان متولد شده با این آنومالی بعد از تثیت وضعیت گازهای خون شریانی و اقدامات احیاء اولیه، می بایستی جهت ترمیم نقص

^۱ استادیار، مرکز تحقیقات ترومما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

^۲ دانشیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

^۳ دستیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

* لشانی نویسنده مسئول؛

دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بیمارستان شهید بهشتی، بخش جراحی عمومی

دوفنیس؛ ۰۳۶۱ ۵۵۵۸۹۰۰-۰۹۱۳ ۴۸۹۶۶

پست الکترونیک؛ nas_golestani @ Yahoo.Com

تاریخ پذیرش نهایی؛ ۸۹/۵/۳۰

تاریخ دریافت؛ ۸۹/۲/۷

سانتی متر ایجاد شده به وجود آمد و محل خراش با مش پروپیلن استریل و نخ نایلون ۳/۰ یا ۴/۰ ترمیم می‌شد. در گروه دوم امتیوم در روی محل خراش ترمیم شده با مش با استفاده از نخ نایلون ۳/۰ به نحوی که به طور کامل نقیصه را بیژوشنده، به جدار دیافراگم فیکس می‌شد. سپس جدار شکمی با نخ نایلون ۴/۰ ترمیم شده و خرگوش‌ها به لانه منتقل شده و تحت مراقبت قرار می‌گرفتند. روز بعد مجدداً در هر دو گروه جراحی صورت گرفت و میزان چسبندگی احتشاء به محل بر اساس مقیاس مازوجی در هر دو گروه مقایسه گردید. مقیاس مازوجی (جدول شماره ۱) یک معیار مشاهده‌ای بوده که در مطالعات اخیر جهت بررسی شدت چسبندگی به کار رفته است [۱۰]. با توجه به اینکه چسبندگی و فیبروز سازمان یافته طی ۱۰ روز اول پس از آسیب به پریتوئن ایجاد می‌شود و طی ۲ الی ۳ هفته پس از آسیب به حداقل خود می‌رسد [۱۱]، لذا مدت ۳۰ روز جهت عمل جراحی بعدی در نظر گرفته شد. مشاهدات بالینی در چک لیست فردی جهت هر خرگوش به صورت جداگانه ثبت شد. امکان کور بودن جراح به نوع مداخله در هنگام سنجش چسبندگی محل عمل وجود نداشت، اما برای پیشگیری از ایجاد تورش در جمع آوری اطلاعات، سنجش چسبندگی‌ها با مشارکت یک جراح دیگر که نسبت به فرضیات و نوع مداخله بی اطلاع بورد، انجام می‌شد. اطلاعات لازم از فرم‌های اطلاعاتی استخراج شده و هر دو گروه با توجه به متغیرهای مورد بررسی توصیف شده و مقایسه آماری دو گروه با استفاده از آزمون‌های فیشر دقیق و ویلکاکسون صورت گرفت.

شود [۶]. جهت حل این مشکلات روش‌های مختلفی استفاده شده است که عمدۀ آنها بر روی تغییر جنس پروتز مصرفی متمرکز بوده است و از آن جمله می‌توان از توصیه به استفاده از مش‌های بیواکتیو را نام برد [۷]. اما مشکل عمدۀ ای که در استفاده از این پروتز‌های خاص مشاهده می‌شود، این است که اولاً بسیار گران قیمت بوده و همه جا در دسترس نیستند و ثانیاً کاهش عوارض در استفاده از آنها چندان قابل ملاحظه نیست [۸]. در این مطالعه استفاده از پروتز رایج در کشور ما (مش‌های پروپیلن) مدنظر است؛ با این تفاوت که سطح مش به وسیله امتیوم پوشیده می‌شود. در اینجا امتیوم به عنوان یک سد محافظتی عمل کرده و مانع واکنش بین مش پروپیلن و احتشاء شکم می‌شود. در ضمن، با توجه به محدودیت مطالعه روی انسان در اینجا از مدل حیوانی خرگوش استفاده شده است.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه تجربی ۲۰ سر خرگوش نر سفید نیوزلندی ۶ ماهه به دو گروه مساوی ۱۰ تایی تقسیم شدند. از یک هفته قبل از مطالعه شرایط نگهداری و تغذیه‌ای آنها تنظیم شده و القای بیهوشی با تزریق ۱۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کتابمین هیدروکلراید صورت گرفت [۱۰، ۹]. در صورت مرگ هر خرگوش در طول مطالعه به هر علت خرگوش دیگری جایگزین شد. خرگوش‌ها به صورت خوابیده به پشت روی تخت قرار گرفته و پس از حذف موهای شکم، محل جراحی با بتادین پرپ می‌شد. سپس با یک برش در خط وسط، جدار شکم و پریتوئن باز شده و در سمت چپ قله دیافراگم یک خراش به ابعاد ۱×۱

جدول شماره ۱- درجه بندی شدت چسبندگی بر اساس مقیاس مازوجی

توصیف	درجه چسبندگی
چسبندگی ندارد	۰
برای آزاد سازی چسبندگی، دست کاری آرام و ظرفی غیرتیز نیاز است	I
برای آزاد سازی چسبندگی، دست کاری شدید غیرتیز نیاز است	II
برای آزاد سازی چسبندگی، نیاز به دست کاری با شمی تیز است	III

جدول شماره ۲ نشان داده شده است، از ۱۰ خرگوشی که دیافراگم آنها با استفاده از مش پروپیلن به همراه امتوپکسی ترمیم شده بود، ۴ خرگوش (۴۰ درصد) دارای چسبندگی احتشا به محل ترمیم بودند و ۶ خرگوش (۶۰ درصد) چسبندگی احتشا به محل ترمیم نداشتند ($P=0.019$).

نتایج

از ۱۰ خرگوشی که دیافراگم آنها با استفاده از مش پروپیلن به تنهایی ترمیم شده بود، ۹ خرگوش (۹۰ درصد) دارای چسبندگی احتشا به محل ترمیم بودند و ۱ خرگوش (۱۰ درصد) قادر چسبندگی احتشا به محل ترمیم بود. همان‌گونه که در

معنی داری بین دو گروهی که با مش قابل جذب و غیر قابل جذب ترمیم شده بودند، از نظر میزان عود مشاهده نشد، ثانیاً انسداد چسبنده روده باریک ناشی از چسبنده به محل پروتزر، در نوع پروتزر قابل جذب به صورت معنی داری کمتر از نوع غیر قابل جذب بود. در مطالعه‌ای که توسط Kimber و همکاران [۱۳] صورت گرفت دو ماده صناعی (Fluorinated Polyester) و PTFE ترمیم نقص دیافراگم ۱۲ خوکجه هندی استفاده شدند که میزان چسبنده در FP کمتر از PTFE بود. در مطالعه دیگری که، توسط Gretheec و همکارانش صورت گرفت، استفاده از پروتزر PTFE یا Gore-Tex و پروتزر بیواکتیو Sargesis از نظر عود و انسداد چسبنده روده با یکدیگر مقایسه شدند که تفاوت معناداری بین این دو گروه مشاهده نشد [۱۴]. در یک مطالعه دیگر که توسط Kimber و همکارانش صورت گرفت، کامپوزیت Mar Lex و Gore Tex در ترمیم نقایص دیافراگم با یکدیگر مقایسه شدند. در این مطالعه که بر روی ۱۲۵ بیمار صورت گرفت ۷۹ بیمار به صورت ترمیم اولیه و ۶ بیمار به صورت استفاده از کامپوزیت ترمیم شدند. انسداد روده در ترمیم اولیه ۵ درصد و در ترمیم با وصله حدود ۷ درصد ذکر شد [۱۵]. یکی از روش‌های ترمیم نقایص دیافراگماتیک وسیع، استفاده از فلاپ‌های عضلانی جدار شکم یا توراکس می‌باشد. اما مشکلی که در استفاده از این فلاپ‌ها مشاهده می‌شود این است که به علت دستکاری وسیع در این عمل استفاده از آن در بیمارانی که روی (Extra Corporeal Membrane Oxygenation; ECMO) هستند، با خطر خونریزی همراه است. Sumato و همکاران استفاده از فلاپ‌های عضلانی در ترمیم هرنی دیافراگماتیک با مش پروپیلن را مقایسه کردند که رابطه معنی داری در کاهش ایجاد چسبنده به دست نیامد [۱۶]. با نگاهی به مطالعات ذکر شده در بالا متوجه می‌شویم که در این مطالعات جهت حل مشکل چسبنده احتشاء به محل ترمیم بیشتر روی تغییر جنس مش مورد استفاده تأکید شده است و سعی شده از موادی استفاده شود که کمترین واکنش و چسبنده احتشاء را داشته باشند. اما با توجه به نتایج دراز مدت مطالعات می‌توان دریافت که این روش تأثیر قابل توجهی در رفع این مشکلات نداشته است و در ضمن مشکلی که استفاده از این مواد را در کشور ما محدود کرده است این است که این مش‌ها اولاً بسیار گران قیمت می‌باشند و ثانیاً در همه جا در دسترس نمی‌باشند. در این مطالعه از مش پروپیلن که در همه جا در دسترس می‌باشد و نیز قیمت بالایی ندارد استفاده شده است و سعی شده مشکل چسبنده از طریق تکنیک جراحی حل شود. مکانیسم احتمالی امتوپکسی در کاهش چسبنده چنین

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی چسبنده احتشاء به محل عمل در دو تکنیک مختلف

روش ترمیم دیافراگم	چسبنده احتشاء به
ترمیم با مش پروپیلن	ترمیم با مش پروپیلن + امتوپکسی
دارد	(%) ۹
ندارد	(%) ۱
جمع	(%) ۱۰
P	۰/۰۱۹

در مقایسه شدت و درجه چسبنده احتشاء به محل ترمیم دیافراگم یافته‌ها چنین بود (جدول شماره ۳): در گروه اول ۱ خرگوش (۱۰ درصد) فاقد چسبنده به محل عمل بود، سه خرگوش (۳۰ درصد) دارای چسبنده درجه بک بودند، ۴ خرگوش (۴۰ درصد) چسبنده درجه دو و ۲ خرگوش (۲۰ درصد) چسبنده درجه سه داشتند. از ۱۰ خرگوش گروه دوم، ۶ خرگوش (۶۰ درصد) هیچ گونه چسبنده احتشاء به محل عمل نداشتند و تنها ۴ خرگوش (۴۰ درصد) دارای چسبنده خفیف درجه یک بودند. در این گروه چسبنده احتشاء درجه دو و سه مشاهده نشد. در بررسی آماری یافته‌های بالا، این اختلاف معنی دار بود ($P=0/015$).

جدول شماره ۳ - توزیع فراوانی درجه چسبنده احتشاء به محل ترمیم در دو تکنیک مختلف

روش ترمیم	درجه چسبنده
ترمیم با مش پروپیلن به تهابی	III
ترمیم با مش پروپیلن + امتوپکسی	II
جمع	I
P	0

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که امتوپکسی به صورت قابل توجهی باعث کاهش چسبنده احتشاء به مش پروپیلن می‌شود. تاکنون مطالعه مشابه این مطالعه چه بر روی حیوان و چه بر روی انسان انجام نشده است، اما مطالعات مختلفی با تکیه بر تغییر جنس مش استفاده شده در ترمیم دیافراگم انجام شده است؛ از جمله این مطالعات می‌توان موارد ذیل را ذکر کرد. در مطالعه گذشته نگری Shaw و همکارانش [۱۲] صورت گرفت ۲۴ هرنی که توسط Shawn و همکارانش [۱۲] ترمیم شده بود. در این مطالعه اولاً تفاوت دیافراگماتیک با استفاده از پروتزر غیر قابل جذب (۱۱ مورد) و قابل جذب (۱۳ مورد) ترمیم شده بود. در این مطالعه اولاً تفاوت

نتیجه گیری

استفاده از امتوپکسی در ترمیم فتق دیافراگماتیک به وسیله مش پروپیلن می‌تواند موجب کاهش چسبندگی احتشاء به مش و جلوگیری از عوارض آن شود.

تشکر و قدردانی

این تحقیق از طریق طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تامین هزینه شده و در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اجرا گردیده است؛ لذا از کلیه همکارانی که ما را در انجام این مطالعه باری نموده‌اند، به ویژه جناب آقای طلایی و سرکار خانم خاتمی تشکر و قدردانی می‌نماییم.

References:

- [1] Ashcraft KW, Holcomb III GW, Murphy JP. Pediatric Surgery. 4th ed. 2004. p. 931-54.
- [2] Brunicardi C, Andersen D. Schwartz's Principles of Surgery. 9th ed. Newyork: McGrawhill; 2010. p. 1416-8.
- [3] Beauchamp T. Sabiston Textbook of Surgery. 18th ed. Saunders; 2005. p. 2072- 3.
- [4] Cullen M. congenital diaphragmatic hernia. Operative Considerations. 5th ed. 1995. p. 243-8.
- [5] Kevin P Keith T pual. Congenital diaphragmatic hernia. Principles and practice of pediatric Surgery. 4th. 2005. p. 897-908.
- [6] Moss RL, Chen CM, Harrison MR. Prosthetic patch durability in congenital diaphragmatic hernia: a long-term follow-up study. *J Pediatr Surg* 2001; 36(1): 152-4.
- [7] de Kort LM, Bax KM. Prosthetic patches used to close congenital diaphragmatic defects behave well: a long-term follow-up study. *Eur J Pediatr Surg* 1996; 6(3): 136-8.
- [8] Langham MR Jr, Kays DW, Ledbetter DJ, Frentzen B, Sanford LL, Richards DS. Congenital diaphragmatic hernia: epidemiology and outcome. *Clin Perinatol* 1996; 23(4): 671-88.
- [9] Avsar AF, Avsar FM, Sahin M, Topaloglu S, Vatansev H, Belviranli M. Diphenhydramine and hyaluronic acid derivatives reduce adnexal adhesions and prevent tubal obstructions in rats. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2003; 106(1): 50-4.
- [10] Heard DJ. Principles and techniques of anesthesia for exotic practice. *Vet Clin North Small Anim Pract* 1993; 23(6): 1301-27.
- [11] Brunicardi FC, Brandt M, Andersen D, Billiar T. Schwartz's principles of surgery. 9th ed. New York: McGraw-Hill; 2010. p. 1325-35.
- [12] Peter SD, Valusek PA, Tsao K, Holcomb III GW, Ostlie MBA, Snyder CL. Abdominal Complications Related to type of Repair for Congenital diaphragmatic hernia. *J Surg Res* 2007; 140: 234-6.
- [13] Kimber CP, Dunkley MP, Haddock G, Robertson L, Carey FA, Cuschieri A. Patch incorporation in diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg* 2000; 35(1): 120-33.
- [14] Grethel EJ, Cortes RA, Wagner AJ, Clifton MS, Lee H, Farmer DL, et al. Prosthetic Patches for congenital diaphragmatic hernia Repair Surgisis VS Gore Tex. *J Pediatr Surg* 2006; 41(1): 29-33.
- [15] Riehle KJ, Magnuson DK, Waldhausen JH. Low recurrence rate after Gore-Tex/Marlex composite patch repair for posterolateral congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg* 2007; 42(11): 1841-4.
- [16] Masumoto K, Nagata K, Souzaki R, Uesugi T, Takahashi Y, Taguchi T. Effectiveness of diaphragmatic repair using an abdominal muscle flap in patients with recurrent congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg* 2007; 42(12): 2007-11
- [17] Bakkum EA, Trimbos-Kemper TC. Natural course of postsurgical adhesions. *Microsurgery* 1995; 16(9): 650-54.
- [18] Hellebrekers BW, Trimbos-Kemper TC, Trimbos JB, Emeis JJ, Kooistra T. Use of fibrinolytic agents in the prevention of postoperative adhesion formation. *Fertil Steril* 2000; 74(2): 203-12.
- [19] Xu X, Pappo O, Garbuzenko E, Bischoff SC, Rivkind A, Levi-Schaffer F. Mast cell dynamics and involvement in the development of peritoneal adhesions in the rat. *Life Sci* 2002; 70: 971-67.