

بررسی عوارض حاملگی در بیماران با تهوع و استفراغ شدید دوران بارداری

۱* شهرلا یزدانی ، زینت السادات بوذری ، ساره فغانی^۲

خلاصه

سابقه و هدف: تهوع و استفراغ در اوایل حاملگی یکی از مشکلات طبی زنان است. در بیماران با ویار شدید حاملگی پیامدهای بارداری شامل سقط، زایمان زودرس، وزن کم زمان تولد، مردہ زایی و پیامد مادری پره اکلامپسی شایع تر است. این مطالعه در جهت بررسی بروز پیامدهای جنبی و مادری حاملگی در بیماران با ویار شدید حاملگی انجام شده است.

مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی روی ۷۰ بیمار حامله قبل از سن ۱۴ هفته حاملگی که با استفراغ شدید حاملگی در بیمارستان یحیی نژاد بابل بستری شدند (گروه مورد) و ۱۰۰ بیمار که جهت مراقبت اوایل حاملگی به این مرکز مراجعه کرده بودند (گروه کنترل) انجام گرفت. همه بیماران تا زمان زایمان پی گیری شدند. اطلاعات لازم و عوارض مادری و نوزادی به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده و سپس آنالیز شدند.

نتایج: زایمان زودرس در گروه مورد ۹/۴ و در گروه کنترل ۱ درصد بود که اختلاف آن به لحاظ آماری معنی دار بود ($P=0.015$). بروز سقط در گروه بیمار ۸/۶ و در گروه کنترل ۱ درصد بود که اختلاف بین آنها نیز معنی دار بود ($P=0.002$). میزان بروز دیابت در گروه کنترل صفر و در گروه بیمار ۱۰/۹ درصد بود ($P=0.001$) ولی در دو گروه از نظر روش زایمان، وزن و مرگ و میر نوزادان و پره اکلامپسی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.

نتیجه گیری: با توجه به بیشتر بودن عوارضی نظیر دیابت بارداری، زایمان زودرس، سقط و بستری نوزاد در بیماران با استفراغ شدید حاملگی، مراقبت و پیگیری دقیق بیماران در طی بارداری توصیه می شود.

واژگان کلیدی: استفراغ شدید حاملگی، عوارض بارداری، تولد زودرس، مرگ و میر جنبی

فصلنامه علمی - پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹، صفحات ۴۳۰-۴۲۶

از آنجایی که تهوع و استفراغ شدید حاملگی اغلب با کمبودهای تغذیه ای و کاهش وزن مادری و اختلالات آب و الکترولیتی همراه است، می تواند موجب افزایش عوارض پره ناتال شود [۲]. در یک مطالعه افزایش زایمان زودرس و افزایش مدت بستری نوزادان گزارش شده است [۳]. در یک مطالعه دیگر کاهش آپگار موقع تولد نوزاد و افزایش زایمان زودرس و وزن کم موقع تولد در بیماران با استفراغ شدید حاملگی نسبت به گروه کنترل دیده شده است [۲]. در برخی از مطالعات نیز میزان سقط در خانم های دارای استفراغ شدید حاملگی با توجه به افزایش میزان HCG β به طور واضح کمتر از گروه کنترل بوده است [۴،۲]. در اکثر مطالعات ارتباطی بین استفراغ شدید حاملگی و دیابت حاملگی و فشارخون حاملگی دیده نشده است [۵،۲]. با توجه به اهمیت بالای موضوع و پیامدهای مادری و نوزادی در بیماران چهار استفراغ شدید حاملگی بر آن شدیدم که بیمارانی را که به این دلیل در بیمارستان شهید یحیی نژاد بستری شده اند را مورد ارزیابی قرار دهیم.

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی بر روی خانم های بارداری که جهت مراقبت های حاملگی مراجعه نموده و نیز خانم های بارداری که با

مقدمه

استفراغ شدید حاملگی به عنوان نوعی از استفراغ تعریف می شود که بیش از سه بار در روز اتفاق بینند و موجب کاهش وزن بیش از ۵ درصد از شروع حاملگی شود؛ همچنین این بیماری ممکن است باعث دهیدراتاسیون، اسیدوز متابولیک و هیپوکالمی شود [۱]. استفراغ شدید حاملگی در ۲ تا ۳ درصد از حاملگی ها اتفاق می افتد و باعث افزایش مراقبت های بهداشتی، افزایش تعداد دفعات بستری شدن در بیمارستان، از کار افتادگی و کاهش کیفیت زندگی بیماران به طور مقطعی در دوران حاملگی می شود [۲]. چنین به نظر می رسد که استفراغ شدید حاملگی با افزایش سریع گنادوتروپین کوریونی، استروژن و یا هر دو در سرم ارتباط داشته باشد [۱].

^۱ استادیار، گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

^۲ دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

* لشانی نویسنده مسؤول؛

بابل، مرکز آموزشی درمانی آیه الله روحانی، دفتر گروه زنان و زایمان

تلفن: ۰۱۱ ۲۱۴۲۱۱۶ - ۰۹۱۱ ۲۲۳۸۳۰۱ - دورنویس: ۱۳۴۸

پست الکترونیک: shahla_yazdani_1348@yahoo.com

تاریخ پذیرش نهایی: ۸۹/۶/۳۰ تاریخ دریافت: ۸۹/۱/۳۰

پس از جمع آوری اطلاعات وارد کامپیوتر شده و از طریق نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از تست‌های آماری دقیق فیشر، t و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد. مقادیر P کمتر از 0.05 به عنوان معنی دار تلقی گردیدند.

نتایج

در این مطالعه 70 بیمار مبتلا به تهوع و استفراغ شدید حاملگی و 120 نفر به عنوان کنترل وارد مطالعه شدند که به علت عدم پیگیری در نهایت 100 نفر از این افراد وارد مطالعه شدند. نتایج به صورت زیر بود: میانگین سن بیماران در دو گروه مبتلا به تهوع و استفراغ حاملگی و گروه کنترل به ترتیب 24.1 ± 3.3 و 23.3 ± 3.7 سال بود ($P=0.199$). درصد بیماران با تهوع و استفراغ حاملگی و 1 درصد افراد گروه کنترل، سقط داشتند که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود ($P=0.02$). در $9/3$ درصد بیماران با تهوع استفراغ حاملگی و 1 درصد گروه کنترل زایمان زودرس اتفاق افتاد که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار بود ($P=0.015$). درصد انجام القا و درصد سزارین بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت (جدول شماره ۱).

تشخیص استفراغ شدید حاملگی در بخش زنان و مامایی بیمارستان شهید یحیی نژاد بستری شده بودند انجام شد. تعداد 70 بیمار با تشخیص استفراغ شدید حاملگی که قبل از 14 هفته حاملگی در بخش زنان بیمارستان یحیی نژاد بابل جهت درمان بستری گردیده بودند، وارد مطالعه شده و آن‌ها اطلاعات از نظر عوارض مادری و نوزادی این حاملگی‌ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. گروه کنترل شامل 100 مورد خانم حامله زیر 14 هفته بود که به درمانگاه مامائی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل مراجعه کرده بودند. معیارهای تشخیص برای استفراغ شدید حاملگی عبارت بود از: استفراغ بیش از سه بار در روز همراه با حداقل یکی از موارد زیر بود؛ کاهش وزن بیمار بیشتر از 3 کیلوگرم از شروع حاملگی تا زمان بستری، کتونوری در ادرار، استفراغ‌هایی که باعث دهیدراتایسون (خشکی مخاطه‌ها) و اختلالات الکترولیتی شود. معیارهای ورودی مطالعه شامل: سن کمتر از 35 سال، سن حاملگی زیر 14 هفته، گراوید 1 و 2 ، BMI زیر 32 و حاملگی تک قلو بود. بیماران با دیابت آشکار و فشار خون مزمن، بیماران با سابقه سقط تکراری و چندقلوبی از مطالعه حذف شدند. اطلاعات لازم و عوارض حاملگی و نوزادی به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده و

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی و درصد سقط، القا و نوع زایمان در افراد مورد مطالعه

گروه‌های مطالعه				شاخص‌های مورد مطالعه
P	کنترل	تهوع و استفراغ حاملگی	ندارد	
0.02	(۹۹) ۹۹	(۴۱) ۶۴	ندارد	سقط
	(۱) ۱	(۸) ۶	دارد	
0.423	(۵۲) ۵۲	(۵۹) ۳۸	ندارد	القا
	(۴۷) ۴۷	(۴۰) ۳۶	دارد	
0.057	(۴۵) ۴۵	(۴۵) ۲۹	طبيعي	نوع زایمان
	(۵۴) ۵۴	(۵۴) ۳۵	سزارین	
0.015	(۹۹) ۹۸	(۹۰) ۵۸	ندارد	زایمان پره ترم
	(۱) ۱	(۹) ۶	دارد	

گروه کنترل بود، ولی توزیع پره اکلامپسی بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت (جدول شماره ۲).

دیابت بارداری (نوع A_1 و A_2) و خونریزی حین بارداری و لیر در بیماران با تهوع و استفراغ حاملگی به طور معنی داری بیشتر از

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی و درصد دیابت و فشار خون بارداری و خونریزی در بیماران با تهوع و استفراغ حاملگی و گروه کنترل

گروه				شاخص‌های مورد مطالعه
P	کنترل	تهوع و استفراغ حاملگی	ندارد	
0.001	(۱۰۰) ۹۹	(۸۹) ۵۷	ندارد	دیابت بارداری
	(۰) ۰	(۱۰) ۷	دارد	
0.607	(۹۹) ۹۸	(۱۰۰) ۶۴	ندارد	پره اکلامپسی
	(۱) ۱	(۰) ۰	دارد	
0.000	(۹۸) ۹۷	(۷۵) ۴۸	ندارد	خونریزی (حین بارداری و لیر)
	(۲) ۲	(۲۵) ۱۶	دارد	

کیلوگرم بود ($P=0.928$). در صد بسته در نوزادان متولد شده از مادران با تهوع و استفراغ حاملگی به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (جدول شماره ۳).

میانگین آپگار نوزادان در دو گروه مبتلا به تهوع و استفراغ حاملگی و گروه کنترل به ترتیب 9.3 ± 0.9 و 9.1 ± 1.1 بود ($P=0.181$). میانگین وزن نوزادان نیز در دو گروه مبتلا به تهوع و استفراغ حاملگی و گروه کنترل به ترتیب 3.1 ± 0.4 و 3.0 ± 0.6 بود.

جدول شماره ۳- توزیع فراوانی و درصد بسته و مرگ و میر نوزادی نوزادان در گروههای مطالعه

گروه	شاخص های مورد مطالعه	
	تهوع و استفراغ حاملگی	ندارد
کنترل	(۹۴/۹) ۹۶	(۷۹/۷) ۵۱
	(۵/۱) ۵	(۲۰/۳) ۱۳
بسته	(۱۰۰) ۹۹	(۹۸/۴) ۶۳
	(۰) ۰	(۱/۶) ۱
مرگ و میر		
	دارد	ندارد

ارائه داده و نشان دادند که پره اکلامپسی در گروه ویار شدید، ویار خفیف و گروه شاهد به ترتیب $3/3$ و $4/7$ و $4/3$ بوده است که از نظر آماری این تفاوت معنی دار نبوده است. البته Jeffrey [۶] نشان داد که در خانمهایی که به دلیل ویار شدید حاملگی بسته شدند، عواقب مادری مانند پره اکلامپسی شایع تر است. میانگین و انحراف معیار وزن نوزادان در دو گروه مبتلا به تهوع و استفراغ حاملگی و گروه کنترل به ترتیب 3.1 ± 0.4 و 3.0 ± 0.6 کیلوگرم بود ($P=0.928$). این در حالی است که در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی ارائه شده است. Tsang و همکاران [۷] نشان دادند که پیامد حاملگی بیماران مبتلا به ویار حاملگی از نظر وزن زمان تولد مشابه جمعیت عمومی بوده است. Hollmgren و همکاران [۸] نیز با مطالعه بر روی ۹۴ خانم حامله با ویار شدید حاملگی نشان دادند که وزن زمان تولد در این زنان مشابه خانمهای حامله سالم بوده است. نتایج برخی مطالعات مشابه مطالعه ما نبوده است. در مطالعه مرادان [۵] در سمنان میانگین وزن زمان تولد در گروه با ویار شدید حاملگی (24.98 ± 4.28) کمتر از ویار خفیف (31.33 ± 3.87) و گروه کنترل بوده (33.19 ± 3.98) که اختلاف بین گروه ها به لحاظ آماری معنی دار بود. Paauw و همکاران [۳] با بررسی ۴۵ خانم با ویار شدید و 306 خانم حامله سالم و Jeffrey و همکاران [۱] نیز نتایج مشابهی را ارائه نمودند. میانگین و انحراف معیار آپگار نوزادان در دو گروه مبتلا به تهوع و استفراغ حاملگی و گروه کنترل به ترتیب 9.3 ± 0.9 و 9.1 ± 1.1 بود ($P=0.181$). در مطالعهای که توسط Holmgren و همکاران در سال ۲۰۰۸ در آمریکا بر روی ۹۴ خانم حامله با ویار شدید حاملگی انجام شد، دیده شد که آپگار نوزادان مادران چهار استفراغ شدید حاملگی مشابه خانمهای حامله سالم بوده است [۸] که مشابه مطالعه ما بود، ولی Dodds و همکاران در مطالعهای در

بحث نتایج مطالعه حاضر نشان داد که زایمان زودرس در زنان مبتلا به استفراغ شدید حاملگی به طور معنی داری بیشتر از زنان گروه کنترل بود. نتایج بدست آمده از مطالعات مختلف در این زمینه متفاوت بوده است. برای مثال Moradan و همکاران [۵] نشان داده اند که زایمان زودرس در گروه با ویار شدید بهوضوح شایع تر از بیماران با ویار خفیف و گروه کنترل است 4.6 ± 0.7 در صد در مقابل $4/7$ در صد و $4/3$ در صد). این نتیجه مشابه مطالعه Jeffrey و همکاران [۶] در آمریکا بوده است. اما در مطالعه Tsang و همکاران [۷] که روی ۱۹۳ خانم با استفراغ شدید حاملگی انجام شد و مطالعه Hollmgren و همکاران [۸] که روی ۹۴ خانم با استفراغ شدید حاملگی در آمریکا انجام شده است نتایج حاصله، با نتایج مطالعه ما مطابقت نداشت و بین دو گروه بیمار و کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در مطالعه ما بروز سقط در زنان مبتلا به استفراغ شدید حاملگی به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بوده است که اختلاف آن نیز به لحاظ آماری معنی دار بود. این نتیجه مشابه مطالعه Jeffrey و همکاران [۶] است. البته این نتیجه با نتایج مطالعه Moradan [۵] مطابقت ندارد. ممکن است این اختلاف به علت مسائل منطقه ای و نژادی باشد. در مطالعه ما بروز دیابت بارداری و خونریزی در گروه زنان مبتلا به استفراغ شدید حاملگی به طور معنی داری بیشتر از زنان گروه کنترل بود که ضرورت تحت نظر داشتن بیماران مبتلا به استفراغ حاملگی را به وضوح نشان می دهد. البته در مطالعه Dodds و همکاران [۲] تفاوت معنی داری در این زمینه بین دو گروه بیمار و کنترل دیده نشد. در مطالعه ما، بروز پره اکلامپسی در زنان مبتلا به استفراغ شدید حاملگی اختلاف معنی داری با زنان گروه کنترل نداشت. مرادان و همکاران [۵] نتیجه مشابه مطالعه ما

زایمان زودرس، سقط، دیابت، خونریزی طی بارداری و میزان بسترهای نوزادان در بیماران با استفراغ شدید حاملگی شیوع بیشتری دارد. لذا، با کنترل دقیق این بیماران می‌توان عوارض را به موقع تشخیص داده و اقدام مناسب انجام شود. بهتر است مطالعات بعدی با حجم نمونه بیشتر در بیماران با استفراغ شدید حاملگی انجام شود تا ضمن همگن سازی دقیق تر (از نظر عوامل محیطی، عادات غذایی، نژاد، شرایط روحی- روانی و...) بین گروه مورد و شاهد از تاثیر مخدوش کننده‌ها بر نتایج مطالعه کاسته شود.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان مقاله از تلاش همکاران بخش مامائی بیمارستان یحیی نژاد به خصوص سرکار خانم جفتانی در جمع- آوری نمونه‌ها تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

سال ۲۰۰۶ در کانادا نشان دادند که تولد نوزاد با آپگار کمتر از ۷ در کودکان متولد شده از زنان مبتلا به استفراغ شدید حاملگی در مقایسه با زنان باردار سالم به طور معنی‌داری بیشتر است [۲] که بر خلاف مطالعه ما بوده است. در مطالعه ما اگرچه تعداد موارد بسترهای نوزاد در زنان مبتلا به استفراغ شدید حاملگی بیشتر از گروه کنترل بود، ولی میزان مرگ و میر نوزادان در دو گروه تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند؛ همچنین در دو گروه مورد مطالعه مرگ داخلی رحمی وجود نداشت. در مطالعه مرادان در هیچ یک از بیماران مرده زایی رخ نداد که این نتایج مشابه مطالعه Peng در مالزی [۹] بوده ولی Jeffrey [۶] در آمریکا عنوان نمود که بروز مرده زایی در زنان با ویار شدید حاملگی شایع‌تر است که شاید با افزایش تعداد بیماران مورد مطالعه نتایج متفاوتی حاصل شود.

نتیجه گیری

با توجه به یافته‌های حاصل از این مطالعه عوارضی چون

References:

- [1] Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III LC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics 22th ed. 2005. 1113.
- [2] Dodds L, Fell DB, Joseph KS, Allen VM, Butler B. Outcomes of pregnancies complicated by hyperemesis gravidarum. *Obstet Gynecol* 2006; 107(2 Pt 1): 285-92.
- [3] Paauw JD, Bierling S, Cook CR, Davis AT. Hyperemesis gravidarum and fetal outcome. *JPEN J Parenter Enteral Nutr* 2005; 29(2): 93-6.
- [4] Chin RK. Nausea and vomiting of early pregnancy and pregnancy outcome. An epidemiological study. *Br J Obstet Gynaecol* 1990; 97(3): 278.
- [5] Moradan S, Ghorbani R, Mosibie R. The incidence of fetal and maternal outcomes in patients with hyperemesis gravidarum [MD thesis]. semnan university of medical sciences 2009. [in Persian]
- [6] Jeffrey T. Hyperemesis gravidarum. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2005; 63(2): 135-8
- [7] Tsang IS, Katz VL, Wells SD. Maternal and fetal outcomes in hyperemesis gravidarum. *Int J Obstet Gynecol* 1996; 55(3): 231-5.
- [8] Holmgren C, Aagaard-Tillery KM, Silver RM, Porter TF, Varner M. Hyperemesis in pregnancy: an evaluation of treatment strategies with maternal and neonatal outcomes. *Am J Obstet Gynecol* 2008; 198(1): 56.e1-4.
- [9] Tan PC, Jacob R, Quek KF, Omar SZ. Pregnancy outcome in hyperemesis gravidarum and the effect of laboratory clinical indicators of hyperemesis severity. *J Obstet Gynaecol Res* 2007; 33(4): 457-64.