

بررسی خصوصیات مولکولی و تیپ بندی کمپاکس کاست کروموزومی ژن SCCmec در سویه‌های استافیلولکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از نمونه‌های بالینی

بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال ۱۳۸۸

الهام زینلی^۱، رضوان منیری^۲، محمود صفاری^۳، سید غلامعباس موسوی^۴

خلاصه

سابقه و هدف: استافیلولکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus*; MRSA) مهمترین عامل ایجاد عفونت بیمارستانی است. هدف از این مطالعه تعیین خصوصیات مولکولی ایزوله‌های استافیلولکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی و شناسایی ژن *mec* و همچنین تیپ بندی SCCmec در بیماران بیمارستان شهید بهشتی کاشان می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی روی ۱۵۰ نمونه استافیلولکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال ۱۳۸۸ انجام پذیرفت. سویه‌ها با تست‌های بیوشیمیابی نظیر رنگ آمیزی گرم، کاتالاز، کواگلاز، تست DNase و تخمیر قند مانیتول تایید گردید. ژنوتیپ SCCmec با روش multiplex PCR تعیین شد و نتایج با استفاده از آزمون مجدور کاری و آزمون دقیق فیشر تحلیل گردید.

نتایج: ۸۷ مورد از ۱۵۰ سویه (۵۸ درصد) استافیلولکوس اورئوس حامل ژن *mecA* بود. ۳۴ سویه از ۸۷ سویه مقاوم به متی‌سیلین (۳۹/۱ درصد) از بیمارستان و ۵۳ سویه (۶۰/۹ درصد) از جامعه بود. ۳ سویه از ۸۷ نمونه (۳/۴ درصد) دارای ژن *SCCmec typeI* بود. ۱۲ سویه (۱۳/۸ درصد) از *SCCmec typeIVd* (۴ درصد)، *SCCmec typeIVb* (۹/۲ درصد)، *SCCmec typeII* (۸ درصد) و ۳ سویه (۳/۴ درصد) *SCCmec typeV* بودند.

نتیجه گیری: بیش از نیمی از سویه‌های استافیلولکوس اورئوس دارای ژن *mecA* بوده و افزون بر ۶۰ درصد آن‌ها از جامعه (CA-MRSA) جدا شده بودند. هم‌چنان، *SCCmec typeII* فراوان‌ترین ژنوتیپ جدا شده از نمونه‌ها بود.

واژگان کلیدی: استافیلولکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین MRSA، تایپینگ باکتریابی، تایپینگ مولکولی

— فصلنامه علمی — پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹، صفحات ۴۴۶-۴۳۹

مقدمه

گوناگونی از قبیل لینزولید، داپتومایسین، تراسایکلین، فلوروروكینولون‌ها در درمان عفونت‌های ناشی از استافیلولکوس اورئوس به کار می‌روند اما به دلیل توانایی بالای باکتری در خشی سازی آن‌ها، این عوامل ضد میکروبی خیلی زود در برابر باکتری بی اثر می‌شوند [۱]. مکانیزم مقاومت در برابر متی‌سیلین به خوبی در سویه‌های استافیلولکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) مورد مطالعه قرار گرفته است [۲]. به عنوان یک عامل مهم در ایجاد عفونت‌های مرتبط با جامعه (Community Associated-MRSA) مطرح می‌باشد [۳]. Health Care Associated-MRSA به عفونت‌هایی که ۴۸ ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان کسب شوند اطلاق می‌شود. CA-MRSA، عفونت ناشی از MRSA بوده که ارگانیسم ظرف ۴۸ ساعت اولیه پذیرش در بیمارستان از بیماران جدا شده باشد [۴]. عفونت‌های CA-MRSA بر حسب تماس قبلی بیمار باشد [۵]. فاکتورهای خطر شامل مصرف آنتی-بیوتیک در طول ۳ ماه گذشته، سابقه بستری شدن در بیمارستان ظرف یک سال گذشته، اقامت در خانه سالمدان در طول سال

استافیلولکوس اورئوس مهم‌ترین عامل ایجاد کننده عفونت‌های بیمارستانی است [۱]. این باکتری توانایی زیادی در ایجاد تطابق با محیط‌های گوناگون را دارد [۱] و به عنوان عامل مهم عفونت بیمارستانی در جهان مطرح است [۲]. عوامل ضد باکتریابی گوناگونی از قبیل لینزولید، داپتومایسین، تراسایکلین، فلوروروكینولون‌ها در درمان عفونت‌های ناشی از عوامل ضد باکتریابی

^۱ دانشجوی کارشناس ارشد، گروه میکروب شناسی و اینمولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

^۲ استاد، گروه میکروب شناسی و اینمولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

^۳ دانشیار، گروه میکروب شناسی و اینمولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

^۴ مرتبی، گروه بهداشت عمومی و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

* **لشکان نویسنده مسئول:** کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی، گروه میکروب شناسی و اینمولوژی

تلفن: ۰۳۶۱ ۵۵۵۰۰۰۲۱ - ۰۳۶۱ ۵۵۵۱۱۱۲

پست الکترونیک: moniri@kaums.ac.ir

تاریخ پذیرش نهایی: ۸۹/۸/۱۲

تاریخ دریافت: ۸۹/۴/۲۴

مواد و روش ها


این مطالعه توصیفی بر روی ۶۰۰ نمونه مشکوک به استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی گوناگون از بیمارستان شهید بهشتی کاشان در فاصله زمانی آبان ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۸۸ انجام پذیرفت. نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان منتقل شده و با استفاده از تست های بیوشیمیابی نظری رنگ آمیزی گرم، کاتالاز، کواگولاز، تخمیر مانیتول، و تست DNase تعیین هویت گردید [۲۱]. ۱۵۰ سویه ای استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه ها جدا گشت. مقاومت به متی سیلین با استفاده از دیسک اگراسیلین یک میکروگرمی تهیه شده از شرکت Mast انگلستان و مطابق با معیار (CLSI) تعیین گردید. سویه استافیلوکوکوس ATCC 33591 به عنوان کنترل مثبت و سویه اورئوس 25923 به عنوان کنترل منفی برای ژن *mecA* استفاده شد. استخراج DNA به روش boiling انجام پذیرفت [۲۲]. استخراج شده در آب مقطر دی یونیزه و در فریزر -۲۰ درجه سلسیوس ذخیره گردید. شناسایی ژن *mecA* و ساب تیپ های آن به روش PCR انجام پذیرفت. بدین منظور، ۵ میکرولیتر از DNA استخراج شده با ۲۰ میکرولیتر از مستر میکس Taq DNA PCR مخلوط گردید. مستر میکس شامل آنزیم PCR dNTPs بود. در این بررسی از ۹ جفت پرایمر استفاده گردید. ژن های مورد ارزیابی، سکانس های پرایمر، اندازه محصولات PCR و شرایط PCR در جدول شماره ۱ ارائه شده است. برنامه PCR شامل دناتوراسیون اولیه در ۹۴ درجه سلسیوس به مدت ۱۵ دقیقه و سپس ۱۰ سیکل شامل دناتوراسیون در ۹۰ درجه به مدت ۹۰ ثانیه، ۳۰ ثانیه، انیلینگ در ۶۰ درجه سلسیوس به مدت ۹۰ ثانیه، طویل شدن زنجیره در ۷۲ درجه به مدت ۹۰ ثانیه و سپس ۲۵ سیکل شامل دناتوراسیون در ۹۴ درجه به مدت ۴۵ ثانیه، انیلینگ در ۵۰ درجه سلسیوس به مدت ۴۵ ثانیه و مرحله طویل شدن نهایی در ۷۲ درجه سلسیوس به مدت ۱۰ دقیقه انجام پذیرفت. الکتروفورز محصولات PCR در ژل ۱/۴ درصد اگاروز به مدت ۷۵ دقیقه در ۹۰ ولت صورت گرفت. رنگ آمیزی ژل با استفاده از اتیدیوم بروماید انجام شده و نتایج توسط دستگاه Transluminator مشاهده شد. همچنین از مارکر ۱۰۰ bp تایید وزن مولکولی محصولات PCR استفاده گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و با به کارگیری آزمون های مجذور کای و دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

گذشته، ابتلا به بیماری های مزمن شامل بدخیمی، نارساپی مزمن کلیوی و دیابت، اعتیاد تزریقی و تماس نزدیک با فردی که احتمال کلونیزاسیون پوستی یا حلقی MRSA در وی زیاد است [۶-۸]. در بیشتر موارد بیماران مبتلا به CA-MRSA حداقل یک فاکتور خطر جهت اکتساب مقاومت به متی سیلین را دارا بوده، ولیکن در برخی از موارد بیماران مبتلا به CA-MRSA هیچ فاکتور خطر شناخته شده ای نداشته اند، این موارد در طول یک دهه اخیر رو به افزایش بوده است [۶]. درمان MRSA از اوایل سال ۱۹۵۹ با پنی- سیلین های نیمه سنتیک از قبیل متی سیلین آغاز شد [۴]. یک سال بعد از به کارگیری متی سیلین مقاومت نسبت به آن افزایش یافت [۴]. در اوایل دهه ۱۹۸۰ سویه های MRSA به عنوان یک عامل جدی و مهم در ایجاد عفونت های بیمارستانی شناخته شد [۹]. انتقال سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در ارتباط با عفونت های بیمارستانی به داخل جامعه نیز اجتناب ناپذیر بوده است [۱۰]. از سال ۱۹۸۷ به بعد ایزو لوه های MRSA نامیده شده است [۱۱]. گسترش سویه های CA-MRSA به دلیل کاهش تمایل باکتری برای اتصال به ناحیه متصل شونده (PBP-2a) به پنی سیلین و سایر بتالاکتام ها می باشد [۱۲]. ژن *mecA* که کد کننده پروتئین تغییر یافته PBP-2a است در طی درمان با متی سیلین غیرفعال نمی گردد [۱۳]. جایگاه ژن *mecA* در ناحیه ژنومیک باکتری به نام کاست کروموزومی استافیلوکوکی SCCmec می باشد [۱۴]. سویه های CA-MRSA در مقایسه با سویه های HA-MRSA به علت ایجاد توکسین لکوسیدین پانتین والتین بیماری زاتر بوده و قابلیت بیشتری در ایجاد بیماری های جدی و شدید دارد [۱۶، ۱۵]. ژن *mecA* قطعه ای به اندازه ۲/۱ کیلو باز است که در ناحیه متحرک ژنومیک به نام SCCmec قرار دارد. در حال حاضر هفت تیپ اصلی SCCmec (تیپ I تا VII) شناسایی شده است [۱۴] که دارای اندازه های متفاوتی بین ۲۰/۹ تا ۶۶/۹ کیلو باز می باشند. V SCCmec تیپ I (۳۴/۳ کیلو باز)، IV (۲۰/۹ کیلو باز)، VI (۲۰/۹ کیلو باز)، VII (۳۵/۹ کیلو باز) فقط به بنا لاکتام ها مقاومند، در صورتی که SCCmec تیپ II (۵۳ کیلو باز) و تیپ III (۶۶/۹ کیلو باز) مقاومت به چندین کلاس آنتی- بیوتیکی را نشان می دهند [۱۷-۱۴، ۲۰]. با توجه به اهمیت سویه های MRSA در جامعه و بیمارستان و عدم آگاهی نسبت به شیوع آن و به منظور تعیین خصوصیات مولکولی ایزو لوه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی و شناسایی ژن *mec* و هم چنین تیپ بندی SCCmec در بیماران بیمارستان شهید بهشتی کاشان این مطالعه انجام پذیرفت.

داشتند. ۱۳۶ نمونه (۹۰/۶ درصد) ادرار، ۵ نمونه (۳/۳ درصد) خون، ۳ نمونه (۲ درصد) آبse، ۲ نمونه (۱/۳ درصد) زخم، ۱ نمونه (۰/۷ درصد) تراشه، ۱ نمونه (۰/۷ درصد) گوش، ۱ نمونه (۰/۷ درصد) CSF و ۱ نمونه (۰/۷ درصد) خلط بود. ۸۷ سویه (۵۸ درصد) دارای ژن *mecA* بودند (شکل شماره ۱). ۵۳ سویه از ۸۷ مورد (۶۰/۹ درصد) CA-MRSA بوده و ۳۴ سویه (۳۹/۱) درصد) HA-MRSA بود. در جدول شماره ۲ فراوانی ساب تیپ‌های SCC*mec* بیان شده است. شایع‌ترین ساب تیپ‌های جدا شده تیپ II (۱۳/۸ درصد) بود. توزیع فراوانی سویه‌های مقاوم به متی سیلین جامعه و بیمارستانی بر حسب تیپ‌های گوناگون SCC*mec* در جدول شماره ۳ بیان شده است.

نتایج

تعداد ۱۵۰ سویه‌ی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه‌های بالینی بیماران بیمارستان شهید بهشتی جدا گردید. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۳۴±۱۹/۶۹ سال و از حداقل ۱ تا حداً کثر ۸۳ سال متغیر بود. ۷۷ سویه از نمونه‌های مردان (۵۱/۳ درصد) و ۷۳ سویه (۴۸/۷ درصد) از نمونه‌های زنان جدا شده بود. ۱۳۷ نفر از بیماران (۹۱/۳ درصد) کمتر از یک هفته در بیمارستان بستری بوده و ۱۳ نفر (۸/۷ درصد) بیشتر از یک هفته در بیمارستان بستری بودند. ۳۷ نفر از بیماران (۲۴/۷ درصد) سابقه مصرف آنتی بیوتیک



تصویر شماره ۱- الگوی آمپلیفیکاسیون به دست آمده از تایپینگ SCC*mec* با استفاده از multiplex PCR در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه‌های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال ۱۳۸۸

جداسازی شد. در شروع دهه ۱۹۹۰ چندین سویه MRSA که حاوی تیپ ۴ بودند گسترش یافتند. در سال ۲۰۰۴ در استرالیا MRSA با تیپ ۵ مشاهده گردید. سویه MRSA تیپ ۶ فقط در پرتغال مشاهده شده و به نام سویه HDE288 نامگذاری شد. تیپ ۷ اولین بار در کشور تایوان مشاهده گردیده و به نام سویه TSGH-17 نامیده شد [۱۴، ۱۷، ۲۰، ۲۴، ۲۵]. در این مطالعه بیش از ۶۰ درصد سویه‌های MRSA از بیماران جامعه جدا شده بودند. در طول دهه گذشته CA-MRSA به طور جهانی ظهور یافته است و نه تنها فقط در جوامع انسانی بلکه در مراکز درمانی رو به ازدیاد است [۲۶، ۲۷]. اولین گزارش از CA-MRSA در سال ۱۹۹۳ از استرالیای غربی بود [۲۸].

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از سویه‌های مورد مطالعه دارای ژن *mec* بودند. از مجموع ۸۷ سویه ۵۳ سویه (۶۰/۹ درصد) CA-MRSA بودند. ۱۳/۷ درصد تیپ II و منشا CA-MRSA و ۱۳/۶ درصد تیپ IV و منشا HA-MRSA بودند. اولین سویه MRSA به نام NCTC10442 که در سال ۱۹۶۰ از انگلستان جداسازی شده، تیپ ۱ بود. در حال حاضر این سویه به نام کلون Archaic معروف است. در سال ۱۹۸۲ سویه (N315) از ژاپن جدا شد که حاوی تیپ ۲ بود. این کلون به نام کلون نیویورک/ژاپن نامگذاری گردید. در سال ۱۹۸۵ سویه (85/2082) که حاوی تیپ ۳ است از ژلاندو

جدول شماره ۱- ژن های مورد ارزیابی، سکانس های پرایمر، اندازه محصولات PCR و منبع مورد استفاده در مطالعه حاضر

Primers	Oligonucleotide sequence (5'- 3')	Amplicon Size	specificity	source
Type I-F Type I-R	5'- GCTTTAAAGAGTGTGTTACAGG -3' 3'- GTTCTCTCATAGTATGACGTCC-5'	۶۱۳	SCCmec I	[۲۳]
Type II-F Type II-R	5'-CGTTGAAGATGATGAAGCG-3' 3'-CGAAATCAATGGTTAATGGACC-5'	۳۹۸	SCCmec II	[۲۳]
Type III-F Type III-R	5'-CCATATTGTACGATGCC-3' 3'-CCTTATTGTCGTAACAGATCG-5'	۲۸۰	SCCmec III	[۲۳]
Type IV a -F Type IV a R	5'-GCCTTATTCAAGAACCG-3' 3'-CTACTCTCTGAAAAGCGTCG-5'	۷۷۶	SCCmec IV a	[۲۳]
Type IV b-F Type IV b-R	5'-TCTGGAATTACTTCAGCTGC-3' 3'-AAACAATATTGCTCTCCCT-5'	۴۹۳	SCCmec IV b	[۲۳]
Type IV c-F Type IV c-R	5'-ACAATATTGTATTATCGGAGAGC-3' 3'-TTGGTATGAGGTATTGCTGG-5'	۴۰۰	SCCmec IVc	[۲۳]
Type IV d-F5 Type IV d-R6	5'-CTCAAATACGGACCCAATACA-3' 3'-TGCTCCAGTAATTGCTAAAG-5'	۸۸۱	SCCmec I V d	[۲۳]
Type V-F Type V-R	5'-GAACATTGTTACTTAAATGAGCG-3' 3'-TGAAAGTTGTACCCCTGACACC-5'	۳۲۵	SCCmec V	[۲۳]
MecA147-F MecA147-R	5'-GTGAAGATATACCAAGTGATT-3' 3'-ATGCGCTATAGATTGAAAGGAT-5'	۱۴۷	mecA	[۲۳]

جدول شماره ۲- تیپ های گوناگون SCCmec در ۸۷ سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی بر حسب

منشا و اندازه آنها

اندازه (bp)	CA- MRSA و HA-MRSA	فرآوانی (/) (۱۰۰ / ۸۷)	SCCmec
۶۱۳	HA-MRSA	(۳/۴) ۳	SCCmecI
۳۹۸	HA-MRSA	(۱۲/۸) ۱۲	SCCmec II
۴۹۳	CA-MRSA	(۹/۲) ۸	SCCmec IV b
۸۸۱	CA-MRSA	(۴/۶) ۴	SCCmec I V d
۳۲۵	CA-MRSA	(۴/۴) ۳	SCCmec V
۳۲۵+۴۹۳	CA-MRSA	(۴/۶) ۴	مولتی باند SCCmec V و SCCmec IVb
۳۲۵+۸۸۱	CA-MRSA	(۱/۲) ۱	مولتی باند SCCmec V و SCCmec IVd
۸۸۱+۴۹۳	CA-MRSA	(۱/۲) ۱	مولتی باند SCCmec IVd و SCCmec IVb
CA- MRSA و HA-MRSA	(۵۸/۶) ۵۱	غير قابل تأیینی	

جدول شماره ۳- فراوانی ساب تایپ های SCCmec در ۸۷ سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین بر حسب منشا جداسازی آنها

P	(۳۴) HA-MRSA		(۵۳) CA-MRSA		ساب تایپ
	فراوانی (%)	فراوانی (%)	فراوانی (%)	فراوانی (%)	
۰/۰۵۶	(۸/۸) ۳		(۰)		دارد
	(۹۱/۲) ۳۱		(۱۰۰) ۵۳		ندارد
<۰/۰۰۱	(۳۲/۴) ۱۱		(۱/۹) ۱		دارد
	(۶۷/۶) ۲۳		(۹۸/۱) ۵۲		ندارد
۰/۴۷	(۵/۹) ۲		(۱۱/۳) ۶		دارد
	(۹۴/۱) ۳۲		(۸۸/۷) ۴۷		ندارد
#1	(۲/۹) ۱		(۵/۷) ۳		دارد
	(۹۷/۱) ۳۳		(۹۴/۳) ۵۰		ندارد
۰/۲۷	(۰)		(۵/۷) ۳		دارد
	(۱۰۰) ۳۴		(۹۶/۳) ۵۰		ندارد
۰/۳۷	(۸/۸) ۳		(۳/۸) ۲		مولتی باند
	(۹۱/۲) ۳۱		(۹۶/۲) ۵۱		دارد
					ندارد

MRSA در بیمارستان‌های سراسر دنیا در فواصل سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ در ژاپن ۶۷ درصد، ۴۰ درصد در آمریکای جنوبی، ۳۵ درصد در آمریکای لاتین، ۳۲ درصد در آمریکا، ۲۶ درصد در اروپا و ۲۳ درصد در استرالیا گزارش شده است [۴۳،۴۲]. این در حالی است که شیوع MRSA در کشورهای داخل اروپا متغیر بوده و دامنه‌ی آن از یک درصد در کشورهای شمالی تا ۴۵ درصد در کشورهای جنوبی متغیر است [۴۴]. شایع‌ترین ساب تایپ مشاهده شده در مطالعه‌ ما تایپ II بود. در کشور اسلوونی از مجموع ۳۱ سویه ۱۶ سویه (۵۱/۶ درصد) SCCmec type IV، ۷ سویه (۲۲/۵ درصد) SCCmec type I و ۶ سویه (۱۹/۴ درصد) SCCmec type III غیرقابل تایپ بندی بودند [۴۵]. در کشور مالزی از ۶۶ سویه MRSA تنها دو تایپ مشاهده شد. ۵۲ سویه (۷۸/۸ درصد) SCCmec type III و ۱۲ سویه (۱۸/۱۸ درصد) SCCmec type II بود [۴۵]. ساب تایپ III و IVc در مطالعه‌ ما مشاهده نگردید. در این مطالعه از ۸۷ سویه ۵۱ MRSA مورد (۵۸/۶ درصد) غیرقابل تایپ بندی بودند.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان ژن mec در جمعیت

این سویه‌ها از بیماران و افرادی که دارای عفونت پوستی بوده گزارش شده است، این افراد فاقد هرگونه فاکتور خطر دال بر داشتن عفونت CA-MRSA بودند [۲۹-۳۱]. ۲۹-۳۱ CA-MRSA مسئول افزایش شیوع MRSA در کشورهای نظیر دانمارک، نروژ و هلند بوده که به طور ذاتی فاقد عفونت HA-MRSA می‌باشند. کلون CA-MRSA قابل مشاهده در این کشورها از نوع سویه USA300 است [۳۰-۳۲]. در سال‌های اخیر به خصوص در آمریکا و تایوان CA-MRSA جایگزین HA-MRSA در مراکز درمانی شده است [۳۳-۳۴،۳۸]. در ایران در شهر تهران در مطالعه‌ای که در بیمارستان امیراعلم انجام شد، از مجموع ۴۱ سویه ۱۷ HA-MRSA جدا شده، ۲۴ سویه (۵۸/۵ درصد) CA-MRSA بودند [۳۹]. در مطالعه‌ای دیگر که در شهر قزوین انجام شد شیوع ۰/۵ MRSA درصد گزارش شد [۴۰]. در مطالعه‌ ما ۳۹ درصد از MRSA مربوط به HA-MRSA بود. اولین ایزوله HA-MRSA در سال ۱۹۶۱ در انگلستان دیده شد که این امر دقیقاً ۲ سال بعد از به کارگیری متی-سیلین در مراکز درمانی بود [۲۹]. در سال‌های بعد سویه‌های MRSA به دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت و در دهه ۱۹۷۰-۱۹۸۰ گسترش جهانی پیدا کرد و عامل اکثریت عفونت‌های بیمارستانی در استرالیا، ژاپن، آمریکا گردید [۴۱]. شیوع

تشکر و قدردانی

نتایج این مطالعه حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی می باشد. از آقای مهدی روحانی جهت کمک در انجام تست های مولکولی و از آقای محمد پور بابائی جهت همکاری در تهیه محیط های کشت صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد.

مورد مطالعه بالا بوده و بیشتر سویه های MRSA جدا شده منشا آن جامعه بوده است. SCCmec typeIV و SCCmec type II در نمونه های مورد بررسی ما مورد توجه بوده است و از آن جایی که تایپ II منشا بیمارستانی و تایپ IV منشا آن جامعه بوده لزوم کنترل معیارهای کنترل عفونت بیمارستانی به منظور جلوگیری از آلودگی های مقاطع احساس می گردد.

References:

- [1] Lowy FD. *Staphylococcus aureus* infections. *N Engl J Med* 1998; 339(8): 520-32.
- [2] National Nosocomial Infections Surveillance System (NNISS) National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System Report, data summary from January 1992 through June 2004. *Am J Infect Control* 2004; 32(2): 470-85.
- [3] Lowy FD. Antimicrobial resistance: the example of *Staphylococcus aureus*. *J Clin Invest* 2003; 111(9): 1265-73.
- [4] Jevons MP. 'Calbenin'-resistant Staphylococci. *Br Med J* 1961; 1(5219): 124-5.
- [5] Pate KR, Nolan RL, Bannerman TL, Feldman S. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in the community. *Lancet* 1995; 346(8968): 132-3.
- [6] Herold BC, Immergluck LC, Maranan MC, Lauderdale DS, Gaskin RE, Boyle- Vavra S, et al. methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in Community-acquired children with no identified predisposing risk. *JAMA* 1998; 279(8): 593-8.
- [7] Salgado CD, Farr BM, Calfee DP. Community-acquired methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: a meta analysis of prevalence and risk factors. *Clin Infect Dis* 2003; 36(2): 131-9.
- [8] Gorak EJ, Yamada SM, Brown JD. Community-acquired methicillin resistant *Staphylococcus aureus* in hospitalized adults and children without known risk factors. *Clin Infect Dis* 1999; 29(4): 797-800.
- [9] Rubins RJ, Harrington CA & Poon A. The economic impact of *Staphylococcus aureus* infection in New York City hospitals. *Emerg Infect Dis* 1999; 5(1): 9-17.
- [10] Kluytmans-Vandenbergh MF, Kluytmans JA. Community-acquired methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: current perspectives. *Clin Microbiol Infect* 2006; 12(Suppl 1): 9-15.
- [11] Moreno F, Crisp C, Jorgensen JH. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* as a community organism. *Clin Infect Dis* 1995; 21(5): 1308-12.
- [12] Hartman A, Tomasz B. Altered penicillin-binding proteins in methicillin-resistant strains of *Staphylococcus aureus*. *Antimicrob Ag Ch* 1981; 19(5): 726-35.
- [13] De LenCastre H, De Jonge BL, Matthews PR. Molecular aspects of methicillin-resistance in *Staphylococcus aureus*. *J Antimicrob Chemoth* 1994; 33(1): 7-24.
- [14] Ito T, Katayama Y & Asanda K .Structural comparison of three types of staphylococcal cassette chromosome *mec* integrated in the chromosome in methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. *Antimicrob Agents Ch* 2001; 45(12): 1323-6.
- [15] Baba T. Genomic and virulence determinants of high virulence community-acquired MRSA. *Lancet* 2002; 359(9320): 1819-27.
- [16] Dufour P, Gillet Y, Bes M. Community-acquired methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* infections in France: emergence of a single clone that produces Panton-Valentine leukocidin. *Clin Infect Dis* 2002; 35(7): 819-24.
- [17] Ito T, Okuma K, Ma XX, Yuzawa H, Hiramatsu K. Insights on antibiotic resistance of *Staphylococcus aureus* from its whole genome: genomic island SCC. *Drug Resist Updat* 2003; 6(1): 41-52.
- [18] Leclercq R. Mechanisms of resistance to macrolides and lincosamides: nature of the resistance elements and their clinical implications. *Clin Infect Dis* 2002; 34(4): 482-92.
- [19] Oliveira DC, Milheirico C, de Lencastre H. Redefining a structural variant of staphylococcal cassette chromosome *mec*, SCCmec type VI. *Antimicrob. Agents Chemother* 2006a; 50(10): 3457-9.
- [20] Takano T, Higuchi W, Otsuka T, Baranovich T, Enany S, Saito K, et al. Novel characteristics of community-acquired methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* belonging to multilocus sequence type 59 in Taiwan. *Antimicrob Agents Chemother* 2008; 52(3): 837-45.
- [21] Connie R, Mahon-Donald C. Leman. Text Book of Diagnostic Microbiology. 3th ed. Saunders, an imprint of Elsevier Inc; 2007. p 369-72.
- [22] Thong KL, Junnie J, Liew FY, Yusof MY, Hanifah YA. Antibiograms and molecular subtypes of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in local teaching hospital, Malaysia. *J Microbiol Biotechnol* 2009; 19(10): 1265-70.
- [23] Makgotlho PE, Kock MM, Hoosen A, Lekalakala R, Omar S, Dove M, et al. Molecular identification and genotyping of MRSA isolates. *FEMS Immunol Med Microbiol* 2009; 57(2): 104-15
- [24] Vandenesch F, Naimi T, Enright MC, Lina G, Nimmo GR, Heffernan H, et al. Community-acquired methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*

- carrying Panton-Valentine leukocidin genes: worldwide emergence. *Emerg Infect Dis* 2003; 9(8): 978–84.
- [25] van Duijkeren E, Wolfhagen MJ, Box AT, Heck ME, Wannet WJ, Fluit AC. Human-to-dog transmission of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. *Emerg Infect Dis* 2004; 10(12): 2235–7.
- [26] Chambers HF. The changing epidemiology of *Staphylococcus aureus*? *Emerg Infect Dis* 2001; 7(2): 178–82.
- [27] Etienne J. Panton-Valentine leukocidin: a marker of severity for *Staphylococcus aureus* infection? *Clin Infect Dis* 2005; 41(5): 591–3.
- [28] Udo EE, Pearman JW, Grubb WB. Genetic analysis of community isolates of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in western Australia. *J Hosp Infect* 1993; 25(2): 97–108.
- [28] Salgado CD, Farr BM, Calfee DP. Community acquired methicillin resistant *Staphylococcus aureus*: a meta-analysis of prevalence and risk factors. *Clin Infect Dis* 2003; 36(2): 131–9.
- [29] Larsen AR, Bocher S, Stegger M, Goering R, Pallesen LV, Skov R. Epidemiology of European community associated methicillin resistant *Staphylococcus aureus* clonal complex 80 type IV strains isolated in Denmark from 1993 to 2004. *J Clin Microbiol* 2008; 46(1): 62–8.
- [30] Bartels MD, Boye K, Rhod Larsen A, Skov RHW. Rapid increase of genetically diverse methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*, Copenhagen, Denmark. *Emerg Infect Dis* 2007; 13(10): 1533–40.
- [31] Stam-Bolink EM, Mithoe D, Baas WH, Arends JP, Moller AV. Spread of a methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* ST80 strain in the community of the northern Netherlands. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2007; 26(10): 723–7.
- [32] Fang H, Hedin G, Li G, Nord CE. Genetic diversity of community-associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in southern Stockholm, 2000–2005. *Clin Microbiol Infect* 2008; 14(4): 370–6.
- [32] Fang H, Hedin G, Li G, Nord CE. Genetic diversity of community-associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in southern Stockholm, 2000–2005. *Clin Microbiol Infect* 2008; 14(4): 370–6.
- [33] Klevens RM, Morrison MA, Fridkin SK, Reingold A, Petit S, Gershman K, et al. Community-associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* and healthcare risk factors. *Emerg Infect Dis* 2006; 12(12): 1991–3.
- [34] Moran GJ, Krishnadasan A, Gorwitz RJ, Fosheim GE, McDougal LK, Carey RB, et al. Methicillin-resistant *S. aureus* infections among patients in the emergency department. *N Engl J Med* 2006; 355(7): 666–74.
- [35] Otter JA, French GL. Nosocomial transmission of community-associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: an emerging threat. *Lancet Infect Dis* 2006; 6(12): 753–5.
- [36] Seybold U, Kourbatova EV, Johnson JG, Halvosa SJ, Wang YF, King MD, et al. Emergence of community-associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* USA300 genotype as a major cause of health care-associated blood stream infections. *Clin Infect Dis* 2006; 42(5): 647–56.
- [37] Huang YH, Tseng SP, Hu JM, Tsai JC, Hsueh PR, Teng LJ. Clonal spread of SCCmec type IV methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* between community and hospital. *Clin Microbiol Infect* 2007b; 13(7): 717–24.
- [38] Maree CL, Daum RS, Boyle-Vavra S, Matayoshi K, Miller LG. Community- associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* isolates causing healthcare-associated infections. *Emerg Infect Dis* 2007; 13(2): 236–42.
- [39] Hassibi M, Mohajer Iravani B, Seifi M, Jafari S, Hadi zade M, Saadat P. Prevalence of methicillin resistant *Staphylococcus aureus*. *Iranian Journal of Medical Microbiology* 2007; 1(1): 71–2. [in persian]
- [40] Sharifi M, Karim zade T, Mohammadi F, Bijani B, Ali pour M. Community – acquired methicillin – resistant *Staphylococcus aureus*: prevalence and risk factors. *The Journal of Qazvin University of Medical Sciences & Health Services* 2009; 4(12): 75–82. [in persian]
- [41] Grundmann H, Aires-de-Sousa M, Boyce J, Tiemersma E. Emergence and resurgence of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* as a public-health threat. *Lancet* 2006; 368(9538): 874–85.
- [42] Diekema DJ, Pfaller MA, Schmitz FJ, Smayevsky J, Bell J, Jones RN, et al. Survey of infections due to *Staphylococcus* species: frequency of occurrence and antimicrobial susceptibility of isolates collected in the United States, Canada, Latin America, Europe, and the Western Pacific region for the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program, 1997–1999. *Clin Infect Dis* 2001; 32 (Suppl 2): S114–132.
- [43] Bell, J.M., Turnidge, J.D. High prevalence of oxacillin-resistant *Staphylococcus aureus* isolates from hospitalized patients in Asia-Pacific and South Africa: results from SENTRY antimicrobial surveillance program, 1998–1999. *Antimicrob Agents Chemother* 2002; 46(3): 879–81.
- [44] Tiemersma EW, Bronzwaer SL, Lyytikainen O, Degener JE, Schrijnemakers P, Bruinsma N, et al. Methicillinresistant *Staphylococcus aureus* in Europe, 1999–2002. *Emerg Infect Dis* 2004; 10(9): 1627–34.
- [45] Thong KL, Junnie J, Liew FY, Yusof MY, Hanifah YA. Antibiotograms and molecular subtypes of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in local teaching hospital, Malaysia. *J Microbiol Biotechnol* 2009; 19 (10): 1265–70.