

# رابطه میزان چاقی با فعالیت بدنی و وضعیت اقتصادی اجتماعی در دانش آموزان دختر منطقه شمال شهر تهران

محمد علی آذربایجانی<sup>\*</sup>، فرشاد تجارتی<sup>۲</sup>، معصومه حبیبی نژاد<sup>۳</sup>

## خلاصه

**سابقه و هدف:** چاقی پدیده‌ای چند بعدی بوده و بدغیر از عوامل بیولوژیک، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز می‌توانند در بروز آن موثر باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین میزان چاقی با فعالیت بدنی و وضعیت اقتصادی اجتماعی در کودکان منطقه شمال شهر تهران طراحی و اجرا گردید.

**مواد و روش‌ها:** برای انجام این مطالعه توصیفی تعداد ۴۸۸ دانش آموز ۷ تا ۱۱ ساله از مدارس ابتدایی منطقه شمیرانات شهر تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. قد، وزن، و دور کمر و باسن آنها با روش‌های استاندارد اندازه گیری شده و صدک BMI بر اساس مرتع CDC ۲۰۰۰ محاسبه شد. برای هر نفر یک پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و میزان فعالیت بدنی (پرسشنامه باربوسا) دانش آموزان تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تعییه و تحلیل قرار گرفتند.

**نتایج:** در این مطالعه رابطه معکوس بین میزان فعالیت بدنی و شاخص توده بدن مشاهده شد ( $P=0.025$ ). همچنین، بین وضعیت اقتصادی اجتماعی و صدک شاخص توده بدن ارتباط معناداری وجود یافت آمده ( $P=0.013$ ) و بین وضعیت اقتصادی اجتماعی و میزان فعالیت بدنی نیز ارتباط معناداری وجود داشت ( $P=0.01$ ).

**نتیجه گیری:** مطالعه حاضر نشان داد که انجام فعالیت‌های بدنی روزانه می‌تواند از عوامل جلوگیری کننده از شیوع چاقی در کودکان باشد. میزان شیوع چاقی تحت تأثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی قرار داشته و بر اساس نتایج این مطالعه به ضرورت انجام فعالیت‌های بدنی روزانه و ورزش توصیه می‌شود.

**واژگان کلیدی:** کودکان دبستانی، چاقی، فعالیت بدنی، وضعیت اجتماعی اقتصادی

فصلنامه علمی - پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰، صفحات ۱۳۲-۱۳۸

## مقدمه

تحقیقان به طور قطعی، چاقی را در ارتباط تنگاتنگ با متغیرهای سبک زندگی مانند الگوهای فعالیت بدنی گزارش کرده و عوامل واسطه‌ای چون سن و جنسیت، قومیت و نژاد و وضعیت اقتصادی اجتماعی را در این امر دخیل می‌دانند [۱]. در ایران با توجه به مطالعات صورت گرفته، اضافه وزن و چاقی در بین کودکان از استانداردهای تعريف شده توسط مرکز بین المللی کنترل و پیشگیری بیماری بالاتر بوده و این اضافه وزن و چاقی در کودکان دختر بیشتر از کودکان پسر گزارش شده است [۲]. مطالعات اخیر تلاش نموده‌اند تا برای ارتقای سلامت عمومی در جوامع، گروه‌های آسیب پذیر را جهت برنامه‌ریزی عملی، شناسایی نمایند که در این راستا توجه به مناطق فقر نشین، هم‌تر بیان شده است [۳]. با این وجود، نتایج حاصل نشان‌گر این مطلب است که در هر دو قشر فقری و ثروتمند، شیوع چاقی وجود دارد [۴]. چاقی و بیماری‌های مرتبط با آن، به دلیل کاهش تحرک و فعالیت بدنی افراد می‌باشد [۵، ۶]. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که فعالیت‌های بدنی در پیشگیری از چاقی موثر است [۷، ۸]. دانش آموزان در مدارس با وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین، فعالیت بدنی کمی داشته و چاق‌تر هستند [۹]. زیرا دانش کمتری نسبت به فعالیت بدنی و

در سال‌های اخیر، چاقی و اضافه وزن رشد فرایندهای در جوامع در حال توسعه داشته [۱] و میزان شیوع چاقی در کودکان نسبت به سال‌های گذشته نیز افزایش یافته است؛ این در حالی است که اقدامات مختلف برای پیشگیری از آن، موقوفیت‌هایی چشمگیری نداشته است [۱]. چاقی زمینه ساز بیماری‌هایی همچون سرطان [۱۰]، دیابت نوع ۲، گرفتگی عروق کرونر، و بیماری‌های قلبی عروقی می‌باشد [۱۱، ۱۲].

<sup>۱</sup> دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

<sup>۲</sup> دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

<sup>۳</sup> کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

\***دانشیار نویسنده مسؤول:** تهران، میدان صنعت، خیابان ایران زمین، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۴۴۳۸۰۹

پست الکترونیک: m\_azarbayjani@iauctb.ac.ir

تاریخ پذیرش نهایی: ۹۰/۱/۲۱

تاریخ دریافت: ۸۹/۲/۴


مدرسه انتخاب شده و پس از هماهنگی با مدیران و مریبان بهداشت مدارس، تعداد ۲۳۸ نفر دانش آموز از مدارس با وضعیت اقتصادی اجتماعی مطلوب و ۲۵۰ نفر دانش آموز از مدارس با وضعیت اقتصادی اجتماعی متوسط رو به پایین به صورت تصادفی انتخاب شدند. پس از انتخاب آزمودنی‌ها، اهداف و مجموع اقدامات این مطالعه برای والدین آنها شرح داده شده و آنها فرم رضایت‌نامه شرکت فرزندشان در این مطالعه را امضاء نمودند. وزن آزمودنی‌ها به‌وسیله ترازوی دیجیتال Zonhel آلمان در حالی که فرد بدون کفش و با لباس سبک و در حالت ایستاده بدون حرکت بود با دقت ۱۰۰ گرم اندازه گیری شد. قد نیز توسط قدسنج دیواری Seca در شرایط بدون کفش، در حالی که پشت پاشنه پا، باسن و شانه‌های آزمودنی با دیوار تماس داشت، با دقت ۱/۰ سانتی‌متر مورد سنجش قرار گرفت. شاخص توده بدن با معیار مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) در آمریکا بر حسب جنس و سن بدین ترتیب محاسبه شد: صدک کمتر از ۵، لاغر؛ بین ۵ تا ۱۵، در معرض خطر لاغری؛ بین صدک‌های ۱۵ تا ۸۵ وضعیت طبیعی؛ بین صدک‌های ۸۵ تا ۹۵، اضافه وزن و بیشتر از صدک ۹۵، به عنوان کودک چاق ارزیابی شدند. با استفاده از نرم‌افزار محاسبه شاخص توده بدنی کودکان (Health Watch) صدک شاخص توده بدن کودکان محاسبه شد. همچنین، میزان فعالیت بدنی توسط پرسشنامه باربوسا [۱۹] اندازه گیری شد. میزان روایی محتوای پرسشنامه به‌وسیله اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی بررسی شده و مورد تایید قرار گرفت. برای رفع نواقص احتمالی، ۳۰ نسخه از پرسشنامه در بین گروه مورد مطالعه، توزیع و جمع آوری گردید، سپس پایابی پرسشنامه بررسی شده و آلفای کرونباخ آن ۰/۷۵ به دست آمد. فعالیت بدنی روزانه شامل کلیه فعالیت‌هایی که یک دانش آموز در طول یک روز انجام می‌داد، بود. درجه‌بندی آن به صورت محاسبه زمان فعالیت‌ها به دقیقه در طول یک روز بوده و موارد زیر را در بر می‌گیرد: فعالیت‌های روزانه شامل مدت زمان نظافت، صرف وعده غذا، ایاب و ذهاب به مدرسه و نوع وسیله؛ فعالیت‌های مدرسه شامل مدت زمان کلاس درس، ساعت ورزشی اجباری، فعالیت‌های اختیاری از جمله تئاتر، سرود و ورزش و مدت زمان فعالیت‌هایی همچون تماشای تلویزیون، بازی‌های کامپیوتری، اینترنت، ورزش داخل منزل، بازی تفریحی و فعالیت‌هایی مانند بازی با دوستان، پیاده روی با خانواده، دوچرخه‌سواری، گردش و مدت زمانی که صرف نظافت و جمع کردن وسایل، نگهداری بچه، جارو کردن حیاط و پله، جارو کردن داخل خانه، شست و شوی لباس و یا وسایل منزل. وضعیت اقتصادی

نوع غذیه داشته و به محیط‌هایی برای انجام فعالیت بدنی دسترسی ندارند [۱۴]. برخی مطالعات نشان می‌دهند که شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است [۱۵]؛ همچنین در کودکان با وضعیت اقتصادی اجتماعی مطلوب، چاقی بیشتر است [۱۶] پاره‌ای از مطالعات نیز نشان می‌دهند که دانش آموزان در مدارس با وضعیت اقتصادی مطلوب و با وضعیت اقتصادی متوسط به پایین دارای اضافه وزن بوده، اما هیچ فرقی در میزان چاقی آنها وجود نداشت [۸]. بیان شده است که شیوع چاقی در جمعیت آسیایی آمریکایی رابطه معنی‌داری با وضعیت اقتصادی اجتماعی آنان ندارد [۱۷]. همچنین، شواهدی دال بر ارتباط بین وضعیت اقتصادی اجتماعی و چاقی در کشورهای توسعه یافته وجود ندارد [۱۸]. لذا، با توجه به تضادهایی که در نتایج تحقیقات کشورهای مختلف وجود دارد و اهمیت سلامت عمومی و نقش کلیدی پیشگیری در ارتقای آن و کاهش هزینه‌های درمان، و با توجه به خطرات ناشی از فعالیت بدنی پایین، برای جلوگیری از همه گیر شدن چاقی در کشورمان و برای برخورداری از یک جامعه سالم، شناخت زمینه‌های خطرزا ضروری است. از آنجایی که عوامل متعددی بر بروز چاقی و اضافه وزن نقش دارند، شناسایی دقیق عوامل اثرگذار می‌تواند دور نمای بسیار روشنی از ماهیت این پدیده در اختیار متخصصان، مسئولان سلامتی، برنامه‌ریزان و تمامی افرادی که در حیطه سلامت، فعالیت می‌نمایند بگذارد. بر همین اساس پژوهش حاضر بر آن است که رابطه بین میزان چاقی و فعالیت بدنی در کودکان دختر در دو وضعیت اقتصادی اجتماعی در شمیرانات را مورد بررسی قرارداده.


## مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی همبستگی از نوع مقطوعی است. تعداد ۴۸۸ دانش آموز دختر ۷ تا ۱۱ ساله مدارس ابتدایی منطقه شمیرانات شهر تهران در بهار سال ۱۳۸۸ به صورت تصادفی طبقه‌ایی در مطالعه شرکت کردند. برای انجام نمونه گیری پس از انجام مطالعات اولیه و کسب مجوزهای لازم و نیز کسب موافقت شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و آموزش و پرورش منطقه شمیرانات، با توجه به اینکه منطقه شمیرانات از دو بخش روستایی و شهری تشکیل شده است، منطقه شمیرانات به دو بخش با وضعیت اقتصادی اجتماعی مطلوب و وضعیت اقتصادی اجتماعی متوسط رو به پایین تقسیم شد. بر اساس آمار اداره آموزش و پرورش شهر شمیران، در بخش شهری ۳۳ مدرسه و در بخش روستایی ۲۵ مدرسه ابتدایی دخترانه در زمان مطالعه وجود داشت. سپس به صورت تصادفی از هر بخش ۲

توده بدن آنها بین ۸۵ و ۹۵ درصد بود (نمودار شماره ۳). نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد رابطه معکوس و معنی‌دار بین فعالیت بدنی و شاخص توده بدن کودکان در تمام سنین و در دو گروه با وضعیت اقتصادی اجتماعی بالا و پایین وجود دارد ( $P<0.025$ ): بدین معنی که با کاهش فعالیت بدنی، صدک شاخص توده بدن داشت آموزان افزایش می‌یافتد (جدول شماره ۱). نتایج آزمون مجذور کای نیز نشان داد بین صدک شاخص توده داشت-آموزان با وضعیت اقتصادی اجتماعی بالا و پایین تفاوت معنی‌داری وجود دارد ( $P<0.013$ )؛ به گونه‌ای که شیوع چاقی و اضافه وزن در داشت آموزان با وضعیت اقتصادی اجتماعی بالا است (جدول شماره ۲). همچنین، نتایج آزمون مجذور کای نشان داد بین فعالیت بدنی داشت آموزان با دو وضعیت اقتصادی اجتماعی اتفاقاً تفاوت معنی‌داری وجود دارد ( $P<0.001$ )؛ بدین ترتیب که میزان فعالیت بدنی در داشت آموزان با وضعیت اقتصادی اجتماعی بالا بیشتر از داشت آموزان با وضعیت اقتصادی اجتماعی رو به پایین است.



نمودار شماره ۱- درصد فراوانی شاخص توده بدن دختران دبستانی با وضعیت اقتصادی اجتماعی بالا و پایین




نمودار شماره ۲- درصد فراوانی فعالیت بدنی روزانه دختران دبستانی با وضعیت اقتصادی اجتماعی بالا و پایین

اجتماعی با استفاده از پرسشنامه ارزیابی وضعیت اقتصادی اجتماعی بررسی شد. میزان روای محتوایی پرسشنامه به سیله استاد جامعه-شناسی و اقتصاد بررسی شده و مورد تایید قرار گرفت. برای تدوین آن، این شاخص به کمک سه متغیر میزان درآمد، تحصیلات و منزلت شغلی والدین ارزیابی شد. هر سه متغیر لازم برای محاسبه شاخص وضعیت اقتصادی اجتماعی به صورت هموزن و یکسان درجه بندی گردیده و سپس به صورت یک معادله افزایشی باهم ترکیب شدند. هر یک از این ۳ متغیر به ۵ قسمت درجه بندی شده، آنگاه درجه ۱ و ۲ وضعیت اقتصادی اجتماعی مطلوب، درجه ۳ و ۴ و ۵ وضعیت اقتصادی اجتماعی متوسط رو به پایین در نظر گرفته شد. منظور از معادله افزایشی این است که درجه بندی این ۳ متغیر یکسان بوده است؛ یعنی با افزایش درآمد، تحصیلات و منزلت شغلی والدین، افزایش می‌یابد. میزان درآمد به صورت بسیار مطلوب، متوسط، متوسط، نسبتاً ضعیف و ضعیف و میزان تحصیلات به صورت فوق لیسانس و بالاتر، کارشناسی، کاردانی، دیپلم و زیردیپلم و منزلت شغلی به صورت بسیار عالی، عالی، خوب، متوسط و بد تقسیم بندی شدند. از ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه بین متغیرهای مطالعه استفاده شد. با استفاده از مجذور کای نیز میزان چاقی و فعالیت بدنی در کودکان با دو وضعیت اقتصادی اجتماعی مورد مقایسه قرار گرفت. لازم به ذکر است روش محاسبه صدک شاخص توده بدن توسط نرم‌افزار HealthWatch Pro با وارد کردن مشخصات شامل تاریخ تولد (سال، ماه، روز) کودک زیر ۱۸ سال، تاریخ دقیق اندازه‌گیری مشخصه‌ها به صورت تاریخ میلادی، جنس، قد و وزن کودک، صدک شاخص توده بدن کودک مورد محاسبه قرار می‌گیرد. سطح معنی‌داری برای تمامی تحلیل‌ها  $P<0.05$  در نظر گرفته شد.

## نتایج

یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد ۲۳ درصد از دختران دبستانی با وضعیت اقتصادی اجتماعی بالا، چاق بوده و ۱۹ درصد آنها دارای اضافه وزن می‌باشند. این در حالی است که ۲۷ درصد از دختران دبستانی با وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین، چاق بوده و ۳۰ درصد آنها دارای اضافه وزن هستند (نمودار شماره ۱). ۸۶ درصد دختران دبستانی که فعالیت بدنی زیاد داشتند، دارای وضعیت اقتصادی اجتماعی بالا بوده و ۱۴ درصد دیگر که فعالیت بدنی آنها زیاد بود، وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین داشتند (نمودار شماره ۲). همچنین، ۱۴ درصد دختران دبستانی منطقه شمیرانات، چاق بودند؛ یعنی صدک شاخص توده بدن آنها بیشتر از ۹۵ درصد بود. به علاوه، ۱۹ درصد دختران اضافه وزن داشتند؛ یعنی صدک شاخص



نمودار شماره ۳- درصد فراوانی صدک شاخص توده بدن دختران دبستانی منطقه شمیرانات

جدول شماره ۱- شاخص‌های آماری صدک شاخص توده بدن و فعالیت بدنی در دو وضعیت اقتصادی اجتماعی در دختران دبستانی مورد مطالعه

وضعیت اقتصادی									
بالا					سن (سال)				
P	r	متوسط رو به پایین	شاخص توده بدنی	فعالیت بدنی	P	r	متوسط رو به پایین	شاخص توده بدنی	فعالیت بدنی
		Mean±SD	Mean±SD	Mean±SD			Mean±SD	Mean±SD	Mean±SD
0.001	-0.585	57/30.93±34/49	68/85.71±13/70	0.001	-0.719	45/41.8±40/87	75/30.77±15	7	
0.014	-0.320	52/22.62±34/47	87/76.77±11/81	0.010	-0.333	55/71.29±32/60	70/21.12±12/79	8	
0.028	-0.327	50/18.69±31/62	65/75.66±12/19	0.020	-0.310	47/6.80±35/68	83/17.31±16/89	9	
0.001	-0.496	81/72.83±15/61	73/26.92±9/85	0.013	-0.336	64/6.539±31/99	82/4.630±10/12	10	
0.001	-0.614	60/71.04±36/20	73/0.612±10	0.01	-0.524	77/5.610±11/52	77/0.8971±20/46	11	

شیوع اضافه وزن در حد ۳۲/۹ درصد و چاقی ۹/۹ درصد [۲۴] گزارش شده است. از طرف دیگر، در کشور هند، شیوع افزایش وزن در دختران ۱۱/۹ درصد و چاقی ۶/۳۱ درصد [۲۵]. در شهر سائوپائولوی برزیل شیوع چاقی ۷/۶ درصد [۲۶]، و در شمال شرق شهر خوئن کان تایلند شیوع چاقی ۱۰/۸ درصد گزارش شده است [۲۷]. مقایسه یافته‌های پژوهش حاضر با یافته دیگران نشان می‌دهد که شیوع چاقی و اضافه وزن نسبت به کشورهای پیشرفته، پایین‌تر بوده و نسبت به کشورهای در حال توسعه بیشتر است. احتمالاً دلیل تفاوت مقادیر مربوط به مطالعات کشورهای دیگر با پژوهش حاضر را می‌توان در پیشرفت و صنعتی بودن این کشورها و با توجه به رابطه نزدیک زندگی مدرنیزه و ماشینی با اضافه وزن و چاقی دانست. در نمونه پژوهش حاضر به دلیل اینکه کشور ما به سرعت در حال پیشرفت می‌باشد، ممکن است الگو گیری از شیوه‌های زندگی مدرن باعث شده که چاقی نیز هم‌سو با آن به سرعت افزایش یابد. همچنین، این مطالعه نشان داد بین صدک شاخص توده بدن دانش آموzan با دو وضعیت اقتصادی اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ ۲۳ درصد از دختران دبستانی که وضعیت اقتصادی اجتماعی مطلوب داشتند، چاق بوده و ۱۹ درصد آنها نیز دارای اضافه وزن بودند. ۲۷ درصد از دختران دبستانی که وضعیت اقتصادی اجتماعی مطلوب داشتند، چاق بوده و ۳۰

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی دانش آموزان مورد مطالعه بر حسب وضعیت اقتصادی و صدک شاخص توده بدنی

عامل	وضعیت اقتصادی		
	بالا	متوسط رو به پایین	جمع
	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	
صدک	(11/7)۵۷	(4/1)۲۰	(7/۱)۳۷
شاخص	(55/3)۲۷۰	(28/1)۱۳۷	(27/1)۱۳۳
توده	(18/9)۹۲	(11/5)۵۶	(7/4)۳۶
بدنی	(14/1)۶۹	(7/6)۳۷	(7/۱)۳۲

## بحث

این مطالعه با هدف بررسی رابطه میزان چاقی و فعالیت بدنی در کودکان دختر با دو وضعیت اقتصادی اجتماعی در شهرستان شمیرانات طراحی و اجرا شد. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، ۱۴ درصد دختران دبستانی منطقه شمیرانات چاق بوده و ۱۹ درصد نیز اضافه وزن داشتند. این میزان از مقادیر به دست آمده از مطالعات انجام شده در دیگر کشورها کمتر می‌باشد، به طوری که در کودکان اسپانیایی، ۲۲ درصد اضافه وزن و ۸/۸ درصد چاقی [۲۰]، در کودکان دختر ساکن کالیفرنیا، ۲۱/۷ درصد اضافه وزن [۲۱]، در سیسیل ایتالیا، شیوع اضافه وزن در کودکان ۱۱ ساله ۴۰ درصد و در کودکان ۱۵ ساله ۲۵ درصد [۲۲]، مجدداً در ایتالیا شیوع اضافه وزن ۴۰/۶ درصد [۲۳] و در جامعه آمریکا

اند، هم سو نمی‌باشد. این ناهم خوانی ممکن است این گونه توجیه شود که فعالیت بدنی کم در آن کشورها مرسوم بوده و از نظر فرهنگی کم تحرکی نهادینه شده باشد. یافته بعدی نشان داد که بین فعالیت بدنی روزانه با صدک شاخص توده بدن در تمام سنین و در هر دو وضعیت اقتصادی اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی با کاهش فعالیت بدنی روزانه صدک شاخص توده بدن داشت آموزان افزایش یافته و به سمت چاقی پیش می‌روند. این یافته با نتایج مطالعات دیگر مبنی بر اینکه بین فعالیت بدنی با میزان چاقی رابطه معکوس وجود دارد، هم خوانی دارد [۳۳، ۶]. این رابطه بر این اساس قابل توجیه است که انجام فعالیت بدنی بیشتر در طی روز موجب مصرف بیشتر کالری شده و از ذخیره آن در غالب بافت چربی جلوگیری به عمل می‌آورد، در نتیجه در این افراد چاقی و به دنبال آن بیماری‌های وابسته به آن کاهش می‌یابد.

### نتیجه گیری

بر اساس نتایج این مطالعه مشخص شد شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان دبستانی متأثر از میزان فعالیت بدنی روزانه بوده و همچنین چاقی، اضافه وزن و میزان فعالیت بدنی روزانه تحت تاثیر وضعیت اقتصادی - اجتماعی می‌باشد.

### تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله از مسئولین آموزش و پرورش، و مدیران مدارس شهرستان شمیرانات، دانش آموزان و والدین آنها که در انجام این مطالعه زحمات فراوانی کشیدند قدردانی می‌نمایند.

در صد آنها دارای اضافه وزن بودند. در این مطالعه شیوع چاقی و اضافه وزن در دانش آموزان با وضعیت اقتصادی اجتماعی رو به پایین بیشتر بود. این نتایج با مطالعات پیشین [۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۶] که نشان دادند در جوامع توسعه‌یافته چاقی کودکان با وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین رابطه دارد، هم خوانی دارد. این هم خوانی به این دلیل است که در منطقه شمیرانات تهران اکثر افراد دارای زندگی مرتفعی بوده و بیشتر از الگوهای غربی استفاده می‌نمایند. به نظر می‌رسد کودکان با وضعیت اقتصادی اجتماعی مطلوب، تغذیه مناسب‌تری داشته و امکانات ورزشی بیشتری در اختیار دارند و به علاوه پول بیشتری داشته تا به کلاس‌های ورزشی بروند. آنها به دلیل الگو گرفتن از غربی‌ها، لاغر بودن را یک ارزش دانسته و سعی در لاغر کردن خود دارند. ممکن است کودکان با وضعیت اقتصادی اجتماعی متوسط رو به پایین به دلیل نداشتن درآمد کافی توانایی شرکت در کلاس‌های ورزشی را نداشته و نتوانند غذاهای مقوی بخورند؛ یعنی در نتیجه خوردن چیزی و پفک و سایر تنقلات به سمت چاقی پیش می‌روند. پژوهش حاضر نشان داد بین فعالیت بدنی دانش آموزان با دو وضعیت اقتصادی اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد. این یافته هم سو با نتایج محققان دیگر می‌باشد [۳۲، ۲۹، ۶]. دلیل این هم خوانی ممکن است بر این اساس قابل توجیه باشد که افراد دارای وضعیت اقتصادی اجتماعی بالا پول و امکانات بیشتری برای شرکت در کلاس‌های ورزشی دارند. از طرف دیگر افرادی که از تحصیلات بالاتری برخوردار هستند، آگاهی شان نسبت به فواید فعالیت بدنی بیشتر بوده و بیشتر سعی در انجام فعالیت‌های بدنی گوناگون دارند. البته این یافته با نتایج برخی از مطالعات قبلی [۳۳، ۱۸] که عدم رابطه بین وضعیت اقتصادی اجتماعی و میزان فعالیت بدنی کودکان را گزارش نموده-

### References:

- [1] Bauman A, Allman-Farinelli M, Huxley R, James WP. Leisure-time physical activity alone may not be a sufficient public health approach to prevent obesity--a focus on China. *Obes Rev* 2008; 9 Suppl 1: 119-26.
- [2] Summerbell CD, Waters E, Edmunds LD, Kelly S, Brown T, Campbell KJ. Interventions for preventing obesity in children. *Cochrane Database Syst Rev* 2005; 20(3): CD001871.
- [3] Rose DP, Vona-Davis L. Interaction between menopausal status and obesity in affecting breast cancer risk. *Maturitas* 2010; 66(1): 33-8.
- [4] Popkin BM. The shift in stages of the nutrition transition in the developing world differs from past experiences. *Public Health Nutr* 2002; 5(1A): 205-14.
- [5] Marinou K, Tousoulis D, Antonopoulos AS, Stefanadi E, Stefanadis C. Obesity and cardiovascular disease: from pathophysiology to risk stratification. *Int J Cardiol* 2010; 138(1): 3-8.
- [6] Singh GK, Kogan MD, Van Dyck PC, Siahpush M. Racial/ethnic, socioeconomic, and behavioral determinants of childhood and adolescent obesity in the United States: analyzing independent and joint associations. *Ann Epidemiol* 2008; 18(9): 682-95.
- [7] Mosavi Jazayeri SMH. Overweight and Obesity among School-Aged Children of Metropolitan Tehran, Iran. *Pak J Nutr* 2005; 4(5): 342-4.
- [8] Merchant AT, Dehghan M, Behnke-Cook D, Anand SS. Diet, physical activity, and adiposity in children in poor and rich neighborhoods: a cross-sectional comparison. *Nutr J* 2007; 11(6): 1.

- [9] Núñez-Rivas HP, Monge-Rojas R, León H, Roselló M. Prevalence of overweight and obesity among Costa Rican elementary school children. *Rev Panam Salud Publica* 2003; 13(1): 24-32.
- [10] Zoico E, Di Francesco V, Guralnik JM, Mazzali G, Bortolani A, Guariento S, et al. Physical disability and muscular strength in relation to obesity and different body composition indexes in a sample of healthy elderly women. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2004; 28(2): 234-41.
- [11] Neuvonen M, Sievänen T, Töennes S, Koskela T. Access to green areas and the frequency of visits—a case study in Helsinki. *Urban Forestry & Urban Greening* 2007; 6(4): 235-47.
- [12] Frank LD, Schmid TL, Sallis JF, Chapman J and Saelens BE. Linking Objectively Measured Physical Activity with Objectively Measured Urban Form: Findings from SMARTRAQ. *Am J Prev Med* 2005; 28(2):117-25.
- [13] Moraes AC, Fernandes CA, Elias RG, Nakashima AT, Reichert FF, Falcão MC. Prevalence of physical inactivity and associated factors in adolescents. *Rev Assoc Med Bras* 2009; 55(5): 523-8.
- [14] Ruiz-Arregui L, Castillo-Martínez L, Orea-Tejeda A, Mejía-Arangó S, Miguel-Jaimes A. Prevalence of self-reported overweight-obesity and its association with socioeconomic and health factors among older Mexican adults. *Salud Pública Mex* 2007; 49 Suppl 4: S482-7.
- [15] Cota D, Vicennati V, Ceroni L, Morselli-Labate AM, Pasquali R. Relationship between socio-economic and cultural status, psychological factors and body fat distribution in middle-aged women living in Northern Italy. *Eat Weight Disord* 2001; 6(4): 205-13.
- [16] Vijayalakshmi K, Amarender Reddy G, Prasanna Krishna T, Krishnaswamy K. Obesity in adolescents of different Socio-economic groups: prevalence in Andhra Pradesh, India. *Asia Pac J Clin Nutr* 2002; 11 Suppl : S740-3.
- [17] Brown DE, Hampson SE, Dubanoski JP, Murai AS, Hillier TA. Effects of ethnicity and socioeconomic status on body composition in an admixed, multiethnic population in Hawaii. *Am J Hum Biol* 2009; 21(3): 383-8.
- [18] Freitas D, Maia J, Beunen G, Claessens A, Thomis M, Marques A, et al. Socio-economic status, growth, physical activity and fitness: the Madeira Growth Study. *Ann Hum Biol* 2007; 34(1): 107-22.
- [19] Barbosa N, Sanchez CE, Vera JA, Perez W, Thalabard JC, Rieu M. A physical activity questionnaire: Reproducibility and validity. *J Sports Sci Med* 2007; 6: 505-18
- [20] Martínez Vizcaíno V, Salcedo Aguilar F, Franquelo Gutiérrez R, Torrijos Regidor R, Morant Sánchez A, Solera Martínez M, Rodríguez Artalejo F. Prevalence of obesity and trends in cardiovascular risk factors among Spanish school children, 1992-2004: the Cuenca (Sapin) study. *Med Clin (Barc)* 2006; 126(18): 681-5.
- [21] Villa-Caballero L, Caballero-Solano V, Chavarria-Gamboa M, Linares-Lomeli P, Torres-Valencia E, Medina-Santillán R, et al. Obesity and socioeconomic status in children of Tijuana. *Am J Prev Med* 2006; 30(3): 197-203.
- [22] Baratta R, Degano C, Leonardi D, Vigneri R, Frittitta L. High prevalence of overweight and obesity in 11-15-year-old children from Sicily. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2006; 16(4): 249-55.
- [23] Hillier D, Fewell F, Cann W, Shephard V. Wellness at work: enhancing the quality of our working lives. *Int Rev Psychiatry* 2005; 17(5): 419-31.
- [24] Veugelers PJ, Fitzgerald AL. Prevalence of and risk factors for childhood overweight and obesity. *CMAJ* 2005 13; 173(6): 607-13.
- [25] Sidhu S, Marwah G, Prabhjot. Prevalence of overweight and obesity among the affluent adolescent school children of Amritsar, Punjab. *Coll Antropol* 2005; 29(1): 53-5.
- [26] Saldiva SR, Escuder MM, Venâncio SI, Benicio MH. Prevalence of obesity in preschool children from five towns in São Paulo State, Brazil. *Cad Saude Publica* 2004; 20(6): 1627-32.
- [27] Langendijk G, Wellings S, Van Wyk M, Thompson SJ, McComb J, Chusilp K. The prevalence of childhood obesity in primary school children in urban Khon Kaen, northeast Thailand. *Asia Pac J Clin Nutr* 2003; 12(1): 66-72.
- [28] Malina RM, Reyes ME, Little BB. Socioeconomic variation in the growth status of urban school children 6-13 years in Oaxaca, Mexico, in 1972 and 2000. *Am J Hum Biol* 2009; 21(6): 805-16.
- [29] Santos R, Aires L, Santos P, Ribeiro JC, Mota J. Prevalence of overweight and obesity in a Portuguese sample of adults: results from the Azorean Physical Activity and Health Study. *Am J Hum Biol* 2008; 20(1): 78-85.
- [30] Sutherland R, Finch M, Harrison M, Collins C. Higher prevalence of childhood overweight and obesity in association with gender and socioeconomic status in the Hunter region of New South Wales. *Nutrition & Dietetics* 2008; 65(3): 192-7
- [31] Mauro M, Taylor V, Wharton S, Sharma AM. Barriers to obesity treatment. *Eur J Intern Med* 2008; 19(3): 173-80.
- [32] Nanney MS, Nelson T, Wall M, Haddad T, Kubik M, Laska MN, et al. State school nutrition and physical activity policy environments and youth obesity. *Am J Prev Med* 2010; 38(1): 9-16.
- [33] Alves JG, Siqueira PP, Figueiroa JN. Overweight and physical inactivity in children living in favelas in the metropolitan region of Recife, Brazil. *J Pediatr (Rio J)* 2009; 85(1): 67-71.