

تعیین عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان توسط زنان باردار در شهرستان کاشان

اعظم باقری^۱ ، نگین مسعودی علوی^۲ ، فاطمه عباس زاده

خلاصه:

سابقه و هدف: با توجه به افزایش سازارین و برای شناسایی پدیده‌هایی که در این زمینه تاثیر دارند، این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه‌های پژوهشکار مخصوص و دستیاران زنان در کاشان در خصوص نوع زایمان و دلایل آمار بالای سازارین انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق تحلیل محتوی، اطلاعات به صورت مصاحبه نیمه ساختاری جمع‌آوری گردید. در نهایت، ۱۱ نفر پژوهشکار و دستیار زنان در مطالعه شرکت کردند. انتخاب شرکت‌کننده برای متخصصین بهروش مبتنی بر هدف بود. دو نفر اول از داوطلبین در دسترس و نفرات بعدی با رعایت تنوع از نظر دیدگاه و سابقه کاری و به پیشنهاد شرکت کنندگان انتخاب می‌شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در این مطالعه، بهروش شیواکوم مجرن صورت گرفت. پس از بازخوانی متن داده‌ها، جملات و مفاهیم کلیدی موجود در آن استخراج و طبقه‌بندی نهایی انجام شد.

نتایج: یافته‌های مطالعه نشان داد ترس از درد زایمان عامل مهمی در ترغیب بیمار و همراهان وی در انتخاب سازارین است. داشتن تجربه خوب از زایمان قبلی از عوامل موثر در انتخاب زایمان طبیعی ذکر شد. فاکتورهای موثر بر انتخاب نوع زایمان در چهار طبقه شامل عوامل مربوط به بیمار، شرایط زایمان، فرهنگ جامعه و پیامدهای سازارین و زایمان طبیعی قرار گرفته که برخی از آنها تسهیل کننده سازارین و برخی تسهیل کننده زایمان طبیعی بودند.

نتیجه‌گیری: براساس نتایج حاصل از این مطالعه یافته ترس از عوامل مختلف موثر بر انتخاب نوع زایمان مورد تأکید قرار گیرند. توجه به ترس بیمار از درد زایمان و خوشایند سازی تجربه زایمان و فرهنگ‌سازی اهمیت ویژه‌ای دارد.

واژگان کلیدی: سازارین، زایمان طبیعی، تحقیق کیفی

دو ماهنامه علمی-پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره ۲، خرداد و تیر ۱۳۹۱، صفحات ۱۵۳-۱۴۶

مقدمه

این زنگ خطری جدی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. سازارین به دلایل مختلف از جمله بالا رفتن سن زایمان، کاهش تعداد بارداری، پایش جنین از طریق دستگاه‌های الکترونیک، دیسترس جنینی، دفع مکونیوم، عدم پیشرفت زایمان، عدم تطابق سر با لگن و پوزیشن‌های غیرطبیعی مانند برعیج انجام می‌شود [۵]، اما مطالعات متعدد در کشورها نشان داده است که در حال حاضر سازارین تکراری در راس علل منجر به سازارین قرار دارد [۵-۷]. البته دلایل افزایش سازارین از جنیه‌های مختلف بیمار، پژوهش، امکانات، جامعه، پرستل و سیستم ارایه خدمات بهداشتی قابل بررسی است. Leone و همکاران در مطالعه‌ای که در ۶ کشور در حال توسعه انجام دادند، دلایل اقتصادی اجتماعی و عوامل جامعه شناختی را موثر بر افزایش سازارین یافتند. در این مطالعه در زنان با وضع اقتصادی بالا، ویزیت بیشتر پیش از تولد، مراجعته به بیمارستان‌های خصوصی عمل سازارین به میزان چشمگیری افزایش می‌یافتد [۸]. ترس از درد، معاینه واژینال، فشار روانی آگاهی پایین نیز به عنوان دلایل انتخاب سازارین ذکر شده است [۵-۷]. زنان تحت مطالعه Mozingo و همکاران دلایل عصبانیت خود پس از زایمان طبیعی را عدم آگاهی و کنترل خود بر فرایند زایمان اعلام کردند [۹] و مطالعات دیگر نشان داده است که وجود رابطه واقعی بین ماما، پژوهشکار و مادر، تجسم اعتماد واقعی، احترام، نشان

اگرچه زمانی سازارین یکی از پیروزی‌های بزرگ انسان محسوب می‌گشت و تاکنون جان مادران و نوزادان بی‌شماری را نجات داده است، اما میزان آن از دهه ۱۹۷۰-۸۰ به شکل نگران-کننده‌ای افزایش یافته است [۱]. متأسفانه کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما در مرحله افزایش میزان عمل سازارین و مداخلات پژوهشکار غیرضروری قرار دارد [۲]. بر اساس نتایج DHS در حدود ۳۵ درصد از کل زایمان‌ها در کشور به روش سازارین انجام می‌شود (در شهر ۴۲ درصد و در روستا ۲۲/۵ درصد). این در حالی است که طبق گزارش WHO فقط ۵-۱۵ درصد کلیه زایمان‌ها باید منجر به سازارین گردد ضمناً، بر اساس سیاست‌های متخذه وزارت بهداشت درمان و آموزش پژوهشکار، مراکز درمانی موظفند با پیگیری، نظارت و مراقبت آمار سازارین خود را در مراکز دولتی به کمتر از ۲۰ درصد و در مراکز خصوصی به زیر ۲۵ درصد برسانند [۳-۴] و

امربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

*نشان نویسنده مسئول؛

کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی

تلفن: ۰۳۶۱ ۵۵۵۰۰۲۱، دوچرخه‌سواری، ۰۳۶۱ ۵۵۵۶۳۳

پست الکترونیک: abbaszadeh_f@kaums.ac.ir

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۰/۱۰/۲۵

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۱/۱۴

شهرستان کاشان مشغول به فعالیت بودند، جمع‌آوری شد. مصاحبه در بیمارستان یا کلینیک و یا مطب پزشکان بر حسب راحتی ایشان، البته با هماهنگی و تعیین وقت مناسب قبلی، انجام شد. کلیه مصاحبه‌ها با کسب اجازه از پزشکان ضبط می‌شد. تا زمانی که اشیاع اطلاعاتی انجام شود جمع‌آوری اطلاعات ادامه داشت و در نهایت، ۱۱ نفر در مطالعه شرکت کردند. انتخاب شرکت کننده برای متخصصین به روش مبتنی بر هدف بود و دو نفر اول از داوطلبین در دسترس انتخاب شدند، سپس بر حسب نتایج و به پیشنهاد شرکت کنندگان نفرات بعدی دعوت می‌شدند، بهنحوی که حداقل تنویر از نظر دیدگاه و سابقه کاری لحاظ می‌شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در این مطالعه، مطابق با روش شیوه‌کومنرن [۱۴] صورت گرفت و ابتدا خط به خط داده‌ها بازنگری شد، سپس هدف یا سوال پژوهش در زمینه نتیجه انتخابی توسط زنان باردار مبتنی بر تجربیات پزشکان را گسترش داده و به مجموعه‌ای از سوال‌ها که انواع خاصی از محتوى داده‌ها را مشخص می‌کرد تقسیم کرده و یک روش طبقه‌بندی را تدوین نمودیم. پس از آن متن داده‌ها بازخوانی شده و جملات و معافیم کلیدی موجود در آن با توجه به مجموعه‌ی سوالات استخراج و طبقه‌بندی نهایی انجام شد. در نهایت برای اعتبار و اعتماد بیشتر، نتایج تجزیه و تحلیل با مصاحبه شوندگان و صاحب‌نظران تحقیق کیفی مطرح شده و نظرات آنها گردآوری شده و بازنگری نهایی در طبقات با استفاده از نظرات مصاحبه شوندگان انجام شد.

نتایج

براساس نتایج این پژوهش پزشکان معتقد بودند فاکتورهای متعددی بر انتخاب نوع زایمان تاثیر گذار می‌باشند که برخی از این عوامل تسهیل کننده سازارین و برخی تسهیل کننده زایمان طبیعی هستند. البته از نظر آنان آمار سازارین در کشور مابالاتر از حد انتظار می‌باشد. این فاکتورها در چهار طبقه شامل عوامل مربوط به بیمار، مربوط به شرایط زایمان، مربوط به فرهنگ جامعه و پیامدهای زایمان طبیعی و سازارین دسته‌بندی شد.

۱- عوامل مربوط به بیمار

(الف) عوامل تسهیل کننده سازارین

در این حیطه اغلب پزشکان ترس از درد را علت اصلی اصرار بیمار به سازارین انتخابی می‌دانستند: "زایمان طبیعی درد دارد. یه وقت می‌بینی ۲۴ ساعتم همین جوری درد دارد. دیگه یعنی این اتندو می‌کشندش از بس همراهش، شوهرش، فامیلش زنگ می‌زنن چرا اینو نمی‌برین سازارین، اینکه ۲۴ ساعته داره درد می‌کشه، پس

دادن مهارت ماماها و حرفة‌ای بودن آنها، توان به کارگیری تکنولوژی‌های تولد در موقع بروز مشکل و حفظ آرامش و القای آن به مادر، مواردی است که در طول مراقبت‌های پیش از تولد و در طول زایمان طبیعی به مادر و تیم پزشکی در انتخاب نوع زایمان و داشتن یک احساس خوب از آن کمک می‌کند. در ضمن یک تعامل خوب بین ماما و مادر در حین انجام زایمان در منزل نه تنها باعث افزایش آمار مرگ و میر و ناخوشی‌های مادری و نوزادی نشده، بلکه سازارین را به طرز چشمگیری کاهش داده است [۱۱،۱۰]. مطمئناً تصمیم زنان در انتخاب سازارین یا نوع زایمان خود متأثر از دیدگاه حاکم بر جامعه است [۸]. در این میان نگرش و عملکرد پزشکان می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد؛ این در حالی است که اکثر پزشکان به خصوص متخصصان زنان و زایمان، دانشجویان پزشکی و ماماها خود مایل به انجام سازارین بوده و یا لائق سابقه انجام یک سازارین را دارند و بیشترین دلیل آن ترس از زایمان طبیعی اعلام شده است [۱۲،۶]. آنچه مسلم است عملکرد و توصیه‌های پزشکان به مراجعین، بستگان و اقوام نقش مهمی در کاهش یا افزایش استقبال مردم از سازارین ایفا می‌کند. برخی مطالعات رفع نگرانی‌های مربوط به پزشکی قانونی و ترس از شکایت از پزشکان را راه‌کاری برای افزایش تمایل به زایمان طبیعی در پزشکان اعلام نموده‌اند [۱۳]. باید بدانیم که رسیدن به این مهم نیاز به همکاری چهار گروه عمدۀ مادران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جامعه و در راس آنها جامعه پزشکی دارد. علی‌رغم انجام مطالعات متعددی که به بررسی شیوع سازارین، دلایل آن و بعض‌ا تاثیر راهکارهایی نظیر آموزش بر نوع زایمان پرداخته‌اند، آمار سازارین هم‌چنان به شکل فزاینده‌ای در کشور رو به افزایش است. بررسی تجربیات و نحوه نگرش پزشکان می‌تواند به تبیین بالا بودن آمار سازارین در کشور کمک نماید. در این زمینه تحقیقات کیفی دارای توانایی‌های منحصر به‌فرد در بازتاب دادن نحوه تفکر و عقاید و نگرش‌ها و بررسی عمیق تجربیات تاثیرگذار است. از این‌رو، در این تحقیق بروش کیفی تحلیل محتوى، با هدف بررسی نظرات و تجربیات پزشکان متخصص و دستیاران زنان کاشان در خصوص دلایل انتخاب نوع زایمان توسط مادران باردار در سال ۱۳۸۹ طراحی و انجام شد.

مواد و روش‌ها

این تحقیق به روش کیفی تحلیل محتوى در سال ۱۳۸۹ انجام شد. روش جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاری بود که در طی آن با استفاده از راهنمای مصاحبه، تجربیات پزشکان متخصص زنان و زایمان و دستیارانی که در زمان پژوهش در

خوب نبوده، جنس نخ بد بوده. می‌گن ممکنه پزشک خوب نزدہ باشه، مثلاً آلوده شده باشه، ماسکش پائین او مده باشه. اول می‌گن که اشکال از پزشکه".

ب) عوامل تسهیل کننده زایمان طبیعی

برخی از عوامل نیز بر تمایل بیمار به زایمان طبیعی اثر مثبت می‌گذارند. خوش‌زا بودن بیمار در اصطلاح عامیانه از این عوامل هست: "یه زائو بود، از اون وقتی که فول شد، فکر کنم حدود نیم ساعت طول کشید، عالی اصلاً اینقدر این بچه عالی بود، اینقدر سرحال بود. اینقدر این زایمان خوب بود. واقعاً این آدم نگاه می‌کنی چرا هم‌چنین کسی بره سزارین بشه." در زایمان طبیعی با تکرار زایمان، انجام آن سهولت بیشتری پیدا می‌کنه. برخلاف سزارین که با افزایش تعداد آن خطر بیشتر شده و احتمال بروز مشکلات بیشتر پیش می‌آید. دانستن این امر توسط بیمار، تمایل به زایمان طبیعی را بیشتر می‌نماید: "شما یه مریض گراوید چهار، پارا سه، که سه تا NVD داشته راحتی، یعنی فکرت یه جوری میاد که تا می‌آد، دو تا درد بکشه زایمان می‌کنه. چقدر راحتی، یعنی مطمئنی که هر چه قدر پاریتی افزایش پیدا بکنه، زایمان‌اش راحت‌تره ولی ما تو سزارین برعکسه. اینم وقتی می‌گیم ریپست ۳ بدنمون می‌لرزه، ریپست ۴ دیگه استرس فول می‌شیم." متخصصین هم‌چنین به شیرین بودن درد زایمان اشاره کرده بودند که می‌تواند روی تمایل به زایمان طبیعی اثر داشته باشد: "اینا چون خودم تجربه کردم می‌گم، اینقدر قشنگه به نظر من شیرین‌ترین درد دنیا، درد زایمانه. شما لحظه‌ای که بچه خارج می‌شه، این لحظه یعنی واقعاً به نظرم با هیچ اثوریابی قابل مقایسه نیست، یعنی واقعاً قشنگه".

۲- عوامل مربوط به شرایط زایمان

الف) عوامل تسهیل کننده سزارین
برخی از عوامل ذکر شده توسط مصاحبه شوندگان مربوط به شرایط زایمان بود. از جمله شرایط محیطی اتفاق زایمان و شرایط عمومی زایمان در اکثر بخش‌های بیمارستانی است: "کتاب می‌گه این اتفاق زایمان باشد، اتفاق کناری عمل باشه، یا همون اتفاق زایمان بشه شرایطی فراهم کرد مریض سزارین بشه توش. خیال پزشک راحت باشه." غیرقابل پیش‌بینی بودن سیر زایمان طبیعی نیز شرایطی را فراهم می‌آورد که گاه پزشکان انجام سزارین را ترجیح می‌دهند: "خدوم به عنوان یه متخصص زنان بعد از این همه سال کار، سزارین رو ترجیح می‌دم، چون الان احساس می‌کنم که زایمان طبیعی یک راه پر پیچ و خمی که هر آن به مانعی بر می‌خورد ولي سزارین غیر از اینکه شما، بیهوشی شو داری، الاتم

چی کار می‌کنیم." هم‌چنین، تجربه ناخوشایند از زایمان قبلی به ترجیح دادن سزارین به زایمان طبیعی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. تجربه ناخوشایند زایمان در اطرافیان نیز در تصمیم گیری بیمار اثر دارد: "یکسری‌اشونم هست، تجربه بد از زایمان اولشون دارن، یا مثلاً رفتار بد باهشون شده، یا اینکه زایمان‌شون اصلاً سخت بوده، کلا زایمان شکم اول خوب می‌دونی سخت تره، شاید برا اینا توضیح داده نمی‌شده که اصلاً شاید شکم دومت هزار برابر از اولی راحت‌تر باشد." جالب توجه این است که پزشکان ابراز می‌نمودند، هر چند جراحی معمولاً در بیماران باعث ترس و نگرانی می‌شود ولی بیماران عمدتاً چنین ترسی از سزارین ندارند: "مردم می‌ترسن که مریض‌اشونو بفرستین اتفاق عمل، اگر هر عملی باشه به غیر از سزارین." پزشکان به اصرار برخی از بیماران به سزارین انتخابی اشاره نموده بودند که پزشک را در تصمیم گیری تحت فشار قرار می‌دهند: "بعضی موقع‌ها آدم واقعاً نمی‌تونه از پس مریض بربیاد، می‌گه به هیچ عنوان من نمی‌آم طبیعی زایمان بکنم، دیگه واقعاً آدم تو منگنه قرار داده می‌شه." دلالت همراه بیماران می‌تواند بر روی انجام سزارین اثر بگذارد. همراه بیماران اغلب خود اطلاعات کافی ندارند و در فرآیند زایمان دخالت می‌نمایند: "تو زایشگاه هم که محل کار ماست، که اصلاً پشت در اتفاق زایمان پر از همراهه مریضه. یعنی اصلاً لحظه‌ای احساس آرامش نمی‌کنی، همین جوری که داری می‌ری، یکی مقننه تو می‌کشه، یکی روپوشته می‌کشه سفارششو بکن." برخی پزشکان معتقد بودند، بیمار باید خود حق انتخاب داشته باشند و بمحاسب مزايا و معایب احتمالي باید بتوانند نوع زایمان را خود انتخاب نمایند. چنین امری در صورت تمایل بیمار به سزارین منجر به افزایش سزارین می‌گردد: "جزو وظایف پزشک این هستش که باید تمام فواید و مضرات یه پروسه رو بگه، روش‌های مختلف هر کدو مش چه منافعی داره، چه خطراتی داره. مریض انتخاب کنه. به نظر من این حق مریضه. این حق مریضو باید رعایت کرد." هم‌چنین عدم قبول مسئولیت توسط بیمار از طرفی پزشک را در شرایط دشواری برای تصمیم گیری قرار می‌دهد: "ما نرسیدیم به اون حدی که یه شهر و ندmon قدرت قبول خطر داشته باشد، اینجا آخر سر می‌گن هر طور صلاح می‌دونی، اصلاً به اون بلوغ فکری ظاهراً نرسیدن." اعتماد به پزشک و فرآیند طی شده می‌تواند نقش مهمی در تصمیم گیری داشته باشد. گاه این اعتماد به‌طور کامل وجود ندارد و یا در صورت بروز مشکلی بیمار تمامی تقصیر را از چشم پزشک می‌بینند: "اگه یه بچیه چرک بکند توی عمل، قبل از اینکه فکر بکنن مریض من نکنه چاقه، من چاقم مال چاقی منه، یا مال قند منه، اصلاً فکر نمی‌کنم مال اینه که مثلاً نکنه نخ، جنسش

متخصص خود به این باور فرهنگی که سازارین روش بهتری برای زایمان است دامن می‌زند و آن را تقویت می‌کند: "من می‌گم رطب خورده، منع رطب چون کند. وقتی همکار من خودش، بچه ۳ کیلویی رو رفته گراوید یک سازارین شده، چطوری می‌توانه به مریضش بگه تو زایمان طبیعی کن. الان متخصصین زایمان اکثراً همه سازارین شدن." انگ بی پولی و خسارت به بیمار از عوامل دیگری است که تمایل بیمار به سازارین را افزایش می‌دهد: "به‌خصوص تو قشر مرphe تصور ذهنی مردم عادی اینه که اگه یکی بره، زایمان طبیعی بکنه به خاطر پولشه، می‌گن ما که پولشو داریم، مثلاً یه جور چشم و هم چشمی پیش می‌آد که اگر فلانی زایمان طبیعی کرده، به خاطر اینه که شوهرش پولشو نداده بره سازارین بشه. در حالی که این طوری نیست، آدم عاقل تری بوده که اینکارو کرده."

ب) عوامل تسهیل کننده زایمان طبیعی در این میان نقش فرهنگ‌سازی پزشک می‌تواند کمک زیادی به تغییر این رویه نماید: "حالا پزشک‌های ما متأسفانه اون بعد فرهنگ سازی‌شونو کنار گذاشتند، یعنی علاوه بر اینکه طبابت می‌کنند، فرهنگ‌سازی هم برای مردم بکنند. متأسفانه پزشک‌ها هم مثل بقیه مردم حوصله ندارند، وقت ندارند." نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات نیز از موارد دیگری بود که در فرهنگ‌سازی به آن اشاره شده بود: "صدا و سیما بیشتر تبلیغ کنند. اینارو بهتره تو این برنامه‌هایی که مردم می‌بینند، پرینته است، بذارن."

۴- عوامل مربوط به پیامدهای زایمان طبیعی و سازارین

الف) عوامل تسهیل کننده سازارین هر یک از دو انتخاب سازارین و زایمان طبیعی دارای پیامدها و عوارضی است که هر دو، بر روی انتخاب نوع زایمان توسط مردم پزشکان متخصص اثر می‌گذارد. برخی از این پیامدها در جهت انتخاب بیشتر سازارین عمل می‌کنند. مانند عوارض زایمان طبیعی: "مریضی بود که مثلاً دیستوژی شانه داشت، مریض اومد فول شد، متأسفانه دیستوژی شونه داد و الان ۲ ساله اینا بچه رو دارن می‌برن فیزیوتراپی، همچنان این دست حرکتش بزنگشته، فلچ کلامکه برash ایجاد شده همچنان هست." برخی از بیماران سیر سازارین طبیعی را طی می‌کنند و در انتها به دلیل مشکلات مانند دیسترس جنین در مرحله آخر راهی اتاق عمل می‌شوند. در واقع بیمار هم درد زایمان طبیعی را تحمل کرده و هم مشکلات مربوط به سازارین برایش پیش می‌آید که اثر منفی روی بیمار گذاشته و اغلب ابراز می‌دارند چرا از اول سازارین نشده‌اند: "بغفل تختش یه مریضه خواهد داد." انجام سازارین در افراد تحصیل‌کرده و پزشکان

اصلًا بیشتر مریض‌ها ۲ تا می‌زان، دیگه یکی یا دو تا دیگه مثل قدیم نیست."

ب) عوامل تسهیل کننده زایمان طبیعی برخی از عوامل نیز وجود دارد که چنانچه شرایط آن فراهم گردد، امکان زایمان طبیعی بیشتر می‌شود. از جمله انجام زایمان بدون درد و زایمان فیزیولوژیک می‌تواند تمایل بیماران به انجام زایمان طبیعی را افزایش دهد: "حالا زایمان طبیعی درد داره، خوب مثلاً بگن که ما زایمان بی درد داریم. اینجا یه مدت بود زایمان بی درد بود، می‌اومند اپیدورال می‌کردن، مریضا راضی بودن، حتی خیلی کسایی که دوست داشتن سازارین بشن، می‌اومند زایمان بی درد می‌کردن. ولی خوب نمی‌دونم چه جوریه دیگه استفاده نمی‌کنن." وجود کلاس‌های آمادگی زایمان برای خانم‌های باردار می‌تواند بر روی تمایل ایشان به زایمان طبیعی اثر مثبت داشته باشد: "کلاس-هایی که دارن آمادگی بدنی ایجاد می‌کنن برای زایمان. کلاس‌های آموزشی گذاشتند، خب اینا نکته‌های مثبتی هستش که اومند افراد و در طول بارداری دارن آماده می‌کنن از نظر ذهنی و بدنی."

۳- عوامل مربوط به فرهنگ جامعه

الف) عوامل تسهیل کننده سازارین در مصاحبه‌های انجام شده، مصاحبه شوندگان به عواملی اشاره نموده بودند که مربوط به فرهنگ و باورهای جامعه است و در نهایت می‌تواند بر روی انتخاب نوع زایمان اثر بگذارد. برخی از این عوامل فرهنگی خانواده و زنان را ترغیب می‌نماید که سازارین انجام دهند. در کل مصاحبه شوندگان معتقد بودند سازارین نزد مردم از ارزش بیشتری برخوردار است: "وقتی سازارین می‌شن، تشكر بیشتری می‌کنن از ازت، نمی‌دونم چرا؟ در صورتی که، برای زایمان طبیعی، شاید ساعت‌ها وقت می‌ذاریم." فرهنگ سازارین در جامعه به قدری جا افتاده است که برخی از مصاحبه شوندگان معتقد بودند، سازارین به صورت مد درآمده است: "الان هر چیزی متأسفانه تو جامعه ما مدعی شده، همسایه‌اش رفته تهران، فلان بیمارستان سازارین شده، فیلمبرداری کرده، اینم می‌آد اینجا، پول نداره بره فلان جا، می‌گه الا و بلا منو سازارین کن." تغیرات و ارزش‌های فرهنگی، تغیرات ماندگاری هستند و به صورت تدریجی می‌توان آنها را عوض نمود. آن هم با اقداماتی سازماندهی شده و هدفمند: "من فکر می‌کنم این ترس از زایمان باید بریزه به مرور زمان، نه یک باره، ما نباید انتظار داشته باشیم که یه دفعه ظرف مدت کوتاه، تمام این ترس‌ها بریزه، ولی باید روش کار کرد. یعنی فقط فشار آوردن روی متخصص و شرایط اینجوری مسلمًا جواب نخواهد داد." انجام سازارین در افراد تحصیل‌کرده و پزشکان

باعث شد ۳۸ درصد از متقارضیان در نهایت به روش طبیعی زایمان نمایند [۱۶]. اگرچه علت سزارین انتخابی در زنان نولی پار در مطالعه Forstholt و همکاران، نگرانی در مورد سلامت بچه و مادر بود لکن در گروهی که زایمان طبیعی کرده بودند کترول درد در زایمان بعدی نگرانی بزرگی به شمار می‌رفت [۱۷]، براساس نتایج این مطالعه دخالت همراه و خانواده‌ی بیمار می‌تواند عاملی برانجام سزارین بیشتر باشد طوری که به توصیه‌های پزشکی اعتماد نکرده و گاه بر انجام سزارین اصرار می‌ورزند. بیان شده است فقدان حمایت اجتماعی در زنانی که سزارین را انتخاب می‌کنند بالاتر بوده و چنانچه همسر بیماران، خود الگویی از احساس ناخوشی روانی، کیفیت زندگی پایین و دپرسیون داشته باشند آمار سزارین افزایش می‌یابد [۱۵]. مردان تحت مطالعه stoll و همکاران نیز ترس از زایمان را عامل مهمی در انتخاب زایمان سزارین عنوان کردند [۱۸]. طبق نتایج مطالعه حاضر برخی از پزشکان حق انتخاب نوع زایمان را برای بیمار قائل هستند که می-توانند عاملی در تسهیل سزارین باشد. در مطالعات متعدد نشان داده شده است با آنکه حق انتخاب و احترام برای بیمار قائل هستند، پس از انجام جلسات آموزشی متعدد و بحث حرفه‌ای بین زنان و پزشکان که در طی بارداری و به طور مکرر انجام می‌شود، آمار سزارین بدنهای چشم‌گیری کم شده، در حالی که حق انتخاب هم-چنان برای بیماران محفوظ است [۱۹، ۲۰، ۲۱]. البته ۵۸ درصد زنان نولی پار و ۲۸ درصد مولتی‌پار تحت مطالعه Pakenham و همکاران، معتقد بودند که سزارین انتخابی اولیه باید در حین مراقبت‌های پیش از تولد آموزش داده شود [۲۱]. حتی اگر بیمار اصرار بر انجام سزارین داشته باشد بایستی پزشک به طور جدی و قاطعه‌در درود خطرات ناشی از انجام آن با بیمار بحث نماید [۲۲]. نتایج این پژوهش نشان داد در صورتی که درد زایمان به تجربه‌ای شیرین بدل شود، زایمان به سهولت انجام خواهد شد و اصطلاحاً اگر زن خوش‌زا باشد و با خاطره‌ای خوش زایمان نماید می‌تواند منجر به کاهش آمار سزارین شود. در نهایت می‌توان به این نتیجه رسید که بایستی برنامه‌هایی خاص در جهت رفع اضطراب و استرس ناشی از درد زایمان برای بیماران و همراهان آنها انجام شود تا ضمن جلب اعتماد و مسئولیت پذیری، خود در جهت انتخاب بیشتر زایمان طبیعی اقدام کنند. انجام حمایت و مشاوره روانی تخصصی برای زنان باردار و خانواده آنان به موازات برنامه‌های مراقبت پیش از تولد می‌تواند بسیار کمک کننده باشد تا زایمان به یک تجربه‌ای شیرین و تکرار شدنی تبدیل شود. پیشنهاد می‌شود برای ارزیابی زنان باردار و خانواده آنان از نظر نیاز به حمایت سیستمیک روانی، هم‌چنین ارائه خدمات مربوطه در کنار

شده، فتال دیسترس پیدا می‌کنند، داره میره برای اتفاق عمل، می-ترسه، می‌گه نکنه منم این جوری بشم." با پیشرفت علم پزشکی و جراحی هم‌چنین سزارین‌ها کم خطر شده و عوارض آن کاهش زیادی یافته. به این ترتیب احتیاط و ترس قبلی از سزارین در مردم و پزشکان وجود ندارد: "الآن سزارین الکتیو قابل مقایسه است با زایمان واژنیال، چون بیهوشیون الکتیو، با پیشرفت تکنیک‌های بیهوشی، شما موربیدیتی بیهوشی به اون شکل ندارین، تکنیک‌های جراحی پیشرفت کرده، شما می‌تونین با حداقل ترومای این کارو بکنین، خوب یه هم‌چنین تفکراتی هم داره می‌آد، معلوم نیست تا ۱۰ ساله دیگه بشینیم اینجا چی بگیم." در هر حال اهمیت جان بچه مهم‌ترین مسئله برای پزشک متخصص در نظر گرفته می‌شود: "قبل‌ازمانی که من رزیدنت بودم، گاهی می‌گفتیم جون مادر و نجات بدم، بچه زیاد مهم نیست، مادر بچه‌دار می‌شه، ولی الان بچه بداندازه مادر برای ما مهم، شاید خوب نتیجه کار من همون بچه‌اس، نمی‌تونیم، که بچه با نتیجه بد بدم به مادر و تمام زندگی اول خانواده رو مختل کنیم."

ب) عوامل تسهیل کننده زایمان طبیعی

در مصاحبه مصاحبه شوندگان به موارد متعدد عوارض سزارین که تجربه نموده بودند اشاره کردند: "ما مریضو سزارین کردیم، مریض ۲ هفته بعد از سزارین تب کرد. یعنی ۱۰ روز متربت شدید پیدا کرد. بعد که خواستیم بستریش کنیم حاضر نشد بستری بشه، به هر جبری بود، ۴۸ ساعت آن‌تی بیوتیک به این دادیم، تبیش که قطع شد رفت خونه، دوباره یه هفته بعد تب کرد." "من مریض با سابقه چند تا سزارین داشتم برای هیسترکتومی، واقعاً خودم قبولش نکردم، برای چسبندگی‌هایی که داشت. اصلاً حالیشون نیست چسبندگی چیه."

بحث

براساس نتایج این مطالعه ترس از درد، داشتن تجربه ناخوشایند در زایمان قبلی و اصرار به انجام سزارین تاثیر به سزاری در انجام سزارین انتخابی داشته، در حالی که ترس کمتر از سزارین و مسئولیت پذیری کم در قبال زایمان واژنیال می‌تواند منجر به اصرار بر انجام سزارین گردد. Halmesmäki و Saisto شایع‌ترین علت درخواست سزارین را ترس از درد و سابقه تولد در دنای قبلى اعلام کرده‌اند. این محققین دریافتند ترس از درد زایمان با ترس کلی از درد و سایر مسائل شخصیتی زنان در رابطه است و با انجام درمان حمایتی برای رفع استرس ناشی از درد در طی بارداری درخواست سزارین اشخاص تا ۵۰ درصد کم می‌شود [۱۵]. حمایت روانی و پزشکی در زنان تحت مطالعه Sjögren و

فرزندان بیشتر بایستی به طور واقع‌بینانه در مورد عوارض جراحی متعاقب سزارین مردم را آگاه نمود تا تصمیم گیری بهتری برای خانواده خود داشته باشدند. براساس نتایج حاصل از این مطالعه برخی پیامدهای زایمان طبیعی و سزارین می‌تواند نقش تسهیل کننده برای سزارین داشته باشد. عوارضی که بعد از یک زایمان طبیعی ماندگار شده است قبول بی‌خطری یا کم خطری سزارین و عدم احساس و درک عوارض مرتبط با آن در جامعه و امکان انجام سزارین پس از تحمل درد به عنوان یک راه حل می‌تواند نقش مهمی در انتخاب سزارین داشته باشد؛ چرا که در هر صورت مهم‌ترین چیز برای مادر، خانواده و پزشک سلامت بچه است. در مطالعات متعدد عوارض جانبی زایمان سزارین مانند مرگ و میر بیشتر در نوزادان، ناخوشی‌های مادری، هیسترکتومی، پلاستیا، انتقال خون، پارگی انژیون، چسبندگی، اقامت طولانی تر در بیمارستان و زمان طولانی جراحی گزارش شده است [۲۶، ۲۵]. براساس نتایج این مطالعه در صورتی که نحوه انجام سزارین و زایمان فیزیولوژیک برای زائو مطرح شده و با یکدیگر مقایسه شوند، می‌توان انتظار داشت زایمان طبیعی بیشتر انتخاب شود. هم‌چنین، تاکید بر هزینه‌های بیشتر سزارین می‌تواند توجیه کننده این واقعیت باشد که در موارد غیر ضروری انجام آن مقرر به صرفه نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه عوامل متعدد وجود دارند که می‌توانند تسهیل کننده سزارین و رواج دهنده آن باشند. در نتیجه باید به رفع استرس و اضطراب ناشی از درد زایمان در بیمار و همراهان وی، طراحی فضایی کامل و مطلوب برای پذیرش زایمان و خوشایند سازی آن برای بیمار با توجه به شرایط زایمان، داشتن برنامه‌ای برای فرهنگ سازی سزارین با نقش بر جسته‌ای برای صدا و سیما و آگاه سازی موثر در زمینه پیامدهای سزارین توجه کرد.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از همکاری بی‌شائبه متخصصان و دستیاران محترم زنان و زایمانی که با مجریان این طرح نهایت همکاری را داشته و امکان انجام این مطالعه را فراهم نمودند، هم‌چنین از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه که با تامین منابع لازم و تصویب این طرح پژوهشی در انجام این مطالعه نقش به سزاپی داشتند، کمال تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

کلینیک‌های مراقبت پیش از تولد تمهیداتی اندیشیده شود. نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از عوامل مربوط به فرهنگ جامعه می‌تواند نقش تسهیل کننده‌ای در سزارین داشته باشد. ظاهرا امروز در جامعه‌ی ما سزارین به یک متدبیل شده است و برخی از مردم ارزش بیشتری برای سزارین قائل هستند. از آن‌جا که وقتی عادات اجتماعی ایجاد می‌شود به تدریج حالت ماندگار پیدا می‌کنند، اصلاح آن مشکل می‌شود. مردم تصور می‌کنند در صورت انجام سزارین احتمال سلامتی جنین بیشتر است و غالباً از عوارض سزارین آگاهی ندارند. از طرف دیگر این که مشاهده می‌شود غالباً افراد متخصص و تحصیلکرده به خصوص پزشکان بیشتر سزارین انجام می‌دهند می‌تواند منجر به آمار سزارین بیشتر مردم شود و گاه مردم به خاطر ترس از انگبی بولی و پایین بودن کلاس اجتماعی طالب سزارین می‌شوند. در مطالعه‌ی Leone و همکاران نیز آمار سزارین در افراد تحصیل کرده و مرffe بالاتر بود و وضعیت جامعه نیز اثر مستقیم بر نوع زایمان داشت [۸]. Wright و همکاران نیز با توجه به انتخاب سزارین توسط درصد بالایی از متخصصان پیشنهاد می‌کنند که متخصصان باید تعادل نگرشی بیشتری پیدا کنند [۲۳]. بر اساس نتایج این پژوهش رادیو، تلویزیون و مطبوعات می‌توانند نقش موثری در کاهش آمار سزارین داشته باشند؛ ضمن اینکه فرهنگ‌سازی اصلی باید توسط پزشکان صورت بگیرد. بیان شده است در کشورهای در حال توسعه صحبت کردن با همسایگان و مشاوران نقش موثری در انتخاب نوع زایمان دارد [۸]. اگر چه بیماران خود انتظار دارند در فرایند نتیجه‌گیری برای نوع زایمان کنترل کننده باشند، لکن از پزشکان خود انتظار دارند در انتخاب نهایی نقش موثری اینها کنند و مسئولانه در این زمینه اقدام نمایند. ترس از پزشک، نگرش منفی نسبت به فرایند زایمان و یا مراقبت بیش از حد بر نوع زایمان تاثیر دارد [۱۵، ۲۰، ۱۹، ۲۴]. براساس نتایج این مطالعه بایستی به شکل همه جانبه نسبت به اصلاح نوافع فرهنگی تمايل به سزارین در جامعه اقدام کرد. پزشکان هسته اصلی این برنامه هستند و با دادن آگاهی مناسب و به موقع در طول بارداری می‌توانند به کاهش سزارین کمک کنند. ضمن این که با توجه به مشکل بودن اصلاح باورهای غلط اجتماعی نقش رسانه‌ها و تلویزیون در این رابطه بسیار مهم است و باید با هماهنگی با سیستم بهداشت و درمان مرتب نسبت به ساخت و ارائه انواع برنامه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی مرتبط اقدام نمود؛ کاری که در سال‌های گذشته گذشت کمتر شاهد آن بوده‌ایم. با پذیرش زایمان طبیعی توسط افراد تحصیل‌کرده و با کلاس اجتماعی بالاتر به طور نامحسوس می‌توان در مردم الگوسازی کرد. با توجه به تمايل جامعه ما برای داشتن تعداد

References:

- [1] Chris Henderson, Sue Macdonald. Mays Midwifery. 13th ed. Biliere Tindall, Royal Collage Midwives London, Uk; 2004. p. 868-81.
- [2] Scott JR, Gibson RS, Karlan By, Haney AF. Danforths Obstetrics & Gynecology. 9th ed. Lippin Cott Williams and Wilkins; 2003. p. 449-60.
- [3] Guidance of managed care/number 5. Available at: <http://darman.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=83>.
- [4] Cunningham FG, Leveno K, Bloom SL, Hauth JC, Rouse D, Spong CY. Williams Obstetrics. 23rd ed. 2010. p. 544-75.
- [5] Jamshidi Evanaki F, Khakbazan Z, Babaei Gh, Noori T. Reasons of choosing Cesarean section as the delivery method by the pregnant women referred to health-treatment centers in Rasht. *Hayat* 2004; 10(22): 51-60. [in Persian]
- [6] Mirtajaddini H. Evaluating of women physicians CAP about cesarean in Kerman [Thesis]. Kerman. Kerman University of Medical Sciences. 2003.
- [7] Firooz bakht M. The reason of cesarean increasing in Emam reza hospital in Amol from 1989 to 1999. [Dissertation]. Tehran. Tehran University of Medical Sciences. 1999.
- [8] Leone T, Padmadas SS, Matthews Z. Community factors affecting rising caesarean section rates in developing countries: an analysis of six countries. *Soc Sci Med* 2008; 67(8): 1236-46.
- [9] Mozingo JN, Davis MW, Thomas SP, Droleman PG. "I felt violated": womens experience of childbirth-associated anger. *MCN Am J Matern Child Nurs* 2002; 27(6): 342-8.
- [10] Goldberg LS. Embodied trust within the perinatal nursing relationship. *Midwifery* 2008; 24(1): 74-82.
- [11] Huber US, Sandall J. A qualitative exploration of the creation of calm in a continuity of carer model of maternity care in London. *Midwifery* 2009; 25(6): 613-21.
- [12] Sakala C. Midwifery care and out-of-hospital birth settings: how do they reduce unnecessary cesarean section births?. *Soc Sci Med* 1993; 37(10): 1233-50.
- [13] Vimercati A, Greco P, Kardashi A, Rossi C, Loizzi V, Scioscia M, et al. Choice of cesarean section and perception of legal pressure. *J Perinat Med* 2000; 28(2): 111-7.
- [14] Adib-Hajbaghery M. Iranian nurses perceptions of evidence-based practice: A qualitative study. *Feyz* 2007; 11(2): 44-52. [in Persian]
- [15] Saisto T, Halmesmäki E. Fear of childbirth: a neglected dilemma. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2003; 82(3): 201-8.
- [16] Sjögren B, Thomassen P. Obstetric outcome in 100 women with severe anxiety over childbirth. *Acta Obstet Gynecol Scand* 1997; 76(10): 948-52.
- [17] Forstholt MM, Langhoff-Roos J, Lidegaard Ø. Sectio at maternal request among nulliparous women. *Ugeskr Laeger* 2010; 172(29): 2075-9.
- [18] Stoll K, Fairbrother N, Carty E, Jordan N, Miceli C, Vostrcil Y, et al. "It's all the rage these days": University students' attitudes toward vaginal and cesarean birth. *Birth* 2009; 36(2): 133-40.
- [19] Karlström A, Engström-Olofsson R, Nystedt A, Thomas J, Hildingsson I. Swedish caregivers' attitudes towards caesarean section on maternal request. *Women Birth* 2009; 22(2): 57-63.
- [20] Weaver JJ, Statham H, Richards M. Are there "unnecessary" cesarean sections? Perceptions of women and obstetricians about cesarean sections for nonclinical indications. *Birth* 2007; 34(1): 32-41.
- [21] Pakenham S, Chamberlain SM, Smith GN. Women's views on elective primary caesarean section. *J Obstet Gynaecol Can* 2006; 28(12): 1089-94.
- [22] Latham SR, Norwitz ER. Ethics and "cesarean delivery on maternal demand". *Semin Perinatol* 2009; 33(6): 405-9.
- [23] Wright JB, Wright AL, Simpson NA, Bryce FC. A survey of trainee obstetricians preferences for childbirth. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2001; 97(1): 23-5.
- [24] Chigbu CO, Ezenyeaku CC. Women's opinions and experiences with induction of labor and cesarean delivery on request in south eastern Nigeria. *Int J Gynaecol Obstet* 2008; 103(2): 158-61.
- [25] Alchalabi HA, Amarin ZO, Badria LF, Zayed FF. Does the number of previous caesarean deliveries affect maternal outcome and complication rates?. *East Mediterr Health J* 2007; 13(3): 544-50.
- [26] Bakhshi T, Landon MB, Lai Y, Spong CY, Rouse DJ, Leveno KJ, et al. Maternal and neonatal outcomes of repeat cesarean delivery in women with a prior classical versus low transverse uterine incision. *Am J Perinatal* 2010; 27(10): 791-6.