

خصوصیات مردم شناختی و آسیب‌شناسی کارسینوم سلول سنگفرشی پوست و لب: بررسی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی تهران

دکتر زهرا صفائی نراق، دانشیار بخش پاتولوژی، بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد رضا مرتضوی، بوره تخصصی پوست، بیمارستان بوعلی سینا ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر عباس امید، پژوهش عمومی

Demographic and Pathologic findings of Squamous Cell Carcinoma of Skin and Lip in Pathology Department of Razi Hospital

ABSTRACT

Squamous cell carcinoma, a cancer of keratinocytes origin, mostly involves sun-exposed areas of the skin. To study the pathologic and demographic features of this disease, records of 395 patients of squamous cell carcinoma of skin and lip were reviewed. Most of the patients (83%) aged 40 years or more at the time of diagnosis. Respectively, 74.4% and 75.8% of cases with skin and lower lip carcinoma were men, but in upper lip cases frequencies of both sexes were equal. The number of patients referred from western and north-western provinces were much more than those of other provinces of the country. The most frequent histologic stage was grade 1 (53% and 58.8% in skin and lip carcinoma, respectively), showing that most patients visit physicians early enough, and are diagnosed in early stages of the disease.

Key Words: Squamous cell carcinoma; Geographic distribution; Histologic grading


چکیده

استانها بیشتر بود. نور آفتاب یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز در بیماران بود. درجه هیستولوژیک تومور در اکثر بیماران (۷۵٪) و (۷۸٪) درجه یک تشخیص داده شد. این نکته نشان می دهد که اکثر بیماران مراجعه زود هنگام داشته و تشخیص بیماری توسط متخصص پوست و پاتولوژیست به موقع گذاشته می شود.

مقدمه

کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) یکی از تومورهای بد خیم پوست است که از سلولهای کراتینوцитیت اپiderم است که اغلب نقاط نواحی در معرض نور آفتاب پوست را گرفتار می کند. با هدف شناخت بهتر ویژگی های دموگرافیک و آسیب شناختی این بیماری، پرونده های آسیب شناسی ۳۹۵ بیمار مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی پوست و لب مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات دموگرافیک بیماران و خصوصیات آسیب شناختی ضایعه استخراج گردید. اکثر بیماران در هنگام ابتلاء کارسینوم سلول سنگفرشی بیش از ۴۰ سال سن داشتند (۸۳٪). به ترتیب ۷۴٪ و ۷۵٪ مبتلایان کارسینوم سلول سنگفرشی پوست و لب تحتانی را مردان تشکیل می دادند، ولی در لب فوقانی فراوانی هر دو جنس برابر بود. تعداد بیماران مراجعه کننده از استانهای غربی و شمال غربی کشور از سایر

کارسینوم سلول سنگفرشی یکی از تومورهای بد خیم پوست از مشتاً سلولهای کراتینوцитیت اپiderم است که اغلب نقاط نواحی در معرض نور آفتاب پوست را گرفتار می کند. با هدف شناخت بهتر ویژگی های دموگرافیک و آسیب شناختی این بیماری، پرونده های آسیب شناسی ۳۹۵ بیمار مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی پوست و لب مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات دموگرافیک بیماران و خصوصیات آسیب شناختی ضایعه استخراج گردید. اکثر بیماران در هنگام ابتلاء کارسینوم سلول سنگفرشی بیش از ۴۰ سال سن داشتند (۸۳٪). به ترتیب ۷۴٪ و ۷۵٪ مبتلایان کارسینوم سلول سنگفرشی پوست و لب تحتانی را مردان تشکیل می دادند، ولی در لب فوقانی فراوانی هر دو جنس برابر بود. تعداد بیماران مراجعه کننده از استانهای غربی و شمال غربی کشور از سایر



شکل ۱- انتشار آناتومیک کارسینوم اسپینوسلولر

روش و مواد

بروندهای تمام ۳۹۵ بیماری که از فروردین ۱۳۷۱ تا اسفند ۱۳۷۹ تمونه هایشان به بخش پاتولوژی بیمارستان رازی تهران ارسال و تشخیص SCC پوست یالب برای آنها مطرح شده بود مورد بازبینی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به سن، جنس و محل زندگی بیماران و خصوصیات آسیب شناختی و محل تشریحی ضایعه استخراج گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی صورت گرفت.


یافته ها

نتایج بدست آمده در این تحقیق در دو بخش ارائه می گردد: قسمت اول شامل یافته های کل بیماران مبتلا به SCC (پوست و لب) و قسمت دوم مشتمل بر یافته های بیماران SCC لب می باشد.

جهان و در افراد دارای مشاغل گوناگون، متفاوت (۳،۲۱) است. سایر عوامل مطرح در ایجاد SCC عبارتند از: نیازد و رنگ و پوست، کارسینوئنهاي صنعتي از قبيل قطران و روغن، اسکارهاي سوختگي قديمى، گرانولوم هاي مزمن سيفيليس، جذام، سل (لوپوس ولگاريس) و بالاخره برخخي سندرومها و بيماريهاي نادر پوست، كه مهمترین آنها گزرودرمي پيگماته (Xeroderma Pigmentosum) می باشد(۴).

شایعترین نقاط ابتلای پوست به SCC نواحی در معرض نور آفتاب مثل پشت دستها و بخش فوقانی صورت و بویژه در مردان لب تحتانی و لاله گوش می باشند(۵). لب يكى از انواع پر خطروآن بوده و احتمال متاستاز و عود آن زياد است. SCC در فراد میانسال و مسن شایعتر است و جز در موارد خاص به تدریت در دوره کودکی ایجاد می شود.

این بررسی به منظور تعیین فراوانی سنی، جنسی، جغرافیایی و تنوع یافته های آسیب شناسی بیماران SCC و مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان رازی تهران انجام شده است.



شکل ۲- هیستولوژی کارسینم اسپیتوسلولر پوست

اسکار سوختگی، الشعه ایکس و بیماری بروون شایع ترین عوامل زمینه‌ای در بیماران مورد مطالعه بودند. در ۶۸ درصد موارد، عامل زمینه‌ای خاصی در پرونده قید نشده بود.

درجه هیستولوژی تومور: اکثر بیماران در هنگام مراجعت SCC درجه یک (Grade I) داشتند. بیمارانی که مبتلا به کراتوز آفتایی با علامت اولیه تهاجم بافتی جداگانه در نظر گرفته شدند، فقط سه مورد به نوع Verrucous مبتلا بودند (شکل دو).

یافته‌های بیماران SCC لب

سن: میانگین سنی مبتلایان به SCC لب ۶۲/۱۸ سال بود. میانگین سنی مردان مبتلا به SCC لب تحتانی و فوقانی به ترتیب ۶۲/۱ و ۶۰ سال و زنان به ترتیب ۶۲/۶ و ۵۸/۲ سال بود. جنس: ۸۲/۴ درصد بیماران مبتلا به SCC لب را مردان تشکیل می‌دادند. این میزان در لب تحتانی ۸۵/۲٪ و فوقانی ۵۰/۶٪ بود.

درجه هیستولوژی تومور: شایع ترین درجه هیستولوژیک تومور SCC لب درجه یک (Grade I) بود. در ۴/۸ درصد بیماران درجه Actinic Cheilitis با تهاجم اولیه بافتی و در ۲ درصد بیماران

یافته‌های بیماران SCC پوست


۱- سن: میانگین سن بیماران مبتلا به SCC پوست ۶۲/۵ سال (از ۲ تا ۹۰ سال) بود. بیشترین تعداد بیماران در گروه سنی ۵۰ تا ۷۹ سالگی بودند و بیماران زیر ۴۰ سال فقط ۷/۲ درصد کل بیماران را تشکیل می‌دادند. تمام بیماران زیر ۴۰ سال سابقه ضایعه Xeroderma Pigmentosum در ناحیه صورت را داشتند.

جنس: مردان ۷۴/۴ درصد مبتلایان را تشکیل می‌دادند. میانگین سنی زنان ۶۲/۲ و میانگین سنی مردان ۶۳/۱ سال بود.

پراکنندگی جغرافیایی: ۱۹ درصد بیماران ساکن استان تهران و ۶۸ درصد سایر استانهای کشور بودند و در ۱۲/۹ درصد نامشخص بود. پنج استان قزوین، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی در مجموع ۲۹/۵ درصد بیماران را شامل می‌شدند که رفمی در خور توجه است.

محل آناتومیک ضایعه: در مجموع ۸۳/۳ درصد موارد SCC در سر و گردن و ۱۳ درصد در اندامها دیده شده بود. SCC لب ۲۷ درصد موارد را تشکیل می‌داد و SCC لب تحتانی با فراوانی ۲۴ درصد، شایع ترین محل درگیری در بدن بود (شکل یک).

عوامل زمینه‌ساز: کراتوز آفتایی (Actinic Keratosis)



شکل ۲- هیستولوژی کارسینوم اسپینوسلولر لب

مرکزی و جنوبی شامل می شود. یکی از دلایل این تفاوت در پراکندگی جغرافیایی فاصله و بعد مسافت استانها از تهران به عنوان یک مرکز اصلی مراجعه بیماران مختلف میباشد. همچنین وجود مراکز درمانی مهم و ارجاعی (referral) از قبیل شیراز، مشهد، کرمان و اهواز که با داشتن بخش پوست فعال، نقش زیادی در جذب استان های مربوطه و استان های مجاور دارند، می تواند تأثیر زیادی بر تعداد مراجعین این استان به تهران داشته باشد. از طرف دیگر نقش رواج بیشتر دامپوری و کشاورزی در استان های غربی کشور و پوست روشنتر ساکنین این استانها، در میزان شیوع SCC پوست با لب قابل تأمل و بررسی است.

وقوع بیشتر SCC در سر و صورت ($\frac{2}{3}$ درصد) در مقایسه با سایر قسمتهای بدن، نشانگر نقش نور آفتاب در کشور ما می باشد، در حالیکه در کشورهایی نظیر ژاپن، میزان SCC سر و صورت تنها اندکی از SCC اندامها بیشتر است و عوامل دیگری قبیل اسکار سوختگی و خایعات التهابی مزمن در ایجاد SCC پوست نقش دارند.

شیوع بیشتر SCC لب در مردان را می توان با همان دلایلی که باعث افزایش SCC پوست در مردان می شوند(نور آفتاب و عوامل

Verrucous Carcinoma دیده شد(شکل سه).

بحث و نتیجه گیری

کارسینوم سلول سنتگفرشی پوست و لب یکی از تومورهای شایع پوست می باشد که در سالهای اخیر، به دلیل تغییرات شیوه زندگی و کار و تماس طولانی با نور آفتاب و کاهش ضخامت لایه اوژون شیوع بیشتری یافته است. توزیع سنی بیماران مبتلا به SCC پوست در این مطالعه، شباهت زیادی با سایر گزارشات دارد (۶، ۱۱). شیوع SCC پوست در مردان در این تحقیق تقریباً برابر زنان بود. علت این تفاوت، احتمالاً آنست که مردان به دلایل شغلی در محیط های باز و در معرض تابش اشعه خورشید هستند و احتمالاً بیشتر با عوامل کارسینوژن تماس دارند. از طرف دیگر زنان به دلیل داشتن پوشش اسلامی، کمتر از مردان در معرض تابش آفتاب قرار می گیرند.

توزیع جغرافیایی بیماران مبتلا به SCC پوست و لب در این تحقیق، شیوع بیشتری را در استان های غربی و شمال غربی کشور نشان میدهد، در حالیکه بیماران کمتری را از استان های شرقی،

اورسی فراوانی سی، جلد اول، شماره اول، پیاپی ۱۳۷۹
می باشد (۷). شایع ترین درجه هیستولوژیک SCC لب و پوست (۸) در بیماران مورد مطالعه ۱ Grade بود. این نکته باعث خرسنده است زیرا نشان دهنده مراجعت زود هنگام اکثر بیماران و تشخیص به موقع بیماری توسط متخصص پوست و پاتولوژیست می باشد.

منابع

- 1- Champion RH, Burton JL, Burns DA, Breathnach SM. Rook Textbook of Dermatology, 6th ed. Oxford: Blackwell Science, 1988.
- 2- Marks I, Staples M, Giles GG. Trends in non-melanocytic skin cancer treated in Australia. *Int J Cancer* 1993; 53: 585-90.
- 3- Glas AG, Hoover RN. The emerging epidemic of melanoma and squamous cell cancer. *JAMA* 1989; 262: 2097-100.
- 4- Swanback G, Hilstroml. Analysis of etiological factors of squamous cell skin cancer of different locations. *Acta Derm Venereol* 1970; 50: 350-4.
- 5- Chuang TY, Popescu NA, Su WDP et al. Squamous cell carcinoma: A population based incidence study in Rochester Minnesota. *Arch Dermatol* 1990; 126: 185-8.
- 6- Zitsch PR. Outcome analysis for Lip Carcinoma. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1995; 113(5): 589-9.
- 7- Silvermans JR. Epidemiologic and demographic update in oral cancer. *J Am Dent Assoc* 1990; 120(5): 495-9.
- 8- Breuniger H. Microstaging of squamous cell carcinoma. *Am J Clin Path*. 1990; 94(5): 624-7.
- 9- Mehregan AH, Hashimoto K. *Pinkus' guide to dermatopathology*. 6th ed. Detroit Michigan: Appleton & Lange, 1995.
- 10- David Elder. *Lever's histopathology of the skin*. 8th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997.
- 11- Weedon D. *The skin systemic pathology*. 3rd ed. New York: Churchill Livingstone, 1992.

کارسینوژن بخصوص سیگار) توجیه نمود (۷). وجود سبیل در مردان (حفاظت لب فوقانی از آفتاب) و نیز نقش پوشاننده مواد آرایشی و روز لب در زنان احتمالاً بر شیوع SCC در آنها مؤثر است. با اینهمه علت تفاوت فاحش در نسبت شیوع لب تحتانی و فوقانی در مردان و زنان همچنان مورد بحث و مجادله محققان