

# بررسی تأثیر مصرف سیگار والدین بر بروز استفراغ پس از عمل در کودکان بستری در بیمارستانهای حضرت امام(ره) و مرکز طبی در سالهای ۷۸ و ۷۹

دکتر کبیری قاضی‌سعیدی، دانشیار بیهوشی، دانشگاه تهران

دکتر مهین جعفری‌چاوبی، استادیار بیهوشی، دانشگاه تهران

دکتر مهرداد خزانی‌کوهپر، دستیار بیهوشی، دانشگاه تهران

## Comparison Of Incidence Of Postoperative Nausea And Vomiting (PONV) Between Children of Smoker Parents And Children of Non-Smoker Parents After Surgery In Imam Khomeini And Children Medical Center Hospitals

### ABSTRACT

Postoperative nausea and vomiting is a common complication that all anesthesiologist are familiar with the problems of its consequences. Although continued research on the recognition of factors affecting the incidence of PONV is being done but they are not sufficient and the need for research along with advances in anesthesiology and newer drugs are considered.

In this prospective cohort study 400 children of 3 to 12 age who has been operated for general surgery (other than eye, thorax and upper abdomen) and orthopedic surgery in the Imam Khomeini and Children Medical Center Hospital has been evaluated. Of these, 200 children who had smoking parent and according to definition were passive smokers and the other 200 children had no smoking parents. Both the groups were matched for sex, age, and type of operation.

With the analysis of data we noted that the incidence of PONV in both groups was 19.5 and there was no significant difference between the two groups. (Passive smoker 19 percent and non-passive smoker 20 percent). We also noted a relation between the duration and the incidence of PONV. So operation with more than 2 hours had higher incidence of PONV. There was also positive relation between PONV and controlled ventilation. However, there was no significant difference as the sex and type of operation was concerned.

In conclusion, children of smoker parents suffer more PONV than children of non-smoker parents if operation takes longer than two hours or the patient is mechanically ventilated during operation.

**Key words:** Postoperative nausea and vomiting (PONV), passive smoker

چشم، گوش، توراکس و قسمت فوقانی شکم) و اعمال ارتوپدی به اتفاقهای عمل بیمارستان حضرت امام(ره) و مرکز طبی کودکان آورده شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. از این میان ۲۰۰ نفر از کودکان دارای والدین سیگاری بوده و طبق تعریف در گروه پاسیو اسموکر قرار گرفتند و ۲۰۰ نفر دیگر غیرسیگاری بودند. حتی امکان سعی شد بیماران در دو گروه از لحاظ جنس، سن، نوع عمل (ارتوپدی، جراحی عمومی) یکسان‌سازی شوند و در نهایت اطلاعات مربوط به هر فرد در پرسشنامه‌ای که به همین منظور آماده شده بود جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد میزان بروز استفراغ پس از عمل در جمیعت مورد مطالعه ۱۹/۵ درصد بود که تفاوت محسوس بین دو گروه از این

### چکیده

استفراغ پس از عمل یک عارضه شایع است که تمامی متخصصان بیهوشی با عوارض و مشکلات ناشی از آن آشنا می‌باشند لذا تحقیقات دامنه‌داری در جهت شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر میزان بروز تهوع و استفراغ پس از عمل و روش‌های جلوگیری و درمان آن صورت گرفته است که البته کافی نیست و نیاز به ادامه این تحقیقات با پیشرفت سریع روش‌های توبیزی و ابداع و تولید داروهای جدیدتر محسوس می‌باشد. در این مطالعه که کوهپر و آینده‌نگر می‌باشد ۴۰۰ کودک ۳ تا ۱۲ ساله که جهت اعمال جراحی عمومی (غیر از

## Archive of SID

علاوه بر آن مسائل دیگری که در مراجع مرتبط با استفراغ پس از عمل ذکر شده‌اند و ما در کنار تحقیق خود اطلاعاتی راجع به آنها در بیماران خود جمع‌آوری کردیم مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار دادیم که جنس بیماران، نوع تهویه، نوع عمل و طول مدت عمل از این جمله می‌باشند(۱).

## مواد و روش‌ها

در این مطالعه که از نوع کوهورت می‌باشد دو گروه ۲۰۰ نفری از کودکان را که از نظر سن، جنس، نوع عمل و بیهوشی یکسان می‌باشند بصورت پروسپکتیو مورد بررسی قرار داده است. تنها یک گروه دارای والدین سیگاری بودند که در این تحقیق سیگاری بودن یکی از والدین مدنظر است و طبق تعريف پاسیو ارایه شده (۵) پاسیو اسموکر محسوب می‌شوند(تعريف پاسیو اسموکر: برخورد بیمار با دود تباکو برای مدت ۱ ساعت یا بیشتر در روز و به مدت ۲ سال یا بیشتر). گروه دیگر دارای والدین غیرسیگاری بوده و غیرسیگاری محسوب می‌گردیدند. اطلاعات در پرسشنامه‌ای که بهمین منظور تهیه شده بود جمع‌آوری گردید و توسط نرم‌افزار SPSS تحت ویندوز ۹۵ و آزمون کای دو مورد تجزیه تحلیل فرار گرفت. لازم به ذکر است با توجه به اینکه دو گروه مورد مطالعه از لحاظ سن، جنس، نوع عمل و بیهوشی با هم یکسان‌سازی شده‌اند لذا مقایسه این دو گروه در مورد این متغیرها بی معنی می‌باشد. ولی در داخل هر گروه بطور مجزا توانستیم این متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم. یعنوان مثال در گروه پاسیو اسموکر نیمی از آنها دختر و نیمی پسر بودند که این دو زیر گروه را نیز از لحاظ استفراغ پس از عمل با هم مقایسه کردیم و این کار را برای سایر متغیرها نیز انجام دادیم که در قسمت نتایج بصورت جدول در دسترس می‌باشد.

## نتایج

شیوع تهوع و استفراغ پس از عمل در این جمعیت ۴۰۰ نفری بطور کلی ۱۹/۵ درصد بود. در گروه بیماران پاسیو اسموکر ۳۸ نفر (۱۹ درصد) و در گروه بیماران غیرسیگاری ۴۰ نفر (۲۰ درصد) دچار استفراغ پس از عمل شدند. مقایسه این دو گروه به تفکیک زمان از نظر شیوع استفراغ پس از عمل در

لحاظ دیده نشد. همچنین نتایج بررسی نشان داد بیمارانی که طول مدت عمل آنها بیش از ۲ ساعت بود با میزان بالاتری از استفراغ پس از عمل مواجه گردیدند. همینطور در گروه بیماران پاسیو اسموکر افرادی که تحت تهویه کنتروله فرار گرفته بیشتر دچار استفراغ پس از عمل شدند. غیر از این موارد بیماران چه از لحاظ جنس، نوع عمل و ... تفاوت بارزی از لحاظ استفراغ پس از عمل با یکدیگر نداشتند.

بطور خلاصه، در صورتیکه طول عمل بیش از ۲ ساعت باشد و یا در حین عمل بیمار نیاز به تهویه مکانیکی داشته باشد، تهوع و استفراغ بعد از عمل در کودکان پاسیو اسموکر بیش از کودکانی که والدین غیر سیگاری دارند مشاهده می‌شود.

## مقدمه

تهوع و استفراغ پس از عمل یکی از مشکلات شایع و بالقوه خطرناک در کودکانی است که تحت بیهوشی عمومی و جراحی فرار می‌گیرند و ترخیص بیمار را از واحد مرافقت پس از بیهوشی به تاخیر انداخته و تبعات و هزینه مالی در پی دارد. این پدیده نیازمند بررسی همه جانبی چه از لحاظ عوامل زمینه‌ساز و چه از لحاظ پیشگیری و درمان می‌باشد. علاوه بر آن ندرتاً منجر به پنومونی آسپیراسیون می‌شود که عارضه‌ای خطرناک و مرگبار محسوب می‌شود بهمین جهت در بعضی مراجع از آن به عنوان big little problem یاد کردند(۱,۲).

یکی از عوامل مهم مؤثر بر تهوع و استفراغ پس از عمل مسائل اجتماعی و رفتاری می‌باشد، از میان این مسائل به مشکلاتی همچون اضطراب و جدایی از والدین در بعضی از مراجع اشاراتی شده است اما در مورد مسئله سیگاری بودن فرد و رابطه آن با استفراغ پس از عمل اختلاف نظر وجود دارد. با این احتمال که نیکوتین با اثر بر مرکز استفراغ در مغز آستانه تحریک آن را پاتین می‌آورد تحقیقی صورت گرفته که رابطه مثبتی بین پاسیو اسموکر بودن کودکان و استفراغ پس از عمل را پیدا کردند (۳). علاقه به این موضوع باعث شد تا ما مسئله سیگاری بودن والدین و اثر آن بر شیوع استفراغ پس از عمل را در مقایسه با کودکانی که والدین غیر سیگاری داشتند مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به اینکه سن شایع مصرف سیگار بین ۳۰ تا ۵۰ سالگی است که سنین باروری نیز محسوب می‌شود، لذا اثبات این موضوع حائز اهمیت می‌باشد(۴).

## Archive of SID

جدول شماره ۴- مقایسه شیوع استفراغ با توجه به نوع عمل در گروه

غیرسیگاری  $P=0.15$ 

جمع	نداشتند		داشتند		استفراغ	
	فراآنی	گروه	فراآنی	گروه	فراآنی	گروه
	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی
۱۰۰	۷۷۶	۷۹%	۲۴	۲%	جراحی عمومی	
۱۰۰	۷۸۴	۸۴%	۱۶	۱۶%	ارتوپدی	
۲۰۰	۱۵۰	۴۰			جمع	

جدول شماره ۵- مقایسه شیوع استفراغ با توجه به نوع عمل در گروه

پاسیواسموکر  $P=1$ 

جمع	نداشتند		داشتند		استفراغ	
	فراآنی	گروه	فراآنی	گروه	فراآنی	گروه
	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی
۱۰۰	۷۸۱	۸۱%	۱۹	۱۹%	جراحی عمومی	
۱۰۰	۷۸۹	۸۱%	۱۹	۱۹%	ارتوپدی	
۲۰۰	۱۵۲	۴۰			جمع	

جدول شماره ۶- مقایسه شیوع استفراغ با توجه به جنس در گروه

غیرسیگاری  $P=0.15$ 

جمع	نداشتند		داشتند		استفراغ	
	فراآنی	گروه	فراآنی	گروه	فراآنی	گروه
	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی
۱۰۰	۷۷۶	۷۹%	۲۴	۲%	پسر	
۱۰۰	۷۸۴	۸۴%	۱۶	۱۶%	دختر	
۲۰۰	۱۵۰	۴۰			جمع	

جدول شماره ۷- مقایسه شیوع استفراغ با توجه به جنس در گروه

پاسیواسموکر  $P=1$ 

جمع	نداشتند		داشتند		استفراغ	
	فراآنی	گروه	فراآنی	گروه	فراآنی	گروه
	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی
۱۰۰	۷۸۱	۸۱%	۱۹	۱۹%	پسر	
۱۰۰	۷۸۹	۸۱%	۱۹	۱۹%	دختر	
۲۰۰	۱۵۲	۴۰			جمع	

جدول شماره (۱) دیده می شود(لازم به ذکر است استفراغ در بعضی از بیماران تکرار شده است).

جدول شماره ۱- مقایسه شیوع استفراغ پس از عمل در دو گروه غیرسیگاری و پاسیواسموکر به تفکیک زمان PACU= واحد مراقبت پس از بیهوشی

گروه	فراآنی		مطلق		زمان	
	۲۴ ساعت	۱۲ ساعت	۲۴ ساعت	۱۲ ساعت	PACU	زمان
	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی		
پاسیواسموکر	۷	۷٪	۲۶	۷٪	۸	۷٪
غیرسیگاری	۹	۱۲٪	۲۷	۷٪	۱۲	۱۲٪

نتایج نجزیه و تحلیل آماری اطلاعات بدست آمده شامل بررسی میزان بروز استفراغ پس از عمل بصورت مقایسه‌ای در رابطه با نوع تهیه (خودبخاری و کتروله)، نوع عمل (جراحی عمومی و ارتوپدی)، جنسیت (دختر و پسر) و طول مدت عمل (بینتر از ۲ ساعت و کمتر با برابر ۲ ساعت) در هر دو گروه پاسیواسموکر و غیرسیگاری در جداول شماره ۲ تا ۹ دیده می شود.

جدول شماره ۲- مقایسه شیوع استفراغ با توجه به نوع تهیه (کتروله- خودبخاری) در گروه غیرسیگاری  $P=0.15$ (کتروله- خودبخاری) در گروه غیرسیگاری  $P=0.15$ 

گروه	فراآنی		نداشتند		استفراغ	
	۲۴ ساعت	۱۲ ساعت	۲۴ ساعت	۱۲ ساعت	نداشتند	داشتند
	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی		
تهیه کتروله	۲۸	۷٪	۲۸	۷٪	۱۱	۷٪
تهیه خودبخاری	۱۳۲	۳۲٪	۱۱۸	۳۲٪	۲۹	۲۹٪
جمع	۱۶۰	۴۰				

جدول شماره ۳- مقایسه شیوع استفراغ با توجه به نوع تهیه در گروه

پاسیواسموکر  $P=0.0002$ 

گروه	فراآنی		نداشتند		استفراغ	
	۲۴ ساعت	۱۲ ساعت	۲۴ ساعت	۱۲ ساعت	نداشتند	داشتند
	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی		
تهیه کتروله	۲۲	۷٪	۲۲	۷٪	۱۵	۱۵٪
تهیه خودبخاری	۱۱۰	۳۲٪	۱۱۲	۳۲٪	۲۳	۲۳٪
جمع	۱۳۲	۴۰				

## Archive of SID

)، اما در گروه بیماران پاسیواسموکر این تفاوت معنی دار است به عبارت دیگر یک رابطه مثبت بین تهیه کنتروله و استفراغ پس از عمل در این گروه بیماران دیده می شود (جدول شماره ۳). لذا پیشنهاد می گردد تمهدات جهت پیشگیری و کاهش استفراغ پس از عمل در این افراد صورت گیرد، بعضی از این تمهدات که در مراجع (۱۲,۴,۷,۸,۹) فابل دستیابی است به قرار زیر می باشد:

۱- بوئیروفنونها: در ویدیو که بدلیل اثرات آنتاگونیستی رسپتورهای دوپامینی خواص ضد استفراغی دارند.

۲- فنویازینها: کلرپرومازین و پرومیتازین از این دسته اند. عمل ضداستفراغی فنویازینها از توانایی آنها در بلوك رسپتور دوپامینی در Chemoreceptor triggerzone (CTZ) ناشی می شود.

۳- داروهای گاستروکیتیک: متوكلوپرامید که حرکات روده را تسريع کرده و تون اسفلکتر تحتانی مری را زیاد می کند از این دسته است.

۴- آنتی کولینرژیکها: بدلیل اثرات ضد بزاق و واگولیتیک استفاده می شوند.

۵- آنتی هیستامینها: دیمن هیدرینات و هیدروکسی زین روی مرکز استفراغ و راههای وسیبولا را تحریک کرده و از استفراغ پیشگیری می کنند.

۶- آنتاگونیستهای سروتونین: انداسترون و گرانیسترون از این دسته می باشند.

اما در رابطه با نوع عمل (جراحی عمومی و ارتودی) در گروه بیماران پاسیواسموکر هیچ تفاوتی از لحاظ استفراغ پس از عمل دیده نشد (جدول شماره ۵) و تفاوتی که در گروه بیماران غیرسیگاری هم دیده شد معنی دار نمی باشد (جدول شماره ۴). مسئله بعدی که مورد بررسی فرار گرفت ارتباط بین استفراغ بعد از عمل با جنسیت بیماران بود که در گروه بیماران پاسیواسموکر هیچگونه تفاوتی ملاحظه نشد (جدول شماره ۷) و در گروه بیماران غیرسیگاری در پسرها ۲۴ درصد و در دخترها ۱۶ درصد بود که از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد  $P=0.10$  (جدول شماره ۶).

البته در بعضی مراجع (۱۰,۱۱) گفته شده استفراغ پس از عمل در خانمهای شایعتر است ولی در مورد بجهه ها تفکیک از لحاظ جنس ذکر نشده است و در این باره به نظر می رسد جا برای تحقیق بیشتر وجود داشته باشد.

جدول شماره ۸- مقایسه شیوه استفراغ با توجه به طول مدت عمل در

گروه غیرسیگاری  $P=0.01$

گروه	استفراغ					نداشتند	داشتند	نداشتند
	فرافوتو	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی			
$\leq 120$	۱۸۵	۷۸۲/۲	۱۰۲	/۱۷/۸	۲۲			
$> 120$	۱۵	۷۵۲/۳	۸	/۴۶/۷	۷			
جمع	۲۰۰			۱۶۰		۴۰		

جدول شماره ۹- مقایسه شیوه استفراغ با توجه به طول مدت عمل در

گروه پاسیواسموکر  $P=0.001$

گروه	استفراغ					نداشتند	داشتند	نداشتند
	فرافوتو	مطلق	نسبی	مطلق	نسبی			
$\leq 120$	۱۸۹	%۸۲/۶	۱۵۸	%۱۶/۴	۳۱			
$> 120$	۱۱	%۲۶/۴	۴	%۶۹/۶	۷			
جمع	۲۰۰			۱۶۲		۳۸		

## بحث

شیوه استفراغ پس از عمل در مرجع شماره (۱) که از معتبرترین مراجع بیهوشی می باشد در گروه جراحیهای غیر از چشم، گوش، توراکس و بالای شکم ۲۰ درصد گزارش شده است که با نتیجه بدست آمده در مطالعه ما (۱۹/۵ درصد) مشابه می باشد. اما تفاوتی که در مرجع شماره (۳) بین گروه پاسیواسموکر با گروه غیرسیگاری از نظر شیوه استفراغ پس از عمل به چشم می خورد در این مطالعه دیده نمی شود و شیوه استفراغ در گروه غیرسیگارها (۲۰ درصد) با گروه پاسیواسموکرها (۱۹ درصد) تفاوت معنی داری در این مطالعه نداشته است.

البته نمی توان با قاطعیت روی این نتایج پافشاری نمود چرا که این مبحث تیار مند تحقیقات بیشتری است و بخصوص پیشنهاد می کنیم مسئله پاسیواسموکر بودن با نبودن را با روشهای دقیقتری از جمله اندازه گیری سطح نیکوتین خون بررسی نمود.

از نظر نوع تهیه (خودبخودی و کنتروله) تفاوتی در شیوه استفراغ پس از عمل در گروه بیماران غیر سیگاری دیده شده است که البته از نظر آماری معنی دار نیست (جدول شماره ۲).

*Archive of SID*

این عارضه مبدول داشته و اقدامات لازم از لحاظ پیشگیری و احیاناً در صورت وقوع در مورد درمان آن صورت گیرد. لازم به ذکر است علیرغم وجود منابع مختلف از لحاظ اقدامات پیشگیری کننده و درمانی استفراغ پس از عمل که بعضی از آنها را ذکر کرده‌ایم ولی هنوز برای دستیابی به موارد کم هزینه‌تر و مناسب‌تر جهت پیشگیری و درمان استفراغ پس از عمل راه زیادی را در پیش رو داریم.

آنچه به وضوح در جداول (۸) و (۹) مشهود است اختلاف معنی‌دار شیوع استفراغ پس از عمل در هر دو گروه بیماران پاسیوسموکر و غیرسیگاری از لحاظ طول مدت عمل می‌باشد که مورد اتفاق مراجع معتبر بیهودشی از جمله مرجع شماره (۱) است که احتمال استفراغ پس از عمل در اعمال طولانی مدت بیشتر شده، لذا پیشنهاد می‌شود در این دسته از بیماران توجه بیشتری به

**منابع**

- Miller Ronald D., Anesthesia. 5 th editon, USA, Churchill livingstone Inc, 2000:234-6.
- Watcha MF., White PF., Postoperative nausea and vomiting. Its etiology, treatment, and prevention. *Anesthesiology*, 1992. (77): 162-84. [Abs]
- J. Motsch, BW. Botliger, K. Voller et al, Parental smoking increases the risk for postoperative vomiting in children. *Sup. Of Anesthesiology*, 1998. Sep: A 1283 [Abs]
- Fujii, Yashitaka, Granisetron reduces vomiting after strabismus surgery and tonsillectomy in children. *Canadian J. Of Anes.*, 1996. 43(1). [Abs]
- Raitakari, OT., Adams, MR., MC Credie, RJ., et al, Arterial endothelial dysfunction related to passive smoking is potentially reversible in healthy young adults. *Ann-Intern-Med*, 1999. 130(7): 578-81. [Abs]
- Z. Hussain Khan, MD., Cigarette a friend or foe. *Medical J. Of IRI*, November 1994. (8): 201-207.
- Lin DM., A double blinded comparison of metoclopramide and droperidol for prevention of emesis following strabismus surgery. *Anesthesiology*, 1992. (70): 357-61.[Abs]
- Watcha MF., Bras PJ., Cieslak GD., Pennant JH., The dose response relationship of ondansetron in preventing postoperative emesis in pediatric patients undergoing ambulatory surgery. *Anesthesiology*, 1995. (82): 47-52. [Abs]
- Mikawa, Katsuya, MD., Nishina, Kahoru, MD., Maekawa, Nobuhiro, MD., et al. Oral clonidine premedication reduces vomiting in children after strabismus surgery. *Anesthesiology*, 1995. 42(11). [Abs]
- Apfel C.C., Greim C.A., Haubitz I., et al, A risk score to predict the probability of postoperative vomiting in adults. *Acta Anesthesiology Scand*, 1998, 42: 495-501.
- Apfel C.C., Greim C.A., Houbitz I., et al., The discriminating power of a risk for postoperative vomiting in adults undergoing various types of surgery. *Acta Anesthesiology Scand*. 1998, 42: 502-509.