

مجله دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال ۱۳۸۱ شماره ۴، صفحات ۲۹۵ تا ۳۰۰

آسیب‌های ورزشی در اسکی بازان

پیست شمشک ۸۰ - ۱۳۷۹

دکتر محمد رضا گبتوی* (استادیار)، دکتر محمود معتمدی* (دانشیار)، دکتر ادب طوسی (پزشک عمومی) دکتر پژمان مضطربزاده (پزشک عمومی)
* گروه ارتودوکسی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ مجتماع بیمارستانی امام خمینی

چکیده

مقدمه: پزشکی ورزشی در ایران رشتہ ای نوبتاً محسوب میشود. به منظور آگاهی از وضعیت کلی آسیب‌های ورزشی در اسکی بازان ایرانی این مطالعه صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: اسکی بازانی که در فصل زمستان ۷۸ و بهار ۷۹ در پیست اسکی شمشک دچار آسیب دیدگی شدند، سرشماری و مورد معاينه قرار گرفتند.

یافته‌ها: در بررسی به عمل آمده از تاریخ ۷۸/۱۰/۱۷ تا ۷۹/۱۱/۱۵ ۳۲۰۵۰ نفر افرادی که در پیست اسکی کرده بودند ۷۱ نفر به عنوان آسیب دیده شناسایی و ۷۶ مورد آسیب در آنها تشخیص داده شد و میزان بروز آسیب در ۱۰۰۰ اسکی باز تشخیص داده شد. از بین اعضای آسیب دیده زانو با ۳۲ درصد و سر و گردن با ۲۰ درصد از موارد آسیب دیدگی بزرگترین سهم را به حود اختصاص داده بودند. از بین عناصر تشریحی زانو، لیگمان کولترال مدیال و لیگمان کروشیت قدامی به ترتیب با ۲۸ درصد و ۲۰ درصد بیشترین موارد را شامل شدند. در این مطالعه رابطه معنی‌داری بین عواملی چون عدم انجام ترمش قبل از اسکی، خستگی ورزشکار و زمان اسکی (ابتدا یا انتهای فصل) از یکسو و شیوع آسیب‌ها از سوی دیگر یافت نشد؛ با اینحال صدمات سر و گردن بر خلاف ضایعات زانو بیشتر در پایان فصل رخ داده بودند. ($p < 0.01$) از بین آسیب دیدگان ۲۶۷ درصد مبتدی بوده و ۲۱ درصد از آنها از وسائل کرایه استفاده میکردند. اگرچه احتمالاً این دو عامل در بروز آسیب ورزشی در اسکی بازان موثرند ولی با توجه به نوع مطالعه در مورد تأثیر مبتدی بودن و یا استفاده از وسائل کرایه بر روی شیوع آسیب‌ها نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود.

نتیجه گیری و توصیه‌ها: نتایج فوق نشانده‌نده لزوم انجام مطالعات گسترده‌تر در این مورد و تعیین عوامل تاثیرگزار بر روی آسیب دیدگهای اسکی بازان بخصوص صدمات زانو میباشد. با توجه به نتایج این مطالعه رعایت بیشتر نکات بازدارنده در رابطه با آسیب‌های زانو و آموزش کاملتر این نکات به ورزشکاران توصیه می‌گردد. از سوی دیگر استفاده از کلاه ایمنی به خصوص در اوآخر فصل اسکی که برف پیست شل تر میشود ضروری به نظر می‌رسد.

۱- دفاتری در اختیار مسئولین امداد رسانی پیست قرار داده شد و از آنان خواسته شد نام و مشخصات آسیب دیدگان را ثبت و در صورت امکان پرسشنامه مربوطه را در اختیار آنها قرار دهد.

۲- از طریق اعلامیه از افرادی که خود یا نزدیکانشان آسیب دیده یا مشکوک به آسیب دیدگی بودند خواسته شد به دفتر پیست مراجعه و اقدام به پر کردن پرسشنامه نمایند.

۳- مجریان سعی کردند تعداد روزهای بیشتری در پیست حضور داشته باشند و حتی الامکان شخصاً اقدام به شناسایی و ثبت مشخصات آسیب دیدگان نمایند. موارد زیر در پرسشنامه ثبت گردید:

۱- سن: جهت تعیین میانگین سنی آسیب دیدگان.

۲- نحوه آسیب دیدگی: سقوط به جلو آسیب چرخشی و با برخورد به مانع (منجمله برخورد با سایر اسکی بازان)

۳- عضو آسیب دیده و نوع آسیب: شخصاً توسط پزشکان عمومی مجری طرح و یا با استخراج ازپرونده بیمارستانی مجرح انجام می گرفت. تشخیص نوع ضایعات اختصاصی زانو توسط متخصصین ارتو پدی مجری طرح با معاینه بالینی در مرحله حاد(مانند کشیدگی رباط کولتال داخلی) و یا پس از تایید با روشهای پاراکلینیک نظر MRI و آرتروسکوپی صورت میگرفت. با توجه به اینکه علامت آسیهای منیسک یا رباطهای متقاطع زانو بعضاً چند ماه بعد ظاهر میشوند موارد آسیب دیدگی زانو پس از اتمام فصل نیز پی گیری و مورد معاینه مجدد قرار گرفتند.

۴- سابقه اسکی: مبتدی بودن به عنوان یک عامل خطر فرض شده و معیار آن سابقه اسکی کمتر از ۱۲ جلسه قرار داده شد(تعداد جلسات متعارف یک فصل آموزش اسکی در کلاسهای تحت نظر فدراسیون)

۵- استفاده از وسائل کرايه: با توجه به غیر استاندارد بودن اکثریت این وسائل استفاده از آنها به عنوان عامل بالقوه خطرساز مورد بررسی قرار گرفت.

۶- انجام نرمیش: نرمیش قبل از آغاز فعالیت ورزشی میتواند از خطر آسیب دیدگی بکاهد. معیار نرمیش انجام حرکات کششی کامل و دوییدن آرام به میزانی که موجب عرق کردن ورزشکار شود در نظر گرفته شد.

مقدمه

آیا به راستی اسکی یک ورزش پر مخاطره است؟ در سالیان اخیر به لحاظ پیشرفت تکنولوژی ساخت وسایل اسکی آسیهای ورزشی مربوط به این رشته ورزشی کلا کاهش یافته ولی الگوی متفاوتی پیدا کرده اند. به عنوان مثال آسیهای ساق کاهش و آسیهای زانو و اندام فوقانی افزایش یافته اند. (۱، ۲) از سوی دیگر الگوی آسیب دیدگی و میزان آن در رشتہ اسنوبورد (Snowboard) و آلپین (Alpine) متفاوت به نظر میرسد (۳، ۴). تحقیقات گسترده ای نیز بر روی عوامل مرتبط با بروز آسیب و نوع آن به عمل آمده است (۵، ۶، ۷). از آنجا که تا به حال در کشور ما تحقیقی در این ارتباط انجام شده بود به منظور آگاهی از وضعیت آسیهای ورزشی بطور کلی و با تأکید بیشتر بر خدمات مفصل زانو در اسکی بازان ایرانی اقدام به سرشماری و شناسایی این آسیهای شد. همچنین با هدف تعیین عوامل احتمالی زمینه ساز این آسیهای رابطه بین عوامل خطرساز و بروز آسیب مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها

مطالعه حاضر به صورت یک مطالعه آینده نگر جهت بررسی شیوه آسیهای مرتبط با ورزش اسکی و عوامل تاثیرگذار بر آنها طراحی و اجرا گردید. جمعیت مورد مطالعه کلیه افرادی بودند که در یک فصل ورزشی مشخص (زمستان ۷۸ و بهار ۷۹) در پیست اسکی شمشک به این ورزش پرداختند. در این مطالعه تعریف آسیب دیدگی مانند سایر مطالعات مشابه (۸، ۹) شامل ناراحتیهایی بود که فرد را از ادامه اسکی کردن بازمی داشته است و به دلیل آن نیاز به مراجعه سریعی یا بستری بوده باشد. بنابراین ضایعاتی مانند خراشیدگیها یا کبودیهای سطحی در این بررسی وارد نشده اند. ضمناً مواردی که افراد از درد یا ناراحتیهایی دیگر به هنگام اسکی شکایت داشتند ولی عامل آسیب زا در موقعی غیر از زمان اسکی کردن رخ داده بود حذف شدند. به لحاظ کوتاهی فاصله (۷۰ کیلومتر) این پیست که از چهل سال پیش دایر بوده در هر فصل پذیرای ۳۰ تا ۴۰ هزار اسکی باز میباشد. برای جمع اوری اطلاعات پس از هماهنگیهای لازم اقدامات زیر بعمل آمد.

۷۶ درصد مشخص گردید. با اینحال با توجه به نوع مطالعه انجام سده در رابطه با ارقام فوق مقایسه و نتیجه گیری آماری صورت نگرفت.

۱۱ درصد از افراد آسیب دیده تعداد ساعات اسکی قبل از بروز آسیب را به خاطر نداشتند و از بقیه موارد ۳۹ درصد قبل از ۳ ساعت و ۴۶ درصد بعد از ۳ ساعت اسکی کردن رخ داده بودند. اختلاف بین این دو گروه معنی دار نبود.

از میان اعضای بدن زانو با ۲۵ مورد یا ۳۲ درصد و سر و گردن با ۱۵ مورد یا ۲۰ درصد بیشترین موارد را به خود اختصاص دادند. کمترین شیوع مربوط به صدمات تن (شکم و قفسه صدری) با ۲/۶ درصد بود. سهم اعضای آسیب دیده در جدول یک ارائه میشود. از بین عناصر تشریحی زانو MCL با ۷ مورد (۲۸ درصد) و ACL با ۵ مورد (۲۰ درصد) در رتبه های اول و دوم قرار گرفتند. مردمی از صدمه دیدگی منیسک خارجی و همچنین شکستگی یا دررفتگی زانو در این گروه مشاهده نشد. توزیع آسیهای زانو در جدول ۲ ارائه میشود. اختلاف درصد استفاده از وسایل کرایه در مقایسه آسیهای زانو و دیگر آسیهای $p=0.12$ و همچنین در مقایسه آسیهای سر و گردن و دیگر آسیهای $p=0.15$ معنی دار نبود. با اینحال مقایسه درصد موارد بروز آسیهای سر و گردن (۵۷ درصد) و آسیهای زانو (۲۵ درصد) (که دو گروه عده آسیب دیده محسوب می شوند) در دوره پایانی فصل نشان دهنده تفاوت آماری قابل توجهی بود $p<0.05$. به عبارت دیگر وضعیت نامساعد برف در دوره پایانی فصل بیشتر باعث بروز آسیهای سر و گردن بوده است نا صدمات زانو.

بحث

در سالیان اخیر تکنولوژی ساخت وسایل اسکی و استانداردهای مربوط به آنها پیشرفت‌های زیادی کرده است که عده آنها بدین شرح می‌باشند:

۱- چوبهای اسکی به نحوی ساخته می‌شوند که موجب سرعت و قدرت مانور بیشتر و به عبارتی اجازه تبادل نیروی بیشتری بین زمین و اندام تحتانی اسکی باز می‌دهند.

۲- فیکس‌های اسکی که رابطه بین اندام تحتانی و چوب اسکی هستند از انعطاف‌پذیری بالایی بروخوردار

۷- تعداد ساعات حضور در پیست قبل از بروز آسیب : با توجه به نقش احتمالی خستگی در افزایش خطر آسیب دیدگی سه ساعت اسکی کردن یا در صف ایستادن قبل از بروز آسیب به عنوان مرز خستگی در نظر گرفته میشود.

۸- زمان آسیب دیدگی: با توجه به آنکه در پایان فصل اسکی دمای هوا افزایش می‌یابد برف پیست در طول روز شل شده و در هنگام شب یخ میزند و لذا برف پیست در ساعات اولیه روز سفت و در ساعات پایانی شل است که هر دو برای اسکی نامناسب و خطرساز به نظر می‌رسند. دوره زمانی مربوطه با مشاهده پیست از تاریخ ۷۸/۱۲/۱۵ تا ۷۹/۱/۱۵ در نظر گرفته شد. نهایتاً پرسشنامه‌های آسیب دیدگان تکمیل و جمع‌بندی شدن و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری Instat,ver 4.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

در دوره زمانی ۷۸/۱۰/۱۷ تا ۷۹/۱/۱۵ جمعاً ۷۱ نفر با ۷۶ مورد آسیب دیدگی شناخته شدند. در همین دوره تعداد ۳۲۰۵۰ برگ بلیط به فروش رفته بود که میزان بروز آسیب (Injury rate) ۲/۳ آسیب در ۱۰۰۰ اسکی باز محاسبه شد. میانگین سن کل آسیب دیدگان ۲۱/۵ سال برآورد شد که میانگین سن افراد دچار آسیب زانو نیز همین قدر بود. گروه سنی ۱۶ تا ۲۰ سال با ۲۸ مورد و گروه سنی ۲۱ تا ۲۵ ساله با ۲۴ مورد بیشترین موارد آسیب‌ها را به خود اختصاص داده بودند. نحوه آسیب دیدگی در ۵۳ مورد (۷۰ درصد) سقوط به جلو در ۱۸ مورد (۴۴ درصد) چرخش و در ۵ مورد (۶ درصد) برخورد با مانع یا با سایر اسکی بازان بوده است. از بین ۲۵ مورد آسیب زانو نیز گروههای ۲۱ تا ۲۵ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال به ترتیب با ۸ مورد و ۷ مورد بیشترین موارد را به خود اختصاص دادند. از بین آسیب دیدگان ۲۶/۷ درصد مبتدا محسوب شده ۲۱ درصد از آنان از چوب و فیکس کرایه استفاده می‌کردند و ۸۰ درصد فیلار ورود به پیست نرمش مطلوب انجام نداده بودند. لازم به ذکر است که در رابطه با سه عامل فوق (مبتدا بودن استفاده از وسایل کرایه و عدم انجام نرم‌شتابی مقدماتی) در یک گروه ۱۰۰ نفره از اسکی بازانی که در طی همان فصل اسکی کرده و هیچ گونه آسیبی ندیده بودند نیز بررسی به عمیط‌آزمودن که شیوه این عوامل به ترتیب ۱۴/۵ درصد و ۹/۷ درصد و www.SID.ir

بیشتر برای افرادی است که نیرو و هیجان بیشتری دارند لذا ضرورت دارد چنین افرادی احتیاط بیشتری به عمل آورند. در مطالعه اخیر مانند مطالعه Goulet (۹) درصد مبتدا و همچنین شیوع استفاده از وسایل کرایه غیر استاندارد در افراد آسیب دیده بیش از افراد آسیب ندیده بود، اگرچه با توجه به نوع مطالعه حاضر در مورد ارزش آماری این یافته نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود. با این حال از آنجایی که استفاده از وسایل کرایه به خصوص در بین افراد مبتدا بسیار شایع می‌باشد بنظر میرسد لازم باشد در این مورد تحقیقات بیشتری به عمل آید و در صورت اثبات استفاده از این وسایل محدود یا لائف استانداردهای مربوط به تنظیم آنها ارائه شود. در این مورد میتوان به استانداردهای ASTM(American Society for Testing Materials) اشاره نمود، اگرچه در بعضی مطالعات حتی این استانداردها نیز برای کاهش صدمات زانو کافی دانسته نشده است (۶، ۵).

جدول شماره ۱- توزیع آسیب‌های ورزشی اسکی بازان پیست شمشک در سال ۱۳۷۸-۷۹

درصد	تعداد	عضو آسیب دیده
۱۹/۷	۱۵	سر و گردن
۲/۶	۲	نه
۶/۰	۵	شانه
۹/۲	۷	بازو و آرنج و ساعد
۳/۹	۳	مچ دست و انگشتان
۶/۵	۵	شست دست
۳/۹	۳	کمر و لگن
۳/۲	۲۵	زانو
۳/۹	۳	ساق پا
۶/۰	۵	مچ پا
۳/۹	۲	نامشخص (اندام فوقانی)
۱۰۰	۷۶	جمع

شده‌اند و در موارد ورود نیروی شدید و بالاتر از حد تحمل اندام (در صورت تنظیم صحیح) با باز شدن و به زمین انداختن اسکی باز از آسیب شدیدتر جلوگیری می‌کنند (۱۰، ۵). نکته مهم تکنیکی آن است که فیکسها نیروهای واردہ بر کفش یعنی نیروهای واردہ بر ساق و پا را تشخیص می‌دهند و نه زانو، از اینروスト که در اکثر آمارهای جهانی علیرغم کاهش شیوع کلی آسیب‌های مربوط به اسکی، صدمات زانو نه تنها کاهش نیافته بلکه روند صعودی نیز داشته است (۲، ۱۱).

در بررسی young et al شیوع کلی صدمات ناشی از اسکی از ۴/۲ در سال ۱۹۶۶ به ۲/۸ در سال ۱۹۷۷ کاهش یافته است (۱۲). در بررسی Deibert et al Mean Days Between Injury که بیانگر میانگین فاصله زمانی بین موارد آسیب بوده و رابطه معکوس با شیوع ضایعات دارد، در فاصله سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۴ ۴۲ درصد افزایش نشان میدهد ولی در همین تحقیق این شاخص در مورد sprain درجه ۳ رباط کروشیت قدامی در گروه سنی بزرگسالان ۲۸۰ درصد کاهش داشته است (۸). در بررسی ایالت ورمونت Vermont میزان بروز کلی آسیبها ۴۴ درصد و موارد آسیب‌های پا و ساق ۷۸ درصد کاهش یافته بود ولی مجدداً sprain درجه ۳ ACL ۲۲۸ درصد افزایش یافته بود (۱۳). از سوی دیگر الگوی ضایعات در اسکی با Snowboard و اسکی Snowboard ski معمولی Alpine skiing متفاوت است، به طوریکه در صدمات اندام فوقانی به خصوص آسیبها و شکستگیهای مچ دست و همچنین صدمات سر و گردن شایعتر می‌باشد (۳). در اسکی Alpine آسیب‌های اندام تحتانی بیشتر از سایر قسمتهای بدن دیده می‌شود (۴).

در مطالعه حاضر رقم ۲۸۳ برای میزان کلی بروز آسیب به دست آمد که در مقایسه با دیگر مطالعات در ظاهر رقمی مطلوب است؛ اگرچه به نظر می‌رسد این رقم کوچکتر می‌تواند تا حدی ناشی از شلوغی پیست و در نتیجه کاهش ریسک نسبی به علت کاهش دفعات نزول اسکی بازان باشد. به هر حال قابل پیش‌بینی است که با حذف عوامل خطرساز این رقم کاهش بیشتری یابد.

میانگین سنی ۲۱/۰ سال و توزیع عده آسیبها در گروه سنی ۱۶ تا ۲۰ و ۲۱ تا ۲۵ سال که در این مطالعه بدست آمدند و یافته‌های مشابه در سایر بررسیها (۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶) مؤید خطر www.SID.ir

Warm سهم زانو در آسیب دیدگی اسکی بازان در بررسی (۱۷) ۲۲ درصد، در بررسی hagel (۱۶) ۳۰ درصد، در بررسی Ueland (۱۵) ۲۷ درصد گزارش شده است. سهم ۳۲ درصدی زانو در این تحقیق نیز تائیدی دیگر بر ضرورت معاینه صحیح زانوی اسکی باز آسیب دیده و همچنین توجه بیشتر به عوامل بازدارنده میباشد.

جدول شماره ۲- توزیع انواع صدمات زانو در افراد دچار آسیب زانو در میان اسکی بازان پیست شمشک در سال ۱۳۷۸-۷۹

عضو آسیب دیده	تعداد	درصد
MCL	۷	۲۸
LCL	۲	۸
ACL	۵	۲۰
PCL	۲	۸
Med.Men.	۳	۱۲
Lat. Men.	۰	۰
دیگر بافت‌های نرم	۴	۱۶
نامعلوم	۲	۸
جمع	۲۵	۱۰۰

نتیجه

این مطالعه به عنوان اولین بررسی صورت گرفته در راتمه با آسیبهای ورزشی در اسکی بازان ایرانی نشان داد که شیوع کلی آسیب‌ها کمتر از سایر مطالعات مشابه بوده و صدمات زانو در صدر قرار دارند. پیشنهاد میشود به منظور گسترش مجموعه اطلاعات پزشکی ورزشی در ایران در آینده تحقیقات گستره تری بر روی اسکی بازان ایرانی انجام شود. مسائلی نظری وضعیت آسیب دیدگی در سایر پیستها (از نظر مقایسه و تخصیص امکانات، ارتباط بین مبتداً بودن و یا استفاده از وسایل کرایه با میزان و شدت آسیب دیدگی، مکانیزم دقیقتراز بروز آسیبها به خصوص آسیبهای زانو و نحوه پیشگیری از آنها و ضرورت احتمالی تمرینات آمادگی قبل از آغاز فصل نیازمند بررسی‌های کاملتری می‌باشد.

عدم انجام نرم‌شن در درصد بالایی از هر دو گروه آسیب دیده و غیر آسیب دیده بیانگر ضرورت آموزش همگانی در این مورد است. با توجه به مطالعه حاضر شیوع آسیبهای سر و گردن در انتهای فصل (با توجه به عوامل ذکر شده) افزایش می‌باید و استفاده از کلاه ایمنی در این دوره از ضرورت بیشتری برخوردار است.

منابع

- 1- Elmquist LG et al : Nordic and Alpine skiing in Fu, F.h Stone, eds . Sports injuries, mechanisms ,prevention and treatment .Williams and Wilkins . 1994; 481- 500.
- 2- Hunter RE: Skiing injuries. Am J sports Med 1999 ;27: 381-90
- 3- O'niell DF, McGlone MR; Injury risk in first time snowboarders versus first- time skiers. Am LJ sports Med 1999; 27: 64 – 7.
- 4- Ronning R , Gerner T , Engebretsen L : risk of injury during alpine and telemark skiing and snowboarding Am J sports Med 2000;28:506-8.
- 5- Finch CF, Kelsall HL : the effectiveness of ski bindings and their professional adjustment for preventing alpine skiing injuries . Sports Med 1998; 26: 407- 16
- 6- Natri et al : Alpine ski bindings and injuries .Sports Med 1999;28 :36- 48
- 7- Viola et al : Anterior cruciate ligament injury incidence among male female professional alpine skiers. Am J sports Med 1999;27:792-5
- 8- Deibert MC et al. Skiing injuries in children ,adolescents and adults. J of Bone and joint surgery 80-A : 25; 1998
- 9- Goulet et al ; factors related to skiing injuries Am J Sports Med 1999; 27: 644- 50
- 10- Hauser W. Experimental prospective skiing injury study In : Johnson RJ, Mote CD, Binet Mh eds. Skiing trauma and safety ; seventh international symposium, ASTM . STP 1522 Philadelphia ASTM 1989; 18-24
- 11- Eriksson E, Johnson RJ . the etiology of downhill ski injuries . in : Hutton RS, Miller DL, eds. Exercise and sports sciences review . Philadelphia: Franklin press, 1981; 8: 1- 17
- 12- Young LR, Oman CM Crane H et al. the etiology of ski injuries: An eight year study of the skier and his equipment . Orth Clin North Am .1976; 13-29
- 13- Johnson RJ , Ettlinger CF, Shealy JE: Skier injury trends:1972 to 1994 in Johnson RJ , Mote jr. Eleventh international symposium .ASTM STP 1289 .Philadelphia : American Society for Testing and Materials, 1997PP : 37-48
- 14- Eriksson E: Ski injuries in Sweden : a one year survey. Orthop clin North Am, 1976; 7:3-9
- 15- Ueland O, Kopjar : Occurance and trends in ski injuries in Norway . Br J sports Med 1998 ; 32: 299- 303
- 16- Warm WJ et al : ski injury statistics 1982-93 in jacksonhill ski resort . Am J sports Med 1995; 23: 597- 600
- 17- Hagel BE et al . Knee injuries in skiers . Clin J sports Med 1999;9-17 [Abstract] .