

ترانس برونکیال بیوپسی ریه بدون هدایت فلوروسکوپی بیمارستان امام (۱۳۷۸)

دکتر شهرام فیروزیخشن (استادیار)، دکتر عنايت صفوی (استادیار)، دکتر محمدرضا زاهدپور انارکی (دانشیار)، دکتر غلامرضا درخشان دیلمی (دانشیار)
بخش ریه بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: ترانس برونکیال بیوپسی ریه (TBLB) روش جایگزین جالبی برای بیوپسی باز ریه در بررسی تشخیص اولیه مبتلایان به بیماریهای منتشر ریوی یا ضایعات لوکال دور از دسترس مستقیم برونکوسکوپ محسوب می‌گردد. در بررسی ضایعات منتشر ریوی، گزارشاتی مبنی بر بی خطر بودن انجام TBLB کور (بدون هدایت فلوروسکوپی) وجود دارد، بعلت در دسترس نبودن فلوروسکوپ در بخش ریه این مرکز در صدد برآمدیم میزان موفقیت TBLB های انجام شده را در بدست آوردن نمونه کافی از نسج ریه و قدرت تشخیص نمونه های بدست آمده را سنجیده و عوارض ناشی از آن را مشخص کنیم.

مواد و روشها: در طی ۶ ماهه اول سال ۱۳۷۸، در بخش آندوسکوپی ریه مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران، ۶۴ مورد TBLB بدون هدایت فلوروسکوپی انجام شده و نتایج در دفاتر بخش آندوسکوپی ثبت گردیده بود که از آنها استفاده به عمل آمد.

یافته ها: در بررسی نتایج معلوم گردید که در ۲ مورد (۳/۱ درصد) نسج ریه بدست نیامده و نتایج پاتولوژیک حاصله در (۷۱/۹ درصد) ۴۶ مورد منجر به تشخیص گردیده بود. گزارشی از هموپیزی نداشتم. سه مورد پنوموتراکس رخ داده بود که تنها در یک مورد (۱/۶ درصد) نیاز به استفاده از Chest tube وجود داشت.

نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به جمیع مراتب، بنظر میرسد TBLB کور در مرکز ما با موفقیت همراه بوده است. و میزان عوارض آن قابل مقایسه با سایر مراکز مورد تأیید می‌باشد.

مقدمه

تشخیصی بالا و ریسک عوارض کمتری را داراست و امکان انجام آن بطور سریانی وجود دارد (۱۰۱-۱۰۰).

پنوموتراکس در ۱۰-۱۱ درصد موارد امکان بروز دارد (۱۰۱) عارضه عمده دیگر آن خونریزی است. عده ای که از بیوپسی ۲-۳ cc محلول اپنی نفرین ۱/۱۰۰۰ را بطور معمولی استفاده می‌کنند. لاواز با سالین راه دیگری برای کنترل خونریزی است.

در بررسی تشخیص اولیه مبتلایان به بیماریهای منتشر ریه یا ضایعات لوکال دور از دسترس مستقیم برونکوسکوپ انجام ترانس برونکیال بیوپسی از ریه (TBLB) روش جایگزین مناسبی برای بیوپسی باز ریه محسوب می‌گردد که قدرت

مربوط به بیماران از روی مطالب متدرج در دفاتر بخش آندوسکوپی ریه استخراج گردید و نتایج بیوپسی از پرونده بیماران بسته و مراجعه به بایگانی پزشکان و آزمایشگاههای مربوطه بدست آمد. با توجه به آنکه بیماران حداقل به مدت یک ساعت بعد از خاتمه پروسه در محل تحت نظر قرار میگیرند و قبل از ترخیص از آنها CXRay کنترل به عمل می آید و به ایشان توصیه میگردد در صورت بررسی هرگونه عارضه احتمالی به اورژانس این مرکز مراجعه کنند. عوارض حاصله از این عمل چه بصورت پنوموتراکس (با توجه به CXRay) و چه خونریزی قابل پیگیری است.

یافته‌ها

کل افراد مورد مطالعه ۶۴ نفر بودند. از این میان ۲۶ نفر مؤنث و ۳۸ نفر مذکور بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۵۱/۱ سال با انحراف معیار ۱۴/۱۸ بود. نمونه‌ها که بدون هدایت فلوروسکوپی بدست آمده بود، تنها در ۲ مورد (۳/۱ درصد) نسج کافی از ریه را برای بررسی بدست نداده بود. در ۷۱/۹ درصد نمونه‌ها نتایج مثبت پاتولوژیکی در جهت تشخیص عارضه بدست آمده بود، در هیچ‌کدام از موارد انجام شده گزارشی از هموپیتیزی حاد وجود نداشت و در کل ۳ نفر (۴/۷۸ درصد) دچار پنوموتراکس شدند که در یک مورد صرفاً با تجویز اکسیژن و در مورد دوم با آسپیراسیون سوزنی پنوموتراکس مرتفع گردید و تنها در یک مورد (۱/۵ درصد) نیاز به گذاشتن Chest tube وجود داشته است. هر سه مورد عارضه با بروز درد در بیمار مشخص گردید و در گرافی این مسئله تأیید شد و موردی از عارضه دیررس بعد از ترخیص بیمار گزارش نگردید.

بحث

در مطالعه حاضر بر روی ۶۴ بیمار تنها ۲ مورد (۳/۱ درصد) نمونه کافی از نسج ریلهای ریه از پروندهای اند و در ۷۱/۹ درصد موارد نتایج مثبت تشخیصی از بیوپسی‌ها بدست آمده، در حالیکه در مطالعه مشابهی که روی ۷۷ بیمار مبتلا به سارکوئیدوز صورت گرفته و از آنها TBLB بدون هدایت فلوروسکوپی به عمل

در این روش نمونه‌ها باید حتی المقدور از قسمتهای محیطی ریه گرفته شوند تا شناس بdest آوردن نمونه از پارانشیم ریه بیشتر شود و با توجه به کوچکتر بودن عروق برونکیال در قسمتهای محیطی تر امکان خونریزی قابل ملاحظه تقلیل یابد. ولی در عین حال باید توجه داشت که برداشتن نمونه از قسمتهای محیطی خطر ایجاد پنوموتراکس را میتواند بدنبال داشته باشد. در مورد ضرورت استفاده از فلوروسکوپی در انجام TBLB اتفاق نظر وجود ندارد (۷۰). فلوروسکوپی میتواند در هدایت پنس به سمت ضایعات فوکال کمک کننده باشد و در ضایعات متشر ریوی گزارشاتی مبنی بر خطر بودن انجام این پروسه بدون هدایت فلوروسکوپی وجود دارد (۸۰-۸۹). برای تعیین محل مناسب بیوپسی در اینحالت اپرатор بیشتر بر روی احساس مقاومت در مسیر پنس یا شکایت بیمار از بروز درد شارپ و ناگهانی قفسه سینه متکی است و این امر با تجربه کاری و مهارت فرد ارتباط زیادی دارد. نظر به در دسترس نبودن امکانات فلوروسکوپی در بخش آندوسکوپی ریه این مجتمع درصد برآمدیم میزان موفقیت TBLB های انجام شده را در بدست آوردن نمونه کافی از نسج ریوی و قدرت تشخیصی نمونه‌ها بدست آمده را بستجیم و عوارض عمده ناشی از انجام این پروسه را تعیین نمائیم.

مواد و روشها

مطالعه بصورت گذشته نگر بر روی بیمارانیکه در بخش آندوسکوپی ریه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران در نیمه اول سال ۱۳۷۸- تحت ترانس برونکیال بیوپسی بدون هدایت فلوروسکوپی قرار گرفته بودند، صورت پذیرفت.

چهار نفر از اساتید بخش ریه این نمونه‌برداری‌ها را انجام داده بودند، و ضایعات مربوطه عمده‌تاً در گیری منتشر ریوی ایجاد کرده بودند. برای نمونه برداری بعد از بیحس نمودن ناحیه حلق و حنجره برونکوسکوپ فیراپتیک به سیستم تنفسی فرد وارد شده و پس از وج نمودن برونکوسکوپ در یکی از انشعابات برونشیال مربوط به ریه گرفتار پنس را به آرامی وارد نموده و با احساس مقاومت در مسیر، پنس را کمی به عقب کشیده و آن را باز کرده و سپس در حالیکه بیمار عمل بازدم را انجام میدهد، پنس به جلو در اینحالت نمونه گرفته میشود. اطلاعات SID

آمده تنها در ۴۰ مورد (۵۹٪ درصد) آلونوں در نمونه وجود داشته و در کل در ۷۶ درصد موارد گرانولوم در نمونه های بیوبسی چه مربوط به برونش یا آلونوں وجود داشته است و

جدول ۱- نتایج حاصل از ترانس برونکیال بیوبسی.

نتایج پاتولوژیک	تعداد (درصد)
Insufficient	۲ (۲٪)
Negative	۱۶ (۲۰)
Chronic inflamation	۱۰ (۱۳٪)
Granulomatous inflamation	۸ (۱۰٪)
Fungal granuloma	۲ (۲٪)
Foreign body granuloma	۲ (۲٪)
Sarcoidosis	۶ (۷٪)
TB	۲ (۲٪)
Interstitial pneumonia	۱ (۱٪)
Pneumoconiosis	۱ (۱٪)
Large cell cancer	۳ (۴٪)
Small cell cancer	۲ (۲٪)
Metastatic cancer	۳ (۴٪)
Lymphoma	۱ (۱٪)
Lymphangitic cancer	۲ (۲٪)
Undifferentiated cancer	۱ (۱٪)
Total	۶۴ (۱۰۰)

کنده است و بایستی به بیماران گوشزد نمود در صورت بروز هرگونه مشکلی با مرکز در تماس باشند تا در اسرع وقت اقدامات مقتضی به عمل آید.

در گزارشات مشترک شده دیگر از TBLB بدون هدایت فلورسکوپی نیز عارضه پنوموتوراکس در ۲ - ۳ درصد موارد نشان داده شده است (۸-۹) که در مقایسه با موارد انجام شده با هدایت فلورسکوپی در همان مرکز تفاوت قابل ملاحظه ای نداشته است (۹).

این عارضه در ۳ مورد از بیماران مورد مطالعه در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران رخ داده است و تنها در یک مورد (۱/۵ درصد) نیاز به تعییه Chest tube وجود داشته است. لذا با توجه به آمارهای موجود انجام TBLB در مرکز ما با موفقیت همراه بوده و میزان عوارض آن قابل مقایسه با سایر مراکز مورد تأیید میباشد.

در پایان بایشی خاطر نشان کرد با وجودیکه در تمامی موارد پنوموتوراکس در مطالعه موجود بیماران علامت دار بودند و موردی از عارضه دیررس گزارش نگردید، ولی صلاح است جانب احتیاط را همواره در مدنظر داشت. انجام گرافی قفسه سینه بعد از انجام پروسه در تشخیص زودرس عارضه کمک www.SID.ir

جدول ۲ - نتایج پاتولوژیک حاصل از تارنس بروونکیال بیوبسی بر حسب جنس :

		جنس / نتایج	
جمع	عدم وجود	وجود	پاتولوژیک
۳۸(٪۵۹/۴)	۱۱(٪۲۷/۲)	۲۷(٪۴۲/۲)	مرد
۲۶(٪۴۰/۶)	۷(٪۱۷/۴)	۱۹(٪۲۹/۷)	زن
۶۴(٪۱۰۰)	۱۸(٪۲۸/۱)	۴۷(٪۷۱/۹)	جمع

جدول ۳ - عوارض حاصله از تارنس بروونکیال بیوبسی بر حسب جنس

جمع	هموئیزی	پنومونوراکس	جنس / عوارض
۱(٪۱/۵۶)	+	۱(٪۱/۵۶)	مرد
۲(٪۳/۱۲)	+	۲(٪۳/۱۲)	زن
۳(٪۴/۳۸)	+	۳(٪۴/۳۸)	جمع

منابع

- Hernandez Blascol et al: Safety of Transbronchial biopsy in outpatients. chest. 99:562-565, 1991
- Ahmak. M. et al . The safety of out patient transbronchial biopsy. chest 90:403-405, 1986.
- Simpson FG et al : Postal survey of bronchoscopic practice by physicians in the united kingdom. Thorax 41:311-317, 1986.
- Levin DC et al : Transbronchial lung Biopsy via the fiberoptic bronchoscope. Am Rev Respir Dis 110:4-112, 1974.

5. Ellls JH : Transbronchial lung biopsy via the fiberoptic bronchoscope . chest 68:524-532, 1975.

6) Judwon MA: Is fluoroscopy neede for bron choscopic lungbiopsy?. J Bronchol 1:327-331, 1994.

7. Anders GT: Is fluoroscopy needed for bronchosopic lung biopsy ?. J Bronchd 1:332-336 1994.

8. De Fenoyl O et al : Transbronchial biopsy without fluoroscope, A five year experience in out patients thorax. 44:956-959, 1989.

9. Anders GT et al : Transbronchial biopsy without fluoroscopy. chest 94:557-560, 1988.

10. Puar HS , et al. Bronchial and Transbronchial lung biopsy without fluoroscopy chest 71:303-306, 1985.