

مجله دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال ۶۰، شماره ۴، صفحات ۳۲۵ تا ۳۳۳، ۱۳۸۱

بررسی تراکم (دانسیتی) استخوان در گروه منتخبی از جامعه سالم ایرانی بیمارستان شریعتی - ۱۳۷۵

دکتر محمود اکبریان، دکتر فریدون دواچی، دکتر احمد سلیم زاده، دکتر فرهاد شهرام، دکتر فرهاد قریب دوست، دکتر عبدالهادی تاجی،
دکتر محمد پژوهی، دکتر احمد رضا جمشیدی

چکیده

مقدمه: استوپوروز یکی از جدی‌ترین مشکلاتی است که سلامتی افراد جوامع مختلف در جهان، خصوصاً زنان یائسه و افراد پیر را تهدید می‌کند. با توجه به زمینه‌های متفاوت رُنیک، نَزاد و جغرافیا، دانسیتی استخوانی می‌تواند در جوامع گوناگون مختلف باشد. در ایران نیز دانسیتی استخوان می‌تواند با دانسیتی استخوان در سایر نقاط دنیا متفاوت باشد و ضرورت دارد دانسیتی استخوان در ایران مشخص گردد.

مواد و روشها: این مطالعه به صورت توصیفی بر روی ۲۸۰ نفر از پرسنل سالم بیمارستان دکتر شریعتی تهران و بستگان آنها که بصورت تصادفی انتخاب و تراکم استخوان با تکنیک Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) در دو محل که شامل ستون فقرات کمری و گردان استخوان ران اندازه‌گیری شد و اطلاعات بدست آمده توسط Polynomial approximation (درجه سوم) مورد تجزیه قرار گرفت.

یافته‌ها: در زنان، دانسیتی استخوان در ستون فقرات کمری (L1-L4)، بیشترین مقدار آن در دهه چهارم (۹۹/۰ گرم بر سانتی‌متر مربع) و کمترین آن در دهه هفتم (۷۹/۰ گرم بر سانتی‌متر مربع) بود. دانسیتی گردان استخوان ران، بیشترین مقدار در دهه چهارم (۸۲/۰ گرم بر سانتی‌متر مربع) و کمترین آن در دهه هفتم (۱۶/۰ گرم بر سانتی‌متر مربع) بود. در مردان، دانسیتی فقرات کمری (L1-L4)، بیشترین مقدار در دهه سوم (۹۸/۰ گرم بر سانتی‌متر مربع) و کمترین آن (۷۴/۰ گرم بر سانتی‌متر مربع) در دهه دوم بود. در مورد دانسیتی گردان استخوان ران، بیشترین آن در دهه چهارم (۸۹/۰ گرم بر سانتی‌متر مربع) و کمترین آن در دهه هفتم (۷۵/۰ گرم بر سانتی‌متر مربع) بود.

نتیجه گیری و توصیه‌ها: بطور خلاصه، تراکم نسج استخوان در نمونه مورد بررسی، هم در ستون فقرات و هم در استخوان فمور و در هر دو جنس نسبت به استاندارهای مورد نظر Hologic پایین‌تر بود.

مقدمه

شکستگی توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) و انجمن بین‌المللی دانسیوتومتری بالینی (SCD) مورد توافق قرار گرفته است (۲۴، ۲۳) و کاهش BMD بین ۱-۲/۵ تا ۲/۵-۲/۰ (T score < -۲/۰) به عنوان استوپوروز تعریف شده است (۲۵، ۲۶). مشکلی که وجود دارد این می‌باشد که مقادیر استاندارد در نژادهای مختلف نسبت به جامعه استاندارد مشخص نگردیده است (۷). گزارش‌هایی مطرح نموده‌اند که BMD ستون، فقرات و فمور در سفید پوستان اروپا و آمریکا بسیار متابله است (۲۷، ۲۹). گزارش‌های دیگر تأثیر زمینه ژنتیک و تفاوت‌های جغرافیائی در کشورهای مختلف را نشان داده است (۲۷، ۳۰)، به عنوان مثال افراد آفریقائی تراکم استخوانی ۱۰ درصد بیشتر از افراد نژاد اروپائی دارند (۳۱). اطلاعات در مورد استاندارها در جوامع آسیانی محدود می‌باشد (۷). در ایران نیز در این خصوص مطالعه‌ای در دسترس نیست. در این پژوهش بررسی مقدماتی BMD با استفاده از DEXA در یک گروه محدود از جامعه ایرانی صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها

مطالعه موجود یک مطالعه توصیفی است که از طریق اندازه‌گیری BMD ستون، فقرات، کمری و استخوان فمور صورت گرفته است. حجم نمونه نهانی ۲۸۰ نفر مرد و زن سالم بودند که از بین ۱۶۰۰ نفر پرسنل بیمارستان دکتر شریعتی تهران و ۵۰۰۰ نفر از بستگان آنها بصورت تصادفی انتخاب شدند، و از آنجا که در میان این افراد همه جور آدم، از همه جای ایران وجود داشتند و از همه رده فرهنگی و اقتصادی بودند، شاید بتوان آنها را نمونه‌ای از افراد سالم ایرانی بحساب آورد. افراد مورد مطالعه بین ۱۰ تا ۸۴ سال سن داشتند که برای هر دهه سنی و هر جنس ۲۰ نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه در هر گروه به تفکیک در جدول شماره ۱ آورده شده است. پرسشنامه‌ای شامل وضعیت سلامت، رژیم غذایی مصرفی، داروهای، خونریزی ماهیانه، حاملگی‌ها و سبک زندگی در تمام بیماران تکمیل گردید. بیماران دچار بیماری‌های تأثیرگذار بر متابولیسم استخوان و نیز آنان که داروهای مؤثر بر متابولیسم کلسیم مصرف می‌نمودند، از مطالعه خارج شدند. اندازه‌گیری تراکم استخوان با استفاده از:

استوپوروز اصطلاحی است برای بیماری که به کاهش توده استخوانی در واحد حجم منجر می‌شود (۱) و تشدید شکنندگی استخوان و شناس شکستگی را در پی دارد (۲). این بیماری در کنار بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، دیابت و سرطان از مهم‌ترین اختلالات شایع در سراسر جهان می‌باشد (۳، ۴). در زنان مسن‌تر سفیدپوست (Caucasian) شناس شکستگی (Fracture risk) در استخوان لگن، ستون، فقرات یا انتهای ساعد در طی عمر تقریباً ۴۰ درصد می‌باشد (۵). در سال ۱۹۹۰ بیش از ۱/۵ میلیون شکستگی لگن گزارش شده است که این میزان تا سال ۲۰۰۰ چهار برابر خواهد شد (۶). طی دهه‌های گذشته شکستگی ناشی از پوکی استخوان مبنای تشخیص استوپوروز بود اما در حال حاضر تراکم استخوان (Bone Mass Density (BMD) مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری دانسیتی استخوان (BMD) در مقایسه با استفاده از مجموع شاخص‌های بالینی مثل سن، وزن، نژاد، مصرف دارو و سابقه فامیلی استوپوروز در پیش‌بینی شناس شکستگی مفیدتر می‌باشد (۷). دو توجیه علمی برای اهمیت تشخیص استوپوروز قبل از وقوع شکستگی وجود دارد. اول اینکه، ارتباط واضحی بین کاهش BMD و افزایش شناس شکستگی وجود دارد، به نحوی که به ازای هر یک انحراف معیار کاهش BMD نسبت به متوسط طبیعی جوانان، خطر نسبی شکستگی ۱/۵ تا ۲/۵ برابر بالا می‌رود (۸-۱۴) و دوم اینکه، با بروز اولین شکستگی ناشی از پوکی استخوان، شناس شکستگی دوم بسیار افزایش می‌یابد و این افزایش خطر در برخی مطالعات ۲۵ برابر گزارش شده است (۸).

طی دهه‌های اخیر روش‌های ارزیابی BMD بسیار پیشرف特 کرده است که از میان آنها Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) از دقت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. این روش می‌تواند بسیار دقیق‌تر از هر روش دیگری برای ارزیابی «شناس شکستگی» بکار رود (۱۵-۲۱). معمولاً تراکم استخوان در بک محل از بدن بیانگر تراکم استخوان سایر استخوان‌های بدن نمی‌باشد (۲۲) ولی از آنجا که ستون، فقرات، کمری و گردن فمور محل شکستگی‌های ناتوان کننده می‌باشند، جای مطلوب برای انجام BMD محسوب می‌شوند (۷). آستانه‌های تشخیصی استوپونی (Low Bone Mass) و استوپوروز در بیماران بدون

سوم) بررسی شد و در نهایت منحنی های بدست آمده با منحنی های استاندارد Hologic برای سفیدپوستان مقایسه گردید.

نتایج

کمترین تراکم استخوان ستون فقرات کمری در مردان در سنین زیر ۲۰ سال و بین ۶۰ تا ۷۰ سال مشاهده شد. شکل ۳ منحنی BMD ستون فقرات کمری در مردان را در مقایسه با منحنی استاندارد Hologic برای سفیدپوستان نشان می دهد. در مردان حداکثر توده استخوانی (PBM) در گردن فمور ۰/۷۳۸ گرم بر سانتی متر مربع در ۳۰ سالگی، برای تروکانتر ۰/۹۰۷ گرم بر سانتی متر مربع در ۲۸ سالگی، برای ایتر تروکانتر ۱/۲۱۹ ۰/۷۱۴ گرم بر سانتی متر مربع در ۳۴ سالگی، برای مثلث Ward ۱/۰۲۱ گرم بر سانتی متر مربع در ۲۳ سالگی و برای توئال فمور ۰/۹۲۱ گرم بر سانتی متر مربع در ۲۲ سالگی بود. مقادیر BMD به تفکیک گروه سنی و مقایسه با منحنی استاندارد در جدول شماره ۵ و شکل ۴ آورده شده است.

کمترین مقادیر BMD در گردن فمور در سنین زیر ۱۵ سال و بین ۶۰ تا ۷۰ سال مشاهده شد.

بطور کلی BMD هم در ستون فقرات کمری و هم در گردن فمور در زنان و مردان پایین تر از مقادیر استاندارد Hologic بود. این کاهش خصوصاً در سنین پایین تر از ۲۵ سال کاملاً واضح بود. در زنان متوسط تفاوت ۶/۵ درصد (CI=۲-۱۲) در ستون فقرات و ۵/۴ درصد (CI=۲-۱۶) در گردن فمور بود. این مقادیر در مردان به ترتیب ۱۳/۸ درصد (CI=۲-۳۶) و ۴/۶ درصد (CI=۱-۱۴) بود. افزایش BMD ستون فقرات کمری از سن ۶۸ سالگی در زنان و ۶۶ سالگی وجود داشت که بر خلاف شبیه نزولی منحنی BMD بود به نحوی که بعد از سن ۷۰ سالگی در زنان و پس از ۷۵ سالگی در مردان میزان BMD نسبت به منحنی مورد مقایسه بالاتر بود. این افزایش تراکم استخوان در گردن فمور مردان بالای ۷۰ سالگی نیز دیده شد.

Dual energy x-ray absorptiometry (Hologic QDR-1000+densitometry) ۱۰۰۰ انجام شد. تراکم استخوان در ستون فقرات کمری L1-L4, L3, L2, L1 و نیز گردن فمور، تروکانتر، ایتر تروکانتر و مثلث Ward و توئال فمور محاسبه گردید. کنترل کیفیت با استفاده از آزمون Phantom صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از Polynomial approximation (درجه

در گروه زنان که ۱۵۲ نفر بودند حداکثر تراکم استخوان (PBM) (Peak Bone Mass) یا (PBM) برای ۱۱۷ گرم بر سانتی متر مربع در ۳۰ سالگی، برای ۱/۰۲۶ L2 گرم بر سانتی متر مربع در ۳۱ سالگی، برای ۱/۰۴۹ L3 گرم بر سانتی متر مربع در ۳۱ سالگی، برای ۱/۰۳۵ L4 گرم بر سانتی متر مربع در ۳۲ سالگی و برای ۱/۰۲۰ L1-L4 گرم بر سانتی متر مربع در ۳۱ سالگی بود. جدول شماره ۲ میزان BMD در مهره های کمری در زنان در سنین زیر ۱۵ سال و بین ۶۰ تا ۷۰ سال مشاهده شد. شکل ۱ منحنی BMD ستون فقرات کمری در زنان را در مقایسه با منحنی استاندارد Hologic برای سفیدپوستان نشان می دهد.

در زنان حداکثر توده استخوانی (PBM) در گردن فمور ۰/۸۳۲ گرم بر سانتی متر مربع در ۳۴ سالگی، برای تروکانتر ۰/۶۸۰ گرم بر سانتی متر مربع در ۲۹ سالگی، برای ایتر تروکانتر ۱/۰۸۸ گرم بر سانتی متر مربع در ۳۷ سالگی، برای مثلث Ward ۰/۶۹۳ گرم بر سانتی متر مربع در ۲۷ سالگی و برای توئال فمور ۰/۹۳۶ گرم بر سانتی متر مربع در ۳۳ سالگی بود. مقادیر BMD به تفکیک گروه سنی و مقایسه با منحنی استاندارد در جدول شماره ۳ و شکل ۲ آورده شده است.

کمترین مقادیر BMD در گردن فمور در سنین زیر ۱۵ سال و بین ۶۰ تا ۷۵ سال مشاهده شد. در مردان که ۱۲۸ نفر بودند، در PBM برای L1 ۰/۹۴۵ گرم بر سانتی متر مربع در ۳۷ سالگی، برای L2 ۰/۹۹۷ گرم بر سانتی متر مربع در ۳۰ سالگی، برای L3 ۱/۰۰۸ گرم بر سانتی متر مربع در ۳۵ سالگی، برای L4 ۰/۹۸۷ گرم بر سانتی متر مربع در ۳۶ سالگی و برای L1-L4 ۰/۹۸۷ گرم بر سانتی متر مربع در ۳۶ سالگی بود. جدول شماره ۴ میزان BMD در مهره های کمری را در مردان به تفکیک گروه های سنی نشان می دهد.

جدول شماره ۱ - نخوه انتخاب نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس و گروه های سنی


مجموع	۸۹-۸۰	۷۹-۷۰	۶۹-۶۰	۵۹-۵۰	۴۹-۴۰	۳۹-۳۰	۲۹-۲۰	۱۹-۱۰	جنسیت
۱۵۲	+	۱۰	۲۱	۲۵	۳۶	۲۱	۱۷	۱۷	زن
۱۲۸	۱	۱۱	۱۲	۲۴	۱۹	۲۳	۱۸	۲۰	مرد
۲۸۰	۱	۲۶	۳۳	۴۹	۵۵	۴۴	۳۵	۳۷	مجموع

جدول شماره ۲ - مقادیر BMD ستون فقرات کمری در زنان مورد مطالعه به تفکیک گروه های سنی


L1 L4 (g/cm ²)	L4 (g/cm ²)	L3 (g/cm ²)	L2 (g/cm ²)	L1 (g/cm ²)	سن (سال)
+/۸۲۳	+/۸۲۰	+/۸۴۶	+/۸۳۱	+/۷۸۹	۱۰-۱۹
+/۹۸۳	+/۹۸۹	+/۱۱۰	+/۹۹۲	+/۹۱۱	۲۰-۲۹
+/۹۹۲	+/۱۰۲۶	+/۱۰۳۶	+/۱۰۰۸	+/۹۴۰	۳۰-۳۹
+/۹۲۸	+/۹۷۵	+/۹۷۴	+/۹۳۵	+/۸۶۳	۴۰-۴۹
+/۸۰۲	+/۸۹۶	+/۸۸۴	+/۸۴۰	+/۷۶۳	۵۰-۵۹
+/۷۹۹	+/۸۴۶	+/۸۳۲	+/۷۹۱	+/۷۰۰	۶۰-۶۹
+/۸۱۳	+/۸۵۵	+/۸۴۵	+/۸۱۸	+/۷۰۶	۷۰-۷۹

جدول شماره ۳ - مقادیر BMD سر فمور در زنان مورد مطالعه به تفکیک گروه های سنی


Ward (g/cm ²)	Total (g/cm ²)	Inter-Troch (g/cm ²)	Trochanter (g/cm ²)	Neck (g/cm ²)	سن (سال)
+/۶۲۲	+/۷۹۲	+/۸۷۵	+/۶۲۵	+/۷۱۴	۱۰-۱۹
+/۶۸۴	+/۹۰۰	+/۱۲۰	+/۶۷۰	+/۸۰۲	۲۰-۲۹
+/۶۷۰	+/۹۳۰	+/۱۰۷۹	+/۶۷۳	+/۸۲۶	۳۰-۳۹
+/۶۰۲	+/۸۹۹	+/۱۰۶۶	+/۶۴۴	+/۷۹۹	۴۰-۴۹
+/۵۰۷	+/۸۳۲	+/۱۰۰۰	+/۵۹۴	+/۷۷۷	۵۰-۵۹
+/۴۰۸	+/۷۰۳	+/۹۰۲	+/۵۳۷	+/۶۶۰	۶۰-۶۹
+/۳۴۶	+/۶۹۸	+/۸۲۰	+/۴۹۵	+/۶۰۱	۷۰-۷۹




شکل ۱- مقایسه BMD ستون فقرات کمری (L1-L4) زنان در جمعیت مطالعه با منحنی استاندارد Hologic برای سفیدپوستان



شکل ۲- مقایسه BMD گردن فمور زنان مطالعه با منحنی استاندارد Hologic برای سفیدپوستان



شکل ۳- مقایسه BMD ستون فقرات کمری (L1-L4) مردان در جمعیت مطالعه با منحنی استاندارد Hologic برای سفیدپوستان



شکل ۴- مقایسه BMD گردن فمور مردان مورد مطالعه با منحنی استاندارد Hologic برای سقیدبستان

جدول شماره ۴- مقادیر BMD ستون فقرات کمری در مردان مورد مطالعه به تفکیک گروه های سنی

L1 L4 (g/cm²)	L4 (g/cm²)	L3 (g/cm²)	L2 (g/cm²)	L1 (g/cm²)	سن (سال)
۰/۷۴۹	۰/۷۷۶	۰/۷۶۹	۰/۷۴۴	۰/۷۰۸	۱۰-۱۹
۰/۹۲۱	۰/۹۴۸	۰/۹۴۲	۰/۹۲۲	۰/۸۷۹	۲۰-۲۹
۰/۹۸۰	۱/۰۰۱	۰/۹۹۶	۰/۹۸۸	۰/۹۳۳	۳۰-۳۹
۰/۹۶۸	۰/۹۸۶	۰/۹۷۸	۰/۹۸۱	۰/۹۲۵	۴۰-۴۹
۰/۹۳۲	۰/۹۵۰	۰/۹۳۵	۰/۹۴۳	۰/۸۹۷	۵۰-۵۹
۰/۹۱۶	۰/۹۴۴	۰/۹۱۶	۰/۹۱۹	۰/۸۸۶	۶۰-۶۹
۰/۹۶۰	۱/۰۱۸	۰/۹۶۸	۰/۹۳۶	۰/۹۲۸	۷۰-۷۵

جدول شماره ۵- مقادیر BMD سر فمور در مردان مورد مطالعه به تفکیک گروه های سنی

Ward (g/cm²)	Total (g/cm²)	Inter-Troch (g/cm²)	Trochanter (g/cm²)	Neck (g/cm²)	سن (سال)
۰/۶۸۲	۰/۸۶۱	۰/۹۶۰	۰/۶۹۱	۰/۷۹۷	۱۰-۱۹
۰/۷۰۸	۰/۹۸۸	۱/۱۶۲	۰/۷۳۱	۰/۸۸۹	۲۰-۲۹
۰/۶۷۷	۱/۰۱۰	۱/۲۱۰	۰/۷۳۲	۰/۸۹۹	۳۰-۳۹
۰/۶۱۳	۰/۹۸۲	۱/۱۷۰	۰/۷۱۰	۰/۸۰۲	۴۰-۴۹
۰/۵۴۳	۰/۹۳۲	۱/۱۰۲	۰/۶۸۲	۰/۷۹۰	۵۰-۵۹
۰/۴۹۱	۰/۹۰۵	۱/۰۶۷	۰/۶۶۶	۰/۷۵۸	۶۰-۶۹
۰/۴۸۳	۰/۹۴۲	۱/۱۲۵	۰/۶۸۰	۰/۷۷۵	۷۰-۷۵

بود که این موضوع با توجه به بالا بودن شیوع استتوآرتریت در این سنین به نظر می‌رسد یک افزایش کاذب باشد. لذا قطعاً در تفسیر بالینی باید با دقت بیشتر از عدم تشخیص موارد استتوپوروز در این افراد جلوگیری کرد. این نکته در بیماران جوانتری که دچار بیماری‌های روماتولوژی همراه با آرتروپاتی‌های ستون فقرات هستند نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد (۲۵). پیشنهاد شده است که در افراد مسن، انداره‌گیری‌های مربوط به استخوان فمور به عنوان معیار تشخیصی استتوپوروز مورد استفاده قرار گیرد (۳۲). قابل ذکر است که در این مطالعه افزایش BMD در سنین پیری در گردن فمور در زنان وجود نداشت در حالی که در مردان افزایش بارز بود (شکل ۲ و ۴).

به رغم بالاتر بودن BMD در مردان نسبت به زنان که در اکثر مطالعات تأیید شده است، در پژوهش حاضر مشاهده شد که BMD ستون فقرات کمری در زنان جوان‌تر نسبت به مردان بالاتر می‌باشد. این تفاوت مهم مسلماً در مطالعات با حجم نمونه بیشتر می‌باشد. این تفاوت می‌تواند عواملی مانند قدرت اندام، اندام‌گذاری، اندام‌گذاری و اندام‌گذاری که در زنان بیشتر است، باشد. این مطالعه نشان داد که اندام‌گذاری که در زنان بیشتر است، به گونه‌ای که نسبت آن در زنان نسبت به مردان ۲ به یک می‌باشد (۸).

به عنوان نتیجه‌گیری باید بیان نمود که این پژوهش پایین‌تر بودن تراکم استخوان در جامعه مورد پژوهش را (که تا حدودی می‌تواند بیانگر وضعیت کلی جامعه ایرانی باشد) نشان داد که این مسئله توجه خاص جهت برنامه‌ریزی‌های تحقیقاتی، آموزشی و استتوپوروز در مبتلایان، راه‌کارهای علمی کاهش میزان شکستگی‌های ناتوان کننده در افراد مسن می‌باشد.

قدرتانی و تشکر

بدین وسیله از معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خاطر تأمین مخارج این پژوهش تشکر بعمل می‌آید.

بحث

همانگونه که قبلاً بیان شد تشخیص استتوپوروز قبل از وقوع شکستگی اهمیت فراوانی دارد. برای تفسیر دقیق BMD نیاز به اطلاعات استاندارد بر حسب منطقه جغرافیائی و نژاد می‌باشد. عدم وجود اطلاعات کافی برای ایجاد استاندارد در گروه‌های نژادی مختلف، تفسیر دسته‌بندی‌های استتوپنی و استتوپوروز را گاه غیر قابل اعتماد می‌سازد (۷). با توجه به اطلاعات حاصله در پژوهش حاضر، تفاوت بین مقادیر استاندارد Hologic در افراد سفیدپوست با مقادیر BMD در جامعه مورد مطالعه ما که از نظر اقتصادی-اجتماعی تا حدود زیادی بیانگر جامعه ایرانی می‌باشد، اهمیت تعیین استاندارهای محلی برای تشخیص استتوپنی و استتوپوروز و میزان شناس شکستگی را واضح می‌سازد. از سوی دیگر پایین‌تر بودن BMD در جامعه مانع نسبت به استاندارد Hologic، تعدیل عوامل خطرساز استتوپوروز را ضروری می‌کند. نتایج مطالعه نشان داد BMD خصوصاً در سنین زیر ۲۵ سال به صورت واضح پایین می‌باشد. این مسئله تا حدودی با دقت در عوامل تغذیه‌ای قابل توجیه می‌باشد چرا که به نظر می‌رسد طی ۲۰ سال اخیر استفاده از مواد لبی و غذاهای حاوی کلسیم کمتر مورد توجه عموم مردم و نیز مستویین امر بوده است. اما بررسی دقیق عوامل مؤثر مسلماً نیازمند مطالعات وسیع‌تر می‌باشد. از طرفی ورود به دهه هفتم زندگی با افزایش BMD (بر خلاف استاندارد مورد مقایسه) همراه درمانی را در سطح مورد تأکید قرار دهد. آموزش مردم در جهت مصرف مواد غذائی حتی از کلسیم و پرهیز از مواد مانع جذب کلسیم خصوصاً در کودکان و جوانان، تعدیل سبک زندگی، افزایش فعالیت بدنی، اقدامات پیشگیری در زنان یانسه و درمان

منابع

1. Krane SM, Halick MF. Metabolic bone disease. In: Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ et al (eds). *Harrison's principles of Internal medicine*. New York: McGraw, 14 th edition, 1998; p: 2247-53.
2. Consensus development conference: Prophylaxis and treatment of osteoporosis. *Am J Med* 1993; 94: 646.
3. Riggs BL, Melton LJIII. Preface of osteoporosis. In: Riggs BL, Melton LJIII. *Osteoporosis*. Philadelphia: Lippincot, 2 nd edition 1995:234-36
4. Riggs BL, Melton LJIII. Involutional osteoporosis. *N Engl J Med* 1986; 314: 1676-86.
5. Melton LJIII, Christiles EA, Cooper C et al. Perspective: How many women have osteoporosis? *J Bone Res* 1992; 7: 1005.
6. Cooper C, Campion G, Melton LJIII. Hip fracture in the elderly: A world-wide projection. *Osteoporosis Int* 1992; 2: 285.
7. Sowers M. Clinical epidemiology and osteoporosis measures and their interpretation. *Endocrinol Metab clin Noth Am* 1997; 26(1): 219-31.
8. Wasnich RD. Fracture prediction with bone mass measurement. In: Genant HK (editor). *Osteoporosis Update*. Berkeley CA: University press, 1987; p: 95-101.
9. Melton LJIII, Atkinson EG, O'Fallon WM, Wahner HW, Riggs BL. Long-term fracture risk prediction with bone mineral measurements made at various skeletal sites. *J Bone Miner Res* 1991; 6(S1):S136.
10. Ross PD, Davis JW, Epstein RS, Wasnich RD. Pre-existing fractures and bone mass predict vertebral fracture incidence in women. *Ann Intern Med* 1991; 114: 919-23.
11. Hui SL, Slemenda CW, Johnston CC, JR. Age and bone mass as predictors of fracture in a prospective study. *J Clin Invest* 1988; 81: 1804-9.
12. Cummings SR, Black DM, Nevitt MC et al. Bone density at various sites for prediction of hip fractures. *Lancet* 1993; 341: 72-5.
13. Ross PD, Genent HK, Davis JW, Miller PD, Wasnich RD. Prediction vertebral fracture incidence from prevalent fractures and bone density among non-black, osteoporotic women. *Osteoporosis Int* 1993; 3: 120-26.
14. Wasnich RD, Ross PD, Davis JW, Vogel JM. A comparison of single and multi-site BMC measurements for assessment of spine fracture probability. *J Nucl Med* 1989; 30: 1166-71.
15. Lane NE, Jergas M, Genent HK. Osteoporosis and bone mineral assessment. In: Koopman WJ. *Arthritis and allied condition*. Philadelphia: William and Wilkins, 1997; p: 153-71.
16. Mazess R, Collick B, Trempe J, Barden H, Hanson J. Performance evaluation of a dual energy x-ray bone densitometer. *Calcif Tissue Int* 1989; 44: 228-32.
17. Mazess R, Barden HS. Measurement of bone by dual-photon absorptiometry (DPA) and dual energy x-ray bone densitometry (DEXA). *Ann Chir Gynecol* 1988; 77: 197-203.
18. Wahner HW, Dunn WL, Brown ML, Morin RL, Riggs BL. Comparison of dual-energy x-ray bone densitometry and dual-photon absorptiometry for bone mineral measurements of the lumbar spine. *Myo Clin Proc* 1988; 63: 1075-84.
19. Struse L, Bracker M, Saltman P, Sartoris D, Kerr E. A comparison of dual-energy x-ray bone densitometry and dual-photon absorptiometry of the lumbar spine in postmenopausal women. *Calcif Tissue Int* 1989; 45: 288-91.
20. Sartoris KJ, Resnik D. Dual-energy radiographic absorptiometry for bone densitometry. Current status and perspective. *AJR* 1989; 152-241.
21. Genant HK, Steiger P, Glueer CC, Block JE. Quantitative bone mineral assessment in osteoporosis. *Eur J Clin Invest* 1989; 16: A86.
22. Morita R, Yamamoto I, Takada M et al. Recent development and clinical application of bone mineral measurements. *Nippon Rinsho* 1998; 56(6): 1458-63.
23. Kanis JA, Melton LJIII, Christainsen C, Johnston CC, Khaltaer N. The diagnosis of osteoporosis. *J Bone Miner Res* 1994; 9: 1137-41.
24. Miller PD. Guidelines for the clinical utilization of bone mass measurement in the adult population. *Calcif Tissue Int* 1995; 57: 251-52.
25. Rosen CJ. *Osteoporosis: Diagnostic and therapeutic principles*. Totowa, New Jersey: Humana Press, 1996 ; 219-229.

26. Korczyk P, Hoszowski K, Bienkowska R, Talajko A, Lorence R. Difficulties in the interpretation of bone densitometric measurements. *Przegl Lek* 1997; 54(4): 250-51, 254-55.
27. Kehmann R, Wapniaz M, Randerath O et al. Dual-energy x-ray absorptiometry at the lumbar spine in German men and women: Across-Sectional study. *Calcif Tissue Int* 1995; 56(5): 350-54.
28. Laitinen K, Valimaki M, Keto P. Bone mineral density measured by dual-energy x-ray absorptiometry in healthy finish woman. *Calcif Tissue Int* 1991; 48: 224-31.
29. Ryan PJ, Spector TP, Black GM, Doyle DV, Fogelman I. A comparison of reference bone mineral density measurements derived from two sources: Referred and population based. *Br Radiol* 1993; 66: 1138-41.
30. Liel Y, Edwards J, Spicer KM, Gordon L, Bell NH. The defect of race and body habitus on bone mineral density of radius, hip and spine in premenopausal women. *Clin Endocrinol Metab* 1988; 66: 1247-50.
31. Solomon L. Bone density in aging Caucasian and African population. *Lancet* 1979; 2: 1826.
32. Black DM, Bauer DC, Lu Y, Tabor H, Genant HK, Cummings SR. Should BMD measured at multiple sites to predict fracture risk in elderly women? *J Bone Res* 1995; 10: S 140.