

مطالعه تغییرات مرفولوژیکی شاخ رحم موش سوری وابسته به مرفین در دوران قبل از بلوغ و طی بلوغ

* دکتر محمد شادخواست (آناتومیست)، دکتر زهرا طوطیان (استادیار)^{*}، دکتر سیمین فاضلی‌پور (استادیار)^{**}، دکتر سعید بکایی (دانشیز)^{**}

* بخش تشريح، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

** بخش اپیدمیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

*** بخش تشريح، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد تهران

چکیده

مقدمه: مرفین مهمترین آلکالوئید تریاک است که به مقدار ۱۰٪ در تریاک یافت می‌شود و به دو فرم مرفین سولفات و مرفین هیدروکلراید وجود دارد. در این مطالعه تغییرات مرفولوژیکی رحم موش سوری در اثر مصرف خوراکی مرفین مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روشها: موش‌های سوری ماده به دنبال افزایش تدریجی مرفین در آب آشامیدنی (۰/۰۱، ۰/۰۱) میلی‌گرم / میلی‌لیتر به مرفین وابسته شدند. موش‌های سوری ماده در دو گروه سنی قبل از بلوغ و طی بلوغ طبقه‌بندی گردیدند. هر گروه سنی به مدت ۲۱ روز مرفین دریافت داشتند. پس از پایان دوره، موش‌ها را وزن کرده، سپس بیهوش نموده و رحم از نظر طول و عرض و خصوصیات ظاهری مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه مشخص گردید که از نظر وزن موش، طول و عرض شاخ رحم بین گروه‌های تجربی و گروه کنترل اختلاف معنی‌داری وجود دارد ($P < 0.01$) و تغییرات مرفولوژیکی مانند کم‌خونی، نازکی، شکننده شدن جدار رحم و نخنی شکل شدن شاخ رحم مشهود بود.

نتیجه گیری و توصیه ها: در این بررسی مشخص گردید که مرفین به عنوان یک ماده مخدّر میتواند در میزان وزن و رشد و نمو اندام تناسلی مؤثر واقع شود و در عملکرد رحم تأثیر بگذارد.

بحرانی در بعد از ظهر مرحله پرواستروس باعث جلوگیری از تخمک‌گذاری در صبح روز بعد می‌گردد (۱). در مطالعات بعدی Sawyer نشان داد که این عمل فقط توسط تحریک الکتریکی ناحیه Median eminence ساقه مغزی برطرف می‌گردد (۲). وی نتیجه گرفت که مرفین باعث جلوگیری از تحریکات نوروژنی در هیپوتalamوس شده که باعث جلوگیری از ترشح LH و FSH می‌گردد. پژوهش‌های مختلفی در زمینه

مقدمه

عمل اپیونیدها بر روی عملکرد دستگاه تناسلی در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. در دو دهه قبل Sawyer و Barroclough دریافتند که تجویز یک دوز مرفین سولفات 50 mg/kg به موش صحرابی درست قبل از دوره



۲- گروه سنی ۶ هفتگی (مرحله بلوغ) که تا ۹ هفتگی از مرفين استفاده کرده‌اند.

برای هر یک از گروه‌های سنی یک گروه کنترل و یک گروه شم نیز از همان جنس و سن فراهم گردید، تعداد موش‌ها برای گروه کنترل و شم ۶ سر انتخاب گردید. گروه کنترل از آب لوله‌کشی بدون مرفين استفاده نمودند. گروه شم از آب لوله‌کشی + شکر استفاده نمودند.

در گروه تجربی، مرفين با ۲ دوز با غلظت mg/ml ۰/۱ و mg/ml ۰/۰۱ به آب مصرفی اضافه گردید و برای از بین بردن مزه تلخ آن از شکر استفاده گردید. میزان مصرف آب برای هر موش روزانه ml ۵ معین گردید.

مرفين مصرفی برای روزهای اول و دوم با غلظت mg/ml ۰/۱ و mg/ml ۰/۰۱ برای روز سوم و چهارم mg/ml ۰/۲ و mg/ml ۰/۰۲ برای روز پنجم و ششم mg/ml ۰/۳ و mg/ml ۰/۰۳، برای روز هفتم تا آخر دوره mg/ml ۰/۴ و mg/ml ۰/۰۴ به آب اضافه گردید. پس از پایان دوره ابتدا با تزریق داخل پریتونومی نالوکسان با دیدن تشنج و کشیدگی حیوان بر روی زمین، گاهی اسهال و بی‌قراری از وابستگی آنها به مرفين مطمئن سپس وزن موش‌ها اندازه‌گیری و توسط کلروفرم بی‌هوش گردیدند، پس از باز کردن حفره شکمی دستگاه گوارش را جدا کرده و محل رحم مشخص گردید. دستگاه تناسلی ماده از یک جفت تخمدان بسیار کوچک در پشت کلیه‌ها به همراه دو شاخ رحم بسیار مشخص و یک بدنه بسیار کوچک تشکیل شده بود. طول شاخ رحم توسط خطکش مدرج ظرفی اندازه‌گیری شده، پس از بررسی خصوصیات ظاهری شاخ رحم نمونه‌ها را توسط سرم فیزیولوژیک سنتشتو داده در داخل فرمالین ۱۰٪ قرار گرفت. عرض شاخ رحم در ناحیه میانی، توسط گراتیکول در زیر لوب اندازه‌گیری شد. برای بررسی و مطالعه تغییرات کمی و مقایسه گروه‌های کنترل و شم با گروه‌های تجربی از آنالیز واریانس یکطرفه با روش تکمیلی Tukey (Post Hoc) و استفاده گردید.

ناهنجاری‌های ناشی از مواد مخدر بر روی دستگاه تناسلی در حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفته و بعضی نتایج مشابهی را ارائه می‌دهند. Ciociola و همکاران در سال ۱۹۹۳، اثرات تراوتونیک مرفين بر روی جنبین موش صحرایی را مورد مطالعه قرار دادند (۳). در سال ۱۹۸۹ Lakhman نشان داد که مرفين آزادسازی LH را مهار کرده و کاهش وزن تخمدان را باعث می‌شود. او نشان داد که کاهش وزن تخمدان می‌تواند اثر مستقیمی بر فعالیت استروئیدی تخمدان داشته باشد و کاهش میزان اثر LH در اثر مرفين در شکل‌گیری جسم زرد و تکوین فولیکول‌ها مؤثر می‌باشد (۱). مطالعات گذشته نشان داد که مصرف مرفين در موش صحرایی بالغ می‌تواند باعث تغییراتی از نظر شکل ظاهری در شاخ رحم گردد (۴). برای مطالعه دقیق تغییرات شاخ رحم در مراحل مختلف رشد زندگی در موش سوری، از مرفين سولفات به صورت خالص استفاده شد تا بتوان اثرات آن را بر روی رحم که مهم‌ترین ساختار تناسلی در رابطه با باروری می‌باشد نشان داد.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه ۱۴۴ سر موش ماده سالم نژاد Balb/c را از مؤسسه سرم‌سازی حصارک کرج تهیه و به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی انتقال و مورد استفاده قرار گرفت. قبل از قرار دادن موش‌ها در قفس‌های مخصوص ابتدا وزن آنها مشخص گردید، (توسط ترازوی الکترونیکی). سپس به منظور سهولت در کار و شناسایی، برای هر کدام یک شناسنامه تهیه گردید و جهت تشخیص موش‌ها در مرحله نهایی، توسط فیکساتیو بوئن علامت‌گذاری گردید. غذای مورد استفاده موش‌ها از شرکت خوراک دام و طیور پارس تهیه گردید موش‌ها در درجه حرارت 21 ± 3 درجه سانتیگراد و رطوبت ۴۰-۵۵ درصد نگهداری شدند. جهت مطالعه از موش‌های سوری در دو گروه سنی با دو غلظت مرفين استفاده گردید، برای هر کدام از غلظت‌های مرفين استفاده گردید.

۱- گروه سنی ۳ هفتگی (قبل از بلوغ) که تا ۶ هفتگی از مرفين استفاده کرده‌اند.

گروه تجربی با غلظت 0.01 mg/ml و گروههای شم و کنترل اختلاف به شدت معنی دار بود. در مورد گروه تجربی با غلظت 0.1 mg/ml بین این گروه و گروههای کنترل و شم اختلاف به شدت معنی دار بود. در مورد گروه کنترل (آب) در مورد طول شاخ رحم اختلاف معنی دار نبود.

نتائج

در مطالعه انجام شده در گروه سنی ۶-۹ هفتگی بین گروههای مورد آزمایش که مرغین خالص دریافت داشتند، از لحاظ وزن موشها، اختلاف به شدت معنی دار ($P < 0.01$) و از نظر طول و عرض شاخ رحم اختلاف معنی دار نبود. اما بین

۱-۲-۳-۴ آناتومی مخاطر و میانزیعه های طوا شاخه ایمیش، سودی بر حسب کروهای مختلف تیمار و شاهد در بخش آناتومی

دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱ کار دامن‌شک


آماره‌های متغیرهای مورد مطالعه	نوع تیمار یا شاهد	تعداد نمونه	خطای معیار تعمیانگین	عرض شاخ رحم	طول شاخ رحم
۰/۰۱ mg/ml	۶-۹ هفته و مرفین	۲۵ (۱/۳۹±۰/۰۶)	۲۰ (۰/۹۲±۰/۰۶)	۲۰ (۲۱/۸۸±۰/۴۱)	خطای معیار تعمیانگین
۰/۱ mg/ml	۶-۹ هفته و مرفین	۲۵ (۱/۳۸±۰/۰۴)	۲۰ (۰/۹۳±۰/۰۷)	۲۵ (۲۳/۷۷±۰/۰۱)	خطای معیار تعمیانگین
۰/۹	۶-۹ هفته و آب و شکر	۶ (۱/۷۰±۰/۰۰)	۶ (۱/۹۴±۰/۱۲)	۶ (۲۹/۰۰±۸۹)	تعداد نمونه
۰/۹	۶-۹ هفته و آب	۶ (۱/۸۲±۰/۱۷)	۶ (۱/۸۰±۰/۱۰)	۶ (۳۱/۳۳±۰/۷۱)	عرض شاخ رحم
۰/۰۱ mg/ml	۳-۶ هفته و مرفین	۲۸ (۱/۳۰±۰/۰۶)	۲۸ (۰/۶۰±۰/۰۳)	۲۸ (۱۹/۵۰±۰/۳۲)	طول شاخ رحم
۰/۱ mg/ml	۳-۶ هفته و مرفین	۲۶ (۱/۲۴±۰/۰۲)	۲۶ (۰/۷۷±۰/۰۲)	۲۶ (۱۹/۸۸±۰/۴۹)	خطای معیار تعمیانگین
۰/۰۱ mg/ml	۳-۶ هفت و آب و شکر	۶ (۱/۴۷±۰/۰۲)	۶ (۱/۰۸±۰/۰۸)	۶ (۲۲/۰۰±۱/۱۳)	خطای معیار تعمیانگین
۰/۰۱ mg/ml	۳-۶ هفت و آب	۶ (۱/۰۷±۰/۰۵)	۶ (۰/۰۴±۰/۰۲)	۶ (۲۰/۷۷±۰/۱۲)	تعداد نمونه

بحث


با توجه به اینکه مرفین به دو شکل خوراکی و تزریقی مورد استفاده قرار می‌گیرد (۵) در این مطالعه اثر وابستگی به مرفین خوراکی بر روی وزن موش، طول و عرض و شکل ظاهری رحم در موش سوری نژاد Balb/c معتاد در دوره قبل از بلوغ و طی بلوغ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، مقدار مرفین مصرفی در این پژوهش $0/01\text{ mg/ml}$ و $0/1\text{ mg/ml}$ بود. در مطالعات قبلی محققین نشان دادند که مصرف مرفین می‌تواند باعث کاهش وزن گردد (۶,۷). نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که در مقایسه وزن در گروه‌هایی که قبل از بلوغ از مرفین خوراکی با دو غلظت $0/01$ و $0/01\text{ mg/ml}$ استفاده کرده بودند بین گروه شم و کترل با یکدیگر و بین این دو گروه با گروه‌های تجربی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (جدول ۱).

در مورد گروه سنی ۳-۶ هفتگی بین گروههای تجربی که مرفین دریافت می‌داشتند و بین گروه تجربی با غلظت mg/ml ۰/۰۱ و گروه کترول (آب) در مورد وزن و طول شاخ رحم اختلاف معنی‌داری وجود نداشت اما در مورد عرض شاخ رحم اختلاف معنی‌دار بود. در مقایسه گروه تجربی با غلظت mg/ml ۰/۰۱ با گروه شم (آب + شکر) در مورد طول شاخ رحم و وزن موش، اختلاف معنی‌دار نبود ولی در مورد عرض شاخ رحم اختلاف معنی‌داری وجود داشت.

در مقایسه گروه تجربی با غلظت $0/1 \text{ mg/ml}$ با گروه شم در مقایسه طول و عرض شاخ رحم اختلاف معنی دار ولی در مورد وزن اختلاف معنی دار نبود. در مقایسه گروه تجربی $0/1 \text{ mg/ml}$ با گروه شم در مقایسه طول و عرض شاخ رحم اختلاف معنی دار ولی در مورد وزن اختلاف معنی دار نبود. نداشت.



تصویر شماره ۱-A-شاخ رحم در موس های ۶ هفته (گروه شم)




تصویر شماره ۲-A-شاخ رحم در موس های ۶ هفته (گروه کنترل)




تصویر شماره ۳-B-شاخ رحم در موس های ۶ هفته (گروه تیمار با غلظت ۰/۰۱ mg/ml مرفين)




تصویر شماره ۴-B-شاخ رحم در موش‌های ۶ هفته (گروه تیمار با غلظت ۱۰٪ مرفین)




تصویر شماره ۵-شاخ رحم در موش‌های ۹ هفته (گروه شم)



تصویر شماره ۶-A-شاخ رحم در موش‌های ۹ هفته (گروه کنترل)



تصویر شماره ۷-B- شاخ رحم در موش های ۹ هفته (گروه بیمار با غلظت 0.01 mg/ml مرفین)



تصویر شماره ۸- شاخ رحم در موش های ۹ هفته (گروه بیمار با غلظت 0.01 mg/ml مرفین)

A: شاخ رحم طبیعی و عروق آن فعال است.

B: شاخ رحم باریک و کم خون است.

درشتمنای تصاویر(ضریدر ۱۰)

معنی دار بود (گروه 0.01 mg/ml و گروه 0.01 mg/ml مرفین در نمودار ۱).

این نتایج نشان دهنده این است که مصرف مرفین در دوران بلوغ می تواند بر کاهش وزن حیوان اثرات قابل توجهی را بر جای بگذارد، بعلاوه در گروه تجربی که میزان مصرف مرفین در آنها 0.01 mg/ml بوده کاهش وزن نسبت به گروه هایی که میزان مصرف مرفین در آنها 0.01 mg/ml

این نتایج نشان داد که به دلیل رشد کمتر بدن و یا سیر بطیشی رشد در دوران قبل از بلوغ مرفین نتوانسته اثرات کمی زیادی در حیوان برجای بگذارد. بررسی وزن حیوان در گروه طی بلوغ در گروه های مختلف کنترل، شم و تجربی و مقایسه آنها با هم نشان داد که وزن حیوان در گروه های کنترل و شم تفاوت معنی دار را نشان نمی دهد در صورتی که در مقایسه وزن حیوان بین گروه کنترل و شم با گروه های تجربی اختلاف


در مقایسه طول رحم در گروههایی که طی بلوغ از مر芬 استفاده کرده بودند، بین گروههای کنترل با شم تفاوت معنی دار نبود، ولی در مقایسه طول رحم بین گروههای کنترل و شم با گروههای تجربی که از مر芬 به میزان $0,1 \text{ mg/ml}$ و $0,01 \text{ mg/ml}$ استفاده کرده بودند تفاوت معنی داری مشاهده گردید ($P<0,01$). این نتایج نشان داد در طی دوران بلوغ که اندام های تناسلی بیشترین رشد را نسبت به سایر اندام ها دارا می باشند به دلیل اثر دارو بر محور هیپوتالاموس، هیپوفیز، تخدمان و رحم و اثرات هورمون های تخدمان در ابعاد رحم، کاهش در اندازه رحم کاملاً محسوس بود (جدول ۱)، بعلاوه می توان نتیجه گرفت که مر芬 موجب کاهش هورمون های گنادوتropین و در نتیجه کاهش هورمون های تخدمان شده، و کاهش هورمون ها توانسته است در اندازه رحم از نظر طول مؤثر واقع شود (۸).

در بررسی عرض شاخ رحم در گروههایی که قبل از بلوغ مطالعه شدند، بین گروه کنترل و شم تفاوت معنی داری مشاهده نشد، ولی در مقایسه بین گروه کنترل و شم با گروههای تجربی با هر دو غلظت مر芬 $0,1 \text{ mg/ml}$ و $0,01 \text{ mg/ml}$ اختلاف معنی دار بود ($P<0,01$) و در مقایسه دو گروه تجربی با یکدیگر اختلاف معنی داری مشاهده نشد. این نتایج نشان دهنده این است که کاهش عرض رحم که ارتباط مستقیم با کاهش ضخامت دیواره رحم دارد، رشد خود را از دوران قبل از بلوغ آغاز می کند. چنانچه کوکائین نیز با تنگ کردن عروق باعث کاهش خونرسانی و در نتیجه کاهش رشد رحم می گردد (۹).


مطالعه عرض رحم در گروههایی که طی بلوغ مورد آزمایش قرار گرفتند در مقایسه بین گروههای کنترل و شم تفاوت معنی دار نبود، ولی در گروههای کنترل و شم با گروههای تجربی که مر芬 را با دو غلظت $0,1 \text{ mg/ml}$ و $0,01 \text{ mg/ml}$ مصرف کرده بودند تفاوت به شدت معنی دار بود ($P<0,01$). و بین دو گروه تجربی اختلاف معنی دار وجود نداشت (جدول ۱ و نمودار ۳). زیرا رشد معنی داری وجود نداشت (جدول ۱ و نمودار ۳). زیرا رشد دیواره رحم مستقیماً تحت کنترل هورمون های جنسی است و مر芬 توансه است با تأثیر بر محور هیپوتالاموس - هیپوفیز - تخدمان و تأثیر بر میزان هورمون های جنسی میزان رشد دیواره رحم را کاهش دهد (۸).

بیشتر است و تفاوت بین آنها به شدت معنی دار است ($P<0,01$). این نتایج نشان دهنده آن است که در دوران بلوغ که جاندار دارای رشد بیشتری است، اثرات مر芬 بر کاهش رشد بیشتر است و هر قدر میزان مصرف آن افزایش یابد آهنگ کاهش رشد، محسوس تر خواهد بود.

در مقایسه طول رحم در گروههایی که قبل از بلوغ مورد مطالعه قرار گرفتند بین گروههای کنترل و شم و نیز در مقایسه طول رحم بین گروههای کنترل و شم با گروههای تجربی که از مر芬 به میزان $0,1 \text{ mg/ml}$ استفاده کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل و شم تفاوت قابل توجه و معنی دار وجود داشت ($P<0,01$).



نمودار شماره ۱- تغییرات وزن در گروههای سنی مورد نظر




نمودار شماره ۲- تغییرات طول شاخ رحم در گروههای سنی مورد نظر

این نتایج نشان دهنده این است که قبل از بلوغ که رحم رشد محسوسی نداشته، مقدار کم مصرف مر芬 نتوانسته بر رفع م مؤثر واقع شود، ولی با افزایش میزان مصرف مر芬 به تدریج کاهش طول رحم دیده شد (جدول ۱ و نمودار ۲).

نتایج نشان داد که مرفین مانند سایر مواد مخدر می‌تواند باعث تنگ شدن عروق خونی، کاهش خونرسانی به رحم و در نتیجه رنگ پریدگی آن گردد (۹،۱۰،۱۱).


در بررسی ضخامت دیواره رحم در گروه‌های تجربی مورد مطالعه و گروه‌های کنترل و شم بین دو گروه کنترل و شم تفاوتی مشاهده نشد، در صورتی که در گروه‌های تجربی ضخامت رحم کم و جدار آن خوابیده و شکننده بود و از نظر ظاهر اصطلاحاً نخی شکل بود (۴).

در این بررسی مشخص گردید که مرفین به عنوان یک ماده مخدر می‌تواند در میزان وزن و رشد و نمو اندام تناسلی مؤثر واقع شود که احتمالاً از طریق محور هیپوталاموس، هیپوفیز تخمدان در دوران بلوغ اعمال می‌شود. ضایعات مختلف در این زمینه دلالت بر این دارد که بیشترین تأثیر مواد مخدر در دوران رشد بر اندام‌های تناسلی است. با توجه به اینکه در رشد و نمو اندام‌های تناسلی هورمون‌ها نقش مؤثر را دارا می‌باشند هر ماده‌ایکه بتواند رشد هورمون‌ها را مهار کند یا افزایش دهد، رشد و نمو اندام‌های تناسلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.



نمودار شماره ۳- تغییرات عرض شاخ رحم در گروه‌های سنی مورد نظر

بررسی مطالعه شکل ظاهری رحم در هر دو گروه تجربی (گروه قبل از بلوغ و طی بلوغ) که توسط مرفین تیمار شده بودند نشان داد که مرفین می‌تواند بروی خونرسانی رحم اختلال ایجاد کند زیرا در مطالعه گروه‌های کنترل و شم تفاوتی در ظاهر رحم وجود نداشت و رحم به طور طبیعی پرخون بود، در صورتی که در گروه‌های تجربی رحم رنگ پریده و کم خون مشاهده گردید که می‌تواند به علت عدم خونرسانی کافی به این اندام در اثر مصرف مرفین باشد. به علاوه این



منابع

1. Lakman, S-Singh, S. Kaur, G. Morphine induced inhibition of ovulation in normally cycling. *Physiology and Behavior* 1989; 46: 467-471.
2. Pang C. N, Zimmermann E and Sawyrt C.H. Morphine inhibition of preovulatory surges of plasma luteinizing hormone and follicle stimulating hormone in the rat. *Endocrinology* 1977; 101: 1726-1732.
3. Ciociola A.A, Gautieri R.F. Evaluation of the teratogenicity of morphine sulphate via a miniature implantable pump. *J Pharmac Sci* 1983; 72(7): 742-745.
4. Fichtenberg D.G. Study of experimental habituation of morphine, ODCCP- Bulletin on Narcotics 1951; P: 19-42.
5. لامیجانی ش، سخنور آ. بررسی جنین والدین معتقد به مرفین در موش سوری. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش تکوینی از دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶.
6. Yilmaz B, Konar V, Kutlu S, Gezen M. R, Kelestimur H. Influence of chronic morphine exposure on body and testicular weights in the developing male rat. *Archives of andrology* 1996; 43: 189-196.
7. Aufrere Le-Bourhis B. Effect of alcohol intoxication during pregnancy on fetal and placental weight: experimental studies. *Alcohol Alchol* 1987; 22(4): 401-407.
8. Siddiqui A, Haq S, Shah B. H. Perinatal exposure to morphine disrupts brain norepinephrine, ovarian cyclicity, and sexual receptivity in rats. *Pharmacol Biochem* 1997; 58(1): 243-248.
9. Webster W. S. Brown-Woodman P. D. C. Cocaine as a cause of congenital malformation of vascular. *Teratology* 1990; 41: 689-697.
10. Moor T. R. J, Sorg L, Miller T. C. K and Rensik R. Hemodynamic effects of intravenous cocaine on the pregnant ewe and fetus. *Am J Obstet Gynecol* 1986; 155: 883-888.
11. Woods J. R, Plessinger M. A and Clerk K.E. Effect of cocaine on uterine blood flow and fetal oxygenation. *JAMA* 1987; 257: 957-961.