

ترانسفوزیون اتولوگ در جراحی قلب

(بیمارستان امام، ۱۳۷۹-۸۰)

دکتر حسن رادمهر (استادیار)، دکتر سید حمید میرخانی (دانشیار)، دکتر مهدی صنعت کارفر (پژوهش عمومی)، دکتر حسن سلطانی نیا **(استادیار)، دکتر سید علی امامی * (استادیار)، دکتر ایرج قربانی بور **(استادیار)، دکتر ابوالقاسمی **، خانم محبوه تقیی *، خانم فاطمه مومنی *، بخش جراحی قلب، بیمارستان امام، دانشگاه علوم پزشکی تهران **گروه بیهوشی، بیمارستان امام، دانشگاه علوم پزشکی تهران *** سازمان انتقال خون ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به پیشرفت در رشته‌های جراحی و اقدامات کلینیکی تهاجمی (Invasive) در سالهای اخیر و افزایش نیاز به مصرف خون از یک طرف و محدودیت در تأمین این نیاز از سوی دیگر، همچنین افزایش شیوع انتقال عفونتهای ویروسی از طریق خون در قرن اخیر توجه را به استفاده از خونهای اتولوگ به جای استفاده از خون همولوگ معطوف ساخته است. این مطالعه به بررسی مقایسه‌ای استفاده از خون اتولوگ و همولوگ می‌پردازد.

مواد و روشها: ۲۰۸ بیمار در فاصله تیرماه ۷۹ تا ۸۰ در بخش جراحی قلب بیمارستان امام خمینی تهران تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتند. در ۱۰۴ بیمار قبل از شروع با پس قلبی - ریوی یا (Cardio- Pulmonary Bypass(CPB)) و قبل از تزریق هپارین یک یا چند واحد خون از هر بیمار گرفته می‌شد و بعد از خاتمه CPB و تزریق پروتامین مجدداً به بیمار تزریق می‌شد(گروه اتولوگ) و ۱۰۴ بیمار دیگر بطور روشن تحت عمل جراحی قرار می‌گرفتند (گروه شاهد).

یافته‌ها: میانگین سنی گروه اتولوگ 55.9 ± 8.6 سال و گروه همولوگ 56.6 ± 9.3 سال بود ($P=NS$). از نظر جنس گروه اتولوگ شامل ۷۳ مرد و ۳۱ زن و گروه همولوگ شامل ۷۹ مرد و ۲۵ زن بود ($P=NS$). از نظر نوع عمل جراحی (بای پاس کرونر - ترمیم یا تعویض دریچه قلبی- اعمال جراحی مادرزادی) تفاوت قابل توجهی بین دو گروه نبود. از نظر ریسک فاکتورها که شامل سیگارکشیدن، سابقه فامیلی قلبی، هیپرلیپیدمی، دیابت قنایی، نارسایی کلیه، هیپرتانسیون، سابقه سکته مغزی و سابقه انفارکتوس قدیمی بود دو گروه با یکدیگر مشابه بودند و اختلاف آماری قابل توجهی نداشتند. همچنین از نظر شدت آثین صدری بر اساس معیار CCS، انجام عمل جراحی اورژانس، تعداد سیستم‌های درگیر کرونر قلب، مدت زمان با پاس قلبی (CPB)، مدت زمان کلامپ آنورت، استفاده از شریان توراسیک داخلی (Internal Mammary Artery) و تعداد گرافت‌های زده شده بین دو گروه تفاوت قابل ملاحظه‌ای به‌چشم نمی‌خورد. بعد از عمل جراحی ملاحظه شدکه متوسط حجم خونریزی در ۲۴ ساعت اول بعد از عمل در گروه اتولوگ 54.8 سی سی و در گروه همولوگ 80.3 سی سی بود. ($P=0.003$) همچنین نیاز به انجام عمل جراحی به جهت کنترل خونریزی در گروه اتولوگ ۲ مورد (۱۸%) و در گروه همولوگ ۹ مورد (۸%) بود. ($P=0.002$) از نظر بروز عفونت زخم و مدیاستئیت، نارسایی کلیه، نیاز طولانی مدت به ونتیلاتور، حادث حاد عروقی مغزی، نیاز به استفاده از IABP (Intraortic Balloon Pump) و مدت اقامت در ICU و بیمارستان دو گروه تفاوت قابل توجه آماری نداشتند. میانگین مدت زمان جدا شدن بیماران از ونتیلاتور (Extubation) در گروه اتولوگ 10.2 ساعت و در گروه همولوگ 14.8 ساعت بود. ($P=0.001$) از نظر حجم خونریزی حین عمل جراحی نیز دو گروه تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشتند.

نتیجه گیری و توصیه ها: در این مطالعه استفاده از خون اتولوگ و همولوگ در اعمال جراحی قلب مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که استفاده از خونهای اتولوگ علاوه بر آنکه روشی کاملاً مطمئن می‌باشد از طرف دیگر روشی مؤثر (Effective) نیز می‌باشد. زیرا با استفاده از این روش بیزان اخونریزی بعد از عمل و نیاز به انجام عمل جراحی مجدد جهت کنترل خونریزی و همچنین مدت زمان نیاز به ونتیلاتور بعد از عمل کاهش می‌یابد.

مقدمه

عمل جراحی از بیمار گرفته شده و حین یا بعد از عمل جراحی مورد استفاده قرار میگیرد.

در این روش یک یا چند واحد خون در فاصله بین اینداکشن بیهوشی و شروع (CPB) (Cardio – pulmonary bypass) و قبل از تزریق هپارین از بیمار گرفته میشود و سپس در پایان CPB بعد از تزریق پروتامین به بیمار تزریق میشود.

(۳) بازیافت گلوبولهای قرمز حین عمل جراحی (Intraoperative Blood Salvage)

در این روش از حجم خونریزی حین عمل، گلوبولهای قرمز گرفته و جدا میشوند و ذخیره شده و سپس بعد از عمل جراحی تزریق میگردد.

(۴) بازیافت گلوبولهای قرمز پس از عمل (Postoperative Blood Salvage)

در این روش از خونهای جمع شده در chest bottle بیماران بعد از عمل جراحی گلوبولهای قرمز جدا شده و در موقع نیاز تزریق میشوند.

با توجه به مطالعاتی که در نقاط مختلف جهان از حدود صد سال قبل صورت گرفته است و بصورت مقالات متعدد چاپ و منتشر شده است استفاده از ترانسفسوزیون اтолوگ روش کامل مؤثر (effective) و ایمن (safe) میباشد (۲)، مزید بر آنکه مزایایی نیز بر استفاده از خون همولوگ دارد از آن جمله میتوان به کاهش خونریزی بعد از عمل جراحی و کاهش مصرف فرآوردهای خونی بعد از عمل و کاهش عوارض بعد از عمل اشاره کرد. این مطالعه نیز به بررسی مقایسه ای بین دو گروه اтолوگ و همولوگ از جهت efficacy و safety و همچنین میزان حجم خونریزی ومصرف فرآوردهای خونی و عوارض بعد از عمل میپردازد.

مواد و روشها

۲۰۸ بیمار در فاصله تیرماه ۱۳۷۹ لغایت فروردین ماه در بخش جراحی قلب بیمارستان امام خمینی (ره) تهران تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتند که شامل یک گروه ۱۰۴ نفری که

ترانسفسوزیون اтолوگ به معنای تزریق هر گونه فرآوردهای خونی گرفته شده از یک فرد به همان شخص میباشد. استفاده از این روش در قرن اخیر بخصوص دهه اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است که از دلایل آن میتوان به افزایش نیاز به مصرف خون و فرآوردهای آن به دنبال پیشرفت در تکنیکهای جراحی، محدودیت ظرفیت بانکهای انتقال خون در تأمین این نیازها، کاهش انتقال عفونتهایی که از طریق ترانسفسوزیون رخ میدهد، گروههای خونی نادر، محدودیت مصرف در افراد با سابقه واکنشهای خونی شدید و جلوگیری از آلوایمینویزاسیون اشاره کرد.

از نکات بسیار مهم استفاده از این شیوه مقرر به صرفه بودن آن از جهت اقتصادی میباشد زیرا تولید هر واحد خون و بخصوص تولید فرآوردهای آن مثل پلاکت و فاکتورهای انعقادی نیازمند هزینه های گرافی خواهد بود. از سوی دیگر استفاده از این روش به افزایش ظرفیت بانکهای انتقال خون کمک هم خواهد کرد زیرا هر واحد خون اтолوگ که حین یا بعد از عمل جراحی مورد استفاده قرار نگیرد بعنوان یک واحد خون همولوگ مصرف خواهد شد. استفاده از خونهای اтолوگ به شیوه های مختلفی صورت میگیرد (۱) که عبارتند از:

(۱) روش جمع آوری خون قبل از عمل جراحی (Preoperative Blood Donation) این روش شایعترین روش استفاده از خونهای اтолوگ است، بدین صورت که خون برای یک عمل از پیش برنامه ریزی شده بتدریج گرفته و ذخیره میشود تا حین عمل جراحی یا بعد از آن مورد استفاده قرار گیرد

(۲) روش جمع آوری خون حین عمل جراحی (Perioperative Autologus Blood Donation With Autologous Hemodilution) یا اصطلاح صحیح تر آن (Hemodilution) Normovolemic Hemodilution Donation (ANHD) این روش بیشترین اندیکاسیون را در جراحی قلب دارد و مورد استفاده در این شکل نیز بوده است. در این روش خون حین

از متغیرهای مربوط به عمل جراحی که مورد بررسی قرار گرفت می‌توان به نوع عمل جراحی، انجام عمل جراحی مجدد، اورژانس بودن یا نبودن عمل جراحی، حجم خونریزی حین عمل، میانگین تعداد گرفتهای زده شده به ازاء هر بیمار، مدت زمان CPB و مدت زمان کلامپ شریان آنورت اشاره کرد. متغیرهای بعد از عمل جراحی که بین دو گروه مقایسه شدند شامل خونریزی، انجام عمل جراحی مجدد به جهت کترل خونریزی، عفونت زخم و مدیاستینیت، سکته مغزی، نیاز طولانی مدت به دستگاه مکانیکی تنفس (بیشتر از ۲۴ ساعت)، نارسایی حاد کلیه و ستدرم کاهش بروندۀ قلبی (Low cardiac output put) (Intra-aortic balloon pump) IABP و نیاز به بودند، همچنین مدت زمان اقامت بیماران در بخش ICU و مدت زمان خارج ساختن لوله تنفس (Extubation) بین دو گروه بررسی شد. مرگ و میر زودرس (کمتر از ۳۰ روز) بین دو گروه بررسی و مقایسه شد. روش اجرای این مطالعه به این صورت بود که پس از القای بی‌هوشی و قبل از تزریق هپارین توسط متخصص بی‌هوشی بر حسب وزن بیمار و میزان هماتوکریت بیمار یک تا دو واحد خون کامل از بیمار گرفته می‌شد. کیسه خون بطور رایگان توسط سازمان انتقال خون در اختیار بیماران قرار می‌گرفت. سپس خون گرفته شده پس از پایان پمپ قلبی ریوی (CPB) و تزریق پروتامین به بیمار تزریق می‌شد. خون اтолوگ گرفته شده قبل از CPB در مقایسه با خون بیمار بعد از CPB میزان پلاکت سالم و فاکتورهای انعقادی به مراتب بالاتری دارد، بنابراین تزریق این خون به بیمار ممکن است به سیستم هموستاز بیمار کمک زیادی بکند. اطلاعات مربوط به بیماران دو گروه به دقت ثبت می‌شدند و به مدت ۳۰ روز بعد از عمل جراحی این بیماران تحت پیگیری (Follow - up) قرار می‌گرفتند. این اطلاعات توسط برنامه نرم‌افزاری SPSS مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. در این مطالعه $P < 0.05$ از نظر آماری معنی‌دار تلقی می‌شد.

یافته‌ها

الف) متغیرهای قبل از عمل جراحی: میانگین سنی بیماران در گروه اтолوگ $86 \pm 55/9$ (۳۴-۷۵) سال و در گروه

قبل از CPB و قبل از تزریق هپارین یک یا چند واحد خون کامل از بیمار گرفته می‌شد و این خون که محتوی پلاکت و فاکتورهای انعقادی زیادی بود (در مقایسه با میزان پلاکت و فاکتورهای انعقادی بیمار بعد از CPB پس از پایان از پمپ قلبی - ریوی (CPB) در اتاق عمل به بیمار تزریق می‌شد (گروه اтолوگ یا مورد) و یک گروه 104 ± 10 نفری دیگر که برای آنها این تداخل انجام نشد (گروه همولوگ یا شاهد) بودند. افرادی در این مطالعه وارد شدند که هماتوکریت خون بیشتر از ۳۵ و وزن بیشتر از ۵۵ و کمتر از ۹۵ کیلوگرم داشتند. معیارهای حذف از این مطالعه عبارت بودند از: آنژین صدری ناپایدار، تنگی بیشتر از ۵۰٪ شریان Left Main، تنگی در یچه آنورت (گرادیان > 70 میلی‌متر جیوه و سطح $< 0/5$ سانتی متر مربع)، هیپرتانسیون غیرقابل کترول، حاملگی، آئمی شدید، هموگلوبینوپاتی‌ها، هیپوولمی، سوء‌تغذیه، آندوکاردیت حاد باکتریال و بیماری ثبت شده کاروتید و عروق محیطی. اینکه هر بیماری که در این مدت تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت در کدام گروه اтолوگ یا همولوگ قرار گیرد کاملاً "تصادفی" و بر مبنای قرعه کشی بود. از تمام بیمارانیکه وارد گروه اтолوگ می‌شدند رضایت کبی از انجام این کار اخذ می‌شد. در این مطالعه به جهت اینکه هم پزشک و هم مطالعه‌گر و هم بیمار از اجرای این روش آگاه بودند لذا این مطالعه Blinding نداشت. متغیرهایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند شامل متغیرهای قبل از عمل و متغیرهای حین عمل و بعد از عمل جراحی بودند. سن و جنس از متغیرهای زمینه‌ای بودند که مورد بررسی قرار گرفتند. از متغیرهای دیگر قبل از عمل می‌توان به رسیک فاکتورها اشاره کرد که شامل سیگار کشیدن، سابقه فامیلی مثبت بیماریهای قلبی، دیابت، فشار خون بالا، سابقه نارسایی کلیه، چربی خون بالا، سابقه حوادث عروقی مغز (TIA) (Stroke) بودند. همچنین متغیر دیگری که بین دو گروه بررسی شد شدت نارسایی قلبی بر اساس معیار New-York Heart Association (NYHA) بود. از متغیرهای دیگر قبل از عمل می‌توان به میزان درگیری عروق کرونر قلب در بیماران CABG و مقدار EF (Ejection Fraction) که توسط آنژیوگرافی مشخص می‌شد.

استفاده شد که این اختلاف بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. ($P=0.054$).

ج) متغیرهای بعد از عمل جراحی: نیاز به انجام عمل جراحی مجدد به علت خونریزی در گروه اтолوگ ($1.1/9$) ۲٪ مورد و در گروه همولوگ ($0.8/6$) ۹٪ مورد بود که از نظر آماری این تفاوت معنی دار بود ($P=0.01$).

(۴) نفر از گروه اтолوگ و (۲) نفر از گروه همولوگ دچار عفونت زخم و مدیاستینیت شدند که تفاوت قابل توجه نبود ($P=0.21$). از نظر بروز Stroke به دنبال عمل جراحی (۱۱٪) نفر از گروه اтолوگ و (۲٪) نفر از گروه همولوگ دچار این عارضه شدند ($P=0.4$).

از بیماران گروه اтолوگ (۰.۳٪) ۴ نفر و از گروه همولوگ (۷٪) ۷ نفر بعد از عمل جراحی به مدت بیشتر از ۲۴ ساعت نیاز به دستگاه تنفس کمکی یا ونتیلاتور داشتند که تفاوت از لحاظ آماری قابل توجه نبود ($P=0.09$). بروز نارسایی حاد کلیه در گروه اтолوگ (۰.۱٪) ۱ نفر و در گروه همولوگ (۰.۱٪) ۱ نفر و در گروه همولوگ ($P=0.09$) نفرمحله شد که تفاوت از نظر آماری قابل توجه نبود (۰.۱٪). مورتالیته زوردرس (داخل بیمارستانی) در بیماران گروه اтолوگ (۰.۳٪) ۴ نفر و در گروه همولوگ (۰.۴٪) ۵ نفر بود ($P=0.21$), که تفاوت مشخص بین دو گروه وجود نداشت. مصرف خون و فرآوردهای آن حین و بعد از عمل جراحی در دو گروه به شرح زیر بود: نیاز به استفاده از خون کامل (whole blood) در گروه همولوگ برابر $1/6 \pm 1/4$ واحد بود که همانطوریکه در دیله می شود مصرف خون در گروه اтолوگ به طور واضحی کمتر از گروه همولوگ است ($P=0.031$). میانگین مصرف پلاسمای منجمد تازه یا FFP (Fresh Frozen Plasma) در گروه اтолوگ معادل $1/2 \pm 1/6$ واحد و در گروه همولوگ $1/9 \pm 1/3$ واحد بود که دیله می شود مصرف FFP در گروه اтолوگ کمتر بوده است. ($P=0.042$).

نیاز به مصرف پلاکت که از روش Random Donor Platelet در گروه اтолوگ 8 ± 2 واحد و در گروه همولوگ 4 ± 2 بوده است ($P=0.041$), بنابراین به طور واضحی دیده می شود که مصرف خون و فرآوردهای آن در گروه اтолوگ به مراتب کمتر از گروه همولوگ می باشد، بنابراین با

همولوگ 9.3 ± 5.6 (۳۸-۷۶) سال بود. ($P=NS$). از نظر جنسیت گروه اтолوگ شامل (۰.۷٪) ۱ مرد و (۰.۲٪) ۱ زن و گروه همولوگ شامل (۰.۷٪) ۷۹ مرد و (۰.۲٪) ۲۵ زن بودند (۰.۱٪). از نظر نوع عمل جراحی در گروه اтолوگ (۰.۹٪) نفر تحت عمل CABG و (۰.۲٪) نفر تحت عمل دریچهای و CABG تحت عمل جراحی مادرزادی قلب قرار گرفتند. (۰.۱٪) نفر تحت عمل دریچهای و (۰.۱٪) ۲ نفر تحت عمل جراحی مادرزادی قلب در گروه همولوگ طبق جدول (۱) با یکدیگر مقایسه شده است.

از گروه بیماران اтолوگ (۰.۵٪) ۴ نفر و از گروه همولوگ (۰.۳٪) ۳۶ نفر سابقه انتفارکتوس قدیمی میوکارد داشتند که با توجه به تاریخچه و تغییرات ECG تشخیص داده می شد. تعدادی از متغیرهای قبل و حین عمل جراحی در دو گروه اтолوگ و همولوگ طبق جدول (۲) با یکدیگر مقایسه شده اند.

ب) متغیرهای حین عمل جراحی: در بیماران CABG جهت گرافت شریان کرونر قلب در گروه اтолوگ برای (۰.۹٪) ۹۷ نفر و در گروه همولوگ برای (۰.۹٪) ۹۸ نفر از LIMA (Left Internal Mammary Artery) جهت گرافت به LAD استفاده شد. شریان پستانی داخلی چپ یا (۰.۷٪) و برای گرافت سایر شریان کرونر از وریدهای صافن استفاده گردید. به ازاء هر بیمار به طور متوسط در گروه اтолوگ $3/4 \pm 1/5$ گرافت و در گروه همولوگ $2/4 \pm 1/1$ گرافت استفاده شد ($P=0.064$). مدت زمان کلامپ شریان گرافت استفاده شد (Cross Clamp Time) به طور متوسط در دو گروه اтолوگ $25/5 \pm 5/6$ دقیقه و در گروه همولوگ $17/2 \pm 5/7$ دقیقه ($P=0.071$) و مدت زمان پمپ قلبی - ریوی یا (CPB) در گروه اтолوگ $44/9 \pm 27/2$ دقیقه و در گروه همولوگ $44/9 \pm 27/2$ دقیقه ($P=0.082$). برای درمان سندرم کاهش برون ده قلبی حین یا بعد از عمل جراحی که به درمان بالینی توپیها پاسخ نمی داد برای (۰.۷٪) ۹ نفر از گروه اтолوگ و (۰.۷٪) ۷ نفر از گروه همولوگ از IABP (Intra-aortic Balloon Pump)

روزافزایش می‌باید، در کنار آن با افزایش شیوع عفونتهای انتقال یابنده از طریق خون (مثل هپاتیت B, C, HIV,...) و صرف هزینه‌های گزار جهت تهیه خون و فرآورده‌های آن فکر استفاده از خون اтолوگ را مطرح ساخت (۳). در همین راستا این مطالعه به بررسی مقایسه‌های استفاده از خون اтолوگ و همولوگ می‌پردازد. اولین باریکه از خون اтолوگ استفاده شد سال ۱۹۳۱ Grant توسط دانشمندی بنام از خون اтолوگ استفاده کرد که ۲۴ ساعت قبل از عمل جراحی یک واحد خون از بیماران می‌گرفت و حین عمل تزریق می‌کرد (۴). تا اوایل دهه ۱۹۸۰ تنها در ۵٪ اعمال جراحی از خون اтолوگ استفاده می‌شد، تا اینکه در اوایل این دهه با شیوع انتقال آلوگی AIDS از طریق تزریق خون استفاده از خون اтолوگ شیوع بیشتری یافت. Dodrill قبل از CPB از بیماران خون گرفته و بعد از CPB به بیماران تزریق می‌کرد (۵). سوال مهمی که در مورد استفاده از خونهای اтолوگ همیشه مطرح بوده است میزان ایمنی safety آن در مقابل ترانسفوزیون همولوگ و همچنین efficacy استفاده از آن و کاهش میزان خونریزی و مصرف خون و فرآورده‌های آن می‌باشد، که در این مطالعه سعی شده است به آن پرداخته شود. یکی از فواید مهم استفاده از خونهای اтолوگ که در مقالات مختلفی به آن اشاره شده است کاهش خونریزی و کاهش مصرف خون همولوگ می‌باشد. Kruskall و همکارانش در اولین مقاله علمی که خونهای اтолوگ را با همولوگ مقایسه می‌کرد (۶) بیمار در گروه اтолوگ در مقابل ۱۰۰ بیمار در گروه همولوگ) نشان داد که با این روش ۲۰٪ کاهش ترانسفوزیون خون خواهیم داشت (۶). Love و همکارانش با مطالعه‌ای که روی ۵۸ بیمار دریافت کننده خون اтолوگ انجام دادند ثابت کردند که ۳۶٪ در مصرف خون صرفه‌جویی شده است (۷). Owing در مطالعه‌ای که روی ۱۰۸ بیمار انجام داد بیان کرد با استفاده از ترانسفوزیون اтолوگ ۵٪ کاهش در مصرف خون داشته‌اند (۸). Achenbach با مطالعه روی ۴۲ بیمار گیرنده خون اтолوگ نشان داد که تا ۷۴٪ در مصرف خون صرفه‌جویی به عمل می‌آید (۹). همچنین Sunderlili با مطالعه وسیعی که انجام داد ۳۴۸ بیمار گیرنده خون اтолوگ را با ۳۴۸ بیمار گیرنده همولوگ مقایسه کرد و ثابت کرد که مصرف خون بطور چشمگیری کاهش داشته است (۱۰). Boldt و همکارانش در مطالعه‌ای نشان دادند که استفاده از

استفاده از این شیوه میزان ترانسفوزیون خون و فرآورده‌های آن کاهش می‌باید. میزان خونریزی بیماران بعد از عمل جراحی با اندازه‌گیری حجم خون جمع شده داخل chest bottle متصل به بیماران اندازه‌گیری می‌شد. متوسط خونریزی بعد از عمل بیماران در ۲۴ ساعت اول بعد از عمل در گروه‌های اтолوگ و همولوگ به ترتیب 548 ± 494 سی سی و 803 ± 642 سی سی بود که همانطوریکه مشاهده می‌شود این حجم در گروه اтолوگ به مراتب کمتر می‌باشد و از نظر آماری کاملاً معنی داربود ($P=0.001$).

از متغیرهای مهم که در دو گروه بررسی شد متوسط روزهای اقامت بیماران در ICU بود که در گروه اтолوگ $1/9 \pm 1/9$ روز و در بیماران گروه همولوگ $2/1 \pm 1/7$ روز بود که این اختلاف معنی دار نبود ($P=0.043$). متوسط میزان هموگلوبین بیماران بعد از عمل در گروه اтолوگ $10/6 \pm 0/8$ و در گروه همولوگ $11/1 \pm 1/8$ بود که تفاوت قابل توجهی نداشت ($P=0.46$). از متغیرهای مهم دیگر مدت زمان جدا شدن بیماران از دستگاه ونتیلاتور بود (Extubation time) که در گروه اтолوگ $10/2 \pm 0/5$ ساعت و در گروه همولوگ $19/8 \pm 1/4$ ساعت بود ($P=0.01$). همانطوریکه مشاهده می‌شود اختلاف زیادی بین مدت زمان جدا شدن بیماران دو گروه از دستگاه تنفس کمکی وجود دارد که این نشاندهنده وضعیت تنفسی بهتر بیماران بعد از عمل جراحی به دنبال مصرف خون اтолوگ به جای همولوگ می‌باشد. متوسط حجم خونریزی حین عمل در گروه اтолوگ $731/8 \pm 210$ سی سی و در گروه همولوگ 7 ± 220 سی سی بود که تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود ($P=0.32$). متوسط حجم خونی که در این مطالعه از بیماران گروه اтолوگ قبل از شروع CPB گرفته شد $1/2 \pm 1/4$ واحد خون کامل سی سی بود.

بحث

با توجه به پیشرفت در تکنیک‌های جراحی و اقدامات تهاجمی در پزشکی و افزایش تعداد اعمال جراحی قلب و اعمال جراحی مجدد قلب، نیاز به ترانسفوزیون خون روز به

پلاکتها با سطح سنتیک CPB (خصوصاًکسیژناتور)، تخریب پلاکتها در سطوح تبادل گاز با خون(اکسیژناتور).

از اثرات دیگر CPB بر سیستم هموستان بدن کاهش فاکتورهای انعقادی خون می‌باشد. این اثر از چند طریق صورت می‌گیرد که یکی dilution است، مطالعات نشان داده‌اند که فاکتورهای انعقادی پس از CPB به $50\% \pm 80\%$ قبل از CPB کاهش می‌یابد (۱۵ و ۱۶). و بیشترین فاکتوری که کاهش می‌باشد فاکتور V می‌باشد البته یک هموستان نرمال با $20 \pm 40\%$ فاکتورهای انعقادی نیز صورت می‌گیرد بنابراین نقش dilution در اختلال هموستان چندان با اهمیت‌نمی‌باشد.

البته سطح فاکتورهای انعقادی تا ۱۲ ساعت بعد از CPB به سطح نرمال برخواهد گشت (۱۶). علت دیگر کاهش فاکتورها، دنساتوره شدن آنها هنگام برخورد با سطوح تبادل گازی (اکسیژناتور) می‌باشد، همچنین به دنبال فیرینولیز که طی CPB ایجاد می‌شود و بعداً به آن اشاره خواهیم کرد محصولات ناشی از تخریب فیبرین (Fibrin degradation products) که عوامل مهاری فاکتورهای انعقادی هستند پدید خواهند آمد. از سوی دیگر هیپوترمی هنگام CPB نیز می‌تواند با اختلال در فعالیت آنزیم‌ها از عملکرد فاکتورهای انعقادی بکاهد.

اثر دیگر CPB بر سیستم هموستان بدن تأثیر آن بر سیستم فیرینولیتیک می‌باشد. همانطور که می‌دانید سیستم فیرینولیز پا به پای لخته شدن خون فعال می‌شود تا انعقاد را کنترل کند. دیده شده است که فیرینولیز علاوه بر فعالیت فیزیولوژیک خود در موارد دیگری نیز بطور غیرطبیعی مثل زمان CPB فعال می‌شود. (۱۷ و ۱۸) و مهمترین فرآیند کلینیکی فیرینولیز هم خونریزی خواهد بود. بنابراین CPB از این طریق نیز موجب اشکال در هموستان طبیعی خواهد شد. از اثرات دیگر برخورد خون با سطوح سنتیک با بار الکتریکی منفی CPB فعال شدن سیستم التهابی بدن می‌باشد (۱۹). با فعال شدن فاکتور XII سیستم کمپلمان و لکوسیتها نیز فعال خواهند شد (۲۰، ۲۱، ۲۲). مهمترین فاکتورهای التهابی که از طریق سیستم کمپلمان تولید می‌شوند C5a و C3a می‌باشد (۲۳). فعال شدن لکوسیتها باعث اگزوسیتوز الاستاز و تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن و اندوتوكسین‌ها خواهد شد که این محصولات تمایل به خونریزی را افزایش خواهند داد (۲۰). از طرف دیگر آزاد شدن

خون اтолوگ (بطور متوسط 10 cc/kg) میزان خونریزی بعد از عمل و نیاز به تزریق خون را کاهش می‌دهد (۱۱).

Davise در یک بررسی مقایسه‌ای بین استفاده از خون اтолوگ و همولوگ نشان داد که خونریزی بعد از عمل و نیاز به خون و فراآوردهای آن بعد از عمل بطور چشمگیری کاهش می‌یابد (۱۲). در این مطالعه نیز مشاهده شد که $32/5\%$ کاهش در مصرف خون‌های در گروه اтолوگ در مقایسه با گروه همولوگ داشتیم. (متوسط حجم خون مصرف شده در گروه اтолوگ $4/9 \pm 1/4 \text{ l} \pm 6/6$ واحد و در گروه همولوگ $4/0 \pm 1/0 \text{ l}$ واحد بود. همچنین با استفاده از خون اтолوگ در این مطالعه روشن شد که $31/7\%$ کاهش در حجم خونریزی بعد از عمل داشته‌ایم $54/8 \pm 4/9 \text{ l}$ سی سی خونریزی در گروه اтолوگ در مقایسه با $80/3 \pm 6/4 \text{ l}$ سی سی در گروه همولوگ. به نظر می‌رسد کاهش خونریزی و کاهش نیاز به تزریق خون در گروه اтолوگ در مقایسه با گروه همولوگ مربوط به اثراتی باشد که پمپ قلبی-ریوی یا (CPB) Cardio pulmonary bypass بر سیستم هموستان بدن به جا می‌گذارد. اثراتی که CPB بر سیستم هموستان داشته‌ایم پلاکتی، فاکتورهای انعقادی، سیستم فیرینولیتیک و سیستم التهابی بدن دارد. اثراتی که CPB بر سیستم پلاکتی می‌گذارد شامل دو قسم است: اثراتی که CPB بر عملکرد پلاکتها دارد و باعث اختلال عملکرد مناسب آنها می‌شود که مهمترین اثر آن برپلاکتیست و دیگر کاهش تعداد پلاکتها می‌باشد. از علل اختلال عملکرد پلاکتی به دنبال CPB می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: CP باعث کاهش ذخایر گرانوله پلاکتها و کاهش دگرانوله شدن آنها می‌شود، ریپتورهای گلیکوپروتئین غشاء دگرانوله که فعالیت پلاکتی مثل هپارین یا پلاسمین استفاده می‌شود و همچنین پلاکت تخریب می‌شود، در زمان CPB از مواد مهار کننده فعالیت پلاکتی مثل هپارین یا پلاسمین استفاده می‌شود و همچنین از علل مهم دیگری که فعالیت پلاکتی را کاهش می‌دهد هیپوترمی است که در CPB ایجاد می‌شود. همانطور که گفته شد اثر دیگر CPB بر سیستم پلاکتی، ترومبوسیتوپنی می‌باشد. مطالعات نشان داده است که تعداد پلاکتها بعد از CPB به $30\% \pm 50\%$ قبل از CPB کاهش می‌یابد (۱۳ و ۱۴).

از علل ترومبوسیتوپنی به دنبال CPB می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: Hemodilution تجمع پلاکتی به دنبال برخورد

بارزی از نظر آماری نداشتند. بنابرآنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت استفاده از ترانسفوزیون اтолوگ روش کاملاً safe و مطمئن‌می‌باشد. از طرف دیگر دیده شده است که مهمترین مشکلی که ممکن است در گرفتن خون از بیماران اтолوگ پیش آید عوارض واژوواگال است که تنها در ۵٪ بیماران با روش آید عوارض واژوواگال است که تنها در ۵٪ بیماران با روش (Preoperative Autologous Donation) دیده شده است. اما در روش ANHD که در این مطالعه بکار گرفته شد بهجهت اینکه از بیمار در اطاق عمل و بعد از القای بی‌هوشی و تحت مرافقت کامل خون گرفته می‌شود این مشکل را خواهیم داشت. از مزایای مهم استفاده از ترانسفوزیون اтолوگ که در این مطالعه مشاهد شد کاهش قابل توجه مدت زمان Extubation بیماران گروه اтолوگ در مقایسه با بیماران گروه همولوگ بود. مطالعه Davies نیز نشان داد که عوارض تنفسی با مصرف خون اтолوگ کاهش می‌یابد (۱۲). در بررسی علت این پدیده دیده شده است که در ترانسفوزیون همولوگ در پلاسمای دهنه خون آنتی‌بادیهای متصل به کمپلمان که ضد نوتروفیل‌ها یا آنتی‌ژنهای لکوسیتی انسان (HLA) هستند وجود دارد که باعث فعال شدن سیستم التهابی بدن و فعال شدن سیستم کمپلمان و تولید فاکتورهایی مثل C5a شده که این پاسخ منجر به افزایش تقویذپذیری مویرگهای ریوی شده که شرایط را برای سیر به سمت یک ادم ریوی غیرقلبی مهیا می‌سازد، که البته با مصرف خونهای اтолوگ این شکل به مراتب کمتر مشاهده می‌شود (۲۵، ۲۶).

تشکر و قدردانی

در پایان از همکاری صمیمانه پرسنل و پزشکان بخش و اطاق عمل جراحی قلب بیمارستان امام خمینی (ره) و همچنین از همکارانمان در سازمان انتقال خون ایران بیوژه جناب آقای دکتر تیموری که بدون یاری آنها این مطالعه به سرانجام نمی‌رسید کمال تشکر و قدردانی را داریم.

اندو توکسین‌های التهابی تمایل برای ایجاد DIC (Disseminated Intravascular Coagulation) را افزایش خواهند داد. از موضوعات دیگری که در مورد استفاده از خونهای اтолوگ مورد بحث می‌باشد safety استفاده از این روش می‌باشد. مطالعات متعددی safety استفاده از این روش را نشان داده‌اند. در مطالعه خود برای ۷۷ بیمار جراحی از ۲۱ روز قبل از عمل خون اтолوگ ذخیره کرد و بعد از عمل جراحی استفاده کرد safety استفاده از این روش را نشان داد (۲۴). در مطالعه خود جهت بیماران جراحی با پاس عروق کرونر از خون اтолوگ استفاده کرد و safety این روش را ثابت کرد (۷). Kruskall در مطالعه مورد شاهدی خود که ۵۷ بیمار گیرنده خون اтолوگ را با ۱۰۰ بیمار گیرنده خون همولوگ مقایسه کرد، safety استفاده از خون اтолوگ را ثابت کرد (۶). Davies با استفاده از خون اтолوگ در بیماران جراحی قلب یک مطالعه مقایسه‌ای انجام داد و علاوه بر اینکه safety استفاده از این روش را نشان داد، همچنین بیان کرد که عوارض تنفسی بعد از عمل جراحی به دنبال ترانسفوزیون اтолوگ کاهش می‌یابد (۱۲). در این مطالعه نیز مشاهده شد که در گروه اтолوگ عوارض بعد از عمل جراحی نه تنها نسبت به گروه شاهد از نظر آسارتی تفاوت معنی داری ندارد بلکه در مواردی نیز عوارض بعد از عمل در بیماران گیرنده خون اтолوگ کاهش قابل توجهی دارد مانند عمل جراحی مجدد به علت خونریزی که در گروه اтолوگ ۱/۹٪ و در گروه همولوگ ۶/۸٪ بود و مدت زمان جدا شدن بیمار از دستگاه ونتیلاتور (Extubation) که در گروه اтолوگ بطور میانگین ۱۰/۲ ساعت و در گروه همولوگ ۱۹/۸ ساعت بود. البته در این مطالعه مشاهده شد که عفونت زخم و مدیاستینیت در گروه اтолوگ بیشتر دیده می‌شود (۳/۸٪ در مقابل ۱/۹٪) که البته این اختلاف از نظر آماری قابل توجه نبود. مورتالیته زودرس (یکماه بعد از عمل جراحی) در بیماران گروه اтолوگ ۳/۸٪ و در بیماران گروه همولوگ ۴/۸٪ بود که تفاوت

منابع

1. Cross MH. Auto-transfusion in cardiac surgery. *Perfusion* 2001 sep; 16(5): 391-400.
2. Kreimeier U, Messmer, K . Peri-operative hemo-dilution. *Transfusapheresis Sci* 2002 Auy; 27(1): 59-72.
3. Dalrymple-Hay MJ Dawkins S, pack L, Deakin CD, Sheppard S, ohri SK,et al. Autotransfusion decreases blood usage following cardiac surgery, a prospective randomized trial. *Cardiovasc sury* 2001 Apr; 9(2): 184-7.
4. Grant FC. Auto-transfusion. *Ann Surg* 1921; 74(8): 253.
5. Dodrill FD, Marshall N, Nyboer J, et al. The use of the heart-lung apparatus in human cardiac surgery. *J Thoracsurg* 1957; 33(1): 60-73.
6. Kruskall MS. Auto-logous blood Collection and Transfusionin a tertiary-care center. In: Taswell HF, Pineda AA, eds. Autologous transfusion and Hemotherapy. Boston: Blackwell Scientific; 1991; 54.
7. Love TR, Hedren WG, O'Keefe DD, et al. Transfusion of predonated autologous blood in elective cardiac surgery. *Ann Thorax surg* 1987; 43: 508-512.
8. Owings DV, Kruskall MS, Thurer RL, et al. Autologous blood donation prior to elective cardiac surgery: safety and effect on subsequent blood use. *JAMA*. 1989; 262(14): 1963-1968.
9. Achenbach H, Tanzeem A, Saggau W,et al. Blood user education by pre-donation how effective is it? In: Friede LN, Hetzer R.Royston D, eds. *Blood Use in Cardiac Surgery*.New York: Springer - Verlag, 1991; 171-173
10. Sandrelli L, Pardini: A, Lorusso, et al. Impact of autologous blood predonation on a Comprehensive blood conservation program. *Ann Thorac surg* 1995; 59: 730-735.
11. Boldt. J.Von Bormann B. Kling D, Jacob M et al. Preoperative plasma pheresis in patients undergoing cardiac surgery procedures. *Anesthesiology* 1990; 72: 282-8.
12. Davies. GG, Well DG, Mabee TM, et al. Platelet- leukocyte plasmapheresis attenuates the deleterious effecs of cardiopulmonary bypass. *Ann Thorac sury*. 1992; 53: 274-7.
13. Campbell F. The Contribution of platelet dysfunction topostbypass bleeding. *J Cardiothorac Anesth* 1991; 5(6) (Suppl 1): 8-12.
14. Mckenna R, Bachmann F, Whittaker B, et al. Th hemostatic mechanism after open heart surgery. *J Thorac Cardiovascular Surg* 1975; 70(2): 298-308.
15. Spiess B, Chang SP. Intra operative coagulation disorders. In: Thomas S. Kramer J, eds. *Manual of Cardiac Anesthesia*.2nd ed. New York: Churchill Livingstone, 1993; 517-552.
16. Salempira M, Levy J, Harker L. Hemostasis and Cardiopulmonary bypass. In: Mora C, ed. *Cardiopulmonary Bypass, Principles and Techniques of Extra corporeal circulation*, 1995; 88-113.
17. Spiess BD. The contribution of fibrinolysis to post bypass bleeding. *J Cardiothorac Vas Anesth* 1991; 5(Suppl): 13-17.
18. Tanaka K, Motoshi T, Isao Y, et al. A lternations in coagulation and fibrinolysis associated with cardiopulmonary bypass during open heart surgery. *J Cardio-thorac Anesth* 1989; 3: 181-188.
19. Gorman JH III, Edmunds LH Jr. Blood anesthesia for cardio-pulmonary bypass. *J Cardiouvasc surg*, 1995; 10: 270-279.
20. Butler J, Rocker GM, Westaby S. Inflammatory response to cardiopulmonary bypass. *Ann Thorac Surg*. 1993; 55: 552-559.
21. Kirklin JK, Westaby S, Blackstone EH. Complement anddamaging effects of cardiopulmonary bypass. *J Thorac Cardiovas Surg* 1983; 86: 845-857.

22. Chenoweth DE. Complement activation Pathophysiology of Cardiopulmonary Bypass. Baltimore: Williams & Wilkins, 1983; 49-60.
23. Chenoweth DE, Cooper SW, Hugli TE, et al. Complement activation during Cardiopulmonary bypass: evidence for generation of C3a and C5a anaphylatoxins. *N Engl J Med* 1981; 304: 497-503.
25. Popovsky M, Chaplin H, Moore S. Transfusion - related acute lung injury: a distress syndrome. *Anesth Intensive Care* 1993; 21: 44-49.
26. Ward H. Pulmonary infiltrates associated with leuko agglutinin transfusion reactions. *Ann Intern Med*. 1970; 73: 689-694.
24. Cuello L, Vasques E, Rois R. Autologous blood transfusion in thoracic cardiovascular surgery; 62(4): 814-818.