

مجله دانشکده پزشکی  
دانشگاه علوم پزشکی تهران  
سال ۲۶، شماره ۵، صفحات ۳۵۷ تا ۳۶۲ (۱۳۸۳)

## بررسی هویت گونه‌های انگل لیشمانيا در اشکال بالینی غیر معمول لیشمانيوز جلدی با استفاده از آنتی بادیهای منوکلونال

\* دکتر گیتی صادقیان، دکتر سیدحسین حجازی \*\*، دکتر محمدعلی نیلفروشزاده \*  
\* مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، بیمارستان امین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
\*\* گروه انگل‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

### چکیده

مقدمه: لیشمانيوز جلدی بیماری انگلی است که توسط گونه‌های مختلف انگل لیشمانيا ایجاد می‌شود. در بعضی مواقع با مواردی از بیماری مواجه می‌شویم که هم از نظر شکل بالینی و هم دوره و سیر با حالات معمول تفاوت دارند. هدف از انجام این مطالعه تعیین هویت انگل لیشمانيا در این موارد بوده است.

مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی و روش نمونه‌گیری آسان بود. از بیماران مراجعه کننده با اشکال بالینی غیر معمول اسمیر مستقیم تهیه و بخشی از نمونه برداشت شده وارد محیط کشت NNN گردیده و پس از آن جهت تولید انبوه به محیط کشت RPMI ۱۶۴۰ انتقال یافته، پروراستیگرلتهاي بدست آمده در پلیت الایرا پوشش داده شد و با استفاده از منوکلونال آنتی بادی اختصاصی ایزوله‌ها تعیین هویت گردید.

یافته‌ها: از ۷۴ نمونه مورد بررسی ۸۷/۸٪ L.major و ۱۲/۲٪ L.tropica گزارش گردید. اشکال غیر معمول که تحت انجام آزمایش قرار گرفتند شامل ضایعات اقمایی در ۴۰/۵٪ اسپوروتیکوئید، ۲۳/۷٪ ضایعات مزمن (بیش از ۲ سال)، ۹/۴٪ زوستریغم، ۶/۷٪ و روکوز، ۵/۴٪ و اریزیلوقوئید، ۴/۰٪ بودند تعداد ۵۰ نفر (۶۷/۵٪) از بیماران هیچ درمانی قبل از بروز ضایعات آتبیک دریافت نکرده و ۲۴ نفر (۳۲/۴٪) تحت درمانهای مختلف قرار گرفته بودند. از ۷۴ بیمار ۲۶ نفر از شهر اصفهان بودند که در آنها ۲۵٪ L.tropica و ۷۵٪ L.major گردید و از کل ۳۸ نفر مراجعه کننده از حومه L.major جدا شد.

نتیجه گیری و توصیه‌ها: گونه‌های جدای شده در این مطالعه شامل L.tropica و L.major بودند و رابطه معنی‌داری بین اشکال بالینی غیر معمول و گونه‌های جدای شده وجود نداشت. بیشترین اشکال غیر معمول روی اندام مشاهده گردیدند. رابطه معنی‌داری نیز بین درمانهای انجام شده قبلی و یا عدم درمان و اشکال بالینی آتبیک بیماری وجود نداشت از افراد مراجعه کننده داخل شهر هر دو گونه ولی از حومه فقط گونه L.major جدا گردید.

## مقدمه

با عامل *L. aethiopica* یک ضایعه اولیه وجود دارد که بصورت لوکال منتشر می‌شود و از این نقطه بیماری به سایر قسمتهای پوست منتشر می‌گردد. مناطق وسیعی از بدن را در گیر می‌کند (۲). در اشکال بالینی زوتانی یا زوستریفرم و در مواردیکه ضایعات اقماری ایجاد می‌شوند، معمولاً سیر بیماری پیشرونده می‌باشد. شکل کلینیکی بادسرخی که بیشتر اوقات روی گونه خانم‌های مسن وقوع می‌یابد که شیوع جوشگاه در این مورد کمتر می‌باشد (۶). در فرم‌های اسپورتوتریکوئید انتشار ضایعه در مسیر لغافیک وجود دارد. از اشکال بالینی دیگر نوع کلوئیدال و زگیلی می‌باشد که در اندام تحتانی گزارش شده‌اند (۲) و نوع پسروربازیفرم نیز وجود دارد که مناطق وسیعی از بدن را در گیر می‌کند (۲). تا کنون مطالعه‌ای در مورد تعیین هویت انگل در موارد بالینی غیر معمول انجام نشده است. به حال در مطالعه‌ای که در اصفهان انجام شده و گونه‌های انگل لیشمانیا توسط پادتن‌های تک دودمانی تعیین گردیده است در ۷/۸۳٪ *L. tropica* و در ۷/۶۷٪ *L. major* و در ۱۰٪ نتایج مشکوک گزارش گردیده است (۷). همچنین در مطالعه دیگری که مشخصات انگل لیشمانیا با روش ایزوآنزیم الکتروفورز تعیین گردیده است علاوه بر لیشمانیا مازور و لیشمانیا تروپیکا لیشمانیا اینفانتوم به عنوان عامل لیشمانیوز جلدی در ۲ مورد و برای اولین بار از ایران گزارش گردیده است و نیز مشخص شده که *L. tropica* عامل لیشمانیوز جلدی راجعه در بیشتر موارد بوده است (۹۸).

در مطالعه بعدی ارگانیسم‌های جدا شده از کانونهای شناخته شده و جدید لیشمانیوز جلدی در ایران (شیراز، تهران، کرمان) با استفاده از آنتی‌بادیهای منوکلونال گونه‌های لیشمانیا تروپیکا، لیشمانیا مازور و لیشمانیا اینفانتوم جدا گردیدند (۱۰).

در مطالعه دیگری که توسط PCR با آنتی‌بادیهای منوکلونال روی نمونه‌های جمع آوری شده از هفت ناحیه مختلف آندیمیک ایران انجام شده است از ۷۷ نمونه ایزوله شده در ۴۲ مورد لیشمانیا مازور و ۲۲ مورد لیشمانیا تروپیکا و ۵ مورد *Critchidia luciliae* جدا گردید، و در

لیشمانیوز جلدی بیماری انگلی است که در بعضی کشورهای جهان از جمله ایران بطور آندیمیک وجود دارد. بیش از ۱۲ میلیون نفر در جهان به این بیماری آلوده‌اند و شیوع موارد جدید ۴۰۰۰۰ در سال می‌باشد. گسترش این بیماری در تمام قاره‌های جهان به جز استرالیا می‌باشد (۱). *L.aethiopica* عمده‌تاً توسط چهار تیپ *L.infantum*, *L.tropica*, *L.major* بیماری که در اثر *L. major* ایجاد می‌شود معمولاً به صورت یک پاپول یاندول که اغلب بدون درد و خارش است شروع و بتدریج بزرگ می‌شود و بعد از آن دلمه مرکزی روی آن تشکیل شده که ممکن است دلمه بیفت و زخم زیرین آشکار شود که بعد از مدت ۶ ماه التیام و نهایتاً جوشگاه بجا می‌گذارد. در لیشمانیوز جلدی ناشی از *L. tropica* بیماری با ندول قهوه‌ای رنگ که به آرامی وسیع می‌شود شروع شده و بعداً تشکیل پلاکی به قطر ۱ تا ۲ سانتی‌متر داده و زخم کم عمقی ایجاد می‌شود که بعد از ۸ تا ۱۲ ماه بهبود و جوشگاه بجا می‌گذارد. به هر حال در بسیاری موارد از روی تظاهرات بالینی نمی‌توان لیشمانیوز جلدی ناشی از *L.major* و *L.tropica* را از یکدیگر بازشناخت (۳ و ۴). لیشمانیوز ناشی از *L. aethiopica* ضایعه در وسط صورت و منفرد می‌باشد که زخمی می‌شود و ظرف مدت ۲ تا ۵ سال بهبود می‌یابد. لیشمانیوز جلدی ناشی از *L. infantum* در بالغین ضایعه جلدی منفرد خود بخود بهبود یابنده‌ای ایجاد می‌کند که سیری معمولی دارد ولی در شیرخواران ایجاد لیشمانیوز احشایی می‌کند (۲). علاوه بر موارد فوق با اشکال بالینی غیر معمول بیماری مواجه می‌شویم از جمله فرم راجعه یا رسیدیوانس که در آن بعد از بهبود ضایعه اولیه فعالیت مجدد بیماری وجود دارد و عامل آن را واکنش غیر طبیعی سیستم ایمنی میزبان ذکر می‌کند (۲). اخیراً گفته شده که در ۵۰٪ این موارد عفونت مجدد با گونه دیگری از لیشمانیا وجود دارد (۱). در فرانس دیگری عامل این شکل بالینی *L. tropica* ذکر گردیده است (۵). در لیشمانیوز جلدی منتشر

تعداد ۱۰۰ میکرولیتر محلول انگلی به درون چاهکهای پلیت‌های الایزا انتقال و به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری شد (عمل Coating) سپس با استفاده از horse radish conjugated antimouse antibody و منوکلونال آنتی‌بادی اختصاصی گونه‌ها شامل D2 اختصاصی لیشمانیا دونووانی و اینفانتوم، T10 اختصاصی برای لیشمانیا تروپیکا، T1 اختصاصی برای لیشمانیا مژور و L7 اختصاصی برای هر دو گونه لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا مژور و انجام مراحل تست الایزا و استفاده از سویه‌های استاندارد پروسه لازم جهت تعیین هویت ایزوله‌ها انجام گرفت.

نمونه‌های جدا شده از اصفهان ۱۵ مورد لیشمانیا تروپیکا و ۵ مورد لیشمانیا مژور گزارش گردیده است (۱۱). از مطالعات دیگر که در ایران انجام گرفته است استفاده از PCR در بیماران با لوپوئید لیشمانیوز بوده است که توانسته‌اند در ۳۰ نفر از ۶۳ بیمار با این روش انگل را جدا کنند ولی گونه‌های آن گزارش نگردیده است (۱۲). با توجه به مطالب فوق و نامشخص بودن گونه‌های عامل در ضایعات غیر معمول کلینیکی سالک به نظر رسید که تعیین هویت انگل در اشکال آتبیک بیماری ضروری می‌باشد تا با توجه به آن بتوان اقدام پیشگیری کننده لازم و تدبیرات درمانی مؤثری را برای این بیماران اتخاذ نمود.

## یافته‌ها

از ۷۴ نمونه مورد بررسی ۶۵ مورد (۸۷/۸٪) و ۹ مورد (۱۲/۲٪) L. tropica گزارش گردید. کمترین سن بیماران ۱ ماه و بیشترین سن ۶۵ سال بود (میانگین سنی ۲۹ سال). تعداد ۴۱ نفر (۵۵/۴٪) مرد بودند که ۱۴/۷٪ آنها به L.major و ۳۳ نفر (۴۴/۶٪) زن L.tropica و ۸۵/۴٪ به L.tropica که ۹٪ آنها به L.tropica و ۹۱٪ به L.major آلوهه بودند. در ۴۰ نفر (۵۴٪) ضایعه در دست، ۱۸ نفر (۲۴/۳٪) در پا، ۴ نفر (۵/۴٪) در تنہ و ۱۲ نفر (۱۶/۳٪) در صورت و گردن بود.

اشکال بالینی غیر معمول مورد مطالعه شامل ضایعات اقماری در ۳۰ نفر، اسپوروتیکونید در ۲۵ نفر، نوع مزمن (دوره بیماری بیش از ۲ سال) در ۷ نفر، زوستروفرم در ۵ نفر، و روکوز در ۴ نفر و اریزپلنوئید در ۳ نفر گزارش گردید جدول (۱).

## مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع توصیفی و روش نمونه گیری آسان بود. بیماران از افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی با اشکال بالینی غیر معمول توسط پزشک متخصص پوست انتخاب گردیدند. این بیماران از گروههای سنی مختلف و از هر دو جنس بوده‌اند. پس از انتخاب برای آنها پرونده تشکیل گردید که در آن سن، جنس، طول مدت بیماری، شکل کلینیکی محل و تعداد ضایعات ثبت می‌گردید. از بیماران اسمیر مستقیم تهیه و بخشی از نمونه برداشت شده جهت جداسازی انگل عامل (Novy MacNeal N.N.N) بیماری به محیط کشت Nicolle انتقال می‌یافتد سپس ایزوله‌های حاصله جهت تولید انبوه به محیط کشت RPMI 1640 همراه با ۲۰٪ از Fetal Calf Serum به عنوان مکمل انتقال می‌یافت. پس از تولید و برداشت انگل از فاز ایستای کشت شستشوهای لازم انجام و انگل شمارش شد. سپس به کمک شمارش با لام هموستیر غلظت مناسبی از انگل تهیه و

جدول شماره ۱ - توزیع فراوانی سویه‌های جدا شده به تفکیک شکل کلینیکی

L.major متلا به	L.tropica متلا به	تعداد کل	شکل کلینیکی
(۹۰%) ۲۷	(۱۰%) ۳	(۴۰/۵۴%) ۳۰	اقماری
(۹۲%) ۲۳	(۸%) ۲	(۳۲/۷۸%) ۲۰	اسپوروتریکوئید
(۷۲%) ۵	(۲۸%) ۲	(۹/۴۵%) ۷	مزمن
(۸۰%) ۴	(۲۰%) ۱	(۶/۷۵%) ۵	زوستریفرم
(۱۰۰%) ۴	..	(۵/۴۰%) ۴	وروکوز
(۶۶/۷۰%) ۲	(۳۲/۳۰%) ۱	(۴/۰۵%) ۳	اریزپلؤئید

جدول شماره ۲ - توزیع فراوانی اشکال بالینی غیر معمول به تفکیک درمانهای انجام شده

بدون درمان	پماد	تزریق داخل ضایعه	گلوکاتنیم	شکل کلینیکی
پاراموایسین	گلوکاتنیم	گلوکاتنیم + کرایوتراپی	سیستمیک	
(۶۶/۶۰%) ۲۰	(۳/۳۳%) ۱	(۶/۶۶%) ۲	(۳/۳۳%) ۱	(۲۰%) ۶
(۸۰%) ۲۰	(۸%) ۲	(۸%) ۲	(۴%) ۱	(۰%) ۰
(۴۲/۸۵%) ۳		(۴۲/۸۵%) ۳	•	(۱۴/۲۸%) ۱
(۴۰%) ۲	•	•	•	(۶۰%) ۳
(۱۰۰%) ۴		•	•	•
(۳۲/۳۲%) ۱		(۳۲/۳۲%) ۱		(۳۲/۳۲%) ۱

جدول شماره ۳ - توزیع فراوانی اشکال بالینی غیر معمول به تفکیک محل ضایعات

صورت و گردن	ته	پا	دست	شکل کلینیکی
(۲۰%) ۶	(۶/۶%) ۲	(۲۰%) ۶	(۵۳/۴۴%) ۱۶	اقماری
(۸%) ۲	•	(۲۸%) ۷	(۶۴%) ۱۶	اسپوروتریکوئید
(۲۸/۶%) ۲	•	(۱۴/۳%) ۱	(۵۷/۱%) ۴	نوع مزمن
•	(۲۰%) ۱	(۶۰%) ۳	(۲۰%) ۱	زوستریفرم
•	(۲۰%) ۱	(۲۰%) ۱	(۵۰%) ۲	وروکوز
(۶۶/۷%) ۲	•	•	(۳۲/۳%) ۱	اریزپلؤئید

شکل کلینیکی مشاهده می‌گردد. این مسئله که آیا مسیر لنفاویکی در دست و پا و یا عوامل محیطی مثل در معرض تروما بودن میتوانسته در افزایش بروز بعضی اشکال بالینی در دست و پا دخالت داشته باشد جای بررسی دارد. از طرفی از کل بیماران ۲۴ نفر تحت درمانهای قبلی قرار گرفته بودند و در ۵۰ نفر درمانی صورت نگرفته بود ( $pvalue=0.25$ ) و رابطه معنی داری بین اشکال غیر معمول و درمانهای انجام شده وجود نداشت. بنابراین تصور و فرضیه ما مبنی بر اینکه شاید تزریق داخل ضایعه و یا کراپوتراپی باعث ایجاد فرم‌های غیر معمول بالینی گردند را زیر سوال می‌برد. همچنین کلیه افراد مورد مطالعه سابقه بیماری زمینه‌ای خاصی را ذکر نکرده بودند که باز در اینجا دو فرض مطرح می‌گردد یکی اینکه هیچ رابطه‌ای بین اشکال بالینی غیر معمول و بیماریهای زمینه‌ای وجود ندارد و دوم اینکه آزمایشات تکمیلی برای اثبات وجود بیماریهای زمینه‌ای لازم می‌باشد که در طرحهای تکمیلی آینده باید در نظر گرفته شود. بطور کلی میتوان پیشنهاد کرد که در موارد مواجه شدن با اشکال بالینی آتیپیک مطالعه فاکتورهای دیگری از قبیل وضعیت ایمنی بیمار همراه با تعیین سیتوکیت‌های مختلف از جمله ایترافرون گاما و ایترلوكین II باید انجام گیرد. در این موارد مسائلی مثل پاتوژنیستی متفاوت سویه‌های عامل و نیز مسائل مربوط به بیمار از جمله وضع اقتصادی، تغذیه و شرایط فیزیکی بدن احتمالاً می‌تواند تاثیرات مربوط به خود را داشته باشد. و همچنین جمع‌آوری نمونه‌های بیشتر جهت تصمیم گیری دقیق‌تر در مورد نتایج و انجام آزمایشات پاراکلینیکی و معاینات دقیق‌تری روی بیماران مورد مطالعه جهت اثبات مشکلات زمینه‌ای در این موارد توصیه می‌گردد.

از ۷۴ بیمار ۵۰ نفر (۷۷/۵۶٪) هیچ درمانی قبل از پیدایش ضایعات دریافت نکرده بودند و ۲۴ نفر (۳۲/۴۳٪) تحت درمانهای مختلف شامل ۱۱ نفر گلوکاتئیم سیستمیک، ۸ نفر تزریق داخل ضایعه گلوکاتئیم، ۲ نفر توأم کراپوتراپی و گلوکاتئیم داخل ضایعه و ۳ نفر پماد پارامومایسین قرار گرفته بودند (جدول ۲).

هیچکدام از ۷۴ بیمار سابقه بیماری زمینه‌ای خاصی را ذکر نکرده بودند.

از ۳۶ نفر (۴۸/۶۴٪) مراجعه کننده از شهر اصفهان در ۹ نفر (۲۵٪) L.tropica و در ۲۷ نفر (۷۵٪) L.major و از کل ۳۸ نفر (۵۱/۳۵٪) مراجعه کننده از حومه L.major جدا گردید.

## بحث

با توجه به نتایج حاصله از تعیین گونه پروماستیگوتهاي جدا شده از ۷۴ نمونه مورد نظر ۸۷/۸٪ L.major و ۱۲/۲٪ L.tropica گزارش گردید. بنابراین گونه غالب L.major بوده و میتوان استنباط کرد که گونه خاصی غیر از این دو سویه در ایجاد اشکال غیر معمول بر خلاف تصور ما نقشی ندارد. با توجه به جدول شماره ۱ و با استفاده از آزمون Chi-Square، تفاوت معنی داری بین L.major و L.tropica شکل کلینیکی غیر معمول در مبتلایان به وجود نداشته است.

در بررسی جدول شماره ۳ عمله ضایعات اقماری، اسپوروتیریکوئید، مزن و وروکوز در دست و پا و ضایعات اریزپلؤئید عمدها در صورت و گردن بوده‌اند ( $Pvalue=0.04$ ) و تفاوت معنی داری محل ضایعات و

## منابع

1. Arndt. KA, Leboit PE, robinson JK, wintrouls BU. Leishmaniasis. Cutaneous Medicine and Surgery. WB. Saunders company 1996: Volume 2, 126: 1163-70.

2. Champion. RH, Burton J.L, Ebling F.J.G. Parasitic worms and protozoa. Textbook of dermatology Rook, wilkinson Blackwell scientific publications 1992 volume 2,28: 125-58.

۳. اردهالی ص، رضایی ح.ر، ندیم الف. انگل لیشمانيا و لیشمانیوزها ، لیشمانیوزپوستی، ۱۳۷۳، ص ۶۵-۴۷.

۴. اردهالی ص، رضایی ح.ر، ندیم الف. انگل لیشمانيا و لیشمانیوزها، همه گیرشناختی لیشمانیوزها در ایران ، ۱۳۷۳ ص ۲۰۱-۱۷۷.

5. Harry. L, Arnold JR, Richard B, william D, parasitic infections, stings, and bites. Disease of the skin Andrews. W.B. Saunders company 1990. Eight Edition, 20: 488-92.

۶. اصيليان، ع. لیشمانيوز جلدی و روشهای درمانی و پیشگیری آن، ۱۳۷۱، ص ۴۸.

۷. نصری فر، پ. تعیین گونه های انگل لیشمانيا پادتن های تک دودمانی در اصفهان. پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد علوم جانوری. ۱۳۷۸.

۸. حاتم، غ. تعیین مشخصات انگل لیشمانيا با روش ایزو آنزیم الکتروفورز. پایان نامه جهت اخذ Ph.D انگل شناسی سال ۱۳۷۵.

9. Hatam GR, Hosseini SM H, Ardehuli S. Isoenzyme studies in characterization of leishmania isolation in Iran, Iran J Med Sci 1999; 44(182): 8-13.

10. Ardehali S, Moattari A, Hatam GR, Hosseini Sm, Sharifi I. Characterization of leishmania isolated in Iran: 1. Serotyping with species specific. Monoclonal antibodies. Acta Trop, 2000, May 31; 75(3) : 301-7.

11. Mahnaz Tashakori, Soheila Aydari, Amina Kariminia, Fereidon Mahboudi, and Mohammad Hosseini Alimohammafian. Characterization of leishmania species and L.major strains in different endemic area of cutaneous leishmaniasis in Iran, Iran. Biomed J 7(2): 43-50, 2003.

12. Momeni AZ, Yotsumoto S, Mehregan DR, Mehregan AH, Mehregan AD, Amingabaheri M, Fujiwara H, Tadu J. Chronic lupoid leishmaniasis. Evaluation by polymerase chain reaction. Archives of dermatology Vol. 132, No 2, February 1996.