

بررسی نتایج درمانی جراحی زودهنگام و تأخیری در کله‌سیستیت حاد

۱۳۷۷-۷۹

دکتر احمد رضا سروش (استادیار)*، دکتر احمد تاج‌الدین (دانشیار)*، دکتر مهران نصراصفهانی (دستیار)*، دکتر شیرزاد نصیری (دستیار)، سپیده مدح خوان (کارورز)**، دکتر اکرم قرامحمدی (کارورز)*

* جراحی عمومی، بیمارستان شربعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

** بخش جراحی، بیمارستان الزهراء، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: در کله‌سیستیت حاد دو نوع درمان جراحی جایگاه دارد، یکی جراحی زودهنگام (early surgery) در عرض ۷۲ ساعت اول و دیگری جراحی تأخیری (late surgery). هدف از این مطالعه مقایسه این دو نوع جراحی از نظر طول مدت بیماری، طول بستره و عوارض بعد از عمل می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به صورت مورد-شاهدی (case-control) و به صورت گذشته‌نگر بین سال‌های ۱۳۷۷-۷۹ انجام شد ۵۰ بیمار در گروه جراحی زودهنگام و ۵۰ بیمار در گروه جراحی تأخیری بودند که از نظر طول بیماری، مدت بستره و عوارض بعد از عمل با یکدیگر مقایسه شدند.

یافته‌ها: در این مطالعه مدت زمان بیماری در گروه جراحی زودهنگام ۲۲/۸۸ روز و در گروه جراحی تأخیری ۵۰/۴ روز بود ($P=0.002$). مدت زمان بستره در بیمارستان در گروه جراحی زودهنگام ۹ روز و در گروه جراحی تأخیری ۱۸/۳۲ روز ($P<0.001$) بود. عوارض بعد از عمل در گروه جراحی زودهنگام ۸ مورد و در گروه جراحی تأخیری ۱۶ نفر می‌باشد ($P=0.061$).

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: طول مدت بیماری در گروه جراحی زودهنگام کمتر از گروه جراحی تأخیری می‌باشد همچنین طول مدت بستره بیماران در بیمارستان در گروه جراحی زودهنگام کمتر از گروه جراحی تأخیری می‌باشد. عوارض بعد از عمل در گروه جراحی زودهنگام و تأخیری تفاوتی با هم ندارند.

کلمات کلیدی: کله‌سیستیت حاد، جراحی زودهنگام، جراحی تأخیری

(hartmans pouch) همراه است. افزایش فشار داخل کیسه صفرا باعث ایسکمی مخاطی، نکروز و زخمی شدن همراه با آدم، تورم و اختلال در بازگشت وریدی می‌شود. به همراه این تغییرات ارتashah لکوسیت‌های سگمانته به درون تمام لایه‌های جدار کیسه صفرا می‌گیرد (۱-۳).

مقدمه

کله سیستیت حاد معمولاً با انسداد گردن کیسه صفرا یا مجرای سیستیک به دنبال گیر کردن سنگ در حفره هارتمن

جراحی تأخیری تقسیم شدن. منظور جراحی زودهنگام، کلہسیستکتومی در عرض ۷۲ ساعت از وقوع کلہسیستیت حاد و جراحی تأخیری کلہسیستکتومی ۳ ماه بعد از کلہسیستیت حاد می‌باشد و سپس بیماران دو گروه از نظر متغیرهایی مثل طول مدت بستری، عوارض بعد از عمل، طول مدت بیماری با یکدیگر مقایسه شدند. در این مطالعه کلً ۱۰۰ بیمار در دو گروه (جراحی زودهنگام ۵۰ بیمار و جراحی تأخیری ۵۰ بیمار)، مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتند.

یافته‌ها


در این مطالعه از ۱۰۰ بیمار مورد مطالعه، ۷۵٪ بیماران زن و ۲۵٪ بیماران مرد بودند. کم‌سن‌ترین بیمار ۱۷ ساله و مسن‌ترین بیمار ۹۰ ساله بوده و میانگین سنی بیماران ۵۵/۸۴ سال بود. نمودار سنی بیماران در نمودار ۱ نشان داده شده است.

در این مطالعه کمترین مدت بیماری ۶ روز و بیشترین مدت بیماری ۳۶۰ روز بود که میانگین مدت بیماری در کل بیماران ۳۶/۶۴ روز بود. همچنین کمترین مدت زمان بستری در بین بیماران ۴ روز و بیشترین مدت زمان بستری ۴۵ روز و میانگین مدت بستری در کل بیماران ۱۳/۶۶ روز بود. جدول ۱ میانگین مدت بیماری و مدت بستری در دو گروه جراحی زودهنگام و تأخیری را به تفکیک نشان می‌دهد.

در ۶۰٪ بیماران کلہسیستیت حاد کشت صفرا مثبت می‌باشد. از سایر علل کلہسیستیت حاد بیماری‌های کلاژن، ترومبوز شریان سیستیک و کله سیستیت بدون سنگ acalculous cholecystitis درمان کلہسیستیت حاد مطرح می‌باشد، یک روش درمان طبی آنتی‌بیوتیکی در مرحله حاد و کلہسیستکتومی انتخابی پس از بهبود علایم التهابی و روش دیگر جراحی زودهنگام در عرض ۴۸-۷۲ ساعت می‌باشد (۱و۳). با وجود اینکه ۷۰٪ بیماران به درمان طبی پاسخ می‌دهند ولی حدود ۲۰٪ موارد با شکست مواجه می‌شوند که نیاز به جراحی اورژانس پیدا می‌کنند. در بررسی‌های انجام شده عوارض تکنیکی در جراحی زودهنگام نسبت به جراحی تأخیری افزایش نمی‌یابد (۴-۶). از عوارض کلہسیستکتومی می‌توان به خونریزی، عفونت، آسیب مجرای مشترک، باقی ماندن سنگ در مجرای و تجمع مایع در زیر دیافراگم می‌باشد (۷-۹).

مواد و روش‌ها

در این مطالعه که به صورت case-control می‌باشد پرونده‌های بیماران مبتلا به کلہسیستیت حاد را که در طی سال‌های ۱۳۷۷-۷۹ در بیمارستان‌های شریعتی و امام خمینی تحت کلہسیستکتومی قرار گرفته بودند جمع‌آوری شده و سپس بیماران با توجه به زمان انجام کلہسیستکتومی نسبت به زمان وقوع کلہسیستیت حاد به دو گروه جراحی زودهنگام و



نمودار شماره ۱ - توزیع سنی بیماران مبتلا به کلہسیستیت حاد

جدول شماره ۱- میانگین مدت بیماری و مدت بستری در دو گروه جراحی زودهنگام و تأخیری به روز

P-value	انحراف معیار به روز	میانگین به روز	تعداد	نوع عمل جراحی	مدت بیماری
۰/۰۰۲	۵۱/۸	۲۲/۸۸	۵۰	زودهنگام	مدت بیماری
	۳۴/۱۱	۵۰/۴۰	۵۰	تأخری	
< ۰/۰۰۱	۳۶/۹	۹	۵۰	زودهنگام	مدت بستری
	۷/۶۲	۱۸/۳۲	۵۰	تأخری	

می‌گیرند، طول مدت بیماری و طول مدت بستری در بیمارستان به طور واضح و معنی‌داری از گروهی که تحت عمل جراحی کلمسیستکتومی تأخیری پس از ۳ ماه قرار می‌گیرند، کمتر است. با توجه به اینکه هزینهای ناشی از بیماری رابطه مستقیم با طول مدت بیماری و مدت زمان بستری دارند، بنابراین از نظر اقتصادی نیز جراحی زودهنگام به صرفه‌تر از جراحی تأخیری می‌باشد. در مورد عوارض بعد از عمل نیز، میزان عوارض بعد از جراحی که گروه جراحی زودهنگام (16%) و گروه جراحی تأخیری (32%) بود که با $P=0.061$ و لی این یافته از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد. با توجه به آمارهای بدست آمده در این مطالعه، جراحی کلمسیستکتومی زودهنگام در بیماران مبتلا به کلمسیستیت حاد توصیه می‌گردد.

با توجه به آمارهای بدست آمده از این مطالعه و مطالعات مشابه قبلی، جهت کاستن طول مدت بیماری، مدت زمان بستری بیماران در بیمارستان، کاهش هزینه‌های مصرفی، کاهش عوارض جراحی، عمل جراحی کلمسیستکتومی زودهنگام در عرض ۷۲ ساعت از تشخیص کلمسیستیت حاد توصیه می‌گردد.

در این مطالعه از بیماران گروه جراحی زودهنگام ۸ بیمار (16%) دچار عارضه بعد از عمل شدند که در گروه جراحی تأخیری ۱۶ بیمار (32%) بود.

جدول شماره ۲- فراوانی عارضه بعد از عمل در دو گروه جراحی زودهنگام و تأخیری

جراحی	عارضه	دارد	ندارد
زودهنگام	۸	۴۲	
	۱۶	۳۴	
تأخری			

بحث

با توجه به یافته‌های بدست آمده در این مطالعه میانگین مدت بیماری در گروه جراحی زودهنگام $(22/88)$ روز) به طور واضحی از گروه جراحی تأخیری ($50/40$ روز) کوتاه‌تر می‌باشد ($P=0.002$). همچنین مدت بستری بیماران در بیمارستان در گروه جراحی زودهنگام (۹ روز) کمتر از گروه جراحی تأخیری (۱۸/۳۲ روز) بود که با ($P<0.001$) از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. یعنی گروه‌هایی از بیماران کلمسیستیت حاد که تحت عمل جراحی کلمسیستکتومی زودهنگام در عرض ۷۲ ساعت از بروز علایم و تشخیص قرار

department of general surgery.
Taiwan R O C:345-347.

6. Eitan A, Toledano C, Rivlin E, Linn S, Barzilia A. Early VS delayed cholecystectomy for cholecystitis. Dep of surgery. 2003;127-9.
7. Hildebandet, J, Dietrich H. Surgical therapy of acute cholecystitis . 1989 jul Klinik fur chimigie:398-401.
8. MC Arthur P, Cuschieri A, Sells RA, Schiels R. Controled clinical trial comparing early with interval cholecystectomy for acute cholecystitis. Word surg. 2003: 850-2.
9. LO CM, Liu CL, Fan ST, Lia EC WongJ. Prospective randomized study of early VS delayed. Queen marry HOs:461-7.

مراجع

1. Seymour schwats MD. Principles of surgery. Seventh edition, printed in singapoore, 1729-1736.
2. Lawerence w. way, MD.Current surgical diagnosis and treatment 1994. sanfrancisco-california.
3. Courtney M, Townsend jr MD john wood, Harris . Sabiston textbook of surgery 2001. Texas w b sanders company. Harcourt science page:1086-1090.
4. Carroll BJ, brith, Phillips EH. Common bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy that result in litigation. Surg endos 1998 Apr: 123-125.
5. Hunang CS, Tia EC, Shi my, Chen DF, Wang NY. Complication of laparoscopic cholecystomy of 200