

## تغییرات تراکم استخوان بعد از پیوند مغز استخوان در ۶۳ بیمار مبتلا به لوسومی و لنفوم

### چکیده

**زمینه و هدف:** پیوند مغز استخوان (BMT) درمان بسیاری از بیماریهای بدخیم و غیربدخیم است و عوارض دراز مدت آن مثل استئوپوروز باید در نظر گرفته شود. هدف از این مطالعه بررسی کاهش تراکم استخوان بعد از BMT در بیماران مبتلا به لوسومی یا لنفوم است. روشن بررسی: در این مطالعه همگروهی آینده‌نگر، ۶۳ بیمار که بهدلیل لوسومی حاد و مزمن و لنفوم تحت پیوند مغز استخوان قرار می‌گرفتند وارد مطالعه و در پایان تعداد ۲۸ نفر بررسی شدند. چگالی معدنی استخوان (BMD) قبل از پیوند، شش و ۱۲ ماه پس از آن اندازه‌گیری شد. استئوکلسین و آلكالین فسفاتاز و تلوپتید C - ترمیتال کلازن نوع I و غلظت سرمی کلسیم، فسفر، ویتامین D و هورمونهای جنسی نیز به همین ترتیب بررسی شدند. **یافته‌ها:** BMD در گردن فمور از  $0/13 \pm 0/01$  گرم بر سانتی متر مربع در زمان پیوند به  $0/13 \pm 0/06$  گرم بر سانتی متر مربع در ماه ششم رسید که با  $P=0/001$  افت معنی دار داشت. سطح آلكالن فسفاتاز در ماه دوازدهم به طور معنی داری بیشتر بود ( $P=0/007$ ). در خصوص استئوکلسین، اختلاف مشاهده شده در دوره‌های زمانی مختلف از نظر آماری معنی دار نبود ( $P=0/15$ ). نوسانات افزایشی متوسط ICTP معنی دار شده است ( $P=0/04$ ). سطح کلسیم در ماه ششم و سطح فسفر در ماه دوازدهم با  $p=0/002$  و  $p=0/04$  افزایش معنی دار داشت. سطح ویتامین D و پاراتورمون از ماه ششم تا ماه دوازدهم با  $p=0/04$  و  $p=0/01$  به طور معنی داری کاهش داشت. کاهش استروژن در خانم‌ها در ماه ششم از نظر آماری معنی دار بود ( $P=0/01$ ) و در سایر شرایط، نوسانات آن از نظر آماری معنی دار نبود. به طور کلی تغییرات تستوسترون نیز در مردان از نظر آماری معنی دار نبود. **نتیجه‌گیری:** خطر تحلیل استخوان در هر دو نوع پیوند اتلولوگ و آلوژن در ناحیه گردن استخوان ران بیشتر از مهره‌های کمری است و این امر، در شش ماه نخست پس از پیوند رخ می‌دهد. راهکارهای پیشگیری و درمان باید مورد توجه قرار گیرند.

**کلمات کلیدی:** استئوپوروز، پیوند مغز استخوان، لوسومی، لنفوم.

علی اصفهانی<sup>۱\*</sup>

مسعود ابرواني<sup>۱</sup>

محسن خوش نیت<sup>۲</sup>

زهره قریشی<sup>۳</sup>

احمد رضا شمشیری<sup>۴</sup>

زهرا مقدم<sup>۵</sup>

محمد جهانی<sup>۱</sup>

ارشییر قوام زاده<sup>۱</sup>

۱. مرکز تحقیقات هماتولوژی انکولوژی و پیوند مغز استخوان

۲. گروه غلاد، مرکز تحقیقات غلاد و متابولیسم

۳. گروه تغذیه دانشکده بهداشت

گرایله‌بیولوژیست، مرکز تحقیقات هماتولوژی و

انکولوژی و پیوند مغز استخوان

۴. لیسانس پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

\*نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات هماتولوژی و

انکولوژی، بیمارستان شهداد قاضی طباطبائی، دانشگاه

علوم پزشکی تبریز

تلفن: ۰۴۱-۵۴۵۱۶۰۲

email: ali\_sfhn@yahoo.com

### مقدمه

می‌آید که از نظر آماری عبارت است از میزان انحراف معیار از متوسط تراکم استخوان افراد جوان و طبیعی. بر همین اساس تراکم طبیعی استخوان عبارت است از T-score بین  $-1 \pm 2/5$ . استئوپنی به T-score بین  $-1 \pm 2/5$  و استئوپوروز به T-score کمتر از  $-2/5$  اطلاق می‌شود.<sup>۱</sup> در بیماران مبتلا به سرطان، استئوپوروز در مقایسه با خود سرطان اهمیت کمی دارد ولی در بیمارانی که تحت درمان قرار می‌گیرند، این وضعیت باعث ناخوشی مزمن و مرگ و میر می‌گردد. برای مثال شکستگی هیپ ناشی از استئوپوروز باعث بی تحرکی

پیوند مغز استخوان درمان انتخابی بسیاری از بیماریهای بدخیم و یا غیربدخیم خونی می‌باشد.<sup>۱</sup> همچنان که طول عمر این بیماران بیشتر می‌شود عوارض دیررس آن از جمله کاهش توده استخوان نیز افزایش می‌باشد.<sup>۱</sup> بر اساس معیار سازمان بهداشت جهانی استئوپوروز بر اساس سنجش تراکم استخوان تشخیص داده شود. این تشخیص بر اساس مقایسه تراکم استخوان بیمار با متوسط تراکم استخوان یک فرد جوان از همان جنس و نژاد حاصل می‌شود و از این مقایسه T-score به دست

استخوان و مرکز غدد و متابولیسم بیمارستان شریعتی انجام شد. محل انجام مطالعه بخش‌های پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی تهران بوده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، معاینه بالینی و داده‌های پاراکلینیک (تراکم استخوان و یافته‌های آزمایشگاهی) جمع‌آوری گردید. سنجش تراکم استخوان توسط دستگاه Lunar به روش جذب دوگانه اشعه ایکس (DXA) در مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان شریعتی انجام گرفت و با واحد گرم بر سانتی متر مربع بیان گردید. مقادیر سرمی پاراتورمون، کلسیم، فسفر، LH، FSH، C-terminal telopeptides of type I collagen (ICTP)، آکالین فسفاتاز استخوانی، استئوکلسین، تستوسترون و استروژن در آزمایشگاه مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اندازه‌گیری شد. بررسیهای فوق‌الذکر قبل از پیوند، شش ماه و یکسال بعد از آن به صورت رایگان و پس از گرفتن رضایت‌نامه کتبی از بیماران انجام شد. برای گزارش متغیرهای کیفی از فراوانی نسبی (درصد) و برای متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. برای بررسی تغییرات در دوره‌های زمانی مورد مطالعه از آزمون Repeated measure ANOVA استفاده شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست ۱۱/۵ انجام شد و بالاخره سطح معنی‌داری در آزمونها  $\alpha = 0.05$  در نظر گرفته شد.

### یافته‌ها

در این مطالعه همگروهی آینده‌نگر ۶۳ بیمار وارد مطالعه شدند و در پایان مطالعه ۲۸ نفر در هر سه مقطع مورد بررسی قرار گرفتند. اکثر بیماران مبتلا به AML بودند (۵۲٪/۴٪) و ALL (۱۷٪/۵٪) و CLL (۱۲٪/۷٪) در جایگاه بعدی قرار داشتند. کمترین بیماری زمینه‌ای CLL بود که تنها در یک مورد (۱٪) وجود داشت. اطلاعات کلی بیماران در جدول ۱ بیان شده است. در این مطالعه، دانسیته استخوانی در ناحیه گردن فمور و مهره‌های کمری، نوسانات کلسین، فسفر، آکالن فسفاتاز، استئوکلسین، ویتامین D، پاراتورمون، ICTP و هورمونهای واپسیه به جنس بر اساس نوع پیوند، جنس و نمایه توده بدنی بررسی و مقایسه شدند.

تغییرات چگالی معدنی استخوان: سطح چگالی معدنی استخوان (BMD) در ناحیه گردن فمور از  $0.13 \pm 0.01$  گرم بر سانتی متر مربع در زمان پیوند به  $0.13 \pm 0.06$  گرم بر سانتی متر مربع در ماه ششم و  $0.12 \pm 0.05$  گرم بر سانتی متر مربع در ماه دوازدهم رسید. سطح

طولانی مدت شده و شرایط زندگی بیمار را دچار محدودیت می‌کند.<sup>۲</sup> ۵۰٪ این بیماران نیاز به کمک در کارهای روزانه دارند و ۲۵٪ به مراقبت‌های طولانی مدت نیاز پیدا می‌کنند. به علاوه افراد مسن که دچار شکستگی هیپ ناشی از استئوپوروز می‌شوند ۱۲٪ تا ۳۷٪ دچار مرگ و میر در عرض یکسال می‌گردند. بنابراین تشخیص زودرس و درمان استئوپوروز باید یکی از اجزای پیشگیری بیمارانی باشد که تحت پیوند مغز استخوان قرار گرفته و زنده هستند.<sup>۳</sup> عوامل خطر استئوپوروز در پیوند مغز شامل عوامل خطر عمومی (مثل سن بالا و لاغری)، عوامل خطر مرتبط با بیماری زمینه‌ای<sup>۴-۶</sup> و عوامل خطر مرتبط با پیوند مغز استخوان<sup>۷</sup> و عوارض آن مثل استفاده از گلوكورتيکويدها،<sup>۸</sup> سیکلوسپورین<sup>۹</sup> کاهش هورمونهای جنسی،<sup>۸-۹</sup> مصرف فاکتور رشد گرانولوستی (G-CSF)<sup>۱۰</sup> و پرتودمانی کل بدن (TBI)<sup>۱۱</sup> می‌باشد. در ایران پیوند مغز استخوان از سال ۱۳۶۹ در بیمارستان دکتر شریعتی تهران آغاز شد و تاکنون حدود ۱۹۰۰ بیمار تحت پیوند مغز استخوان قرار گرفته‌اند. از آنجائی که پیشگیری از بروز پوکی استخوان و شناخت هر چه سریع‌تر آن به‌منظور درمان به موقع و مناسب در بیماران پیوند شده مغز استخوان ضروری است بدین منظور، اندازه‌گیری دانسیته استخوان (BMD) قبل و بعد از پیوند مغز استخوان در تمام بیماران یک اقدام اساسی و ضروری است.

### روش بررسی

این مطالعه از نوع همگروهی آینده‌نگر است و یک مطالعه بنیادی-کاربردی محسوب می‌شود و در بیمارستان شریعتی تهران با ۶۳ بیمار (۴۵ مرد و ۱۸ زن) تحت پیوند مغز استخوان (۲۱ اتلولوگ و آلوژن) و مبتلا به یکی از انواع لوسمی‌های حاد میلوبیتی (AML) و لنفوئیدی (ALL)، لوسمی‌های مزمن میلوبیتی (CML) و لنفوئیدی (CLL) یا لنفوم هوچچکین (HL) و غیر هوچچکین (NHL) آغاز شد. معیارهای خروج از مطالعه عود و بروز عوارض شدید مرتبط با پیوند مغز استخوان در نظر گرفته شد. حجم نمونه براساس فرمولهای آماری حداقل ۲۲ مورد تعیین گردید، ولی تعداد بیماران مورد مطالعه به ۶۳ مورد یعنی حدود سه برابر تخمین اولیه افزایش یافت تا احتمال تورش و ریزش ناشی از فوت و یا عود جبران گردد و در نهایت تعداد ۲۸ نفر از بیماران در هر سه مقطع زمانی مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق با همکاری مشترک مرکز خون و پیوند مغز

بودند. سطح آلکالن فسفاتاز از  $171/16 \pm 264/04$  واحد بر لیتر در زمان پیوند به  $325/83 \pm 315/32$  واحد بر لیتر در ماه ششم پس از پیوند و  $333/12 \pm 447/86$  واحد بر لیتر در ماه دوازدهم افزایش یافت. سطح آن از زمان پیوند تا ماه شش افزایش داشته که از نظر آماری معنی دار نیست. (P=0.75). سپس از ماه شش به ۱۲ نیز افزایش پیدا کرد که از نظر آماری تا حدودی معنی دار بود (P=0.08) ولی به طور کلی متوسط سطح آلکالن فسفاتاز در ماه دوازدهم نسبت به آغاز مطالعه به طور معنی داری بیشتر بود (P=0.007). متوسط سطح استئوکلسین از  $34/51 \pm 32/62$  نانوگرم بر میلی لیتر در زمان پیوند به  $46/86 \pm 34/79$  نانوگرم بر میلی لیتر در ماه ششم پس از پیوند و  $50/04 \pm 36/37$  نانوگرم بر میلی لیتر در ماه دوازدهم افزایش یافت. با وجود روند افزایشی متوسط سطح استئوکلسین، اختلاف مشاهده شده در دوره های زمانی مختلف از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.15). در خصوص ICTP، سطح آن از  $0/92 \pm 0/058$  نانوگرم بر سانتی متر مکعب در زمان پیوند به  $1/56 \pm 0/091$  نانوگرم بر سانتی متر مکعب در ماه ششم پس از پیوند و  $0/77 \pm 1/41$  نانوگرم بر سانتی متر مکعب در ماه دوازدهم افزایش یافت. اگرچه در مقایسه دو به دو ارتباط معنی داری بدست نیامد، نوسانات افزایشی متوسط آن معنی دار شده است (P=0.04). سطح هورمون پاراتورمون از  $22/77 \pm 23/22$  پیکوگرم بر سانتی متر مکعب در ماه شش افزایش یافت که از نظر آماری معنی دار نیست (P=1)، ولی از ماه شش تا ماه ۱۲ بطور معنی داری افت داشته است (P=0.01). (در پایان ماه دوازدهم به  $4/38 \pm 11/78$  پیکوگرم بر سانتی متر مکعب رسید). سطح کلسیم از زمان پیوند تا ماه شش کاهش داشت (از  $1/45 \pm 9/91$  میلی گرم بر دسی لیتر به  $9/34 \pm 1/02$  میلی گرم بر دسی لیتر رسید) که از نظر آماری معنی دار نیست (P=0.71) ولی در پایان ماه دوازدهم به  $10/45 \pm 0/72$  میلی گرم بر دسی لیتر رسید و بدین ترتیب از ماه شش تا ماه ۱۲ به طور معنی داری افزایش داشته است (P=0.02). سطح فسفر هم از  $0/84 \pm 3/33$  میلی گرم بر دسی لیتر در زمان پیوند به  $3/71 \pm 0/59$  میلی گرم بر دسی لیتر در ماه شش و  $1/06 \pm 0/72$  میلی گرم بر دسی لیتر در ماه دوازدهم افزایش یافت ولی هیچ کدام از نظر آماری به ترتیب با P=0.25 و P=0.78 معنی دار نیستند ولی متوسط آن در ماه ۱۲ نسبت به زمان پیوند طور معنی داری بیشتر بود.

BMD از زمان پیوند تا ماه ششم افت معنی دار داشت (با درجه آزادی ۲، آماره آزمون  $23/3 \pm 0/001$  (P)) ولی از ماه شش تا ماه ۱۲ دیگر تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P=1). سطح BMD در ناحیه مهره های کمری از  $0/14 \pm 1/13$  گرم بر سانتی متر مربع در زمان پیوند به  $0/14 \pm 1/12$  گرم بر سانتی متر مربع در ماه ششم رسید که تا ماه دوازدهم همین مقدار باقی ماند. سطح BMD در ناحیه مهره های کمری با درجه آزادی ۲، آماره آزمون  $0/79 \pm 0/049$  در هیچ مقطع زمانی تغییرات معنی داری نشان نداده است. دانسیته استخوانی گردن فمور در دو جنس مذکور و مؤنث از زمان پیوند در آغاز مطالعه تا پایان ماه دوازدهم با درجه آزادی ۲، آماره آزمون  $19/26 \pm 0/001$  (P) بطور معنی داری افت داشت ولی بین زنان و مردان اختلاف معنی داری یافت نشد (درجه آزادی ۲، آماره آزمون  $0/45 \pm 0/051$  (P)). دانسیته استخوانی گردن فمور در دو نوع پیوند آلوژن و اتو لوگ در طی زمان با درجه آزادی ۲، آماره آزمون  $14/61 \pm 0/001$  (P) به طور معنی داری افت داشت. با این حال، گردن فمور در بیماران تحت هر دو نوع پیوند اختلاف معنی داری نداشت (درجه آزادی ۱، آماره آزمون  $0/98 \pm 0/033$  (P)). دانسیته استخوانی گردن فمور در دو گروه دارای نمایه توده بدنی (BMI) بالا (کیلوگرم بر مترمربع  $>25$ ) و BMI پایین (کیلوگرم بر مترمربع  $\leq 24/9$ ) در طی زمان با درجه آزادی ۲، آماره آزمون  $19/55 \pm 0/001$  (P) بطور معنی داری افت داشت. البته بین این دو گروه نیز از نظر BMD گردن فمور اختلاف معنی داری وجود داشت به طوری که افت تراکم استخوان این ناحیه در گروه دارای BMI بالاتر کمتر بود (درجه آزادی ۱، آماره آزمون  $5/18 \pm 0/03$ ). به طور کلی دانسیته استخوانی مهره های کمری از زمان پیوند در آغاز مطالعه تا پایان ماه دوازدهم در هر دو جنس مذکور و مؤنث، هر دو نوع پیوند آلوژن و اتو لوگ و در هر دو گروه با BMI بالا و پایین به ترتیب با درجه آزادی ۲، آماره های آزمون  $1/16 \pm 0/65$  (P=0.32) و  $2/28 \pm 0/53$  (P=0.05) افت معنی داری نداشت ولی BMD مهره های کمری در دو گروه دارای BMI بالا و پایین با هم اختلاف معنی داری داشتند (درجه آزادی ۱، آماره آزمون  $8 \pm 0/009$  (P)). مقایسه درصد بروز استئوپنی و استئوپوروز در پیوند آلوژن و اتو لوگ به ترتیب در جداول ۲ و ۳ آورده شده است.

نشانگرهای بیوشیمیابی تغییر شکل استخوان شامل نشانگرهای ساخت (آلکالن فسفاتاز و استئوکلسین) و جذب استخوان (ICTP)

مردان بود ( $P=0.01$ ) ولی بین دو جنس مذکر و مؤنث اختلاف معنی داری وجود نداشت ( $P=0.47$ ). سطح ICTP در هر دو نوع پیوند اтолوگ و آلوژن در طول زمان افزایش معنی دار داشت (از زمان پیوند تا ماه ششم با  $P=0.05$ ) ولی بین دو نوع پیوند اختلاف معنی داری وجود نداشت ( $P=0.06$ ). ICTP در دو گروه با BMI بالا و پایین در طی زمان به طور معنی داری افزایش نداشت ( $P=0.1$ ) ولی افزایش ICTP در گروه دارای BMI کمتر به طور معنی داری بیشتر بود ( $P=0.02$ ). سطح هورمون پاراتورمون در طی زمان در دو جنس مذکر و مؤنث، در دو نوع پیوند آلوژن و اтолوگ و در دو گروه با BMI بالا و پایین به طور معنی داری افت داشت ( $P=0.03$ ,  $P=0.02$ ). در عین حال بر اساس نوع جنس، نوع پیوند و مقدار BMI تفاوتی بین گروهها مشاهده نشد ( $P=0.42$ ,  $P=0.52$ ,  $P=0.08$ ,  $P=0.08$ ).

هورمونهای جنسی: روند تغییرات FSH در زنان سعودی بوده به طوری که از  $24/75 \pm 15/17$  واحد بر لیتر در زمان پیوند به  $49/41 \pm 10/45 \pm 5/20$  واحد بر لیتر در ماه ششم پس از پیوند و  $4/83 \pm 1/80$  واحد بر لیتر در ماه دوازدهم رسید. بدین ترتیب میانگین زمان صفر واحد بر لیتر در ماه دوازدهم داشت ( $P=0.02$ ). سطح LH نیز از  $18/96 \pm 13/86$  واحد بر لیتر در زمان پیوند به  $18/66 \pm 4/8$  واحد بر لیتر در زمان دوازدهم رسید. روند سعودی LH از زمان پیوند تا ماه ۱۲ با  $P=0.03$  معنی دار بود سطح استراديول در زنان از  $44/01 \pm 51/77$  پیکومول بر لیتر در آغاز پیوند به  $20/99 \pm 8/82$  پیکومول بر لیتر در ماه ششم پس از پیوند و  $28/66 \pm 9/28$  پیکومول بر لیتر در ماه دوازدهم پس از پیوند رسید که در هیچ مقطع زمانی تغییرات معنی داری نداشته است. تراکم استخوان در بیماران موئی که دچار هیپوگلادیسم بودند در ماه ششم  $1/1$  گرم بر سانتی متر مربع در مقابل  $1/22$  در افراد موئی نرمال بود و در ماه دوازدهم این مقادیر به ترتیب  $0/9$  و  $1/04$  بود. سطح FSH در مردان از  $6/14 \pm 7/53$  واحد بر لیتر در زمان پیوند به  $41/93 \pm 38/76$  واحد بر لیتر در ماه دوازدهم رسید و روند تغییرات FSH در مردان از زمان صفر نسبت به ماه ۱۲ با  $P=0.02$  از نظر آماری معنی دار می باشد. ولی سیر نوسانات LH علیرغم سعودی بودن با  $P=0.11$  معنی دار نیست در مردان نیز با درجه آزادی ۲ و آماره آزمون  $1/56$  و  $P=0.22$  در هیچ

( $P=0.04$ ). از نظر سطح ویتامین D، اختلاف معنی داری بین زمان صفر (زمان پیوند) و ماه ششم وجود ندارد (از  $15/55 \pm 4/79$  نانوگرم بر سانتی متر مکعب به  $31/12 \pm 4/276$  نانوگرم بر سانتی متر مکعب رسید) و به این ترتیب رسید) ولی از ماه ششم تا ماه دوازدهم متوسط سطح ویتامین D به  $35/89 \pm 22/01$  نانوگرم بر سانتی متر مکعب رسید و به این ترتیب به طور معنی داری افت پیدا کرد ( $P=0.04$ ). بین زنان و مردان از نظر نوسان سطح کلسیم اختلاف معنی داری وجود نداشت (درجه آزادی ۱، آماره آزمون  $0/36$  و  $P=0.56$ ) ولی سطح کلسیم در هر دو نوع پیوند آلوژن و اтолوگ از آغاز مطالعه تا ماه ششم با  $P=0.01$  افزایش داشت (درجه آزادی ۱، آماره آزمون  $3/43$  و  $P=0.08$ ). لازم به ذکر است که نوسان کلسیم در دو گروه با BMI بالا و پایین از ماه ششم به ۱۲ افزایش معنی داری داشت ( $P=0.02$ ). با وجود افزایش میزان فسفر در طول زمان، تغییرات فسفر با جنس برهمکنش داشتند یعنی آزمون  $5/97$  و  $P=0.005$ . سطح فسفر در هر دو نوع پیوند و در دو گروه BMI بالا و پایین در طول زمان به طور معنی داری افزایش داشت ( $P=0.001$  و  $P=0.01$ ). در عین حال سطح فسفر در دو جنس، دو نوع پیوند و دو گروه با BMI بالا و پایین اختلاف معنی داری نداشت ( $P=0.39$  و  $P=0.16$ ). در عوض سطح آلکالن فسفاتاز در طول زمان نه تنها در هر دو جنس، بلکه در هر دو نوع پیوند اтолوگ و آلوژن و در هر دو گروه با BMI بالا و پایین نیز به طور معنی داری افزایش داشت ( $P=0.002$ ,  $P=0.02$  و  $P=0.002$ ) ولی بر اساس نوع جنس، نوع پیوند و مقدار BMI تفاوتی بین گروهها مشاهده نشد ( $P=0.58$  و  $P=0.21$  و  $P=0.15$ ). در مورد استئوکلسین نیز بین زنان و مردان و در هر دو گروه پیوند اтолوگ و آلوژن تفاوتی بین گروهها مشاهده نشد ( $P=0.90$  و  $P=0.98$ ). در خصوص ویتامین D باید ذکر کرد اگرچه سطح آن در طی زمان در دو جنس مذکور و مؤنث کاهش معنی داری نداشت ( $P=0.15$ ), در دو نوع پیوند اтолوگ و آلوژن و در دو گروه با BMI بالا و پایین به طور معنی داری افت پیدا کرد ( $P=0.02$ ). البته در خصوص این ویتامین نیز بر اساس نوع جنس، نوع پیوند و مقدار BMI تفاوتی بین گروهها مشاهده نشد ( $P=0.16$ ,  $P=0.04$  و  $P=0.81$ ). با وجود افزایش سطح ICTP در طول زمان تغییرات این متغیر با جنس برهمکنش داشتند یعنی افزایش آن در زنان بیشتر از

معنی‌داری افزایش داشت ( $P<0.001$ ). اگرچه سطح این هورمون در دو جنس تفاوت معنی‌دار داشت (در زنان بیشتر از مردان بود  $P<0.001$ ، در دو نوع پیوند و در دو گروه با BMI بالا و پایین اختلاف معنی‌داری وجود نداشت بهترین با  $P=0.15$  و  $P=0.49$ ). لازم به ذکر است که در بیماران سطح LH تغییراتی مشابه FSH داشت. نکته قابل ذکر در خصوص استروژن این است که کاهش آن در خانم‌ها از زمان پیوند تا ماه ششم از نظر آماری معنی‌دار بود ( $P=0.01$ ) و در سایر شرایط، نوسانات آن از نظر آماری معنی‌دار نبود. تغییرات تستوسترون نیز در مردان از نظر آماری معنی‌دار نبود.

## بحث

پیوند مغز/استخوان (BMT) درمان انتخابی برای بسیاری از بیماریهای بدیمی و غیربدیمی است همچنانکه طول عمر این بیماران افزایش می‌یابد، عوارض درازمدت پیوند مثل استئوپوروز باید در نظر گرفته شود چرا که با مرگ و میر بیماران ارتباط مستقیم دارد. بیشترین محل کاهش تراکم استخوان در گردن فمور مشاهده شد. این مسئله در اکثر مطالعات قبلی نیز گزارش شده بود.<sup>1</sup> بیشترین زمان کاهش تراکم استخوان در شش ماه اول ایجاد شد که در بررسی‌های انجام شده در فور پیوند سایر اعضاء نیز تایید شده بود.<sup>12</sup> مجموع استئوپوروز و استئوپنی در مهره‌های کمری از  $51/2\%$  بعد از یک سال به  $56/5\%$  افزایش یافت ولی در ناحیه گردن فمور از مجموع  $26/8\%$  به  $46/8\%$  رسید که نشان می‌دهد بیشترین کاهش تراکم استخوان در گردن فمور رخ می‌دهد.<sup>13</sup> نکته جالب توجه کاهش معنی‌دار BMD هم در ناحیه گردن فمور و هم در ناحیه مهره‌های کمری در گروه دارای BMI پایین‌تر (کمتر از  $25$ ) بود که اثر BMI را به عنوان یک عامل مؤثر مستقیم بر دانسته استخوانی مورد تأکید قرار می‌دهد. نشانگرهای ساخت یعنی آکالان فسفاتاز و استئوکلسین بعد از پیوند نسبت به قبل از پیوند به میزان قابل توجهی افزایش داشت درحالی که انتظار داریم بعد از پیوند میزان ساخت استخوان کاهش یابد. بیشترین کاهش در ساخت استخوان در چهار تا شش هفته اول رخ می‌دهد و سپس میزان ساخت افزایش می‌یابد<sup>15</sup> از آنجایی که در این مطالعه در فاصله چهار تا شش هفته اول بررسی صورت نگرفته است لذا افزایش نشانگرهای ساخت در پایان ماه دوازدهم قابل توجیه می‌باشد. به طور کلی سطح ICTP در بیماران ما افزایش یافت که این افزایش در زنان بیشتر از

جدول-۱: اطلاعات کلی بیماران

مشخصات دموگرافیک	(طیف) عدد
تعداد بیماران (بیمار)	۳
متوسط سن (سال)	۲۵(۱۸-۵۵)
جنس (زن/ مرد)	۲/۰/۱
وزن (کیلوگرم)	۶۷/۸ (۴۴-۱۲۰)
نمایه توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع)	۲۳/۸ (۱۵/۶-۳۵/۴)
مرتبه رمیسیون اول	۵۲
پیوند آلوژن به اتلولوگ	۲/۱
تعداد روزهای بستری	۴۵/۵ (۳۰-۱۱۰)

جدول-۲: مقایسه درصد استئوپنی و استئوپوروز در پیوند آلوژن

مهره‌های کمری (%)	گردن فمور (%)	نرمال	استئوپنی	استئوپوروز	نرمال	استئوپنی	استئوپوروز
قبل از پیوند	۲۶/۸	۷۳/۲	۴/۹	۴۶/۳	۴۸/۸	۴۸/۸	۰
۶ ماه بعد	۳۴/۵	۶۲/۱	۲/۴	۵۵/۲	۴۱/۴	۴۱/۴	۳/۴
۱۲ ماه بعد	۳۹/۱	۵۲/۲	۴/۳	۵۲/۲	۴۳/۵	۴۳/۵	۸/۷

جدول-۳: مقایسه درصد استئوپنی و استئوپوروز در پیوند اتلولوگ

مهره‌های کمری (%)	گردن فمور (%)	نرمال	استئوپنی	استئوپوروز	نرمال	استئوپنی	استئوپوروز
قبل از پیوند	۱۵	۲۵	۶۰	۵	۳۰	۶۵	۰
۶ ماه بعد	۱۸/۸	۱۸/۸	۶۲/۵	۷۳	۱۸/۸	۷۵	۶
۲ ماه بعد	۱۲/۵	۳۷/۵	۵۰	-	۵۰	۵۰	۲

قطعه زمانی تغییرات معنی‌داری نداشته است ( $2/48 \pm 2/48$  پیکومول بر لیتر  $3/81$  در زمان پیوند،  $2/33 \pm 4/71$  پیکومول بر لیتر در ماه ششم پس از پیوند و  $2/96 \pm 5/11$  پیکومول بر لیتر در ماه دوازدهم). با وجود افزایش میزان FSH در طول زمان، تغییرات آن با جنس برهمنکش داشتند. افزایش FSH در گروه زنان بیشتر از مردان بود ( $P=0.004$ ). سطح این هورمون در طی زمان در دو جنس مذکور و مؤنث، هر دو نوع پیوند آلوژن و اتلولوگ و در هر دو گروه با BMI بالا و پایین به طور

توجهی کاهش می‌یابد. همچنین بیشترین کاهش تراکم استخوان در ناحیه گردن فمور و بخصوص در شش ماه اول بعد از پیوند ایجاد می‌شود. هیپوگنادیسم خصوصاً در زنان به صورت قابل توجهی ایجاد شد. عواملی که با کاهش تراکم استخوان رابطه مستقیم داشتند هیپوگنادیسم در زنان و BMI بود. مطالعات دیگر در خصوص بررسی اثر مصرف کورتیکواستروئیدها بر تراکم استخوان در این بیماران ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه در بیماران پیوند شده مغز استخوان شکستگی در مقادیر بالاتری از چگالی استخوان رخ می‌دهد،<sup>۱۹-۲۱</sup> لذا توصیه می‌کنیم راهکارهای پیشگیری از استئوپوروز از جمله تجویز کلسیم و ویتامین D، آموزش ورزش‌های تحمل‌کننده وزن<sup>۲۲</sup> داشتن وزن مناسب و جایگزینی هورمونی برای بیماران مونث اتخاذ گردد. در بیماران مذکور نیز کنترل تستوسترون به عمل آید و در صورت کاهش آن جایگزینی هورمونی مناسب انجام شود. مطالعات بعدی در این مرکز درباره مداخلات درمانی از جمله استفاده از بیس فسفاتها<sup>۲۳</sup> بعد از پیوند مغز استخوان در حال برنامه‌ریزی و شروع می‌باشد و در صورت نتایج مطلوب تجویز آن در بیماران پیوند شده در نظر گرفته می‌شود.

#### سپاسگزاری:

با تشکر از مرکز تحقیقات هماتولوژی- انکولوژی و پیوند مغز استخوان و مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران که با مساعدت همه جانبه ایشان این مطالعه به انجام رسید.

## References

- Lawrence GR. Metabolic bone disease. Larsen PR, Kronenberg HR. Williams Textbook of Endocrinology. 10th ed. Philadelphia: Sanders; 2003; p. 1373-410.
- Taube T, Beneton MN, McCloskey EV, Rogers S, Greaves M, Kanis JA. Abnormal bone remodelling in patients with myelomatosis and normal biochemical indices of bone resorption. *Eur J Haematol* 1992; 49: 192-8.
- Holmes SJ, Whitehouse RW, Clark ST, Crowther DC, Adams JE, Shalet SM. Reduced bone mineral density in patients with adult onset growth hormone deficiency. *J Clin Endocrinol Metab* 1994; 78: 669-74.
- Melhus H, Michaelson K, Kindmark A, Bergstrom R, Holmberg L, Mallmin H, et al. Excessive dietary intake of vitamin A is associated with reduced bone mineral density and increased risk for hip fracture. *Ann Intern Med* 1998; 129: 770-8.
- Holler E, Kolb HJ, Moller A, Kempeni J, Liesenfeld S, Pechumer H, et al. Increased serum levels of tumor necrosis factor alpha precede major complications of bone marrow transplantation. *Blood* 1990; 75: 1011-6.
- Ebeling PR, Thomas DM, Erbas B, Hopper JL, Szer J, Grigg AP. Mechanisms of bone loss following allogeneic and autologous hemopoietic stem cell transplantation. *J Bone Miner Res* 1999; 14: 342-50.
- Barton CH, Vaziri ND, Martin DC, Choi S, Alikhani S. Hypomagnesemia and renal magnesium wasting in renal transplant recipients receiving cyclosporine. *Am J Med* 1987; 83: 693-9.
- Schimmer AD, Quatermain M, Imrie K, Ali V, McCrae J, Stewart AK, et al. Ovarian function after autologous bone marrow transplantation. *J Clin Oncol* 1998; 16: 2359-63.
- Schimmer AD, Ali V, Stewart AK, Imrie K, Keating A. Male sexual function after autologous blood or marrow transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant* 2001; 7: 279-83.
- Takamatsu Y, Simmons PJ, Moore RJ, Morris HA, To LB, Levesque JP. Osteoclast-mediated bone resorption is stimulated during short-term administration of granulocyte colony-stimulating factor but is not responsible for hematopoietic progenitor cell mobilization. *Blood* 1998; 92: 3465-73.
- Stern JM, Sullivan KM, Ott SM, Seidel K, Fink JC, Longton G, et al. Bone density loss after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a prospective study. *Biol Blood Marrow Transplant* 2001; 7: 257-64.

12. Shane E, Rivas M, McMahon DJ, Staron RB, Silverberg SJ, Seibel MJ, et al. Bone loss and turnover after cardiac transplantation. *J Clin Endocrinol Metab* 1997; 82: 1497-506.
13. Valimaki MJ, Kinnunen K, Volin L, Tahtela R, Loytynniemi E, Laitinen K, et al. A prospective study of bone loss and turnover after allogeneic bone marrow transplantation: effect of calcium supplementation with or without calcitonin. *Bone Marrow Transplant* 1999; 23: 355-61.
14. Castañeda S, Carmona L, Carvajal I, Arranz R, Díaz A, García-Vadillo A. Reduction of bone mass in women after bone marrow transplantation. *Calcif Tissue Int* 1997; 60: 343-7.
15. Kang MI, Lee WY, Oh KW, Han JH, Song KH, Cha BY, et al. The short-term changes of bone mineral metabolism following bone marrow transplantation. *Bone* 2000; 26: 275-9.
16. MacAdams MR, White RH, Chippis BE. Reduction of serum testosterone levels during chronic glucocorticoid therapy. *Ann Intern Med* 1986; 104: 648-51.
17. Reid IR. Glucocorticoid-induced osteoporosis: assessment and treatment. *J Clin Densitom* 1998; 1: 65-73.
18. Schulte C, Beelen DW, Schaefer UW, Mann K. Bone loss in long-term survivors after transplantation of hematopoietic stem cells: a prospective study. *Osteoporos Int* 2000; 11: 344-53.
19. Kauppila M, Irlala K, Koskinen P, Pulkki K, Sonninen P, Viikari J, et al. Bone mineral density after allogeneic bone marrow transplantation. *Bone Marrow Transplant* 1999; 24: 885-9.
20. Luengo M, Picado C, Del Rio L, Guanabens N, Montserrat JM, Setoain J. Vertebral fractures in steroid dependent asthma and involutional osteoporosis: a comparative study. *Thorax* 1991; 46: 803-6.
21. Manolagas SC, Jilka RL. Bone marrow, cytokines, and bone remodeling. Emerging insights into the pathophysiology of osteoporosis. *N Engl J Med* 1995; 332: 305-11.
22. Braith RW, Mills RM, Welsch MA, Keller JW, Pollock ML. Resistance exercise training restores bone mineral density in heart transplant recipients. *Congr Coll Cardiol* 1996; 28: 1471-7.
23. Shane E, Thys-Jacobs SE, Rivas M, McMahon DJ, Staron RB, Seibel MJ, et al. Antiresorptive therapy prevents bone loss after cardiac transplantation (CTX). *Bone Min Res* 1996; 11: 340.

Archive of SID

## Bone densitometric changes after bone marrow transplantation in 63 patients with leukemia and lymphoma

Esfahani A.<sup>\*1</sup>  
Iravani M.<sup>1</sup>  
Khoshnyat M.<sup>2</sup>  
Ghoreishi Z.<sup>3</sup>  
Shamshiri A R.<sup>1</sup>  
Moghadam Z.<sup>4</sup>  
Jahani M.<sup>1</sup>  
Ghavamzadeh A.<sup>1</sup>

1- Hematology, Oncology and Bone Marrow Transplantation Research Center  
2- Endocrinology and Metabolism Research Center  
3- Department of Nutrition and Biochemistry  
4- Head nurse of Bone Marrow Transplantation Clinic

Tehran University of Medical Sciences

### Abstract

**Background:** Bone marrow transplantation (BMT) is the treatment of choice for many patients with malignant and nonmalignant diseases. Long-term complications such as osteoporosis should be considered, because it is directly associated with the morbidity and mortality. The purpose of this study is to assess the bone mineral density after allogenic or autologous bone marrow transplantation in patients with leukemia or lymphoma.

**Methods:** We prospectively investigated 63 patients undergoing BMT for acute and chronic leukemia and lymphoma. At the end of the study, a total of 28 patients were assessed. Bone mineral density (BMD) was measured prior BMT, and 6 and 12 months after BMT. Osteocalcin, bone alkaline phosphatase and C-terminal telopeptides of type 1 collagen (ICTP) were assessed. Serum concentration of calcium, phosphorous, vitamin D, PTH and sex hormones (FSH, LH, testosterone and estradiol) were also measured.

**Results:** There was a significant decrease in the bone mineral density of the femoral neck six months after BMT ( $p<0.001$ ),  $1.01\pm0.13\text{g/cm}^2$  prior to BMT and  $0.96\pm0.13\text{ g/cm}^2$  at six months, but no considerable changes were seen in lumbar vertebrae. Bone loss between the 6<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> months was not observed. The levels of ICTP and phosphorus increased significantly by the 12<sup>th</sup> month ( $p=0.04$ ). The level of calcium was higher at the 6<sup>th</sup> month ( $p=0.002$ ) but the level of vitamin D and PTH decreased by the end of the study ( $p=0.04$  and  $p=0.01$ , respectively) and the average of osteocalcin did not increase significantly. In women, the level of estradiol decreased by the 6<sup>th</sup> month ( $p=0.01$ ), but the testosterone changes were not significant.

**Conclusion:** The risk of bone loss in both allogeneic and autologous BMT is higher in the femoral neck than the lumbar vertebrae, occurring mainly in the first six months after BMT. Preventive and clinical procedures should be considered.

**Keywords:** Osteoporosis, bone marrow transplantation, leukemia, lymphoma.

\* Corresponding author: Hematology and Oncology Research Center, Ghazi Tabatabaii Hospital, Tabriz, Iran.  
Tel: +98-411-3343811-3  
email: ali\_sfhn@yahoo.com