

## تعیین اثر دگرآمتاژون وریدی و بوپیوآکائین موضعی در استفراغ و درد بعد از تونسیلکتومی

### چکیده

**زمینه و هدف:** با توجه به سن پایین بیماران تونسیلکتومی و اینکه درد و استفراغ بعد از عمل منجر به تاخیر در شروع تغذیه و ناراحتی بیمار شده و زمان ترخیص را به تعویق می‌اندازد، این مطالعه جهت بررسی اثر و مقایسه تزریق وریدی یک دوز دگرآمتاژون و تزریق موضعی بوپیوآکائین در کاهش درد و استفراغ بعد از عمل تونسیلکتومی طراحی شد. روش بررسی: در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی ۱۲۰ کودک ۳-۵ ساله با کلاس I ASA که کاندید تونسیلکتومی تحت بیهوشی عمومی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند در گروه اول دو میلی لیتر نرمال سالین در پیلار لوزه‌ها تزریق گردید، گروه دوم  $0.5 \text{ mg/kg}$  دگرآمتاژون وریدی (حداکثر ۱۶ میلی گرم) دریافت نمودند و در گروه سوم دو میلی لیتر بوپیوآکائین  $0.5\%$  در پیلار لوزه‌ها قبل از شروع عمل و بعد از انتوباسیون تزریق شد. در خاتمه عمل بیماران از جهت درد و استفراغ در ساعات ۰/۵، ۴، ۲۴ و ۱۲۰ بعد از انتوباسیون و انتقال به ریکاوری کنترل شدند. **یافته‌ها:** ۷۰ مذکور و ۵۰ مومنث در میانگین سنی  $8/4 \pm 3/2$  بعد از انتوباسیون موقتی عدم مراجعته جهت پیگیری پرسشنامه برای ۱۱۷ نفر تکمیل شد. تنها کاهش قابل توجه و مورد مطالعه بودند که بدلیل عدم مراجعته جهت پیگیری پرسشنامه برای ۱۱۷ نفر تکمیل شد. تنها کاهش قابل توجه و معنی دار در پارامتر درد بعد از عمل مربوط به گروه بوپیوآکائین و چهار ساعت پس از عمل بود ( $P < 0.05$ ). در یقه موارد اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد. **نتیجه گیری:** با توجه به کاهش درد و استفراغ پس از تونسیلکتومی توسط دگرآمتاژون وریدی و بوپیوآکائین موضعی، مصرف همزمان دو دارو در تونسیلکتومی توصیه می‌شود و بررسی مصرف همزمان دو دارو پیشنهاد می‌گردد.

**کلمات کلیدی:** دگرآمتاژون، بوپیوآکائین، تونسیلکتومی، استفراغ، درد.

پیمان دبیر مقدم\*

محمد حسین برادران فر<sup>۱</sup>

ویدا آیت الله<sup>۲</sup>

مجید شکیبا پور<sup>۳</sup>

۱. مرکز تحقیقات گوش گلور بینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲. گروه گوش گلور بینی

۳. گروه بیهوشی و مراقبتها و پژوهش

بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهریار، صدوقی بزرگ

\*نویسنده مسئول: تهران، بیمارستان امیراعلم

تلفن: ۰۲۶۰۳۰۳۷

email: payman.dm@gmail.com

### مقدمه

تونسلکتومی یکی از شایع‌ترین اعمال جراحی سرپایی در کودکان است. درد و استفراغ (۷۱-۴۰ درصد)<sup>۱</sup> که دو عارضه عمده این عمل هستند می‌توانند منجر به تاخیر در شروع تغذیه بعد از عمل و بی‌قراری کودک شده و نهایتاً ترخیص کودک را به تاخیر می‌اندازند. کاهش درد و استفراغ بعد از عمل به منظور بهبود کفیت مراقبتها بعد از عمل و کاهش موربیدیتی است و با کنترل آنها می‌توان ۶-۴ ساعت پس از عمل بیمار را مرخص کرد. تزریق وریدی دگرآمتاژون و تزریق موضعی داروهای بی‌حس کننده، در چند سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نتایج حاصله یکسان نبوده و تاثیر روش‌های فوق روش نیست. دگرآمتاژون علاوه بر اثر ضد استفراغ به علت اثر

### روش بررسی

انتخاب نمونه‌ها به صورت Conventional بر روی ۱۲۰ بیمار کاندید عمل تونسیلکتومی بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شد. جامعه مورد بررسی کودکان ۱۵-۳ ساله در کلاس I ASA بودند که از مهر

در آزمون آنالیز واریانس، تفاوت میانگین شدت درد نیم ساعت پس از اکستوباسیون بین سه گروه معنی دار نشد ( $P=0.13$ ). میانگین شدت درد در چهار ساعت پس از عمل در هر سه گروه یکسان بود ( $P=0.05$ ) اما مقایسه بین دو گروه دارونما و بوپیواکائین در این زمان تفاوت معنی دار داشت ( $P=0.018$ ) و میانگین شدت درد در گروه بوپیواکائین به صورت معنی دار کمتر از گروه دارونما بود. مقایسه دو به دو دارونما - دگراماتازون و دگراماتازون - بوپیواکائین در این زمان تفاوت معنی دار نشان نداد. در ۲۴ ساعت و ۱۲۰ ساعت پس از عمل هم میانگین شدت درد بین سه گروه معنی دار نشد ( $P=0.63$ ) و ( $P=0.89$ ). بیشترین موارد استفراغ نیم ساعت بعد از اکستوباسیون در گروه بوپیواکائین و کمترین موارد در گروه دگراماتازون بود. اما در آزمون  $\chi^2$  تفاوت معنی دار آماری بین سه گروه مشاهده نشد ( $P=0.66$ ). چهار ساعت پس از عمل باز هم بیشترین استفراغ را گروه بوپیواکائین و کمترین موارد را گروه دگراماتازون داشته اند ولی تفاوت معنی دار نبود ( $P=0.55$ ). ۲۴ ساعت پس از عمل کمترین استفراغ را در گروه دگراماتازون داشتیم اما بدلیل کم بودن موارد استفراغ در این زمان انجام آزمون آماری امکان پذیر نبود. در ساعت ۱۲۰ پس از عمل هم فقط یک مورد از گروه دارونما استفراغ داشت لذا انجام آزمون آماری امکان پذیر نبود. در نتیجه تنها کاهش معنی دار و مهم در مطالعه ما کاهش درد توسط بوپیواکائین در ساعت چهار پس از عمل بود.

## بحث

در این مطالعه دگراماتازون نتوانست به طور قابل توجهی باعث کاهش استفراغ شود هر چند ۲۴ ساعت پس از عمل تعداد موارد استفراغ کمتری نسبت به سایر گروه ها ملاحظه گردید. همچنین درد بعد از عمل هم توسط دگراماتازون هیچگونه کاهشی نشان نداد. بوپیواکائین توانست به صورت چشمگیری چهار ساعت پس از عمل درد را کم کند اما هیچ اثری روی استفراغ نداشت. استفراغ بعد از عمل یک مشکل مولتی فاکتوریال است و فاکتورهای متعدد مرتبط با بیهوشی و غیر مرتبط با بیهوشی جهت دستیابی به نتایج صحیح باید مدنظر باشند. تکنیک بیهوشی، مقدار هیدراتاسیون بیمار، دوز داروی مخدر، درمان ضد استفراغ قبل از عمل، تخلیه هوای معده و مسائل دیگر باید در نظر گرفته شوند<sup>1</sup> در مطالعه ما سعی بر این شد که تمامی این فاکتورها مد نظر بوده و برای همه بیماران یکسان باشد.

۸۲ لغایت شهریور ۸۳ تحت عمل تونسیلکتومی با روش Sharp قرار گرفته بودند. پس از رگ گیری و تجویز میدازولام به عنوان پره مدلیکاسیون ۲۰ ml سرم  $2/3$ ،  $1/3$  انفوزیون می شد. سپس کودک به اتاق عمل منتقل شده با  $2 \mu\text{g/kg} + 0.5 \text{ mg/kg} + 0.5 \text{ mg/kg}$  آتراکوریوم +  $0.5 \text{ mg/kg}$  تیوپنتال سدیم بیهوشی انجام و پس از سه دقیقه تهویه، انتوبه می شد. قبل از شروع عمل جراحی، دو میلی لیتر بوپیواکائین  $0.5\%$  در پیلار لوزه ها (هر طرف  $1 \text{ ml}$ ) یا دو میلی لیتر محلول نرمال سالین (هر طرف  $1 \text{ ml}$ ) و یا  $0.5 \text{ mg/kg}$  (حداکثر  $16$  میلی گرم) دگراماتازون به صورت وریدی تجویز می شد. سپس به جراح گوش و حلق و بینی (بدون اطلاع از گروه بیمار) اجازه عمل داده می شد. حین عمل با در نظر گرفتن میزان خون از دست رفته  $3-5$  میلی لیتر سرم به ازای هر کیلو گرم وزن داده می شد. ادامه بیهوشی با هالوتان  $1\%$  و  $N2O 50\%$  بود در انتهای عمل معده ساکشن شده و کودک کاملاً بیدار اکستوبه می شد. درد با استفاده از Visual Analog Scale (VAS) در زمانهای نیم ساعت بعد از اکستوباسیون، ساعت چهارم، ساعت ۲۴ و روز پنجم (ساعت ۱۲۰) پس از عمل کنترل می شد. (شدت درد از صفر تا ده نمره گذاری شده سپس میانگین هر گروه محاسبه می شد). دفعات استفراغ در زمانهای نیم ساعت پس از اکستوباسیون، ساعت چهارم، ساعت ۲۴ و روز پنجم بعد از عمل ثبت می شد. وجود استفراغ به صورت مشاهده ای بود یا از همراه کودک سئوال می شد. پس از خاتمه توسط نرم افزارهای آماری آنالیز و تست شد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به نرم افزار SPSS ویراست یازده و نیم وارد گردید.

## یافته ها

در هیچ بیماری قبل از عمل داروی ضد استفراغ استفاده نشد. دوز داروی مخدر در همه مشابه بود. مایع درمانی همه افراد مثل هم بود. کودکان چاق در مطالعه شرکت داده نشدند ( $BMI \geq 30$ ). ۱۲۰ کودک ۱۵-۳ ساله کاندید تونسیلکتومی وارد مطالعه شدند که  $70$ ٪ (۰.۵۸) و  $50$ ٪ (۰.۴۲) با میانگین سنی  $8/4 \pm 3/3$  بودند. به علت عدم مراجعه جهت پیگیری، پرسشنامه برای  $117$  نفر تکمیل شد. میانگین طول عمل جراحی در همه گروه ها مشابه و زیر یک ساعت بود. نیم ساعت پس از اکستوباسیون بیشترین میانگین شدت درد در گروه دارونما و کمترین درد در گروه بوپیواکائین ملاحظه گردید. اما

بعد از عمل را کاهش داده، زمان شروع غذا را کوتاه‌تر کرده و ۱۲-۲۴ ساعت بعد از عمل بلع در گروه دگراماتازون به طور واضح، راحت‌تر و با درد کمتری نسبت به پلاسبو بود. بوپیوکائین با بلوك ایمپالس‌های nocieptive مانع انتقال ایمپالس به طناب نخاعی و مراکز بالاتر شده و باعث کاهش درد می‌شود.<sup>۸۹</sup> همچنین به علت بی‌حسی منطقه تحیریک کمتر حلق و استفراغ را به دنبال دارد. Wong<sup>۸</sup> مشاهده کرد که انفیلتراسیون بوپیوکائین ۰/۵ mg/kg در زیر مخاط اطراف لوزه‌ها بهتر از تجویز ۰/۵ mg/kg اسپری نرمال سالین یا ۲ mg/kg اسپری بوپیوکائین توانست درد بعد از عمل (زودرس) را کنترل کند. Vasan<sup>۹</sup> هیچ اختلاف معنی‌دار آماری در درد بعد از عمل، احتیاج به داروی ضد درد، مدت بستره و نیاز به داروی ضد استفراغ در گروهی که ۵ ml بوپیوکائین ۰/۵ در فضای اطراف لوزه‌ها تزریق گردیده بود نسبت به گروهی که ۵ ml نرمال سالین در فضای اطراف لوزه‌ها تزریق شده بود، مشاهده نکرد. Johonse<sup>۱۰</sup> کاهش قابل توجه در در گروه دریافت‌کننده بوپیوکائین ۰/۲۵٪ نسبت به گروه پلاسبو مشاهده کرد اما نیاز به مصرف ضد درد در روز اول در هر دو گروه یکسان بود. Cupero<sup>۱۱</sup> برای حلق خیلی از فاکتورها در ۲۱ بیمار بعد از انتوپیاسیون و قبل از شروع عمل در طرف راست پیلار لوزه‌ها ترکیبی از تریامسینولون و بوپیوکائین و در طرف چپ نرمال سالین تزریق کرد و هیچ تفاوت مهمی در میزان درد بعد از عمل در دو طرف مشاهده نکرد. Kander<sup>۱۲</sup> هم در ۷۲ بیمار بعد از عمل و قبل از استوپیاسیون در طرف راست گاز آغشته به دو میلی‌لیتر بوپیوکائین ۰/۵٪ و در طرف چپ گاز آغشته به دو میلی‌لیتر نرمال سالین به مدت پنج دقیقه گذشت. در تمام زمانهای چهار ساعت بعد از عمل، قبل از خواب، قبل از صبحانه، قبل از ناهار و قبل از ترجیص درد در طرف راست کمتر بود و مصرف توپیکال بوپیوکائین را پیشنهاد کرد. Kaygovsuz<sup>۱۳</sup> ۸۰ بیمار را به چهار گروه تقسیم کرد. در گروه ۱ بوپیوکائین و در گروه ۲ دگراماتازون در پیلار لوزه‌ها تزریق شد در گروه ۳ از اسپری لیدوکائین چهار بار در روز روی حفره لوزه و در گروه ۴ نرمال سالین چهار بار در روز روی حفره لوزه پاشیده می‌شد. در روز اول دگراماتازون، بوپیوکائین و لیدوکائین در مقایسه با گروه مشاهده درد را بیشتر کم می‌کنند اما در مقایسه دو به دو با هم‌دیگر تفاوتی ندارند. اما در روز سوم اسپری لیدوکائین تاثیر بهتری دارد. با توجه به نتایج مختلف و حتی مخالف مطالعات فوق و سایر مطالعات

اثر ضد استفراغ دگراماتازون می‌تواند مربوط به آنتاگونیسم پروستاکلاندین، مهار سروتونین و یا آزادی اندورفین‌ها باشد<sup>۱۴</sup> اثر ضد درد دگراماتازون هم می‌تواند به علت کاهش التهاب موضعی و یا به علت آزادی اندورفین‌ها باشد<sup>۱۵</sup> نیمه عمر بیولوژیکی دگراماتازون ۴۸-۳۶ ساعت است و می‌توان کاهش تعداد موارد استفراغ در مطالعه ما در زمان ۲۴ ساعت پس از عمل را به آن نسبت دهیم.<sup>۱۶</sup> April<sup>۱۷</sup> همکارانش در مطالعه‌ای بر روی ۸۰ کودک که در گروه مورد باکوتر تونسیلکتومی شده بودند در مقایسه با گروه شاهد مشاهده کردند که دگراماتازون باعث کاهش تریسموس، استفراغ و افزایش درجه حرارت تا شش ساعت بعد از عمل شد و در عرض ۲۴ ساعت بعد از عمل تغذیه را زودتر از گروه شاهد شروع کردند. دوز بالاتر دگراماتازون و اختلاف روش تونسیلکتومی (کوتر در مقایسه با sharp dissection لوزه) می‌تواند یکی از دلایل تاثیر واضح دگراماتازون در این مطالعه نسبت به مطالعه‌ای ما باشد.<sup>۱۸</sup> Hanasono<sup>۱۹</sup> همکاران در مطالعه‌ای روی ۲۲۹ بیمار در چهار گروه ملاحظه کردند دگراماتازون با دوز ۰/۵ mg/kg توانست درد و استفراغ را در گروهی که دگراماتازون گرفته بودند نسبت به گروههای شاهد کاهش دهد اما بیشترین کاهش درد در گروهی بود که هم دگراماتازون گرفته بودند و هم به صورت sharp (cold) عمل شده بودند (نسبت به الکتروکوتور یا hot). Giannoni<sup>۲۰</sup> در ۵۰ بیمار کلونیدین خوراکی و تزریق بوپیوکائین در لوزه‌ها قبل از عمل تجویز کرد. سپس یک گروه دگراماتازون و ریدی و گروه دیگر به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند هیچ اثر مثبت قابل توجهی از مصرف دگراماتازون مشاهده نشد و حتی برگشت فعالیتهای روزانه در گروه دگراماتازون بدتر از گروه شاهد بود. Samarkaneli<sup>۲۱</sup> مشاهده کرد تزریق داخل و ریدی ۰/۵ mg/kg دگراماتازون توانست انسیدانس استفراغ را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد اما روی درد و نیاز به ضد درد و شروع غذا هیچ تاثیری نداشت. Celiker<sup>۲۲</sup> سه دوز ۱۵۰-۱۰۰ µg/kg دگراماتازون را در سه گروه با گروه شاهد مقایسه کرد و دید که هیچ تفاوتی در شدت درد و استفراغ در چهار گروه وجود ندارد. او نوع بیهوشی و تکنیک جراحی را عامل این بی‌تفاوتی دانست. M.Elhakim<sup>۲۳</sup> مشاهده کرد که دگراماتازون ۰/۵ mg/kg تونسیلکتومی با کوتر توانست انسیدانس استفراغ زودرس و تاخیری

هر حال مصرف بوپیوکایین به صورت توپیکال می‌تواند کم خطرتر از انفیلتراسیون باشد. شاید مطالعه‌ای که روی تعداد بسیار زیاد نمونه در یک روش جراحی و بیهوشی استاندارد و یکسان و با استفاده از چند Face pain scale rating – visual (روش آزمون شدت درد مانند: analog scale – numerical verbal scale بهتری به میزان اثربخشی دگرآماتازون و بوپیوکایین در کاهش درد و استفراغ بعد از تونسیلکتومی بدهد).

در اثربخشی بوپیوکایین در کاهش درد (انفیلتراسیون یا توپیکال) و حتی استفراغ و در اثربخشی دگرآماتازون (وریدی یا انفیلتراسیون) در کاهش استفراغ و درد همگی مطالعات بر این نکته تاکید دارند که تک دوز دگرآماتازون و بوپیوکایین بی‌خطر، ارزان و راحت می‌باشد و مصرف آنها توصیه شده است. مواردی نادر از آریتمی، فلنج طنابهای صوتی و آنسٹری ساقه مغز به دنبال انفیلتراسیون بوپیوکایین گزارش شده اما در هیچکدام از مطالعات موجود عارضه‌ای مشاهده نشد. به

## References

- Miller RD. Miller's Anesthesia. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone; 2005.
- Elhakim M, Ali NM, Rashed I, Riad MK, Refat M. Dexamethasone reduces postoperative vomiting and pain after pediatric tonsillectomy. *Can J Anaesth* 2003; 50: 392-7.
- April MM, Callan ND, Nowak DM, Hausdorff MA. The effect of intravenous dexamethasone in pediatric adenotonsillectomy. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1996; 122: 117-20.
- Hanasono MM, Lalakea ML, Mikulec AA, Shepard KG, Wellis V, Messner AH. Perioperative steroids in tonsillectomy using electrocautery and sharp dissection techniques. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2004; 130: 917-21.
- Giannoni SC. AAO-HNS: Addition of Dexamethasone fails to reduce tonsillectomy pain. [cited 2001]; [http://www.psigrroup.com/dg/205bd2.htm] Available from: URL.
- Samarkandi AH, Shaikh MA, Ahmad RA, Alammar AY. Use of dexamethasone to reduce postoperative vomiting and pain after pediatric tonsillectomy procedures. *Saudi Med J* 2004; 25: 1636-9.
- Celiker V, Celebi N, Canbay O, Başıgil E, Aypar U. Minimum effective dose of dexamethasone after tonsillectomy. *Paediatr Anaesth* 2004; 14: 666-9.
- Wong AK, Bissonnette B, Braude BM, Macdonald RM, St-Louis PJ, Fear DW. Post-tonsillectomy infiltration with bupivacaine reduces immediate postoperative pain in children. *Can J Anaesth* 1995; 42: 770-4.
- Vasan NR, Stevenson S, Ward M. Preincisional bupivacaine in posttonsillectomy pain relief: a randomized prospective study. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2002; 128: 145-9.
- Johansen M, Harbo G, Illum P. Preincisional infiltration with bupivacaine in tonsillectomy. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1996; 122: 261-3.
- Cupero TM, Kim SY, Silva AB. The effects of a preoperative steroid/anesthetic injection on post-tonsillectomy pain. *Ear Nose Throat J* 2003; 82: 305-8.
- Kadar AA, Obaid MA. Effect on postoperative pain after local application of bupivacaine in the tonsillar fossa; a prospective single blind controlled trial. *J Pak Med Assoc* 2003; 53: 422-6.
- Kaygusuz I, Susaman N. The effects of dexamethasone, bupivacaine and topical lidocaine spray on pain after tonsillectomy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2003; 67: 737-42.

## The effect of intravenous dexamethasone and local bupivacaine in post-tonsillectomy vomiting and pain

Dabirmoghaddam P.<sup>\*1</sup>  
Baradarnfar M H.<sup>2</sup>

Ayatollahi V.<sup>3</sup>

Shakibapooh M.<sup>2</sup>

1- Otolaryngology Research Center

Tehran University of Medical Sciences

2- Department of Otolaryngology  
3- Department of Anesthesiology

Yazd University of Medical Sciences

### Abstract

**Background:** Tonsillectomy is the second most common pediatric surgery. Despite improvements in anesthetic and surgical technique, post-tonsillectomy pain continues to be a significant clinical concern for the patient, family, and physician. Young patients undergoing tonsillectomy experience postoperative pain and vomiting resulting in delays in oral feeding and in discharge from the hospital. Reduction of these side effects will lead to the improved quality of postoperative care. This study was performed to compare the efficacies of local Bupivacaine and intravenous Dexamethasone with that of a placebo on post-tonsillectomy pain and vomiting.

**Methods:** This clinical trial included 120 ASA I children, aged 3-15 years, undergoing tonsillectomy. The patients were randomly categorized into three groups: 1- local infiltration of 2 ml normal saline into the tonsillar pillar as a placebo; 2- IV Dexamethasone (0.5 mg/kg, with a maximum of 16 mg); 3- local infiltration of 2 ml 0.5% Bupivacaine into the tonsillar pillar. After the operation, patients were observed regarding vomiting and pain at 0.5, 4, 24, 120 hours postextubation.

**Results:** Of 120 patients, 70 were male and 50 were female. The mean age of patients was 8.4 years. Three patients were missed in follow up. The questionnaire was completed for 117 patients. The mean duration of operation was longest in the placebo group (55 minutes) and shortest in Dexamethasone group (50 minutes). We noticed significant reduction in postoperative pain only in the Bupivacaine group and at the fourth postoperative hour. In the Dexamethasone group, during the first 24 hours, we could not statistically analyze the effect on vomiting. Since Bupivacaine and Dexamethasone reduce postoperative pain and vomiting, respectively, and are safe, cost-effective and available, we recommend using these drugs for tonsillectomy patients.

**Conclusion:** Considering the greater efficacy of Dexamethasone in the reduction of vomiting and that of Bupivacaine in pain reduction in other studies, we recommend further study to assess the use of these two drugs together.

**Keywords:** Dexamethasone, Bupivacaine, tonsillectomy, vomiting, pain.

\* Corresponding author: Amiralam Hospital, Saadi Ave., Tehran  
Tel: +98-21-66703037  
email: payman.dm@gmail.com