

همراهی بیماری سلیاک با اسکلروز متعدد

چکیده

زمینه و هدف: بیماری اسکلروز متعدد (MS) و بیماری سلیاک (CD) جزء بیماری‌های اتوایمون می‌باشند. برخی مطالعات قبلی نقش رژیم غذایی فاقد گلوتن را در درمان بیماری MS بررسی کرده‌اند. در این مطالعه، به بررسی همراهی بیماری سلیاک با بیماری MS پرداخته‌ایم. روش بررسی: تیتر آنتی‌بادی‌های ضد گلیادین IgA، IgG و آنتی‌بادی ضد اندوامیزیال IgA با روش ELISA در ۳۴ بیمار MS سنجیده شد. گروه کنترل ۳۴ نفر بدون هیچ شکایت و نشانه عصبی، مورد ارزیابی سرولوژیک مشابه بیماران MS قرار گرفتند. افرادی که در گروه MS یا گروه کنترل سطوح آنتی‌بادی ضد گلیادین و یا ضد اندوامیزیال بالای حد نرمال داشتند بیوپسی دئوندون شدند. یافته‌ها: در گروه بیماران MS سطوح بالای آنتی گلیادین IgG در ۵/۹٪ از موارد و تیتر بالای آنتی گلیادین IgA نیز در همین حد (۵/۹٪) وجود داشت. در گروه کنترل آنتی گلیادین IgG در ۰/۹٪ و آنتی گلیادین IgA در ۰/۲٪ افراد یافت شد. تفاوت سطح IgG یا IgA ضد گلیادین بین دو گروه MS و کنترل معنی‌دار نبود، به ترتیب $p=0.051$ و $p=0.48$.^۱ ضد اندوامیزیال در هیچ یک از بیماران و افراد کنترل دیده نشد. پس از بیوپسی موارد مثبت هیچ نمای پاتولوژیک اختصاصی سلیاک گزارش نشد. نتیجه گیری: ۸/۸٪ از بیماران MS و ۸/۸٪ از افراد گروه کنترل سطوح بالای AGA داشتند. در حالی که سطوح IgA ضد اندوامیزیال که آنتی‌بادی اختصاصی تری برای CD است در هر دو گروه نرمال بود و بیوپسی دستگاه گوارش نیز در دو گروه جهت تشخیص سلیاک اختصاصی نبود. بنابراین AGA در هر بیماری نورولوژیکی باید با احتیاط تفسیر شود. مطالعه حاضر نشان داد که هیچ ارتباطی بین MS و CD وجود ندارد.

کلمات کلیدی: سلیاک، اسکلروز متعدد، آنتی‌بادی ضد گلیادین، آنتی‌بادی ضد اندوامیزیال، پرولاکتین.

رویا ابوالفضلی*

سید امیر میر باقری^۲

مهتاب ربانتی انصاری^۳

۱. گروه نورولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب ایران

۲. گروه گوارش

۳. دانشجوی پزشکی

بیمارستان امیر اعلم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

*نویسنده مسئول: تهران، خیابان سعدی، بیمارستان امیر اعلم

تلفن: ۰۲۶۰۶۱۰۶

email: abolfazl@sina.tums.ac.ir

مقدمه

عملکرد سیستم اعصاب با علت ناشناخته و در ۵٪ از بیماران با بیماری‌های نورولوژیک شناخته شده نشان داده شده است.^۴ از طرفی در بسیاری از موارد تظاهرات عصبی سلیاک قبل از سایر علایم و گاه تنها تظاهر بالینی بیماری هستند بنابراین باید سلیاک در تشخیص افتراقی اختلالات عصبی با علت ناشناخته قرار گیرد.^۵ در نمای پاتولوژیک سلیاک از آتروفی خفیف ویوس در روده کوچک تا آتروفی کامل ملاحظه می‌گردد.^۶ حضور فاکتورهای سرولوژیک در تشخیص سلیاک بسیار کمک‌کننده است. کلا" سه دسته نشانگر سرمی برای سلیاک وجود دارد: آنتی‌بادی ضد گلیادین پروتئین مسؤول ایجاد بیماری در گلوتن گندم، آنتی‌بادی ضد اندوامیزیال و آنتی‌بادی ضد ترانس گلوتامیناز نسجی که در این بین مورد سوم حساسیت و

بیماری سلیاک (CD) Celiac Disease بیماری التهابی مزمن دستگاه گوارش است که در مواجه با گلوتن یا فرآورده‌های آن در افراد حساس پیش می‌آید.^۱ پاسخ نامتناسب لغوپیتیت‌های T علیه گلوتن مصرف شده عامل اصلی این بیماری شناخته شده است.^۲ تظاهرات بالینی بیماری سلیاک در دستگاه گوارش شامل سوء‌جدب، کاهش وزن، اتساع شکم یا نفخ، اسهال مزمن و استئاتوره (اسهال چرب) است.^۳ در گیری سیستم اعصاب در بیماری سلیاک اهمیت فوق العاده‌ای دارد. تظاهرات عصبی در ۱۰٪ بیماران سلیاک ظاهر می‌شود.^۴ در ضمن حساسیت به گلوتن که با کمک تست‌های مربوط به آنتی‌بادی‌ها ارزیابی شده است، در بیش از ۵۰٪ بیماران دارای اختلال

CSF و پتانسیل برانگیخته، طبق نظر نورولوژیست، انجام و در پرونده آنها ثبت شد. نوع بالینی بیماری MS در پرونده ثبت شد. پس از آن برای بیماران آنتی بادی ضد گلیادین (IgA,IgG) و آنتی بادی ضد اندوامیزیال (IgA) و سطح سرمی پرولاکتین اندازه گیری شد. بیمارانی که آنتی بادی ضد گلیادین (IgA) یا IgG یا هر دو یا آنتی بادی ضد اندوامیزیال (IgA) در آنها مثبت شد، تحت بیوپسی دئونوم توسط متخصص گوارش قرار گرفتند و نتایج حاصل از بیوپسی توسط پاتولوژیست از نظر شواهد دال بر بیماری سلیاک ارزیابی گردید. در گروه کنترل نمونه خونی از ۳۴ بیمار بستری در بخش گوش و حلق و یعنی بیمارستان امیر اعلم (بدون ذکر مشخصات فردی) گرفته شد. افراد گروه کنترل از نظر سن و جنس با گروه بیماران یکسان سازی شدند. گروه کنترل کراپتیزای MS را پر نکردن و نمونه گیری به صورت غیر تصادفی ساده بود. افراد سالم از نظر سطح آنتی بادی ضد گلیادین (IgA,IgG) آنتی بادی ضد اندوامیزیال (IgA) و سطح سرمی پرولاکتین مورد ارزیابی قرار گرفتند. افرادی که آنتی بادی ضد گلیادین (IgA) یا هر دو یا آنتی بادی ضد اندوامیزیال (IgA) در آنها مثبت شد، بیوپسی دئونوم شدند و بیوپسی ها از نظر شواهد دال بر بیماری سلیاک ارزیابی گردید. داده های کیفی با تست^۲ و داده های کمی با t-test در گروه بیماران و کنترل مقایسه شد.

یافته ها

در این طرح ۳۴ نفر بیمار مبتلا به MS در گروه مورد و ۳۴ نفر فرد سالم از نظر بیماری های عصبی در گروه شاهد (کنترل) قرار داشتند. از ۳۴ نفر مبتلا به MS ۲۹ نفر زن بودند. متوسط سن آنها ۲۹/۶ سال با دامنه ۱۵-۴۶ سال بود. در گروه کنترل ۱۷ نفر زن بودند و میانگین سنی افراد ۳۱/۴ سال با دامنه ۱۹-۵۰ سال بود. پس از کسب رضایت و توضیح موارد لازم، افراد دو گروه تحت آزمایشات سرولوژیک و هورمونی و بر حسب مورد، اندوسکوبی و بیوپسی دئونوم قرار گرفتند. دو نفر از افراد گروه کنترل با وجود مثبت شدن سرولوژیک آنتی بادی های ضد گلیادین، حاضر به انجام بیوپسی نشدند. سطوح بالای آنتی بادی ضد گلیادین از نوع IgG (IgG < ۱۲ u/ml) در دو نفر از ۳۴ بیمار MS یافت شد.^(۹) در گروه کنترل نیز تیتر بالای این آنتی بادی در ۵/۹ افراد (دو نفر از ۳۴ نفر) وجود داشت. تیتر بالای آنتی بادی ضد گلیادین از نوع IgA (IgA < ۱۲ u/ml) در

ویژگی بالا مشابه مورد دوم دارد ولی اندازه گیری آن نسبت به مورد دوم ارزان تر و آسان تر است^(۷) و حتی در بعضی بیماران تشخیص داده نشده با آنتی بادی ضداندومیزیوم، مثبت شده است.^(۷) کاربرد فاکتورهای سرولوژیکی در جریان غربالگری، آشکار کننده فراوانی بالای سلیاک در بین اشخاص بدون علامت بوده است.^(۸) بیماری اسکلروز متعدد (MS) بیماری مزمن میلین زدای دستگاه اعصاب مرکزی است و با التهاب سیستم اعصاب مرکزی و میلین زدایی مشخص می شود. علت آن ناشناخته است اگرچه مکانیسم های اینمی به همراه فاکتورهای محیطی در افراد مستعد از نظر ژنتیک، مهم می باشند. درمان بیماران با تظاهرات عصبی سلیاک ناامید کننده است و رژیم فاقد گلوتن که درمان اصلی در سلیاک محسوب می شود جز در موارد کمی قادر به اصلاح یا متوقف ساختن اشکالات عصبی نیست^(۳) مگر اینکه بین شروع درمان یعنی شروع رژیم بدون گلوتن و بروز علائم عصبی فاصله اندکی (شش ماه)^(۹) باشد. سلیاک بیماری گاه مخفی است که تنها با فاکتورهای سرولوژیک قبل از بروز علائم عصبی و یا سایر علائم قابل ردیابی است و چنانچه همراهی بین MS و سلیاک باشد، کشف سلیاک و درمان زود هنگام آن مانع از سوار شدن علائم عصبی ثانویه به سلیاک^(۱۰) بر روی علائم عصبی ناشی از بیماری MS می شود و چه بسا در بهبود علائم عصبی ناشی از بیماری MS نیز نقش داشته باشد. در این تحقیق برآینم تا با توجه به نقش مطرح شده پرولاکتین (PRL) (هورمون مترشحه از هیپوفیز قدامی که احتملاً از سلول های اینمی نیز ترشح می شود)^(۱۱) به طور همزمان سطح سرمی PRL و ارتباط آن را با مثبت شدن فاکتورهای سرولوژیکی سلیاک در بیماران MS مورد مطالعه قرار دهیم تا شاید به تستی ارزان تر و مقرر بن به صرفه تر در بررسی میزان فعالیت و شدت دو بیماری دست یابیم.

روش بررسی

این مطالعه به صورت مورد- شاهدی طراحی شده است. تعداد ۳۴ بیمار بزرگسال (۱۵-۴۰ سال) مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در سال ۸۴-۸۵ که توسط نورولوژیست مورد ارزیابی قرار گرفته و تشخیص بیماری MS با توجه به کراپتیزای McDonald داده شد.^(۱۲) نمونه گیری به روش غیر تصادفی ساده انجام شد. معاینات کامل نورولوژیک و تست های تشخیصی بیماری MS مانند MRI امتحان

تغییرات مورفولوژیک یا پاتولوژیک در بافت روده وجود نداشت. در دو بیمار دیگر تغییرات خفیف در پر زهای روده (اکثربت پرزها از نظر طول و نما نرمال بودند) به همراه دئودنیت مزمن (وجود سلولهای التهابی مزمن با انتشار غیراختصاصی بیماری سلیاک) گزارش شد. هیچ یک از نمایان این انتشار غیراختصاصی بیماری سلیاک قابل انتظار جهت تشخیص بیماری سلیاک دیده نشدند. در گروه کنترل نیز بیوپسی دئودنوم در دو فرد انجام شد که بافت دئودنوم نرمال و بدون تغییرات مورفولوژیک پرزها یا نمای این انتشار غیراختصاصی دیگری گزارش شد. تیتر بالای آنتی بادی ضد اندومیزیال ($<10 \text{ u/ml}$) در هیچ یک از بیماران مبتلا به MS و افراد گروه کنترل یافت نشد. میانگین تیتر آنتی بادی ضد اندومیزیال در گروه مورد و کنترل به ترتیب $1/66 \text{ u/ml}$ و $1/104 \text{ u/ml}$ با دامنه اطمینان $\pm 0/038$ بود، (جدول ۱)، بدین ترتیب مشخص شد که تیتر این آنتی بادی در محدوده نرمال خود در گروه بیماران MS به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود، Pvalue این مقایسه

۰/۵٪ افراد گروه مورد و در ۲/۹٪ افراد گروه کنترل وجود داشت.(در گروه بیماران MS در کل سه بیمار AGA بالا داشتند که در یک نفر آنها هم IgA و هم IgG مثبت بود و در دو نفر دیگر IgG یا IgA مثبت شد ولی در گروه کنترل مواردی که تیتر مثبت IgG AGA داشتند غیر از مواردی بودند که از نظر IgA AGA نتایج مثبت داشتند. میانگین تیتر IgG AGA در دو گروه مورد و کنترل به ترتیب $5/84 \text{ u/ml}$ و $2/35 \text{ u/ml}$ بود. تفاوت تیتر این آنتی بادی در دو گروه مورد و کنترل از نظر آماری دارای $p=0/051$ بود. میانگین تیتر IgA AGA در دو گروه مورد و کنترل به ترتیب $5/56 \text{ u/ml}$ و $4/94 \text{ u/ml}$ بود. تفاوت تیتر این آنتی بادی در دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود، $p=0/48$ (جدول ۱). در گروه بیماران MS، چهار بیماری که تیتر بالای آنتی بادی ضد گلیادین (IgG یا IgA یا هر دو) داشتند تحت آندوسکوپی و سپس بیوپسی دئودنوم توسط متخصص گوارش قرار گرفتند. در بررسی های پاتولوژی تهیه شده از نمونه ها در دو نفر از بیماران

جدول-۱: میانگین تیتر آنتی بادی ها و پرولاکتین در دو گروه

| فاکتور خونی | پرولاکتین (mIU/l) | ابتلا به MS | تعداد | میانگین | انحراف معیار | خطای معیار میانگین |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------|---------|--------------|--------------------|
| آنتی گلیادین نوع IgG (u/ml) | | MS- | ۳۴ | ۲/۳۵ | ۰/۵۸ | ۰/۹۵ |
| آنتی گلیادین نوع IgA (u/ml) | | MS+ | ۳۴ | ۵/۸۴ | ۸/۵۶ | ۱/۴۶ |
| آنتی اندومیزیال نوع IgA (u/ml) | | MS- | ۳۴ | ۴/۹۴ | ۲/۸۵ | ۰/۴۹ |
| | | MS+ | ۳۴ | ۵/۵۶ | ۴/۲۷ | ۰/۷۳ |
| | | MS- | ۳۴ | ۱/۰۴ | ۰/۱۱ | ۰/۱۹ |
| | | MS+ | ۳۴ | ۱/۶۶ | ۱/۷۲ | ۰/۲۹ |
| | | MS- | ۳۳ | ۵۳۷/۳۳ | ۳۴۳/۶۱ | ۰/۹۸۱ |
| | | MS+ | ۲۱ | ۴۰۷/۳۷ | ۳۰۷/۳۸ | ۶/۶۸۵ |

جدول-۲: میانگین تیتر آنتی بادی ها و پرولاکتین در گروه بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد با توجه به شدت بیماری

| فاکتور خونی | پرولاکتین (mIU/l) | ابتلا به MS | تعداد | میانگین | انحراف معیار | خطای معیار میانگین |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------|---------|--------------|--------------------|
| آنتی گلیادین نوع IgG (u/ml) | | RR | ۳۰ | ۷/۰۹ | ۸/۹۷ | ۱/۶۳ |
| آنتی گلیادین نوع IgA (u/ml) | | SP | ۴ | ۲/۹۳ | ۴/۷۳ | ۲/۳۶ |
| آنتی اندومیزیال نوع IgA (u/ml) | | RR | ۳۰ | ۵/۴۳ | ۴/۴۲ | ۰/۸۰ |
| | | SP | ۴ | ۷/۵۳ | ۳/۲۰ | ۱/۶۰ |
| | | RR | ۳۰ | ۱/۷۵ | ۱/۸۲ | ۰/۳۳ |
| | | SP | ۴ | ۱/۰۰ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ |
| | | RR | ۱۹ | ۴۳۷/۰۴ | ۳۰۷/۴۶ | ۷۰/۰۵۳ |
| | | SP | ۲ | ۱۲۵/۰۰ | ۹/۱۹ | ۶/۵۰ |

RR=Relapsing_Remitting, SP=Secondary_Progressive

سروپوزیتیو بودند.^{۱۴} در دو مطالعه کوچک دیگر بیوپسی دئوندال در سه بیمار از ۲۶ بیمار مبتلا به MS پاتولوژیک بود ولی هیچ یک علائم گوارشی نداشتند.^{۱۵} از طرفی در مطالعه‌ای بیوپسی ژنوم در ۱۴ بیمار مبتلا به MS انجام شد ولی هیچ شاهد سروولوژیک و یا مورفولوژیک و پاتولوژیک در بیوپسی، به نفع بیماری سلیاک یافت نشد.^{۱۶} سالورتا و همکاران در سال ۲۰۰۴ در مطالعه‌ای که وجود سلیاک را در بیماران MS با کمک tTG (آنـتی بادی ضد ترانس گلوتامیناز) بررسی کرد، هیچ مورد مثبتی پیدا نکردند.^{۱۷} در مطالعه‌ما، در کل شیوع تیتر بالای آنتی بادی ضد گلیادین در گروه MS/۸/۸ و در گروه کنترل نیز ۸/۸٪ بود. بیوپسی دئوندوم در افرادی که سطح بالای AGA را نشان دادند به نفع بیماری سلیاک نبود مقایسه میانگین تیترهای آنتی بادی ضد گلیادین IgA در دو گروه مورد و کنترل تفاوت معنی داری نشان نداد. تفاوت تیتر IgG AGA در دو گروه مورد و کنترل با $p=0.051$ از نظر معنی دار بودن حد مرزی دارد. اگر این تفاوت را معنی دار در نظر بگیریم در جهت مطالعاتی که نشان دادند در ۵٪ بیماران با بیماری نورولوژیک شناخته شده از جمله MS، تیترهای بالای AGA وجود دارد^{۱۸} گام برداشته ایم. ولی بیوپسی روده وجود سلیاک در این دسته از بیماران را رد می کنند. این نتایج بار دیگر تأکیدی بر تفسیر با احتیاط تیتر بالای AGA در بیماران مبتلا به هر ظاهر نورولوژیک است. به نظر می رسد که شیوع سطوح بالای AGA در گروه بیماران MS ما شبیه به شیوع تیتر بالای AGA در جمعیت نرمال که حدود ۱۰٪ است^{۱۹} باشد از طرفی عده‌ای پیشنهاد می کنند که تفاوت معنی داری سطوح AGA IgA بین گروه بیماران MS و افراد سالم می تواند به علت افزایش برداشت پرتوئین از روده بیماران باشد زیرا افزایش نفوذپذیری جدار روده در بیماری MS گزارش شده است.^{۲۰} تیتر بالای آنتی بادی ضد اندومیزیال در هیچ یک از افراد گروه مورد یا شاهد یافت نشد گرچه در محدوده نرمال سطح آنتی بادی ضد اندومیزیال در گروه MS به طور معنی داری بالاتر بود. از آنجا که آنتی بادی های ضد اندومیزیال و ضد ترانس گلوتامیناز شاخص های سروولوژیک حساس تر و اختصاص تری نسبت به AGA در کشف مواد تحت بالینی سلیاک هستند، عدم مثبت شدن آنتی بادی ضد اندومیزیال در بیماران MS ما با بیوپسی منفی روده از نظر سلیاک همخوانی دارد، بالاتر بودن سطح آنتی بادی ضد اندومیزیال در محدوده نرمال در گروه مورد نسبت به گروه کنترل می تواند با ماهیت اتوایمون بیماری MS و

۰/۰۴٪ محاسبه شد. اندازه گیری سطح سرمی پرولاکتین جهت بیماران گروه مورد و افراد گروه کنترل به عمل آمد که در گروه بیماران MS ۲۱ نفر نتایج خود را در اختیار ما قرار دادند. سطح سرمی پرولاکتین در گروه کنترل $537/33 \text{ mIU/L}$ با دامنه اطمینان $119/9 \pm$ در گروه MS $7/37 \text{ mIU/L}$ با دامنه اطمینان $133/6 \pm$ بود. اختلاف دو گروه با $p=0.16$ معنی دار نبود. ۳۰ بیمار در گروه بیماران MS از نظر شدت بیماری فرم Relapsing Remitting (RR) و چهار بیمار فرم Secondary Progressive (SP) را دارا بودند. میانگین تیتر آنتی بادی ضد اندومیزیال در گروه SP بالاتر از RR نبود. 1 u/ml در برابر $1/75 \text{ u/ml}$ با دامنه اطمینان $0/66 \pm$ تفاوت معنی داری یافت نشد $p=0.4$ (جدول ۲). میانگین تیتر IgG AGA در گروه RR بالاتر از گروه SP بود $(6/09 \text{ u/ml})$ در برابر $3/93 \text{ u/ml}$ که اختلاف موجود با $p=0.6$ معنی دار نبود (جدول ۲). میانگین تیتر IgA AGA در گروه SP بالاتر از گروه RR بود. $5/4 \text{ u/ml}$ در برابر $7/5 \text{ u/ml}$ که البته این تفاوت معنی دار نبود، $p=0.6$ (جدول ۲). میانگین تیتر سرمی پرولاکتین نیز در گروه SP پائین تر از گروه RR بود $437/4 \text{ mIU/L}$ در برابر $125/5 \text{ mIU/L}$ که تفاوت موجود با $p=0.17$ معنی دار نبود. بین سطح سرمی پرولاکتین و تیتر آنتی بادی های IgA AGA و IgG AGA و آنتی اندومیزیال IgA در کل و به تفکیک در گروه مورد و کنترل رابطه ای وجود نداشت. همبستگی این دو در بازه $0/6-0/1$ بود. لازم به ذکر است در هیچ یک از افراد گروه مورد و کنترل علائم گوارشی ذکر شده در پرسشنامه شامل کاهش وزن، نفخ، اسهال مزمن، استئاتوره و عالیم غیراختصاصی گوارشی وجود نداشت.

بحث

ارتباط بین بیماری MS و بیماری سلیاک به دنبال موفقیت رژیم غذایی فاقد گلوتن در درمان گروهی از بیماران MS از دوران قدیم مطرح بوده است. در ابتدا اطلاعات کمی در مورد مورفولوژی روده و با وضعیت آنتی بادی ها وجود داشت. اختلال در تنظیم اینمی و نقص در آپوپتوزیس یافته های مشترکی در هر دو بیماری بودند که از این زمینه حمایت می کردند.^{۱۳} در سال ۱۹۹۶ گزارش شد که ۵۷٪ بیماران مبتلا به اختلالات نورولوژیک کرپیتوژنیک از نظر IgA یا IgG AGA یا هر دو) سروپوزیتیو هستند. در همین مطالعه ۵٪ بیماران با بیماری نورولوژیک شناخته شده و ۱۲٪ افراد کنترل سالم نیز AGA

گلیادین IgA یا IgG و سطح آنتی اندومیزیال وجود ندارد. در مطالعه ما سطح سرمی پرولاکتین با شدت بیماری MS نیز ارتباطی نداشت. به نظر می رسد که اختلالات پرولاکتین برای تشخیص بیماری MS مشخصه نمی باشد. شاید بتوان گفت که اختلالات نورواندوکرین در CNS بیماران MS ثانویه به درگیری التهابی فعل برخی از قسمتهای مانند محور هیپوتalamوس-هیپوفیز یا عصب اپتیک باشد و به عنوان علت اولیه بیماری و تعیین کننده شدت و سیر بیماری مطرح نباشد.^{۱۸,۱۹} به نظر می رسد جهت تایید عدم همراهی بیماری اسکلروز متعدد با بیماری سلیاک نیاز به انجام مطالعاتی برای مقایسه بیان سایتوکاینها در دو بیماری و تفاوت الگوی HLA باشد. در این مطالعه حجم نمونه و پی گیری کافی جهت قضاوت در ارتباط پرولاکتین با شدت و سیر اسکلروز متعدد میسر نشد. لذا به نظر می رسد انجام مطالعاتی با حجم نمونه کافی که ارتباط سطح سرمی پرولاکتین را با محل درگیری CNS در اسکلروز متعدد بستجند، مفید باشد.

فعالیت بیشتر دستگاه ایمنی در این افراد مرتبط باشد. نتایج مطالعه ما نشان داد که شدت بیماری MS (بر اساس فرم بیماری) با سطوح آنتی بادی ها ارتباط معنی داری ندارد. در مطالعاتی افزایش سطح پرولاکتین پایه و تحریک شده با TRH در گروه بیماران MS بالاتر از جمعیت نرمال گزارش شده و همچنین عنوان شد که سطح سرمی پرولاکتین رابطه معنی دار با شدت فعالیت بیماری سلیاک دارد.^{۱۶} در مطالعه ای دیگر در بررسی تغییرات سطح سرمی پرولاکتین در MS مشخص شد که ارتباطی بین مقادیر پرولاکتین با سیر و دوره بیماری MS یا فعالیت آن وجود ندارد و پرولاکتین نمی تواند شاخصی برای میزان فعالیت بیماری در جمعیت بیماران MS باشد.^{۱۷} ممکن است هایپر پرولاکتینی از مشخصات MS در بیماران آسیابی باشد که درگیری عصب اپتیک را نشان می دهد.^{۱۸} اندازه گیری سطح سرمی پرولاکتین در گروه مورد و کنترل در این مطالعه بیانگر این مطلب بود که رابطه ای بین سطح سرمی پرولاکتین و سطح آنتی بادی های ضد

References

- Trier JS. Celiac sprue. *N Engl J Med* 1991; 325: 1709-19.
- Schuppan D. Current concepts of celiac disease pathogenesis. *Gastroenterology* 2000; 119: 234-42.
- Ghezzi A, Zaffaroni M. Neurological manifestations of gastrointestinal disorders, with particular reference to the differential diagnosis of multiple sclerosis. *Neurol Sci* 2001; 22: 117-22.
- Hadjivassiliou M, Gibson A, Davies-Jones GA, Lobo AJ, Stephenson TJ, Milford-Ward A. Does cryptic gluten sensitivity play a part in neurological illness? *Lancet* 1996; 347: 369-71.
- Hagen EM, Gjerde IO, Vedeler C, Hovdenak N. Neurological diseases associated with celiac disease. *Tidsskr Nor Laegeforen* 2000; 120: 439-42.
- Feldman M. Celiac disease. In: Feldman M, Lawrence S, Sleisenger MH, Slesinger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. 7th ed. Philadelphia: Saunders; 2002; p. 1817-37.
- Tesei N, Sugai E, Vázquez H, Smeocul E, Niveloni S, Mazure R, et al. Antibodies to human recombinant tissue transglutaminase may detect coeliac disease patients undiagnosed by endomysial antibodies. *Aliment Pharmacol Ther* 2003; 17: 1415-23.
- Lahat E, Broide E, Leshem M, Evans S, Scapa E. Prevalence of celiac antibodies in children with neurologic disorders. *Pediatr Neurol* 2000; 22: 393-6.
- Volta U, De Giorgio R, Petrolini N, Stangbellini V, Barbara G, Granito A, et al. Clinical findings and anti-neuronal antibodies in coeliac disease with neurological disorders. *Scand J Gastroenterol* 2002; 37: 1276-81.
- Mohn A, di Ricco L, Magnelli A, Chiarelli F. Celiac disease: associated vertigo and nystagmus. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2002; 34: 317-8.
- Draca S, Lević Z. The possible role of prolactin in the immunopathogenesis of multiple sclerosis. *Med Hypotheses* 1996; 47: 89-92.
- McDonald WI, Compston A, Edan G, Goodkin D, Hartung HP, Lublin FD, et al. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. *Ann Neurol* 2001; 50: 121-7.
- Salvatore S, Finazzi S, Ghezzi A, Tosi A, Barassi A, Luini C, et al. Multiple sclerosis and celiac disease: is there an increased risk? *Mult Scler* 2004; 10: 711-2.
- Pengiran Tengah CD, Lock RJ, Unsworth DJ, Wills AJ. Multiple sclerosis and occult gluten sensitivity. *Neurology* 2004; 62: 2326-7.
- Reichelt KL, Jensen D. IgA antibodies against gliadin and gluten in multiple sclerosis. *Acta Neurol Scand* 2004; 110: 239-41.
- Azar ST, Yamout B. Prolactin secretion is increased in patients with multiple sclerosis. *Endocr Res* 1999; 25: 207-14.
- Heesen C, Gold SM, Bruhn M, Mönch A, Schulz KH. Prolactin stimulation in multiple sclerosis—an indicator of disease subtypes and activity? *Endocr Res* 2002; 28: 9-18.
- Yamasaki K, Horiuchi I, Mimohara M, Osoegawa M, Kawano Y, Ohyagi Y, et al. Hyperprolactinemia in optico-spinal multiple sclerosis. *Intern Med* 2000; 39: 296-9.
- Wei T, Lightman SL. The neuroendocrine axis in patients with multiple sclerosis. *Brain* 1997; 120: 1067-76.

Association of celiac disease with multiple sclerosis

Abolfazli.R.^{*1}
Mirbagheri.A.²
Rabbani Anari M.³

1- Department of Neurology
2- Department of Gastroenterology
3- Medical Students

Amiralam Hospital, Tehran University of Medical Sciences

Abstract

Background: Multiple sclerosis (MS) and the gluten intolerance disease, celiac disease, (CD) are immune-mediated diseases. Better testing for antibodies associated with CD, including anti-gliadin antibody [AGA], as well as anti-endomysial and anti-tissue transglutaminase antibodies, has improved the diagnosis of CD. Certain neurologic conditions have a reported association with CD. Previous researchers have investigated the role of a gluten-free diet in the treatment of MS and found no benefits. Here, we investigate the possible immunological association of CD with MS.

Methods: Using ELISA, we estimated serum IgG and IgA anti-gliadin and IgA anti-endomysial antibodies in 34 MS patients, who were new or previous cases without immunosuppressant treatment for at least the last six months. The mean age was 29.6 years (range 15-46 years), with 30 patients relapsing-remitting, and four secondary-progressive MS. Thirty-four random anonymous blood donors were used as serologic controls (mean age 31.4 years, range 19-50 years). The individuals in both groups with elevated AGA (IgG or IgA) or anti-endomysial antibody (IgA) underwent duodenal biopsy.

Results: In the MS group, high levels of IgG AGA were found in 5.9% of the subjects, and 5.9% had elevated IgA AGA. In the controls, elevated IgG AGA was detected in 5.9% of the subjects and IgA AGA in 2.9% ($p=0.051$ and 0.48, respectively). For IgG and IgA AGA levels, no significant differences were found between the patient and control groups. IgA anti-endomysial antibodies were not found in either group. Upon biopsy, the specific pathological features of celiac were absent.

Conclusion: The same number of MS patients and controls had high levels of AGA, with normal levels of IgA anti-endomysial antibodies, which is more specific for CD, while the GI biopsies from both groups were not specific for CD. Therefore, AGA levels in any neurologic case should be interpreted with caution. The present study showed no association between MS and CD.

Keywords: Multiple sclerosis, celiac disease, anti-gliadin, anti-endomysial, prolactin, duodenal biopsy.

* Corresponding author: Dept. of Neurology, Amiralam Hospital, Saadi Ave., Tehran. Tel: +98-21-66706106 email: abolfazl@sina.tums.ac.ir