

مقایسه آپاندکتومی باز و لپاراسکوپیک در بیماران مبتلا به آپاندیسیت حاد

چکیده

زمینه و هدف: جهت درمان آپاندیسیت حاد دو روش آپاندکتومی بازو آپاندکتومی لپاراسکوپیک موجود است. تاکنون مطالعات زیادی برای مقایسه این دو روش درمانی صورت گرفته است که بیشترین فاکتورهای بررسی شده مدت زمان جراحی، مدت زمان بسترهای، درد بعد از عمل و عوارض عفونی می‌باشند. روش بررسی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی تعداد ۱۰۰ بیمار شامل ۵۰ مورد آپاندکتومی بازو و ۵۰ مورد آپاندکتومی لپاراسکوپیک صورت گرفت و مدت زمان جراحی، مدت بسترهای، مخدر مصرف شده و عوارض عفونی مورد بررسی قرار گرفتند. **یافته‌ها:** میانگین مدت زمان بسترهای آپاندکتومی لپاراسکوپیک ۴۴/۴۸ ساعت و باز ۵۴/۸۰ ساعت می‌باشد p<0.01. میانگین دوز استاندارد مخدر مصرف شده برای آپاندکتومی لپاراسکوپیک ۲/۴۰ و برای باز ۳/۴۶ می‌باشد p<0.01. میانگین مدت زمان عمل جراحی برای لپاراسکوپیک ۳۱/۸ دقیقه و برای باز ۳۵/۲ دقیقه است p=0.05. تعداد موارد عفونت زخم در آپاندکتومی باز چهار مورد (۸٪) و در لپاراسکوپیک یک مورد (۲٪) است. موارد آبese داخل شکم یک مورد در آپاندکتومی باز (۲٪) بوده است و آبese داخل شکل بعد از آپاندکتومی لپاراسکوپیک وجود نداشته است. **نتیجه‌گیری:** طول مدت بسترهای حداقل ۱۰ ساعت در آپاندکتومی لپاراسکوپیک کمتر می‌باشد که از لحظه آماری معنی دار است p<0.01. میانگین دوز مصرف مخدر نیز با p<0.01 در آپاندکتومی لپاراسکوپیک کمتر است ولی طول مدت عمل جراحی در دو گروه تفاوت معنی داری نداشته است. از نظر عفونت زخم و آبese داخل شکمی در گروه لپاراسکوپیک کمتر بوده است.

کلمات کلیدی: آپاندیسیت حاد، لپاراسکوپی، عوارض

نوذر درستان

شهنام عسکرپور

مهدی عسگری

فرامرز بازیار

سید حمیدرضا حسینی خواه منشاوی

گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی

جنای شاپور اهواز

*بویسته مسئول، اهواز، خیابان آزادگان، بیمارستان امام
خمینی (ره)، پخش جراحی عمومی

تلفن: ۰۶۱۱-۲۲۱۶۵۰۱

email: Shahnam_askarpour@yahoo.com

مقدمه

ارجحیت سلول‌ها پلی مورفونوکلئر (PMN) در آپاندیسیت حاد غیر عارضه‌دار وجود دارد و شمارش بالاتر از ۱۸۰۰۰ شک به عوارض آپاندیسیت به خصوص پرفوراسیون و آبese را ایجاد می‌کند.^۱ از سونوگرافی به عنوان اولین روش تشخیصی کمکی در بیمارانی که تشخیص آپاندیسیت در آنها مبهم و دو پهلو است استفاده می‌شود.^۲ از CT Scan نیز می‌توان برای تشخیص آپاندیسیت حاد استفاده کرد. زمانی که با سایر روش‌های تشخیصی به نتیجه نرسیده باشیم می‌توان از لپاراسکوپی به عنوان یک روش تشخیصی- درمانی استفاده کرد.^۳ برای درمان آپاندیسیت حاد دو روش آپاندکتومی باز به روش سنتی و آپاندکتومی لپاراسکوپی وجود دارد. آپاندکتومی لپاراسکوپی در درمان آپاندیسیت حاد همواره کتراورسی بوده است زیرا جراحان

آپاندیسیت حاد (Acute appendicitis) شایع‌ترین علت شکم حاد جراحی است به طوری که ۷٪ از مردم در طول زندگی خود به علت ابتلای به آپاندیسیت حاد به آپاندکتومی احتیاج پیدا می‌کنند.^۱ بیشترین میزان بروز بیماری در اوایل دهه دو و سه زندگی است و شیوع در مردان اندکی بیشتر از زنان است.^۲ تشخیص آپاندیسیت حاد با ترکیبی از شرح حال و معاینات فیزیکی و با کمک تست‌های آزمایشگاهی و مطالعات رادیولوژیکی صورت می‌گیرد.^۳ درد شکم، تهوع، استفراغ و بی‌اشتهاای مهم‌ترین علائم آپاندیسیت هستند.^۱ در معاینه شکم، تندرننس و گاردنینگ خفیف در ربع تحتانی راست شکم مشهود است. در آزمایشات در اغلب موارد لکوسیتوز خفیف (۱۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰) با

و ریوی مزمن برای گروه لپاراسکوپیک انتخاب نشدند. حجم نمونه مورد نیاز بر اساس آزمون‌های آماری ۵۰ بیمار در هر کدام از دو گروه بوده است. انتخاب نوع جراحی باز و لپاراسکوپیک به صورت تصادفی (یک روز در میان) انجام شده است از لحاظ ملاحظات اخلاقی پس از توضیحات لازم برای بیمار در مورد هر کدام از روشهای رضایت نامه بیمار در پرونده بیمار ثبت گردید. اطلاعات مورد نیاز از روی پرونده بیماران شامل مدت زمان جراحی، مدت زمان بستری، تعداد دوز استاندارد مخدیر مصرف شده به دست آمده است و بیماران به مدت یک ماه تحت پی‌گیری دقیق از نظر بررسی عوارض زخم و آبsegue‌های داخل شکم بودند. برای آنالیز آماری اطلاعات و نتایج به دست آمده از آزمون‌های آماری استاندارد χ^2 و T-test استفاده شده است و مقادیر $p < 0.05$ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

میانگین زمان بستری در گروه آپاندکتومی باز (۵۴/۸-۴۱-۶۲) و در گروه لپاراسکوپیک ۴۴/۸ ساعت (۳۵-۶۱) بود ($p < 0.01$). میانگین تعداد دوز استاندارد مخدیر مصرف شده در گروه آپاندکتومی باز (۳/۴۶-۲-۵) و در گروه آپاندکتومی لپاراسکوپیک (۲/۴۰-۰-۶) است (۰.۰۰۰۱). میانگین مدت زمان جراحی در گروه آپاندکتومی باز (۳۵/۲ دقیقه (۲۹-۴۱) و در گروه لپاراسکوپیک (۳۱/۸ دقیقه (۲۶-۴۰) است که تفاوت معنی دار آماری ندارد. موارد عفونت زخم در گروه آپاندکتومی باز چهار مورد (۸٪) و در گروه آپاندکتومی لپاراسکوپیک یک مورد (۰.۲٪) تعداد موارد آبsegue‌های داخل شکمی در گروه آپاندکتومی باز یک مورد (۰.۲٪) بود و در گروه لپاراسکوپیک ملاحظه نشد.

بحث

مطالعات زیادی در مقایسه بین آپاندکتومی باز و لپاراسکوپیک صورت گرفته است که بتواند مزایا و معایب هر کدام را شناسایی کند ولی هنوز توافق عمومی بین جراحان برای ترجیح دادن آپاندکتومی لپاراسکوپیک به باز وجود ندارد. آپاندکتومی لپاراسکوپیک با احتمال کمتر عفونت زخم در مقایسه با آپاندکتومی باز همراه است (۰.۲٪ در مقابل ۰.۷٪) ولی شناس پیدایش آبsegue‌های داخل شکم در آپاندکتومی لپاراسکوپیک بیشتر است (۰.۱٪ در مقابل ۰.۰۸٪).^۳ احتمال پیدایش عفونت زخم در آپاندکتومی لپاراسکوپیک کمتر از نصف موارد

تکنیک رایج آپاندکتومی باز را یک روش ساده و مؤثر می‌دانند.^۵ بسیاری معتقدند آپاندکتومی لپاراسکوپیک روش موثر و مطمئن برای آپاندیسیت حاد است.^۶ در بسیاری از مراکز تخصصی دنیا برای درمان بیماران آپاندیسیت حاد از لپاراسکوپی استفاده می‌شود.^۷ بزرگترین متأثالتیزی که آپاندکتومی باز و لپاراسکوپی را با هم مقایسه کرده است شامل ۴۷ مطالعه است که ۳۹ مورد آن در بالغین انجام شده است و این آنالیزها ثابت کرده‌اند که هزینه جراحی و مدت زمان آن در آپاندکتومی لپاراسکوپی بیشتر از باز است ولی میزان عفونت زخم بعد از لپاراسکوپی تقریباً نصف موارد باز است.^۸ ولی شناس پیدا کردن آبsegue‌های داخل شکم پس از آپاندکتومی لپاراسکوپیک سه برابر آپاندکتومی باز است. در بررسی دیگری که شامل ۱۹۶۰ بیمار بود ۱۰۳۵ بیمار تحت آپاندکتومی لپاراسکوپیک و ۹۲۵ بیمار تحت آپاندکتومی باز قرار گرفتند. آپاندکتومی لپاراسکوپیک با درصد کمتری از عفونت زخم نسبت به آپاندکتومی باز همراه بود (۲/۹٪ در مقابل ۷/۴٪) ولی شناس پیدا کردن آبsegue‌های داخل شکمی در آپاندکتومی لپاراسکوپیک بیشتر از آپاندکتومی باز بود (۱/۹٪ در مقابل ۰/۰٪). زمان بستری در بیمارستان در آپاندکتومی لپاراسکوپیک کوتاه‌تر از آپاندکتومی باز بود (۳/۱ روز در مقایسه با ۳/۸ روز).^۹ مزیت اصلی آپاندکتومی لپاراسکوپیک کمتر بودن درد بیمار پس از جراحی است که با بازگشت سریع تر بیمار به سطح فعالیت‌های فیزیکی و زندگی عادی همراه است.^{۱۰} هدف از انجام این تحقیق مقایسه آپاندکتومی با روش لپاراسکوپیک و روش باز می‌باشد.

روش بررسی

در یک مطالعه کارآزمایی بالینی از تاریخ ۸۴/۷/۱ تا ۸۵/۷/۱ بیماران با تشخیص آپاندیسیت حاد که در بیمارستان‌های گلستان و امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی اهواز تحت جراحی قرار گرفتند بررسی شدند. تشخیص آپاندیسیت در تمامی این بیماران از روی شرح حال و معاینات فیزیکی، نتایج آزمایشگاهی و رادیولوژی توسط اساتید و دستیاران جراحی صورت گرفته است. بیمارانی که از گروه تحت مطالعه حذف شده‌اند شامل بیماران که تابلوی پریتونیت ژنرالیزه داشتند، بیماران با درد شکم طول کشیده بیشتر از پنج روز و وجود یک توده شکم در معاینه، کودکان زیر پنج سال و افراد بالای ۶۵ سال از مطالعه حذف شدند. همچنین بیماران دارای بیماری قلبی

۳۱ دقیقه برای آپاندکتومی باز ($p=0/5$) است. میانگین مدت زمان بستری در بیمارستان برای آپاندکتومی لپاراسکوپیک کوتاه‌تر از آپاندکتومی باز است. (سه روز در مقابل چهار روز باز ($p=0/2$).^{۱۲} آپاندکتومی لپاراسکوپیک با درد بعد از عمل کمتر و ریکاوری سریع‌تر نسبت به آپاندکتومی باز همراه است ولی مدت زمان جراحی در آپاندکتومی لپاراسکوپیک به وضوح طولانی‌تر است (۶۰ دقیقه در مقابل ۳۵ دقیقه باز ($p=0/1$). مدت زمان بستری در بیمارستان و عوارض بین این دو گروه تفاوتی ندارد.^{۱۷} مدت زمان جراحی مقداری متفاوت است ولی عوارض در گروه لپاراسکوپیک کمتر است مدت زمان بستری در بیمارستان در گروه لپاراسکوپیک مقداری کوتاه‌تر است.^{۱۸} آپاندکتومی لپاراسکوپیک باعث افزایش مدت زمان جراحی (۴۷ دقیقه در مقابل ۳۶ دقیقه)، مدت زمان بیهوشی خواهد بود.^{۱۹} درد بعد از عمل در گروه آپاندکتومی لپاراسکوپیک به‌طور آشکار کمتر است ($p<0/001$) میانگین مدت زمان جراحی در گروه لپاراسکوپیک طولانی‌تر از باز است. (۶۱ دقیقه در مقابل ۴۱ دقیقه باز ($p<0/001$).^{۲۰} مدت زمان جراحی به‌طور میانگین ۱۶ دقیقه برای آپاندکتومی لپاراسکوپیک طولانی‌تر است. مدت زمان بستری در آپاندکتومی لپاراسکوپیک به‌طور میانگین ۱۵ ساعت کوتاه‌تر است.^{۱۳} مدت زمان جراحی ۸۱/۷ دقیقه برای آپاندکتومی لپاراسکوپیک و ۶۶/۸ دقیقه برای آپاندکتومی باز باز ($p<0/02$) است. مدت زمان بستری در بیمارستان برای آپاندکتومی لپاراسکوپیک ۱/۱ روز و برای آپاندکتومی باز ۱/۲ روز است.^{۲۱} در این مطالعه میانگین مدت زمان بستری برای آپاندکتومی لپاراسکوپیک باز ۵۴/۸۰ و برای آپاندکتومی لپاراسکوپیک ۴۴/۴۸ ساعت که دارای ($p<0/01$) است. این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار است. میانگین تعداد دوز محدر استاندارد مصرف شده در آپاندکتومی باز ۳/۴۶ و در آپاندکتومی لپاراسکوپیک ۲/۴۰ باز ($p<0/01$) است که بیانگر آن است که مقدار محدر مصرف شده و درد بعد از عمل با یک تفاوت معنی‌دار آماری در آپاندکتومی لپاراسکوپیک کمتر است. میانگین مدت زمان عمل جراحی در آپاندکتومی باز ۳۵/۲ دقیقه و در آپاندکتومی لپاراسکوپیک ۳۱/۸ دقیقه است که تفاوت معنی‌دار آماری ندارد.

References

- Jaffe B, Berger D. The appendix. Brunicardi F, Anderson D, Biliar T. Schwartz's Principles of Surgery. 8th ed. New York: McGraw-Hill; p. 1125-31.
 - Lally K, Cox C, Andrassy R. Appendix. Beauchamp R, Evers B, Mattox K. Sabiston textbook of surgery. Philadelphia: Elsevier saunders. 2004; p. 1381-88.
- آپاندکتومی باز است ولی شیوع آبسه‌های داخل شکمی بیشتر است.^{۱۱} از ۸۷ بیمار با آپاندکتومی لپاراسکوپیک پنج نفر بیمار ۶٪ عفونت زخم و در گروه آپاندکتومی باز شش بیمار ۷٪ دچار عفونت زخم شدند (۶٪). شیوع آبسه داخل شکم در آپاندکتومی لپاراسکوپیک در دو بیمار ۲٪ و در آپاندکتومی باز سه بیمار ۴٪ وجود داشت (۶٪).^{۱۲} عفونت زخم به‌طور آشکار در آپاندکتومی لپاراسکوپیک کمتر شیوع دارد. در مطالعات مختلف میزان تفاوت در شیوع عفونت زخم در آپاندکتومی لپاراسکوپیک نسبت به باز ۶/۱٪ تا ۲/۳٪ (میانگین ۴/۲٪) بوده است. شیوع آبسه داخل شکم در گروه لپاراسکوپیک بیشتر از باز بوده است که این افزایش در مطالعات مختلف (۰/۹٪ تا ۰/۰٪) (میانگین ۰/۴٪) بوده است.^{۱۳} در این مطالعه صورت گرفته در بررسی شیوع عوارض عفونی به تفاوت آشکار رسیدیم به‌طوری که شیوع عفونت زخم در گروه آپاندکتومی باز در چهار بیمار ۸٪ و در آپاندکتومی لپاراسکوپیک در یک بیمار ۲٪ بوده است. موارد آبسه داخل شکم به‌دبال عمل جراحی آپاندکتومی در گروه آپاندکتومی باز یک مورد ۲٪ بوده است و در گروه آپاندکتومی لپاراسکوپیک وجود نداشته است. مدت زمان بستری برای آپاندکتومی لپاراسکوپیک نسبت به آپاندکتومی باز مختصری کوتاه‌تر است (سه روز در مقابل ۳/۷ روز).^{۱۴} مدت زمان عمل جراحی و هزینه عمل در آپاندکتومی لپاراسکوپیک بیشتر از آپاندکتومی باز است. یکی از فواید اصلی برای پیشنهاد آپاندکتومی لپاراسکوپیک کاهش درد بعد از عمل می‌باشد. مدت زمان بستری در بیمارستان نیز در آپاندکتومی لپاراسکوپیک کوتاه‌تر است ولی این کاهش کمتر از یک روز است. در اکثر مطالعات آپاندکتومی لپاراسکوپیک با مدت زمان کوتاه‌تری برای برگشت به فعالیت نرمال فرد همراه است.^۱ آپاندکتومی لپاراسکوپیک با کاهش درد بعد از عمل، تحمل سریع‌تر رژیم غذایی، مدت زمان کوتاه‌تر بستری و بازگشت سریع‌تر به کار همراه است.^{۱۵} میانگین مدت زمان عمل جراحی برای آپاندکتومی لپاراسکوپیک ۳۱/۵ دقیقه و برای آپاندکتومی باز ۴۱ دقیقه بوده است ولی تفاوت مهم در درد بعد از عمل وجود نداشته است.^{۱۶} میانگین مدت زمان عمل جراحی ۳۵ دقیقه برای آپاندکتومی لپاراسکوپیک و

3. Ho HS. Appendectomy. Wilmore DW, Cheung LY, Harken AH. ACS Surgery principles & practice. New York: American College of Surgeons/WebMD Publishing; 2002; p. 815-9.
4. Ellis H, Nathanson L. Appendix and appendectomy. Zinner M, Schwartz S. Maingot's Abdominal Operations. USA: Prentice hall; 1997; p. 1191-6.
5. Olmi S, Magnone S, Bertolini A, Croce E. Laparoscopic versus open appendectomy in acute appendicitis: a randomized prospective study. *Surg Endosc* 2005; 19: 1193-5.
6. Grantcharov TP, Rosenberg J. Laparoscopic appendectomy. *Ugeskr Laeger* 2005; 167: 2879-82.
7. Naess F. Laparoscopy and suspected acute appendicitis. *Tidsskr Nor Laegeforen* 2005; 125: 1820-1.
8. Kathkouda N, Mason RJ, Towfigh S. Laparoscopic versus open appendectomy: a prospective, randomized, double-blind study. *Adv Surg* 2006; 40: 1-19.
9. Subrt Z, Ferko A, Oberreiter M. Elective standard appendectomy versus elective laparoscopic appendectomy in women. A retrospective study. *Rozhl Chir* 2005; 84: 233-7.
10. Scott-Conner CE. Laparoscopic gastrointestinal surgery. *Med Clin North Am* 2002; 86: 1401-22.
11. Golub R, Siddiqui F, Pohl D. Laparoscopic versus open appendectomy: a metaanalysis. *J Am Coll Surg* 1998; 186: 545-53.
12. Klingler A, Henle KP, Beller S, Rechner J, Zerz A, Wetscher GJ, et al. Laparoscopic appendectomy does not change the incidence of postoperative infectious complications. *Am J Surg* 1998; 175: 232-5.
13. Sauerland S, Lefering R, Neugebauer EA. Laparoscopic versus open surgery for suspected appendicitis. *Cochrane Database Syst Rev* 2002; 1: CD001546.
14. Goh BK, Chui CH, Yap TL, Low Y, Lama TK, Alkouder G, et al. Is early laparoscopic appendectomy feasible in children with acute appendicitis presenting with an appendiceal mass? A prospective study. *J Pediatr Surg* 2005; 40: 1134-7.
15. Phillips S, Walton JM, Chin I, Farrokhyar F, Fitzgerald P, Cameron B. Ten-year experience with pediatric laparoscopic appendectomy--are we getting better? *J Pediatr Surg* 2005; 40: 842-5.
16. Heikkinen TJ, Haukipuro K, Hulkko A. Cost-effective appendectomy. Open or laparoscopic? A prospective randomized study. *Surg Endosc* 1998; 12: 1204-8.
17. Hellberg A, Rudberg C, Kullman E, Enochsson L, Fenyö G, Graffner H, et al. Prospective randomized multicentre study of laparoscopic versus open appendicectomy. *Br J Surg* 1999; 86: 48-53.
18. Anderson DG, Edelman DS. Laparoscopic appendectomy versus open appendectomy: a single institution study. *JSLS* 1997; 1: 323-4.
19. Fallahzadeh H. Should a laparoscopic appendectomy be done? *Am Surg* 1998; 64: 231-3.
20. Kazemier G, de Zeeuw GR, Lange JF, Hop WC, Bonjer HJ. Laparoscopic vs open appendectomy. A randomized clinical trial. *Surg Endosc* 1997; 11: 336-40.
21. Minné L, Varner D, Burnell A, Ratzer E, Clark J, Haun W. Laparoscopic vs open appendectomy. Prospective randomized study of outcomes. *Arch Surg* 1997; 132: 708-11.

Open versus laparoscopic appendectomy: study on 100 patients

Dorostan N
Askarpour SH*
Askaree M
Paziar F
Hoseinkhah H

Department of General Surgery
Ahwas Jundishapur Medical
Science

Abstract

Background: Acute appendicitis is one of the most common abdominal emergencies. Many studies comparing the two routes of open and laparoscopic appendectomy have been performed comparing the duration of each operation, duration of hospitalization, amount of post-operative pain medication required and infectious complications were the most commonly evaluated factors.

Methods: This clinical trial study, performed between March 2005 and March 2006 at Golestan and Imam Khomayni hospitals in Ahvaz, Iran, included 100 patients. Open appendectomy and laparoscopic appendectomy were carried out on 50 patients each. Duration of surgery and hospitalization, amount of pain medication and infectious complications were compared, with chi-square, ANOVA and t-test used for statistical analysis.

Results: The average length of hospital stay for laparoscopic appendectomy was 44.48 hours and for open appendectomy was 54.80 hours ($p<0.01$). The average of amount of pain medication for laparoscopic appendectomy was 2.40 doses and for open appendectomy was 30.46 doses ($p<0.01$). The laparoscopic and open procedures averaged 31.8 and 35.2 minutes, respectively ($p=0.5$). Only one (2%) laparoscopic case had infection, while four (8%) open appendectomy subjects suffered from this complication. Patients who underwent laparoscopic appendectomy had no intra-abdominal abscesses.

Conclusions: Duration of hospitalization was statistically much shorter using the laparoscopic appendectomy than that of the open procedure ($P<1\%$). The amount of pain medication administered was also statistically less in the laparoscopic procedure ($P<1\%$). However, the amount of time to complete each procedure was not statistically different. Most importantly, complications such as wound infection and intra-abdominal abscess were remarkably less using laparoscopy. We recommend laparoscopic appendectomy over open appendectomy.

Keywords: Acute appendicitis, laparoscopy, complication.

*Corresponding author: Ahwas - azadegan Ave - imam khomayne hospital-general surgery ward
Tel: +98-611-2216501
email:
shahnam_askarpour@yahoo.com