

## پیش‌دارو در بیهوشی اطفال: میدازولام در مقایسه با کتامین رکتال

### چکیده

علیرضا ابراهیم سلطانی<sup>۱\*</sup>

شهریار اربابی<sup>۱</sup>

هدایت ا. نحوی<sup>۲</sup>

نیکی مشیریان<sup>۳</sup>

۱- گروه بیهوشی

۲- گروه جراحی اطفال

دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان مرکز طبی  
کودکان

۳- پژوهش عمومی

\*تویسته مسئول، تهران، خیابان دکتر قربیب، بیمارستان  
مرکز طبی کودکان تلفن: ۰۶۹۱۱۰۳۰  
email: esoltani@sina.tums.ac.ir

### مقدمه

می‌توان آن را تجویز کرد.<sup>۴</sup> شروع اثر آن ظرف ۱۰ تا ۲۰ دقیقه و مدت اثر آن ۳۰ دقیقه می‌باشد و با دوزهای کمتر از ۵ mg/kg<sup>۵</sup> می‌تواند اثراخراجی را کاهش دهد و می‌تواند به عنوان آلتنتاتیو میدازولام به کار رود و در مطالعاتی که روی کتامین با دوزهای ۳-۶ mg/kg<sup>۶</sup> انجام شده درصد موقوفیت بالایی را بدون عوارض جانبی واضح برای آن گزارش کرده‌اند و البته در روش تزریق وریدی توهمند و اثرات روانی حتی با دوزهای ساب آنسستیک کم نیز گزارش شده است.<sup>۷</sup> البته متابولیت کتامین که نورکتامین می‌باشد نیز می‌تواند با حداقل عوارض جانبی باعث سدیشن شود. ترشح براق فراوان، توهمند و دیسفوریا در دوزهای بالاتر از ۶ mg/kg<sup>۸</sup> به صورت خوراکی بیشتر

تجویز دارو قبل از عمل (premedication) برای آرامبخشی و اثرات ضد اضطرابی در بیهوشی اطفال کاربرد گسترده‌ای دارد.<sup>۱</sup> استفاده آسان، شروع اثر سریع، مدت اثر کوتاه و عدم وجود عوارض جانبی از علاجیم یک پره‌مدیکاسیون خوب می‌باشد. رئوس یک مداوای قبل از عمل که شامل رهانی از اضطراب، تسکین، تثییت وضعیت همودینامیک، به حداقل رساندن احتمال آسپیراسیون محتوای اسیدی معده، ایجاد بی‌دردی، جلوگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل می‌باشد در سال ۱۹۶۰ توسط Mushin تعریف شدند.<sup>۹</sup> بیماران قبل از عمل اضطراب دارند حتی دوزهای کم کتامین نیز در رفع اضطراب موثر است.<sup>۳</sup> میدازولام یک داروی پره‌مدیکاسیون خوب می‌باشد و به علاوه به چندین روش (خوراکی، تزریقی، رکتال، نازال)

گذاشتن ماسک جهت القاء بیهوشی عوارضی چون بروز آپنه افزایش ترشح براق، تهوع و استفراغ، دفع مدفع و نیستاگموس در بیماران مورد ارزیابی قرار گرفته و ثبت شد. در خاتمه بعد از جمع آوری اطلاعات با استفاده از برنامه SPSS و از طریق آزمون  $T$  test و  $\chi^2$  آنالیز آماری به عمل آمد. مقادیر  $p < 0.05$  معنی دار در نظر گرفته شد.

## یافته ها

۶۴ کودک یک تا ۱۰ سال با میانگین سنی ۴/۲ در گروه میدازولام و ۳/۷ در گروه کتامین که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، با توجه به آزمون های آماری انجام شده، اختلاف معنی داری از لحاظ میانگین و توزیع سنی نداشتند. ( $p = 0.385$ ) از طرفی از لحاظ جنسیت نیز اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد ( $p = 0.740$ ) امتیاز پذیرش ماسک  $p = 0.042$  و اثر ضد اضطرابی  $p = 0.00$  در دو گروه اختلاف معنی دار دارد (جدول ۱) و با توجه به اینکه در ارزیابی از نظر درصد موفقیت در مورد اثر آرام بخشی امتیاز دو و سه مطلوب و در مورد اثر ضد اضطرابی و پذیرش ماسک امتیاز سه و چهار مطلوب و در مورد رفتار حین جدا شدن از والدین امتیاز دو مطلوب ارزیابی شد درصد مطلوب به جز در مورد اثر آرام بخشی که امتیاز دو گروه زیر ۷۵٪ بود در بقیه موارد درصد موفقیت بالای ۷۵٪ بود با برتری میدازولام (جدول ۲). عوارض جانبی به طور کلی شیوع بالای نداشت در گروه میدازولام فقط یک مورد تهوع و استفراغ دیده شد اما در گروه کتامین در ۳۴٪ موارد نیستاگموس و ۴۰٪ موارد افزایش ترشح براق، یک مورد تهوع استفراغ و دفع مدفع نیز وجود داشت و تنها موارد نیستاگموس و افزایش براق اختلاف معنی داری داشت ( $p = 0.001$  و  $p = 0.016$ ). (جدول ۱)

## بحث

در این مطالعه داروی میدازولام رکتال  $0.5 \text{ mg/kg}$  دارای تاثیر بهتر و عوارض جانبی کمتر نسبت به داروی کتامین  $5 \text{ mg/kg}$  بوده است که البته می توان نتیجه ضعیف در مورد داروی کتامین  $5 \text{ mg/kg}$  را به علت کم بودن مقدار دوز مصرفی عنوان کرد به طور مثال در مطالعه Tanaka<sup>۱</sup> دوز موثر کتامین رکتال برای ایجاد اثر مطلوب  $10 \text{ mg/kg}$  عنوان شده است که دو برابر دوز مصرفی این دارو در مطالعه ما می باشد. اگر چه باید این نکته را نیز مدنظر داشت که دوز  $10 \text{ mg/kg}$

دیده می شود.<sup>۸</sup> هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای از نظر اثرات ضد اضطرابی، آرام بخشی، تحمل ماسک بیهوشی حین القاء بیهوشی و نحوه جدا شدن از والدین می باشد.

## روش بررسی

پس از اخذ تائیدیه کمیته اخلاق پژوهشی دانشکده پژوهشکی این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دو سویه کور طراحی شد. ASA II (double blinded clinical trial) ۶۴ کودک یک تا ۱۰ ساله با I و II که کاندید انجام اعمال جراحی انتخابی غیرقابلی و غیر توراسیک با زمان بیش از ۳۰ دقیقه بودند، به شرط اخذ رضایت از والدین و نداشتن آنومالی در ناحیه مقعد و ژنیتالیا، عدم حساسیت په هر کدام از داروهای کتامین و یا میدازولام، نداشتن سابقه ضربه به سر و کاهش سطح هوشیاری و سابقه بیماری متابولیک زمینه ای که در سال های ۸۳ و ۸۴ به بیمارستان مرکز طبی مراجعه کردند به صورت تصادفی (با استفاده از بلوک های تصادفی) در دو گروه قرار گرفتند. پیش دارو توسط پژوهشک متخصص که از نوع آن اطلاعی ندارد در حجم های مساوی به صورت رکتال توسط لوله مخصوص تجویز شد بدین صورت که کتامین (نوع راست گرد از شرکت بایر آلمان) با دوز  $0.3 \text{ mg/kg}$  و میدازولام (از شرکت اکسیربروجرد) با دوز  $0.5 \text{ mg/kg}$  به صورت محلول در آب م قطره به نحوی که حجم کل به پنج میلی لیتر بر سر توسط یک لوله به صورت رکتال برای بیماران و در بغل والدین شان تجویز شد) سپس دو گروه کتامین و میدازولام ۳۰ دقیقه پس از تجویز دارو توسط پژوهشک دیگری با استفاده از سیستم امتیازدهی آقای Kogan مورد ارزیابی قرار گرفتند به این صورت که خاصیت آرام بخشی یک تا سه امتیاز می گیرد: بیدار=۱، منگ و خواب آلود=۲، کاملا خواب=۳، خاصیت ضد اضطرابی یک تا چهار امتیاز می گیرد: خیلی مضطرب است با گریه=۱، بیمار اضطراب دارد=۲، آرام ولی بدون همکاری=۳، آرام با همکاری=۴، پذیرش ماسک بیهوشی در حین القاء بیهوشی یک تا چهار امتیاز می گیرد: ماسک را رد می کند=۱، مقداری از ماسک می ترسد=۲، در صورت اطمینان بخشی همکاری می کند=۳، آرام است و همکاری می کند=۴ رفتار حین جدا شدن از والدین یک تا دو امتیاز می گیرد: بیمار گریه می کند=۱، بیمار گریه نمی کند=۲، اثر ضد اضطرابی و در فرم مخصوص جمع آوری و ثبت شد. در خلال انجام مطالعه و حین

جدول-۱: میانگین نمرات و درصد موفقیت در دو گروه دریافت کننده پیش‌داروی میدازولام و کتامین رکتال

| متغیر<br>امتیاز  | میدازولام رکتال | کتامین رکتال | p       |
|------------------|-----------------|--------------|---------|
| جداشدن از والدین | ۱/۹۱±۰/۲        | ۱/۸۱±۰/۳     | ۰/۲۸۸   |
| پذیرش ماسک       | ۳/۴۷±۰/۷        | ۳/۰۶±۰/۸     | ۰/۰۴۲   |
| ضداضطرابی        | ۳/۷۵±۰/۵        | ۳/۱۹±۰/۶     | <۰/۰۰۰۱ |
| سدیشن            | ۱/۹۱±۰/۶        | ۱/۸۴±۰/۷     | ۰/۷۲۵   |
| درصد موفقیت      |                 |              |         |
| جداشدن از والدین | (۰/۹۰/۶)        | (۰/۸۱/۳)     | ۰/۴۷۴   |
| پذیرش ماسک       | ٪۹۰/۶           | ٪۷۱/۹        | ۰/۰۰۵   |
| ضداضطرابی        | ٪۹۶/۹           | ٪۸۴/۴        | ۰/۰۸۰   |
| سدیشن            | ٪۷۱/۹           | ٪۶۵/۷        | ۰/۵۹۰   |

مطالعات متعددی که روی روش‌ها و دوزهای مختلف میدازولام و کتامین به عمل آمد مقایسه مناسبی بین میدازولام و کتامین رکتال به عمل نیامده بود.<sup>۱۲-۱۶</sup> لذا در این مطالعه مقایسه‌ای بین میدازولام و کتامین رکتال به عمل آمد به طور خلاصه اثرات ضداضطرابی و پذیرش ماسک القای بیهوشی در گروه پیش‌داروی مقداری میدازولام نسبت به گروه کتامین بهتر بود. جدا شدن از والدین در هر دو گروه نتیجه قابل قبولی داشت اما سدیشن با اینکه در گروه میدازولام مقداری بیشتر بود اما در سطح قابل قبولی نبود. مدت زمان سدیشن تقریباً یکسان بود و عوارض جانبی در حد بسیار پایینی قرار داشت. همانگونه که در قسمت نتایج مشهود است دو گروه از نظر میزان سدیشن و جدا شدن از والدین (جدول ۲) و در هر دو مورد زیر ٪۷۵ رضایت وجود داشت اما در هر چهار مورد ارزیابی که به عمل آمد میدازولام نتیجه بهتری از خود نشان داد هر چند در دو مورد اول اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود اما اگر مجموعه اثرات و شیوه بروز عوارض را در نظر بگیریم میدازولام با اثر بهتر و عوارض کمتر دارویی بهتری می‌باشد. البته هیچگکدام از دو دارو سطح رضایت مطلوب را به عنوان آرامبخش در این مطالعه ایجاد نکردند که این مورد را نیز می‌توان به کم بودن دوز مصرفی داروها نسبت داد. اگر چه این کار در مورد داروی میدازولام با توجه به عارضه و قله تنفسی باید به احتیاط زیادی انجام شود. در مجموع با توجه به نتایج حاصل شده در این مطالعه به نظر می‌رسد که داروی میدازولام رکتال با دوز ۰/۵mg/kg می‌تواند اختیاب مناسبی برای انجام پیش‌درمانی (Premedication) در بیهوشی اطفال باشد.

می‌تواند عوارض جانبی به مراتب بیشتری نسبت به آنچه که در مطالعه ما دیده شد داشته باشد. نتایج نشان می‌دهد که کتامین تجویز شده به صورت رکتال به تنها یی اثرات آرامبخش وابسته به دوز را به تنها یی در کودکان ایجاد می‌کند هنگامی که در بالاترین میزان غاظت پلاسمایی خود برسد. کتامین ۱۰mg/kg ۱۰ شروعی آهسته دارد. ولی به اندازه میدازولام ۱mg/kg ۱ برای ایجاد تسکین در کودکان سالم قبل از بیهوشی مؤثر است. کتامین رکتال ۱۰mg/kg ۱ برای جراحی‌های کوتاه‌مدت به خاطر تسکین بیش از حد و طولانی شدن زمان ریکاوری بعد از عمل توصیه نمی‌شود. همچنین از اشکالات دیگر کتامین می‌توان به شروع آهسته اثر آن اشاره کرد. که در مطالعات دیگر نیز به این قضیه اشاره شده است.<sup>۹</sup> میدازولام به صورت تجویز داخل بینی از دیازپام خوارکی مختصراً، مؤثرتر است. در کودکان، میدازولام اثرات ضداضطرابی و آرامبخشی با شروع سریع را ایجاد می‌کند که می‌تواند جانشین خوبی برای روش‌های دیگر مورد استفاده برای داروی بیهوشی باشد اما تجویز آن آزاردهنده است و بینی را می‌سوزاند.<sup>۱۰</sup> در مقایسه‌ای که آقای کوگان و همکارانش روش چهار روش تجویز (خوارکی، رکتال، نازال، زیربینی) میدازولام انجام دادند دیده شد که هر کدام از روش‌ها مزايا و مضراتی دارند سریع ترین روش از نظر تاثیر روش نازال است ولی مطلوب نیست روش خوارکی و رکتال از نظر دوز و زمان اثر مشابه هستند.<sup>۹</sup> کتامین خوارکی ۸mg/kg در مقایسه با ۶mg/kg و ۴ روش پیش‌دارو درمانی (Premedication) مناسبی در مورد کودکان کاندید عمل جراحی می‌باشد. اما مدت زمان ریکاوری را طولانی می‌کند.<sup>۹</sup> در

## References

1. Meursing AE. Psychological effect of anesthesia in children. *Curr Opin Anesthesiol* 1989; 2: 335-8.
2. Geldner G, Hubmann M, Knoll R, Jacobi K. Comparison between three transmucosal routes of administration of midazolam in children. *Pediatr Anesth* 1997; 7: 103-9.
3. Bleiberg AH, Salvaggio CA, Roy LC, Kassutto Z. Low-dose ketamine: efficacy in pediatric sedation. *Pediatr Emerg Care* 2007; 23: 158-62.
4. Warner DL, Cabaret J, Velling D. Ketamine plus midazolam, a most effective paediatric oral premedicant. *Paediatr Anaesth* 1995; 5: 293-5.
5. Erk G, Ornek D, Dönmez NF, Taşpinar V. The use of ketamine or ketamine-midazolam for adenotonsillectomy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2007; 71: 937-41.
6. Gutstein HB, Johnson KL, Heard MB, Gregory GA. Oral ketamine preanesthetic medication in children. *Anesthesiology* 1992; 76: 28-33.
7. Gharde P, Chauhan S, Kiran U. Evaluation of efficacy of intranasal midazolam, ketamine and their mixture as premedication and its relation with bispectral index in children with tetralogy of fallot undergoing intracardiac repair. *Ann Card Anaesth* 2006; 9: 25-30.
8. Gingrich BK. Difficulties encountered in a comparative study of orally administered midazolam and ketamine. *Anesthesiology* 1994; 80: 1414-5.
9. Kogan A, Katz J, Efrat R, Eidelman LA. Premedication with midazolam in young children: a comparison of four routes of administration. *Paediatr Anaesth* 2002; 12: 685-9.
10. Tanaka M, Sato M, Saito A, Nishikawa T. Reevaluation of rectal ketamine premedication in children: comparison with rectal midazolam. *Anesthesiology* 2000; 93: 1217-24.
11. Munro A, Machonochie I. Midazolam or ketamine for procedural sedation of children in the emergency department. *Emerg Med J* 2007; 24: 579-80.
12. Turhanoglu S, Kararmaz A, Ozylmaz MA, Kaya S, Tok D. Effects of different doses of oral ketamine for premedication of children. *Eur J Anaesthesiol* 2003; 20: 56-60.
13. Marhofer P, Freitag H, Höchtl A, Greher M, Erlacher W, Semrsroth M. S(+)-ketamine for rectal premedication in children. *Anesth Analg* 2001; 92: 62-5.
14. Abu-Shahwan I, Chowdary K. Ketamine is effective in decreasing the incidence of emergence agitation in children undergoing dental repair under sevoflurane general anesthesia. *Paediatr Anaesth* 2007; 17: 846-50.
15. Lejus C, Renaudin M, Testa S, Malinovsky JM, Vigier T, Souron R. Midazolam for premedication in children: nasal vs. rectal administration. *Eur J Anaesthesiol* 1997; 14: 244-9.
16. Horiuchi T, Kawaguchi M, Kurehara K, Kawaraguchi Y, Sasaoka N, Furuya H. Evaluation of relatively low dose of oral transmucosal ketamine premedication in children: a comparison with oral midazolam. *Paediatr Anaesth* 2005; 15: 643-7.

## Rectal premedication in pediatric anesthesia: midazolam versus ketamine

Ebrahim Soltani A<sup>1\*</sup>  
Arbabi SH<sup>1</sup>  
Nahvi H<sup>2</sup>  
Moshirian N

1-Department of Anesthesiology, Tehran University of Medical Sciences Children Medical Center  
2- Department of pediatric surgery, Tehran University of Medical Sciences, Children Medical Center

### Abstract

**Background:** Premedication is widely used in pediatric anesthesia to reduce emotional trauma and ensure smooth induction. The rectal route is one of the most commonly accepted means of drug administration. The aim of our study was to investigate and compare the efficacy of rectally administered midazolam versus that of ketamine as a premedication in pediatric patients.

**Methods:** We performed a prospective randomized double-blinded clinical trial in 64 children, 1 to 10 years of age, randomly allocated into two groups. The midazolam group received 0.5 mg/kg rectal midazolam and the ketamine group received 5 mg/kg rectal ketamine. The preoperative sedation scores were evaluated on a three-point scale. The anxiolysis and mask acceptance scores were evaluated separately on a four-point scale, with ease of parental separation, based on the presence or lack of crying, evaluated on a two-point scale.

**Results:** Neither medication showed acceptable sedation (<75%), with no significant difference in sedation score between the two groups ( $P=0.725$ ). Anxiolysis and mask acceptance using either midazolam or ketamine were acceptable, with midazolam performing significantly better than ketamine ( $P=0.00$  and  $P=0.042$ , respectively). Ease of parental separation was seen in both groups without significant difference ( $P=0.288$ ) and no major adverse effects, such as apnea, occurred in either group.

**Conclusions:** Rectal midazolam is more effective than ketamine in anxiolysis and mask acceptance. Although they both can ease separation anxiety in children before surgery, we found neither drug to be acceptable for sedation.

**Keywords:** Ketamine, midazolam, sedation, anxiolysis

\*Corresponding author: Keshavarz Blvd., Gharib St., Children Medical Center  
Tel: +98-21-66911030  
email: esoltani@tums.ac.ir