

ارتباط الگوی ضربان قلب جنین با تعداد گلوبول‌های قرمز هسته‌دار در خون بند ناف هنگام تولد

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۰۲/۰۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۰۷/۲۱

چکیده

زمینه و هدف: در مطالعات قبلی ارتباط احتمالی بین افزایش گلوبول‌های قرمز هسته‌دار با مدت و شدت آسفيکسی مطرح شده است. هدف مطالعه بررسی ارتباط بین الگوی ضربان قلب جنین با تعداد گلوبول‌های قرمز هسته‌دار خون بند ناف هنگام تولد می‌باشد. **روش بررسی:** در یک مطالعه مقطعی، توصیفی- تحلیلی، ۳۲۲ خانم حامله با جنین ترم و سالم کاندید ختم حاملگی موردن بررسی قرار گرفتند. برای تمام بیماران در طول لیبر پایش خارجی ضربان قلب جنین (FHR) به طور مداوم صورت گرفت. براساس آنالیز الگوی FHR جنین بهدو گروه با الگوی طبیعی (شاهد) و یا حداقل یک الگوی غیرطبیعی (عدم وجود beat to beat variability- عدم وجود acceleration و وجود افت قلب جنین از هر نوع آن) تقسیم شدند. بالاصله پس از زایمان خون بند نافی از نظر تعداد گلوبول‌های قرمز هسته‌دار (NRBC) و pH بررسی شد و به صورت جداگانه ثبت و بین دو گروه مقایسه شد. **یافته‌ها:** میانگین تعداد NRBC خون بند نافی نوزاد در الگوهای غیرطبیعی decelaration و Early deceleration، Variable deceleration و Late deceleration، Beat to Beat variability و Acceleration با میانگین تعداد NRBC خون بند نافی نوزاد در صورت نبود آن تقسیم شدند. در برابر 0.93 ± 0.01 در 1.47 ± 0.01 ($p < 0.0001$)، همچنین میانگین تعداد NRBC خون بند نافی نوزاد در صورت نبود Acceleration یا نبود Beat to Beat variability با گروه شاهد به میزان معنی داری بالاتر بود. (بهترتب 1.07 ± 0.07 در 1.37 ± 0.05 در 1.47 ± 0.05 ($p < 0.0001$)). ارتباط معکوس و معنی داری بین آپگار دقیقه پنج و pH خون بند نافی تعداد NRBC خون طناب نافی نوزاد، برقرار بود. **نتیجه‌گیری:** احتمالاً هیپوکسی جنین مسبب افزایش NRBC خون بند نافی نوزادان و الگوی غیرطبیعی FHR می‌باشد.

کلمات کلیدی: عفونت ادراری، نوزاد، زردی.

*
 Shirin NirooManesh
 مریم محبی

گروه زنان- زایمان، پره ناتال

بیمارستان میرزا کوچک خان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

*
 نویسنده مسئول: تهران، خیابان استاد نجات اللهی،
 بیمارستان میرزا کوچک خان تلفن: ۰۲۶۰۴۱۷۲ email: shirin.niroomanesh@yahoo.com

مقدمه

بیماری‌های مزمن، استرس حادی که منجر به آزاد شدن NRBC‌ها از مغز استخوان می‌شود و هیپوکسی پس از تولد می‌باشد. افزایش بیش از حد آن می‌تواند بدون علت نیز باشد. زمانی که افزایش تعداد NRBC به دنبال آسفيکسی حاد یا تحت حاد ایجاد می‌شود، مقدار این افزایش نشان‌دهنده عملکرد، شدت و طول مدت آسفيکسی می‌باشد. با این حال همپوشانی وسیعی بین مقدار NRBC پس از آسفيکسی حاد، تحت حاد و یا مزمن وجود دارد. آسفيکسی با هر مدت زمانی همیشه باعث افزایش تعداد NRBC‌ها نشده و در مواردی که آسفيکسی وجود ندارد میزان NRBC در حد بسیار زیادی افزایش داشته است. بنابراین نباید به تعداد NRBC به عنوان تنها عامل تعیین‌کننده شدت و طول مدت آسفيکسی داخل رحم توجه کرد. همچنین نشان داده شده که

گلوبول‌های قرمز هسته‌دار (NRBC) اریتروسیت‌های نابالغی هستند که به صورت اولیه در مغز استخوان جنین در پاسخ به اریتروپویتین تولید شده و به عنوان پیش‌ساز ریتکولوسیت و اریتروسیت رسیده ذخیره می‌شوند.^۱ NRBC در خون محیطی نوزادان طبیعی تازه متولد شده سالم وجود دارد^۲ و در مدت کوتاهی پس از تولد از جریان خون پاک می‌شوند.^{۳-۵} محرک‌های حاد و مزمن بسیاری، باعث افزایش تعداد NRBC‌های در گردش خون می‌شوند که این افزایش می‌تواند به علت افزایش فعالیت خون‌سازی و یا تخلیه سریع منابع ذخیره در مغز استخوان باشد.^۶ افزایش تعداد NRBC اغلب به علت پره ماقوریتی، افزایش خون‌سازی به دنبال

شمارش دستی (به صورت تعداد NRBC در هر یکصد گلbul سفید (WBC) و اندازه‌گیری PH به صورت جداگانه جمع‌آوری می‌شد. آپگار دقیقه اول و پنج نوزاد ثبت می‌شد. برای مقایسه میانگین متغیرهای کمی از آزمون Student's t- test و تست همبستگی Independent Samples t- test ویراست ۱۲ استفاده به عمل آمد و $p < 0.05$ معنی دار بود.

یافته‌ها

در این مطالعه اطلاعات ۳۲۲ بیمار بررسی شد. میانگین ($\pm SD$) سن بیماران $25/84 \pm 4/68$ سال بود (حداقل ۱۷ و حداکثر ۳۹ سال). در مقایسه کلیه نمونه‌ها با موارد شاهد میانگین تعداد NRBC خون بند ناف نوزاد در الگوهای Variable deceleration، Late deceleration و Early deceleration نسبت به گروه شاهد به میزان معنی داری افزایش داشت. ($11/88 \pm 4/406$ و $8/32 \pm 4/64$ و $4/11 \pm 4/913$ در برابر $10/58 \pm 5/366$ و $10/73 \pm 5/07$ در برابر $13/73 \pm 3/58$) میانگین تعداد NRBC خون بند ناف نوزاد در صورت نبود Acceleration یا نبود Beat to beat variability در مقایسه با گروه شاهد به میزان معنی داری بالاتر بود. ($10/73 \pm 5/07$ و $10/85 \pm 5/12$ در برابر $13/73 \pm 3/58$) (جدول ۱). با توجه به نتایج آزمون همبستگی مشخص ارتباط بین آپگار دقیقه پنج و pH خون بند ناف با تعداد NRBC خون طناب نافی نوزاد، از لحاظ آماری معنی دار بود ($p < 0.05$) (نمودارهای ۱ و ۲). با توجه به میزان ($-0/85$ و $-0/80$) این ارتباط معکوس می‌باشد و به این صورت در دسته‌های با "ارزش متوسط" و "ارزش بالا" طبقه‌بندی شدند.

جدول ۱: مقایسه میانگین NRBC خون بند ناف در الگوهای ناهنجار و گروه شاهد

متغیرها	گروه شاهد		گروه مورد	p
	تعداد	-		
سن مادران (سال)	$26/16 \pm 4/954$	$25/52 \pm 4/382$	۱۵۹	$-$
FHR ناهنجار			۱۶۳	
*Late Deceleration	$11/88 \pm 4/406$	$0/93 \pm 1/790$		$0/0001$
*Variable Deceleration	$8/32 \pm 4/64$	$0/93 \pm 1/790$		$0/0001$
*Prolonged Deceleration	$10/58 \pm 5/366$	$0/93 \pm 1/790$		$0/0001$
*Early Deceleration	$4/11 \pm 4/913$	$0/93 \pm 1/790$		$0/0001$
نبود	$10/73 \pm 5/07$	$0/93 \pm 1/790$		$0/0001$
نبود	$13/73 \pm 3/58$	$0/93 \pm 1/790$		$0/0001$
variability				


مقادیر براساس میانگین طانحراف معیار بیان شده، آزمون t-test و مقادیر $p < 0.05$ معنی دار است

شمارش دستی NRBC با پیشرفت اسیدوز بند ناف و پیشرفت کاهش آپگار، افزایش می‌یابد.^{۷-۹} هدف از مونیتورینگ ضربان قلب جنین Fetal Heart Rate (FHR) بررسی مداوم اکسیژنasiyon جنین است.^{۱۰} در واقع ضربان قلب جنین با این هدف مونیتور می‌شود که بتوان هیپوکسی نوزادی را زودتر تشخیص داد و درمان نمود. بنابراین بهنظر می‌رسد هیپوکسی جنین باعث افزایش NRBC خون بند نافی نوزادان و الگوی غیرطبیعی ضربان قلب جنین، می‌شود. با این حال ارتباط بین این دو متغیر در مطالعات کمی بررسی شده است.^{۱۱} هدف مطالعه بررسی ارتباط الگوی ضربان قلب جنین با تعداد NRBC خون بند ناف هنگام تولد می‌باشد.


روش بررسی

پس از تائید طرح توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کمیته اخلاق پزشکی، ۳۲۲ بیمار حامله ترم، تک قلو، با سن حاملگی هنگام زایمان (براساس LMP یا سونوگرافی سه ماهه اول یا دوم) بزرگتر یا مساوی ۳۷ هفته و کوچکتر از ۴۱ هفته، کاندید ختم حاملگی از بین مراجعین بیمارستان میرزا کوچک خان در سال ۱۳۸۴ در یک مطالعه مقطعی و توصیفی - تحلیلی به صورت نمونه‌گیری آسان بررسی شدند. احتمال وجود آنومالی‌های کروموزومی یا مادرزادی جنینی نظیر دیابت، سندروم داون، سندروم TORCH، دیابت حاملگی (دیابت آشکار از قبل از حاملگی اثبات شده به وسیله آزمایش قند خون)، IUGR (وزن زیر صد٪ اثبات شده توسط سونوگرافی قبل از زایمان)، مصرف سیگار (مادر حامله که روزانه بیش از پنج نخ سیگار مصرف می‌کند)، پره اکلامپسی (فسار خون مادر بالاتر یا مساوی $140/90$ و پروتئینوری بزرگتر مساوی $+1$) موجب خروج بیمار از مطالعه می‌شد. در تمامی بیماران در طول لیبر یا حداکثر طول لیبر الگوی نوار قلبی جنین به طور مداوم ثبت می‌شد و بروز هرگونه ناهنجاری با ذکر نوع آن ثبت می‌گردید. بر اساس بروز یا عدم بروز ناهنجاری بیماران به دو گروه مورد (بروز هر یک از ناهنجاری ذیل) شاهد (عدم وجود هر یک از این الگوها و وجود Beat to beat variability و وجود Acceleration مناسب) تقسیم می‌شدند. انواع ناهنجاری عبارت بودند از وجود افت در ضربان قلب جنین از هر نوع آن (Early, variable, late, prolonged deceleration) و عدم وجود Acceleration یا Beat to beat variability مناسب. بلاfaciale پس از زایمان خون بندناف جهت اندازه‌گیری تعداد NRBC با

از گروه با Acceleration بالاتر است. ($10/73 \pm 5/07$ در برابر $1/47 \pm 2/50$) نیز نشان داد که وجود Acceleration در FHR به طور قابل اعتمادی عدم حضور هیپوکسی در جنین را نشان می‌دهد.^{۱۱} مطالعات دیگر نشان می‌دهد که Acceleration یکی از معیارهای قابل اعتماد سلامت جنین است. طبیعی است که در نتایج تعداد NRBC خون بند ناف نوزاد در دو گروه بدون Acceleration بهمیزان معنی‌داری از گروه با Acceleration بالاتر باشد. Ferber همچنین نشان داد که فقدان Accelerations به عنوان تنها ناهنجاری در FHR است که به صورت غیر وابسته می‌تواند افزایش NRBC‌ها را در زمان تولد پیشگویی کند.^{۱۲} در پاسخ به هیپوکسی کبد جنین تولید اریتروپویتین را افزایش می‌دهد. از آنجایی که اریتروپویتین از جفت عبور نمی‌کند افزایش اریتروپویتین فقط در نتیجه هیپوکسی واقعی جنین می‌تواند باشد و منشا مادری ندارد. اریتروپویتین موجب تحریک سیستم خون‌ساز جنین می‌شود (در سه ماهه سوم عمدتاً مغز استخوان) که تولید RBC را افزایش دهد. از آنجایی که NRBC‌ها می‌توانند شکل خود را از نظر اندازه و انساط‌پذیری تغییر دهند، از مغز استخوان به داخل خون محیطی رها می‌شوند. البته یک فاصله زمانی بین بروز هیپوکسی و آزاد شدن NRBC‌ها به داخل خون وجود دارد که بر اساس مطالعه Blackwell این رهایی با تاخیری بین ۱۲ تا ۲۴ ساعت صورت می‌گیرد و گذراست.^{۱۳} Ghosh نشان داد که ارتباط معنی‌دار منفی بین سطوح NRBC و درجه آپگار و pH شریان نافی برقرار است.^{۱۵} Fern نیز به نتایج مشابهی دست یافت و نشان داد که آپگار پائین، pH خون بندناف به خوبی با تعداد NRBC در ارتباط بود.^{۱۶} Minor نیز نشان داد در کودکان SGA که تعداد NRBC بالای داشتند، به طور معنی‌داری pH شریان نافی پائین‌تری داشتند.^{۱۷} سایر مطالعات نیز نتایج مشابهی در بر داشتند.^{۱۸} (نتایج مطالعه ما نشان داد که ارتباط بین آپگار دقیقه‌پنج و pH خون بند ناف با تعداد NRBC خون بند ناف نوزاد، معنی‌دار است و با توجه به میزان $r = -0.612$ و $r = -0.850$) این ارتباط معکوس است و به ترتیب در دسته‌های با "ارزش متوسط" و "بالا" طبقه‌بندی می‌شود. لذا می‌توان گفت در Beat to Acceleration یا عدم وجود Deceleration یا to Deceleration مختلف beat variability در FHR تعداد NRBC‌ها افزایش می‌یابند. به نظر می‌رسد هیپوکسی جنین مسبب افزایش NRBC خون بندناف نوزادان و الگوی غیرطبیعی FHR می‌باشد.



نمودار-۱: بررسی ارتباط بین pH با تعداد NRBC خون بند ناف نوزاد ($p < 0.05$)



نمودار-۲: ارتباط بین آپگار دقیقه پنج با تعداد NRBC خون بند ناف ($p < 0.05$)

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین تعداد NRBC خون بند ناف نوزاد در الگوهای Variable deceleration، Late deceleration و Early deceleration Prolonged deceleration شاهد به میزان معنی‌داری افزایش می‌یابد. این نتایج مشابه نتایج به دست آمده از مطالعه Ferber می‌باشد.^{۱۹} آنها نشان دادند که در انواع مختلف Decelerations تعداد NRBC‌ها افزایش دارد. اگرچه مطابق الگوی نهایی که برای پیشگویی افزایش NRBC‌ها در زمان تولد ارائه شده است، هیچ‌یک از انواع مختلف Decelerations ارتباط معنی‌داری نداشته‌اند. البته عدم اثبات رابطه بین انواع مختلف Decelerations و توان پیشگویی پیامد پری ناتال در مطالعات دیگر نیز نشان داده شده است.^{۲۰} همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین تعداد NRBC خون بند نافی نوزاد در گروه بدون Acceleration بهمیزان معنی‌داری

References

- Sills RH, Hadley RA. The significance of nucleated red blood cells in the peripheral blood of children. *Am J Pediatr Hematol Oncol* 1983; 5: 173-7.
- Miller DR, Baehner RL. Blood diseases of infancy and childhood. 7th ed. St. Louis, MO: Mosby; 1995.
- HS I. Morphologic and quantitative study of blood corpuscles in the newborn period. *Am J Dis Child* 1924; 27: 473-515.
- Naeye RL, Localio AR. Determining the time before birth when ischemia and hypoxemia initiated cerebral palsy. *Obstet Gynecol* 1995; 86: 713-9.
- Osaki FA, Naiman JL. Normal blood values in the newborn period. Hematologic problems in the newborn. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1972. p. 1-30.
- Hermansen MC. Nucleated red blood cells in the fetus and newborn. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2001; 84: 211-5.
- De Waele M, Foulon W, Remmans W, Segers E, Smet L, Jochmans K, et al. Hematologic values and lymphocyte subsets in fetal blood. *Am J Clin Pathol* 1988; 89: 742-6.
- Simpson JL, Elias S. Isolating fetal cells from maternal blood. Advances in prenatal diagnosis through molecular technology. *JAMA* 1993; 270: 2357-61.
- Widness JA, Susa JB, Garcia JF, Singer DB, Sehgal P, Oh W, et al. Increased erythropoiesis and elevated erythropoietin in infants born to diabetic mothers and in hyperinsulinemic rhesus fetuses. *J Clin Invest* 1981; 67: 637-42.
- King T, Parer J. The physiology of fetal heart rate patterns and perinatal asphyxia. *J Perinat Neonatal Nurs* 2000; 14: 19-39.
- Ferber A, Grassi A, Akyol D, O'Reilly-Green C, Divon MY. The association of fetal heart rate patterns with nucleated red blood cell counts at birth. *Am J Obstet Gynecol* 2003; 188: 1228-30.
- Buonocore G, Perrone S, Gioia D, Gatti MG, Massafra C, Agosta R, et al. Nucleated red blood cell count at birth as an index of perinatal brain damage. *Am J Obstet Gynecol* 1999; 181: 1500-5.
- Nelson KB, Dambrosia JM, Ting TY, Grether JK. Uncertain value of electronic fetal monitoring in predicting cerebral palsy. *N Engl J Med* 1996; 334: 613-8.
- Blackwell SC, Hallak M, Hotra JW, Refuerzo J, Hassan SS, Sokol RJ, et al. Timing of fetal nucleated red blood cell count elevation in response to acute hypoxia. *Biol Neonate* 2004; 85: 217-20.
- Ghosh B, Mittal S, Kumar S, Dadhwal V. Prediction of perinatal asphyxia with nucleated red blood cells in cord blood of newborns. *Int J Gynaecol Obstet* 2003; 81: 267-71.
- Ferns SJ, Bhat BV, Basu D. Value of nucleated red blood cells in predicting severity and outcome of perinatal asphyxia. *Indian J Pathol Microbiol* 2004; 47: 503-5.
- Minior VK, Shatzkin E, Divon MY. Nucleated red blood cell count in the differentiation of fetuses with pathologic growth restriction from healthy small-for-gestational-age fetuses. *Am J Obstet Gynecol* 2000; 182: 1107-9.
- Hanion-Lundberg KM, Kirby RS, Gandhi S, Broekhuizen FF. Nucleated red blood cells in cord blood of singleton term neonates. *Am J Obstet Gynecol* 1997; 176: 1149-54.

Fetal heart rate pattern and umbilical cord nucleated erythrocyte count: a cross-sectional study

Niroomanesh Sh.*
Mohebi M.

Department of Obstetrics &
Gynecology, Division of
Perinatology

Tehran University of Medical
Sciences

Abstract

Received: April 21, 2008 Accepted: October 12, 2008

Background: Previous studies have suggested the presence of a relationship between the increase of Nucleated RBC (NRBC) and the duration and intensity of asphyxia. The purpose of this study was to evaluate the relationship of fetal heart rate pattern and the number of NRBC's in umbilical cord blood sample at birth.

Methods: We enrolled 322 pregnant women with healthy, term fetuses who referred to Mirza Kouchak Khan Hospital for pregnancy termination in 2005 in a case-control study. All patients underwent continuous FHR monitoring and based on their FHR pattern, they were divided into two groups with normal FHR pattern and at least one abnormality in FHR pattern (including absence of beat to beat variability; absence of proper acceleration; and early, late, variable and prolonged deceleration). Samples of umbilical cord blood were evaluated for NRBC count and pH immediately after birth. The variables were compared in these two groups.

Results: The mean NRBC count was significantly higher in patients with any kind of deceleration (late, variable, early or prolonged) in comparison with controls (respectively 11.88 ± 4.406 , 8.32 ± 4.64 , 10.58 ± 5.366 , and 4.11 ± 4.913 vs. 0.93 ± 1.790 in controls). Furthermore the mean NRBC count was significantly higher in patients with absence of acceleration or beat to beat variability (10.73 ± 5.07 and 13.73 ± 3.58 vs. 1.47 ± 2.50). There was a negative correlation between 5th minute Apgar score and umbilical cord blood sample with mean NRBC count of umbilical cord blood sample.

Conclusion: Any abnormality in FHR pattern is associated with a significant increase in mean NRBC count of umbilical cord blood sample. There is also a significant relationship between the 5th minute Apgar score and umbilical cord blood sample pH, and mean NRBC count in umbilical cord blood sample.

Keywords: Fetal heart rate, pattern, apgar score, nucleated, erythrocyte, umbilical cord, sample.

* Corresponding author: Dept. of
Obstetrics & Gynecology, Nejatollahi
Ave., Karimkhan-e-Zand St., Mirza
Koochak Khan Hospital, Tehran, IRAN
Tel: +98-21-88904172
email: shirin.niroomanesh@yahoo.com