

بررسی پیامدهای قلبی-عروقی ناشی از اختلال تحمل گلوکز: نتایج مطالعه قند و لیپید تهران

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۸/۰۶/۱۶ ۱۳۸۸/۰۹/۲۱ تاریخ پذیرش:

چکیده

زمینه و هدف: علی رغم شیوع اختلالات تحمل گلوکز در ایران، اطلاعاتی در خصوص تاثیر اختلالات مزبور بر بروز وقایع قلبی-عروقی (CVD) در دسترس نیست. مطالعه حاضر برای بررسی نقش گروههای مختلف متاپولیسم غیرطبیعی گلوکز در پیش‌بینی خطر بیماری‌های قلبی عروقی انجام شد. روش بررسی: در ۱۷۵۲ مرد و ۲۲۷۳ زن میانه و بزرگتر که در ابتدای مطالعه فاقد بیماری‌های قلبی عروقی بودند، بروز رخداد قلبی-عروقی در دوره ساله و پی‌گیری با میانه ۷/۶ سال بررسی گردید. **یافته‌ها:** در مجموع ۱۹۷ مورد بیماری‌های قلبی عروقی در مردان و ۱۴۳ مورد در زنان وجود داشت (در کل چگالی بروز ۱۱/۸ در هزار شخص-سال با فاصله اطمینان ۹۵٪/۱۱٪). پس از کنترل عوامل خطر معمول از جمله سن، شاخص‌های آنتروپومتریک، لیپید و فشار خون، سطح تحصیلات، سیگار، درمان دارویی فشار خون و چربی خون، سابقه خانوادگی بیماری قلبی عروقی و دیابت، نسبت خطر (CI) برای بیماری‌های قلبی عروقی در زنان در دو گروه دیابت شناخته شده و دیابت تازه تشخیص داده شده به ترتیب برابر (۲/۴۰-۶/۲۷) و (۳/۸۸-۳/۹۵) ۱/۵۲ و (۲/۳۴-۳/۹۵) ۱/۰۱-۲/۳۱ بود. گلوکز ناشتاوی مختلط یا اختلال تحمل گلوکز، پس از تعديل سن، با ۵۶٪ افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی در زنان همراه بود. **نتیجه‌گیری:** در افراد دیابتی باید همواره پیشگیری اویله را از نظر بیماری‌های قلبی-عروقی در نظر داشت، صرف نظر از آنکه دیابت آنها در جریان غربالگری تشخیص داده شده باشد و یا آنها از قبل تحت درمان دیابت باشند. این امر بهویژه در زنان اهمیت بیشتری دارد.

کلمات کلیدی: دیابت، عدم تحمل گلوکز، بیماری قلبی-عروقی.

داود خلیلی^۱، فرزاد حدائق^{۱*}مریم توحیدی^۱، نوشین فهیم‌فر^۱فاطمه اسکندری^۱، فریدون عزیزی^۱

۱- مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های متاپولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متاپولیسم

۲- گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

* نویسنده مسئول: تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان پعن، خیابان پروانه، پلاک ۲۴، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متاپولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کد پستی ۱۹۳۹۵-۲۷۶۳ تلفن: ۰۲۲۴۲۵۰۰۰ email: fzhadaegh@endocrine.ac.ir

مقدمه

بالای ۲۰ سال دارای اختلال تحمل گلوکز بوده و یک‌سوم کل موارد دیابت، تشخیص داده نشده می‌باشد.^۱ در مطالعات قبلی، ما نشان داده‌ایم که الگوهای خطر قلبی-عروقی افرادی که به تازگی دیابت آنها تشخیص داده شده است Newly diagnosed diabetes mellitus (NDM) مساوی یا بالاتر از افرادی است که مورد شناخته شده دیابت (KDM) در Harriss^۲ در یک مطالعه مروری گزارش کرد که هرچند میزان هیپر گلیسمی در بیماران NDM به اندازه KDM نمی‌باشد، لیکن آنها نیز دارای عوامل خطر قابل توجهی برای بروز عوارض دیابت هستند.^۳ به علاوه ارتباط درجات متوسط عدم تحمل گلوکز، که توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان گلوکز ناشتاوی مختلط (IFG) و Impaired Fasting Glucose (IFG) و احتلال تحمل گلوکز (IGT) Impaired glucose tolerance (IGT) تعریف

خطر روزافزون بیماری قلبی-عروقی (CVD) در دیابت نوع دو به خوبی مشخص گردیده است^۱ و به نظر می‌رسد که این خطر مستقل از سایر عوامل خطر معمول شامل سن، مصرف سیگار، پرفشاری خون و هیپرکلسترولیمی باشد.^{۴-۵} اگرچه بیشتر مطالعات در جوامع غربی، شرق آسیا و استرالیا^{۶-۷} انجام شده است لیکن بسیاری از مبتلایان به دیابت نوع دو از کشورهای در حال توسعه بوده و به نظر می‌رسد که تا سال ۲۰۳۰، خاورمیانه بیشترین افزایش در شیوع دیابت نوع دو را داشته باشد.^۸ اخیراً مطالعه‌ای در ایران، شیوع دیابت نوع دو را در افراد ۲۵-۶۵ ساله ۷/۷٪ نشان داده است.^۹ مطالعه دیگری شیوع دیابت نوع دو در شهر تهران را نشان داد. این مطالعه همچنین نشان داد که یک‌سوم بالغین تهرانی

دوره پی‌گیری به عنوان پیامد، برای جمعیت فوق در نظر گرفته شد. این طرح توسط کمیته اخلاق پژوهشکده علوم غدد درون ریز تأیید و رضایت‌نامه کتبی از تمامی افراد شرکت‌کننده اخذ گردید. اندازه‌گیری‌های بالینی، تن سنجی و آزمایشگاهی: افراد تحت مطالعه توسط یک پرسشنگر آموزش دیده و با استفاده از یک پرسشنامه پیش آزمون شده مورد مصاحبه قرار گرفته و اطلاعات مربوط به سن، جنس، سوابق بیماری، داروهای مصرفی، عادات مربوط به مصرف سیگار و سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی-عروقی و دیابت ثبت شد. اندازه‌گیری‌های تن سنجی شامل وزن، قد و دور کمر (WC) بود.^{۱۲} نمایه توده بدنی (BMI) از طریق تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم به مجبور قدر حسب مترا محاسبه شد. فشار خون در وضعیت نشسته و پس از ۱۵ دقیقه استراحت و با استفاده از فشار سنج جیوه‌ای استاندارد شده، در دو نوبت اندازه‌گیری و میانگین آنها به عنوان فشار خون فرد در نظر گرفته شد. یک نمونه خون وریدی پس از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتاپی گرفته شده و تمامی آزمایشات در آزمایشگاه تحقیقاتی TLGS در همان روز نمونه‌گیری انجام شدند. آزمون استاندارد تحمل گلوکز خوراکی Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) با مصرف ۷۵ گرم گلوکز برای تمامی افرادی که فاقد دیابت شناخته شده بودند انجام گرفت. گلوکز ناشتا 2 Hour Plasma Glucose (FPG)، گلوکز دو ساعته پلاسمای Glucose (FPG)، گلوکز دو ساعته پلاسمای چگالی بالا (HDL-C) بعد از رسوب دادن لیپوپروتئین‌های حاوی آپولیپوپروتئین B به‌وسیله اسید فسفوتگستیک اندازه‌گیری گردید. تمامی آزمایشات با استفاده از کیت‌های تجاری مربوطه (شرکت پارس آزمون، تهران، ایران) و اتوآنالیزر 2 (Vital Scientific, Selectra 2 Spankeren, The Netherlands) انجام شدند. درصد ضرایب تغییرات درون و برون آزمونی در تمامی آزمایشات کمتر از ۲/۲٪ بود.

تعریف پیامدها و متغیرها: جزیيات پیامدهای قلبی-عروقی در گذشته منتشر شده است.^{۱۳} بیماری کرونری قلب Coronary Heart Disease (CHD) شامل موارد ذیل در نظر گرفته شد: انجارکتوس قطعی میوکارد تأیید شده توسط الکتروکاردیوگرام (ECG) و Electrocardiogram (ECG) بیومارکرهای انجارکتوس احتمالی (یافته‌های مثبت ECG به علاوه عالیم و شواهد قلبی علی‌رغم فقدان بیومارکرها یا یافته‌های مثبت ECG در

شده است با CVD به صورت فزاینده‌ای شناخته شده است.^{۱۴} علی‌رغم شیوع بالای دیابت و اختلالات تحمل گلوکز در قفقازی‌های ساکن خاورمیانه، تاکنون اطلاعات در دسترسی در مورد اثر آن بر خطر CVD در این منطقه وجود نداشته است. به‌منظور روشن کردن این موضوع، مطالعه قند و لیپید تهران Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS)، امکان ارزیابی نقش گروه‌های مختلف متابولیسم غیر طبیعی گلوکز را در پیش‌گویی رخدادهای CVD، مستقل از سایر عوامل خطر معمول فراهم نمود.

روش بررسی

جامعه مورد مطالعه: Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) مطالعه‌ای آینده‌نگر و مبتنی بر جمعیت می‌باشد که به‌منظور تعیین عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در جمعیت شهرنشین تهران پایه‌گذاری شده است.^{۱۵} تعداد ۱۵۰۰۵ نفر افراد سه ساله و بالاتر در فاز مقطعی (اسفند ماه ۱۳۷۷ تا شهریور ماه ۱۳۸۰) وارد این مطالعه شدند. تعدادی از شرکت‌کنندگان به عنوان گروه مداخله با هدف ایجاد تغییرات مطلوب در شیوه زندگی تحت آموزش قرار گرفتند و شرکت‌کنندگان جهت تعیین بروز بیماری‌های غیرواگیر پی‌گیری شدند.^{۱۶} در کل ۵۴۰۶ نفر فرد ≥ ۴۰ سال (۲۳۹۸ نفر مرد و ۳۰۰۸ نفر زن) در فاز مقطعی TLGS شرکت داشتند که از این تعداد ۲۰۷۵ نفر (۹۲۹ نفر مرد و ۱۱۴۶ زن) در گروه مداخله قرار گرفتند. برای مطالعه حاضر، پس از حذف ۴۹۴ نفر به‌دلیل سابقه CVD و ۴۲۲ نفر دیگر به‌دلیل نقص اطلاعات، تعداد ۴۴۹۰ نفر وارد مطالعه شدند. از این تعداد ۴۰۲۵ نفر (۸۹/۶٪) شامل ۱۷۵۲ مرد و ۲۲۷۳ زن تا اسفند ۸۶ با میانه ۷/۶ سال (۲۸۸۰۰ شخص-سال) پی‌گیری شدند. دیابت به عنوان عامل اصلی مواجهه در شروع مطالعه و نیز متغیرهای سن، نمایه توده Waist Circumference، دور کمر (BMI)، Body Mass Index (BMI)، دور کمر (WC)، کلسترول تام (TC)، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C)، High Density Lipoprotein- Cholesterol (HDL-C)، Triglycerides (TG)، فشار خون سیستولی و دیاستولی، گلیسیرید (TG)، سطح سواد، مصرف سیگار، درمان پرفساری خون، درمان با داروهای پایین‌آورنده چربی، سابقه خانوادگی CVD زودرس، سابقه فامیلی دیابت و حضور یا عدم حضور در گروه مداخله، به عنوان سایر عوامل مواجهه در شروع مطالعه و موقعیت بیماری‌های قلبی عروقی در طول

طبيعي، از آزمون بقای کاکس استفاده شد.^{۱۶} در اين آزمون ابتلا به CVD در طول مطالعه به عنوان موارد شکست (Failure) و عدم ابتلا به CVD تا انتهای مطالعه، مرگ بهدلیلی غیر از CVD و یا گم شدن در طول مطالعه (lost to follow-up) به عنوان موارد سانسور شده (Censored) در نظر گرفته شدند. زمان تا وقوع (time to event) (برای هر فرد به صورت زمان بین ورود به مطالعه و یکی از موارد: وقوع CVD، پایان پی‌گیری و یا مرگ غیر CVD تعریف گردید. مدل Stepwise برای ورود و خروج متغیرهای محدودش‌کننده احتمالی (p<0.01 برای ورود و p<0.01 برای خروج) در نظر گرفته شد. متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل شامل سن، TC، WC، BMI، TG، Fشار خون سیستولی و دیاستولی، سطح سواد، مصرف سیگار، درمان پرفساری خون، درمان با داروهای پایین آورنده چربی، سابقه خانوادگی CVD زودرس، سابقه فامیلی دیابت و حضور در گروه مداخله بودند. به دلیل چولگی و توزیع غیر طبیعی TG، از لگاریتم طبیعی آن استفاده شد. برای مدل خطرات متناسب کاکس، فرضیه خطرات متناسب Proportional hazard assumption به دو روش گرافیکی و آزمون متغیر وابسته به زمان Time-dependent covariate test ارزیابی شد و در کل این فرضیه برای تمامی متغیرهای مدل کاکس برقرار بود. به دلیل اثر متقابل معنی‌دار بین جنس و دیابت در پیش‌بینی رخدادهای قلبی-عروقی (p=0.006)، تحلیل‌ها برای دو جنس به صورت جداگانه انجام شدند. در تحلیل آماری از SPSS ویراست ۱۵ استفاده گشته و مقدار p≤0.05 معنی‌دار تلقی گردید.

یافته‌ها

جمعیت مورد مطالعه شامل ۱۷۵۲ مرد و ۲۲۷۳ زن با میانگین و انحراف معیار سنی $55 \pm 10/4$ سال در مردان و $52 \pm 9/1$ سال در زنان بود. در مقایسه، بین افرادی که مراحل پی‌گیری را دنبال نمودند با گروهی که صرفاً در فاز مقطعی مطالعه شرکت داشتند، در مردان تفاوت معنی‌داری از نظر سن و عوامل خطر عمده CVD بین دو گروه وجود نداشت اما در زنان شیوه مصرف سیگار و داروهای پایین آورنده چربی خون در گروه دوم بیشتر بوده است (به ترتیب ۱۲/۷٪ در مقابل ۷/۷٪ و ۱۰/۷٪ در مقابل ۶/۹٪، مقادیر p کمتر از 0.05). پس از میانه ۷/۶ سال پی‌گیری ۱۲۲۸۲ شخص- سال در مردان و ۱۶۴۷۷ شخص- سال در زنان) تعداد ۳۴۰ رخداد قلبی- عروقی

حضور بیومارکرهای بینایی و مبهم)، آژین صدری نایابیار (نشانه‌های جدید قلبی یا تغییر در الگوی نشانه‌ها و یافته‌های مثبت ECG در حضور بیومارکرهای طبیعی)، CHD ثابت شده بهوسیله آنژیوگرافی و مرگ ناشی از بیماری کرونری قلب. CVD در کل به هر نوع رخداد ناشی از CHD یا سکته‌های مغزی (اختلال نوروولژیک جدید که به مدت بیشتر از ۲۴ ساعت طول کشیده باشد) یا مرگ ناشی از بیماری‌های عروقی مغز اطلاق می‌شود. شرکت‌کنندگان در صورت گزارش دیابت و دریافت درمان دارویی، به عنوان دیابت شناخته شده (KDM) در نظر گرفته شدند. بنا بر معیارهای تشخیصی انجمن دیابت امریکا (ADA) American Diabetes Association (ADA) افراد فاقد دیابت شناخته شده به این صورت تقسیم‌بندی شده‌اند: تحمل گلوکز طبیعی (NGT) Normal Glucose Tolerance با FPG کمتر از ۱۴۰mg/dl و 2hPG کمتر از ۱۰۰mg/dl، دیابت تازه تشخیص داده شده با FPG≥۱۲۶mg/dl و یا 2hPG≥۲۰۰mg/dl، IFG منفرد با ۱۰۰≤FPG<۱۲۶mg/dl و ۱۰۰≤2hPG<۱۲۶mg/dl و IGT منفرد با FPG<۱۰۰mg/dl و 2hPG<۲۰۰mg/dl^{۱۵}. به دلیل تعداد کم رخدادهای قلبی- عروقی در گروه‌های IFG و IGT، افراد این دو گروه، با هم در یک دسته و به عنوان گروه IFG/IGT در نظر گرفته شدند. وجود دیابت در والدین و خواهر و برادر افراد به عنوان سابقه فامیلی دیابت وجود CVD در وابستگان درجه یک مونث زیر ۶۵ سال و مذکر زیر ۵۵ سال به عنوان سابقه فامیلی CVD زودرس تعریف شدند. سابقه مصرف سیگار به دو دسته تقسیم‌بندی شد: مصرف هر نوع تباکو به صورت روزانه یا گاه‌گاهی در گذشته یا حال در مقابل عدم مصرف سیگار. سطح سواد به دو دسته کمتر از دبیرستان و مساوی و بالاتر از آن تقسیم شد.

تحلیل آماری داده‌ها: میانگین (\pm خطای استاندارد) یا فراوانی مشخصات پایه در هر دو جنس و برای تمامی گروه‌های متابولیسم گلوکز، با استفاده از آزمون‌های ANCOVA یا رگرسیون لجستیک بر اساس سن تعديل گردید. برای بررسی تفاوت بین این گروه‌ها، برای داده‌های پیوسته از آزمون ANCOVA و برای متغیرهای طبقه‌بندی شده از آزمون χ^2 استفاده شد. به منظور شناخت بهتر اختلاف بین دو گروه NDM و KDM، این دو گروه به صورت جداگانه مورد تحلیل بیشتر قرار گرفتند. به منظور اندازه‌گیری نسبت خطر (HR) Hazard ratio تعديل شده CVD برای گروه‌های اختلال گلوکز، در مقایسه با گروه

آورنده چربی خون و سابقه فامیلی دیابت به طور معنی‌داری در گروه KDM بالاتر از NDM بود اما میانگین WC، BMI و TG در گروه دوم بالاتر بود ($p < 0.05$). نمودار ۱ خطر تجمعی CVD را برای گروه‌های اختلال گلوکز پس از تعدیل سازی برای سن نشان می‌دهد. در مردان، گروه‌های NGT و IFG/IGT خطر تجمعی یکسان و گروه‌های KDM و NDM خطر تجمعی نسبتاً یکسان داشتند. در زنان با پیشرفت از گروه NGT به گروه IFG/IGT و سپس گروه NDM و در نهایت KDM، افزایش تدریجی در میزان بروز CVD مشاهده شد. میزان خطر برای گروه‌های اختلال گلوکز در مقایسه با گروه طبیعی در جدول ۳ نشان داده شده است. پس از تعدیل سازی برای سن، گروه IFG/IGT نشان داده شده است. فقط در زنان با ۵۶٪ افزایش خطر CVD همراه بود ($p = 0.056$) با فاصله اطمینان ۴۵–۲۴٪. اما پس از تحلیل چند متغیره و با در نظر گرفتن عوامل خطر معمول، IFG/IGT در هیچ‌یک از دو جنس HR معنی‌داری نداشت. نسبت خطر پس از تحلیل چند متغیره برای KDM و NDM به ترتیب در مردان (۰.۹۵/۰.۷۲) و (۰.۳۱/۰.۲۱) و (۰.۵۲/۰.۱۵) بود.

یافت شد (چگالی بروز ۱۱/۸ در هزار شخص - سال با فاصله اطمینان ۹۵٪/۱۳-۱۰/۶). از این تعداد ۱۹۷ مورد در مردان و ۱۴۳ مورد در زنان بود (چگالی بروز ۱۶ در هزار شخص - سال با فاصله اطمینان ۹۵٪/۱۸-۱۲/۹ در مردان و ۸/۷ در هزار شخص - سال با فاصله اطمینان ۹۵٪/۱۰-۷/۴ در زنان). مشخصات پایه مردان و زنان بر اساس توزیع گروه‌های متابولیسم گلوکز به ترتیب در جدول ۱ و ۲ نشان داده شده است. در بین گروه‌ها، تفاوت معنی‌داری در تمامی متغیرها مشاهده شد (به جز ساقه فامیلی CVD در مردان و مصرف سیگار در زنان). گروه‌های اختلال گلوکز (IFG/IGT و NDM) در مقایسه با NGT، دارای الگوی عوامل خطر بدتری بودند. در مردان، میانگین سطح FPG، شیوع درمان با داروهای پایین آورنده چربی خون و سابقه فامیلی دیابت، به طور معنی‌داری در گروه KDM بالاتر از NDM بود. اما میانگین سطوح TC و شیوع مصرف سیگار در NDM بالاتر بوده است (تمامی مقادیر p کمتر از ۰.۰۵). در زنان میانگین FPG، شیوع درمان پرفسنالی خون، درمان با داروهای پایین

جدول-۱: مشخصات پایه مردان بر اساس توزیع گروه‌های متابولیسم گلوکز

متغیرها*	تعداد					
	p ‡	p †	KDM	NDM	IFG/IGT	NGT
سن (سال)			۹۳	۱۶۸	۴۷۸	۱۰۱۳
نمایه توده بدن (Kg/m²)	۰/۰۷۷	<۰/۰۰۱	۶۰/۹±۰/۲	۵۸/۶±۰/۸	۵۵/۹±۰/۵	۵۳/۵±۰/۳
دور کمر (Cm)	۰/۰۸۱	<۰/۰۰۱	۲۷/۲±۰/۴	۲۸/۱±۰/۳	۲۷/۱±۰/۲	۲۵/۵±۰/۱
قند ناشاتی پلاسمای (mg/dl)	۰/۱۶۸	<۰/۰۰۱	۹۴/۴±۱/۱	۹۶/۵±۰/۸	۹۳/۶±۰/۵	۸۹/۹±۰/۳
قند دو ساعه پلاسمای (mg/dl)	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱	۱۷۷/۴±۲/۲	۱۴۰/۲±۱/۶	۱۰۱/۶±۱	۸۸/۲±۰/۷
کلسترول (mg/dl)	۰/۰۰۹	<۰/۰۰۱	۲۱۳/۵±۴/۴	۲۳۰/۱±۳/۳	۲۱۶/۹±۱/۹	۲۰۸/۷±۱/۳
کلسترول-HDL (mg/dl)	۰/۱۱۸	<۰/۰۰۱	۳۵/۶±۱	۳۷/۷±۰/۸	۳۸/۶±۰/۴	۳۹/۲±۰/۳
لگاریتم تری گلیسرید (mg/dl)	۰/۰۶۱	<۰/۰۰۱	۵/۳۲±۰/۰۶	۵/۴۷±۰/۰۴	۵/۱۸±۰/۰۲	۵±۰/۰۲
فشارخون سیستولی (mmHg)	۰/۱۸۹	<۰/۰۰۱	۱۳۰/۷±۲/۰	۱۳۵±۱/۵	۱۲۸/۶±۰/۹	۱۲۲/۹±۰/۶
فشارخون دیاستولی (mmHg)	۰/۳۱۴	<۰/۰۰۱	۸۰/۹±۱/۲	۸۳±۰/۹	۸۱/۵±۰/۵	۷۸/۴±۰/۴
سطح سواد (پیشتر و مساوی دیپرسن)	۰/۰۲۴۰	۰/۰۰۱	۴۳	۵۰/۶	۵۱	۵۹/۱
صرف سیگار (گذشته یا حال) (%)	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۳۶/۶	۵۱/۸	۴۲/۶	۴۸/۳
درمان پر فشاری خون (%)	۱/۴۶۰	<۰/۰۰۱	۱۵/۳	۱۲	۸/۵	۴/۳
درمان پایین آورنده چربی خون (%)	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱	۱۶/۳	۲/۴	۲/۱	۱/۷
سابقه فامیلی دیابت (%)	۰/۰۰۹	<۰/۰۰۱	۵۳/۴	۳۶/۲	۲۲	۱۹
سابقه فامیلی بیماری قلبی-عروقی (%)	۰/۵۸۳	۰/۳۹۳	۹/۷	۱۱/۹	۱۲/۱	۱۴/۴

Normal Glucose Tolerance (NGT): تحمل گلوکز طبیعی، Impaired Fasting Glucose/Impaired Glucose Tolerance (IFG/IGT): تحمل گلوکز ناشاتی مختلف یا اختلال تحمل گلوکز، Known diagnosed diabetes mellitus (KDM): دیابت تازه شناخته شده، Newly diagnosed diabetes mellitus (NDM): دیابت پایین آورنده چربی خون: دیابت شناخته شده.

* تمامی داده‌ها برای سن تعديل شدند (با استفاده از آزمون ANCOVA برای متغیرهای پیوسته و تحلیل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای دو حالتی). داده‌ها بر اساس میانگین \pm خطای استاندارد یا درصد نشان داده شدند. \ddagger بین تمامی گروه‌ها بر اساس آزمون ANCOVA یا $p \leq 0.05$ بین NDM و KDM بر اساس آزمون ANCOVA یا $p \leq 0.05$ معنی‌دار تلقی گردید.

جدول-۲: مشخصات پایه زنان بر اساس توزیع گروههای متابولیسم گلوکز

*متغیرها	تعادل	KDM	NDM	IFG/IGT	NGT	p †	p ‡
سن (سال)	۱۹۲	۲۳۴	۶۲۵	۱۲۲۲		<۰/۰۰۱	۰/۰۰۱
نمایه توده بدن (Kg/m ²)		۵۷/۶±۰/۷	۵۴/۶±۰/۶	۵۳/۶±۰/۴	۵۱/۴±۰/۳		<۰/۰۰۴
دور کمر (Cm)		۲۹/۲±۰/۳	۳۰/۷±۰/۳	۳۰±۰/۲	۲۸/۵±۰/۱		<۰/۰۱۱
قند ناشای پلاسمای (mg/dl)		۹۵/۹±۰/۸	۹۸/۷±۰/۷	۹۵/۳±۰/۴	۹۱/۱±۰/۳		<۰/۰۰۱
قند دو ساعته پلاسمای (mg/dl)		۱۹۹/۲±۱/۹	۱۳۵/۷±۱/۷	۱۰۰/۱±۱	۸۷/۴±۰/۸		<۰/۰۰۱
کلسترول (mg/dl)			۲۷۰±۲/۴	۱۴۳/۵±۱/۵	۱۰۵/۹±۱		<۰/۰۰۱
-HDL- کلسترول (mg/dl)		۲۳۸/۲±۲/۳	۲۳۸/۸±۲	۲۳۷/۴±۱/۸	۲۲۸±۱/۳		<۰/۰۶۲
لکاریتم تری گلیسرید (mg/dl)		۴۳/۷±۰/۸	۴۳/۳±۰/۷	۴۴/۳±۰/۴	۴۵/۶±۰/۳		<۰/۰۱۷
فشارخون سیستولی (mmHg)		۵/۲۷±۰/۰۴	۵/۳۹±۰/۰۳	۵/۱۸±۰/۰۲	۵/۰۲±۰/۰۱		<۰/۰۴۶
فشارخون دیاستولی (mmHg)		۱۳۴/۵±۱/۴	۱۳۵/۸±۱/۲	۱۳۰/۶±۰/۸	۱۲۳/۵±۰/۵		<۰/۰۴۶
سطح سواد (بیشتر و مساوی دیبرستان)		۸۲/۷±۰/۸	۸۴/۵±۰/۷	۸۳/۲±۰/۴	۷۹/۵±۰/۳		<۰/۰۱۶
صرف سیگار (گذشته با حال) (%)		۱۷/۷	۲۴/۸	۲۸/۳	۳۷/۹		<۰/۰۷۷
درمان پر فشاری خون (%)		۱۰/۴	۶	۵/۹	۷/۵		<۰/۰۶۹
درمان پایین آورنده چربی خون (%)		۳۴/۴	۲۴/۱	۱۸/۷	۹/۹		<۰/۰۱۹
سابقه فامیلی دیابت (%)		۲۴/۱	۵/۶	۷/۵	۴/۱		<۰/۰۰۱
سابقه فامیلی بیماری قلبی-عروقی (%)		۶۰	۴۷/۲	۳۹/۹	۲۵/۳		<۰/۰۱۰
سابقه فامیلی بیماری قلبی-عروقی (%)		۲۲/۹	۲۳/۵	۱۹/۸	۱۶/۵		<۰/۰۸۶

Normal Glucose Tolerance (NGT): تحمل گلوکز طبیعی، Impaired Fasting Glucose/Impaired Glucose Tolerance (IFG/IGT): گلوکز ناشای مختلط یا اختلال تحمل گلوکز، Known Diagnosed Diabetes Mellitus (NDM): دیابت تازه شناخته شده، Newly Diagnosed Diabetes Mellitus (KDM): دیابت شناخته شده.

* تمامی داده‌ها برای سن تعديل شدند (با استفاده از آزمون ANCOVA برای متغیرهای پیوسته و تحلیل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای دو حالتی). داده‌ها بر اساس میانگین ± خطای استاندارد یا درصد نشان داده شدند. [†] بین تمامی متغیرها بر اساس آزمون ANCOVA یا χ^2 بین NDM و KDM بر اساس آزمون ANCOVA یا χ^2 معنی دار تلقی گردید.


جدول-۳: نسبت‌های خطر (HRs) با فاصله اطمینان ۹۵٪ برای بیماری‌های قلبی-عروقی در گروههای اختلال گلوکز، بر اساس مدل خطرات متناسب کاکس در مردان و زنان

مردان	بیماری قلبی-عروقی (تعداد/درصد)	HR با تدبیل شده بر اساس سن	P*	HR تدبیل شده بر اساس سن	P*	مردان
NGT				گروه مرجع	گروه مرجع	NGT
IFG/IGT				۰/۹۵(۰/۵۲-۱/۱۲)	۰/۹۵۲	۰/۹۹(۰/۶۹-۱/۴۱)
NDM				۱/۰۲(۱/۰۱-۲/۳۱)	<۰/۰۰۱	۲/۴۳(۱/۶۷-۳/۵۳)
KDM				۱/۷۲(۱/۰۰-۲/۹۵)	۰/۰۰۲	۲/۱۷(۱/۳۲-۳/۵۷)
زنان				گروه مرجع	گروه مرجع	NGT
IFG/IGT				۱/۲۹(۰/۸۱-۲/۰۷)	۰/۰۵۲	۱/۵۶(۱/۰۰-۲/۴۵)
NDM				۲/۳۴(۱/۳۹-۳/۹۵)	<۰/۰۰۱	۳/۱۱(۱/۹۱-۵/۰۷)
KDM				۲/۸۸(۲/۴۰-۶/۲۷)	<۰/۰۰۱	۴/۹۵(۳/۱۵-۷/۷۸)

Normal Glucose Tolerance (NGT): تحمل گلوکز طبیعی، Impaired Fasting Glucose/Impaired Glucose Tolerance (IFG/IGT): گلوکز ناشای مختلط یا اختلال تحمل گلوکز، Known Diagnosed Diabetes Mellitus (NDM): دیابت تازه شناخته شده، Newly Diagnosed Diabetes Mellitus (KDM): دیابت شناخته شده.

* HR تعديل شده در مردان برای سن، فشارخون سیستولی و دیاستولی، کلسترول تام، HDL کلسترول، مصرف سیگار و درمان پر فشاری خون. نمایه توده بدن، دور کمر، تری گلیسرید، میزان سواد، درمان پایین آورنده چربی خون، سابقه دیابت در خانواده و شرکت در گروه مداخله بهدلیل $p < 0.10$ در مدل باقی نماندند. HR تعديل شده در زنان برای سن، فشارخون سیستولی، کلسترول تام، درمان پر فشاری خون و سابقه فامیلی بیماری قلبی-عروقی. نمایه توده بدن، دور کمر، تری گلیسرید، مصرف سیگار، میزان سواد، درمان پایین آورنده چربی خون، سابقه دیابت در خانواده و شرکت در گروه مداخله بهدلیل $p < 0.10$ در مدل باقی نماندند. HR بر اساس مدل رگرسیونی کاکس و $p \leq 0.05$ معنی دار تلقی گردید.

شناخته شده در هر دو جنس، عوامل خطر پرقدرتی برای رخدادهای CVD هستند و این نقش مستقل از سایر عوامل خطر معمول می‌باشد. در مردان، KDM و NDM دارای خطر نسبتاً همانندی برای CVD بودند (۱/۷۲ در مقابل ۱/۵۲)، در حالی که در زنان HR برای بروز CVD در بالاتر از NDM (۳/۸۸ در مقابل ۲/۳۴) بود. نکته قابل توجه این است که بهدلیل تفاوت در روش مطالعه از جمله توزیع سنی، مدت پی‌گیری و تعاریف جمعیت‌های مورد مطالعه، مقایسه مستقیم یافته‌های ما با سایر مطالعات آینده‌نگر مرتبط، ممکن نمی‌باشد. افراد مبتلا به دیابت تحت درمان طبی ممکن است دارای مدت طولانی‌تر بیماری، اختلال متابولیک شدیدتر و شیوع بیشتر عوارض میکروواسکولار در مقایسه با موارد NDM باشند که خود می‌تواند علت خطر بالاتر CVD در گروه KDM در بیشتر مطالعات باشد.^{۱۷, ۱۸} به علاوه اخیراً مطالعه‌ای در دانمارک، نسبت خطر را برای CVD در بیماران KDM و درمان شده با داروهای پایین آورنده قند خون، بهتر تیپ ۱/۷۶ و ۱/۸۷ در مردان و زنان نشان داد (بدون تعديل برای عوامل خطر). این میزان خطر برابر یا کمتر از HR‌های به دست آمده برای موارد NDM در مطالعه ما می‌باشد.^{۱۹} نتایج حاضر همچنین یافته‌های مطالعه DECODE و سایر مطالعات بلندمدت را که خطر قابل توجهی را برای CVD در افراد NDM گزارش کرده‌اند، تأیید می‌نماید.^{۲۰} موارد دیابت تشخیص داده شده در جریان غربالگری می‌تواند نشان‌دهنده مدت طولانی‌تر مواجهه با عوامل خطر CVD باشد در حالی که این عوامل خطر در این مطالعات تنها در یک مقطع زمانی اندازه‌گیری شده‌اند.^{۲۱} با منظور نمودن هر دو گروه KDM و NDM در تحلیل، یافته‌های حاضر پیشنهاد می‌نماید که دیابت می‌تواند مستقل از سایر عوامل خطر، اثر بیشتری بر رخداد CVD در زنان داشته باشد (HR: ۳/۰۴ در مقابل ۱/۵۸). همچنین با در نظر گرفتن تمام گروه‌های اختلال گلوکز با یکدیگر، HR برای رخداد CVD تنها در زنان معنی دار بود. بنابراین تفاوت دو جنس در خطر وابسته به اختلال گلوکز برای بروز CVD توجیه نشده باقی ماند. این مسئله پیشنهاد می‌کند که شاید عوامل اضافه‌تری در توجیه فراوانی CVD در زنان دیابتی مطرح باشد. یافته‌های ما توسط یک متا-آنالیز بزرگ که بر روی ۳۷ مطالعه هم گروهی آینده‌نگر انجام شده و بیانگر همراهی دیابت با خطر بیشتر CVD در زنان بود، حمایت می‌گردد.^{۲۰} در تحلیل تعديل شده برای سن، خطر رخداد CVD در جمعیت زنان NDM و



نمودار ۱: خطر تجمعی بیماری قلبی عروقی، تعديل شده بر اساس سن، در گروه‌های اختلال گلوکز
Impaired Fasting Glucose Tolerance (NGT) گلوکز ناشای مختلط یا اختلال تحمل Glucose/Impaired Glucose Tolerance (IFG/IGT)
Known Diabetes mellitus (KDM) گلوکز، دیابت تازه شناخته شده،
Diagnosed diabetes mellitus (NDM) دیابت شناخته شده
Diagnosed diabetes mellitus (KDM) دیابت شناخته شده
نحوه‌های اختلال گلوکز

در زنان (۲/۴۰-۶/۲۷ و ۳/۸۸-۳/۹۵) در نظر گرفتن توأم دو گروه KDM و NDM در یک گروه، به عنوان کل موارد دیابت، در تحلیل چندمتغیره، HR معادل (۱/۰۹-۲/۲۹) در مردان و (۱/۹۸-۴/۶۷) در زنان به دست آمد. همچنین با در نظر گرفتن تمامی گروه‌های اختلال گلوکز در یک گروه واحد، HR معنی داری در مردان مشاهده نشد ([۱/۰۲-۰/۷۵-۱/۴۰] ولی در زنان این HR معنی دار بود [۱/۸۰-۲/۶۷] [۱/۲۰-۲/۶۷] (داده‌ها نشان داده نشده است).

بحث

مطالعه حاضر که در قالب یک مطالعه هم گروهی بزرگ در نژاد فرقانی در خاورمیانه طراحی و بر روی افرادی انجام شده است که در آغاز مطالعه فاقد CVD بودند، نشان داد که دیابت ناشناخته و

در افرادی که دارای فشار خون و الگوی لیپیدی طبیعی و خطر متوسط قلبی- عروقی هستند، روش نمی باشد.^{۳۴} این مطالعه دارای محدودیتهایی بود. نخست، ما گروههای هوموستاز گلوكز را براساس نتایج یک نوبت OGTT پایه تعریف کردیم که می تواند افراد را به صورت نادرستی گروهبندی نماید. دوم اینکه ما اطلاعاتی دال بر نوع و مدت دیابت نداشتمیم، هرچند که با در نظر گرفتن افراد ≥ 40 سال، با احتمال بیشتری افراد مبتلا به دیابت نوع دو را نسبت به نوع یک وارد مطالعه نمودیم. در نهایت اینکه، مدت تقریباً کوتاه پی گیری و تعداد نسبتاً کم رخدادها، قدرت آماری مطالعه ما را برای انجام تحلیل های بیشتر محدود نمود. مطالعه ما همچنین دارای نقاط قوتی تحلیل های بیشتر محدود نمود. مطالعه ما همچنین دارای نقاط قوتی نیز بود که شامل حجم نمونه بزرگ و نماینده شهر تهران و استفاده از گلوكز ناشتا و دو ساعته برای تعیین گروهبندی های تحمل گلوكز و افتراق بهتر رخدادهای CVD در گروههای مختلف بود. به علاوه با در نظر داشتن اهمیت جنس در همراهی دیابت با بروز CVD، اطلاعات ما به صورت جداگانه در دو جنس تحلیل گردید. به طور خلاصه، این مطالعه هم گروهی بزرگ مبتنی بر جمعیت، نشان داد که در افراد ≥ 40 ساله و بالاتر مبتلا به دیابت، صرف نظر از عوامل خطر معمول، باید پیشگیری اولیه پرقدرتی را از نظر CVD همواره در نظر داشت، چه آنها به تازگی در جریان غربالگری تشخیص داده شده باشند و چه از قبل تحت درمان دیابت باشند. این موضوع به ویژه در زنان با هر نوع اختلال متابولیسم گلوكز، اهمیت بیشتری دارد. سپسگزاری: نویسندها تشكر خود را از پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم بهجهت حمایت مالی این طرح (طرح شماره ۱۲۱) و همچنین شرکت کنندگان ساکن منطقه ۱۳ تهران و کمیته پی آمدها ابراز می دارند.

KDM ما، حدود $1/3$ و $2/3$ برابر مقادیر متناظر در مردان بود و این نسبت در تحلیل چند متغیره تغییری نکرد. نتایج مطالعه حاضر هم سو با متأ- آنالیز Kanaya نمی باشد؛ آنها نتیجه گیری کردند که پس از تعديل سازی برای عوامل خطر معمول، فزوئی خطر نسبی برای رخداد CVD در زنان مبتلا به دیابت، از بین رفت.^{۳۱} با این وجود در تحلیل اطلاعات مطالعه حاضر، سطح کنترل گلیسمیک، مدت ابتلا به دیابت، عوامل التهابی و لیپوپروتین های کوچک متراکم Small dense lipoproteins، عواملی که ممکن است در خطر بیشتر دیابت در زنان شرکت کنند، در نظر گرفته نشده است.^{۳۲} ما در تحلیل تعديل شده برای سن، خطر معنی داری (HR $\approx 1/5$) را برای گروه IFG یا IGT در زنان یافتیم که پس از در نظر گرفتن سایر عوامل خطر CVD از بین رفت. ناتوانی ما در نشان دادن خطر معنی دار برای رخدادهای CVD احتمالاً مربوط به تعداد نسبتاً کم رخدادها و میانگین سنی تقریباً ۳۳ جوان جمعیت می باشد، همان طور که در مطالعه Black در هر دو اگرچه در مطالعه ما، NDM به صورت معنی داری با CVD در هر دو جنس همراهی داشت، لیکن شواهد مستقیمی دال بر تغییر وضعیت سلامت افراد در نتیجه غربالگری موارد بدون علامت مبتلا به دیابت NDM وجود ندارد.^{۳۴} با این وجود، در این مطالعه، در مردان گروه KDM مقادیر بالاتر کلسترول و استعمال بیشتر سیگار نسبت به گروه مشاهده شد و زنان گروه NDM نیز چاق تر بوده و مقادیر بالاتری از تری گلیسرید داشتند (جدول ۱ و ۲)، لذا بسیاری از افراد گروه اول دارای عوامل خطر اضافه تری برای CVD بودند و آنان که بیشترین الگوی خطر قلبی- عروقی را دارند، بیشترین سود را از درمان می برنند.^{۳۴} با این وجود، فایده غربالگری و درمان دیابت بدون علامت

References

1. Lowe LP, Liu K, Greenland P, Metzger BE, Dyer AR, Stamler J. Diabetes, asymptomatic hyperglycemia, and 22-year mortality in black and white men. The Chicago Heart Association Detection Project in Industry Study. *Diabetes Care* 1997;20(2):163-9.
2. Saydah SH, Loria CM, Eberhardt MS, Brancati FL. Subclinical states of glucose intolerance and risk of death in the U.S. *Diabetes Care* 2001;24(3):447-53.
3. DECODE Study Group, the European Diabetes Epidemiology Group. Glucose tolerance and cardiovascular mortality: comparison of fasting and 2-hour diagnostic criteria. *Arch Intern Med* 2001;161(3):397-405.
4. Ma S, Cutter J, Tan CE, Chew SK, Tai ES. Associations of diabetes mellitus and ethnicity with mortality in a multiethnic Asian population: data from the 1992 Singapore National Health Survey. *Am J Epidemiol* 2003;158(6):543-52.
5. Barr EL, Zimmet PZ, Welborn TA, Jolley D, Magliano DJ, Dunstan DW, et al. Risk of cardiovascular and all-cause mortality in individuals with diabetes mellitus, impaired fasting glucose, and impaired glucose tolerance: the Australian Diabetes, Obesity, and Lifestyle Study (AusDiab). *Circulation* 2007;116(2):151-7.
6. Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. *Diabetes Care* 2004;27(5):1047-53.
7. Hossain P, Kawar B, El Nahas M. Obesity and diabetes in the developing world: a growing challenge. *N Engl J Med* 2007;356(3):213-5.
8. Esteghamati A, Gouya MM, Abbasi M, Delavari A, Alikhani S, Alaeddini F, et al. Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in the adult population of Iran: National Survey of Risk Factors for Non-Communicable Diseases of Iran. *Diabetes Care* 2008;31(1):96-8.

9. Hadaegh F, Bozorgmanesh MR, Ghasemi A, Harati H, Saadat N, Azizi F. High prevalence of undiagnosed diabetes and abnormal glucose tolerance in the Iranian urban population: Tehran Lipid and Glucose Study. *BMC Public Health* 2008;8:176.
10. Harris MI, Eastman RC. Early detection of undiagnosed diabetes mellitus: a US perspective. *Diabetes Metab Res Rev* 2000;16(4):230-6.
11. Unwin N, Shaw J, Zimmet P, Alberti KG. Impaired glucose tolerance and impaired fasting glycaemia: the current status on definition and intervention. *Diabet Med* 2002;19(9):708-23.
12. Azizi F, Rahmani M, Emami H, Mirmiran P, Hajipour R, Madjid M, et al. Cardiovascular risk factors in an Iranian urban population: Tehran lipid and glucose study (phase 1). *Soz Praventivmed* 2002;47(6):408-26.
13. Azizi F, Ghanbarian A, Momenan AA, Hadaegh F, Mirmiran P, Hedayati M, et al. Prevention of non-communicable disease in a population in nutrition transition: Tehran Lipid and Glucose Study phase II. *Trials* 2009;10:5.
14. Hadaegh F, Harati H, Ghanbarian A, Azizi F. Association of total cholesterol versus other serum lipid parameters with the short-term prediction of cardiovascular outcomes: Tehran Lipid and Glucose Study. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil* 2006;13(4):571-7.
15. Genuth S, Alberti KG, Bennett P, Buse J, Defronzo R, Kahn R, et al. Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus. *Diabetes Care* 2003;26(11):3160-7.
16. Kleinbaum DG, Klein M. Kleinbaum/Klein: Survival Analysis: A Self-Learning Text. 2nd ed. New York: Springer; 2005.
17. Schramm TK, Gislason GH, Køber L, Rasmussen S, Rasmussen JN, Abildstrøm SZ, Hansen ML, et al. Diabetes patients requiring glucose-lowering therapy and nondiabetics with a prior myocardial infarction carry the same cardiovascular risk: a population study of 3.3 million people. *Circulation* 2008;117(15):1945-54.
18. Vaccaro O, Eberly LE, Neaton JD, Yang L, Riccardi G, Stamler J; Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group. Impact of diabetes and previous myocardial infarction on long-term survival: 25-year mortality follow-up of primary screenees of the Multiple Risk Factor Intervention Trial. *Arch Intern Med* 2004;164(13):1438-43.
19. Rodriguez BL, Lau N, Burchfiel CM, Abbott RD, Sharp DS, Yano K, et al. Glucose intolerance and 23-year risk of coronary heart disease and total mortality: the Honolulu Heart Program. *Diabetes Care* 1999;22(8):1262-5.
20. Huxley R, Barzi F, Woodward M. Excess risk of fatal coronary heart disease associated with diabetes in men and women: meta-analysis of 37 prospective cohort studies. *BMJ* 2006;332(7533):73-8.
21. Kanaya AM, Grady D, Barrett-Connor E. Explaining the sex difference in coronary heart disease mortality among patients with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. *Arch Intern Med* 2002;162(15):1737-45.
22. Juutilainen A, Kortelainen S, Lehto S, Rönnemaa T, Pyörälä K, Laakso M. Gender difference in the impact of type 2 diabetes on coronary heart disease risk. *Diabetes Care* 2004;27(12):2898-904.
23. Blake DR, Meigs JB, Muller DC, Najjar SS, Andres R, Nathan DM. Impaired glucose tolerance, but not impaired fasting glucose, is associated with increased levels of coronary heart disease risk factors: results from the Baltimore Longitudinal Study on Aging. *Diabetes* 2004;53(8):2095-100.
24. Norris SL, Kansagara D, Bougatsos C, Fu R; U.S. Preventive Services Task Force. Screening adults for type 2 diabetes: a review of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. *Ann Intern Med* 2008;148(11):855-68.

Glucose intolerance as a risk factor for cardiovascular outcomes: Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS)

Khalili D.^{1,2}
Hadaegh F.^{1*}
Tohidi M.¹
Fahimfar N.¹
Eskandari F.¹
Azizi F.¹

1- Prevention of Metabolic Disorders Research Center,
Research Institute for Endocrine Sciences

2- Department of Epidemiology,
School of Public Health

Shahid Beheshti University of
Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

Received: September 07, 2009 Accepted: December 12, 2009

Background: Diabetes and dysglycemia have a high prevalence in Iranian population but the information about their impact on the cardiovascular disease (CVD) risk is scarce in this population. This study aimed to determine the risk of CVD according to glucose tolerance status.

Methods: We ascertained cases with incident CVD in a population of 1752 men and 2273 women, 40 years old and over and free of CVD at the beginning of study, during a follow up with a median of 7.6 years. To calculate hazard ratio (HR) for CVD, we controlled traditional risk factors, including age, body mass index, waist, total cholesterol, HDL-cholesterol, triglycerides, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, education, smoking, hypertension medication, lipid lowering medication and family history of premature CVD and diabetes.

Results: Cardiovascular events occurred in 197 men and 143 women. Its incidence density was 11.8 per 1000 person-years (95% confidence interval: 10.6 to 13.1) totally. Multiple adjusted HR in women with known diabetes was 3.88 (95%CI: 2.40 to 6.27) and with newly diagnosed was 2.34 (95%CI: 1.39 to 3.95) and the corresponding values for men were 1.72 (95%CI: 1.00- 2.95) and 1.52 (95%CI: 1.01- 2.31) respectively. Impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance increased 56% the risk of CVD in women (HR: 1.56 with 95% CI, 1.00 to 2.45), just in the age adjusted model.

Conclusion: All diabetic patients should receive primary prevention for CVD intensively, regardless of whether they are newly diagnosed or are known cases; specially, females who have abnormal glucose metabolism.

Keywords: Diabetes mellitus, glucose intolerance, cardiovascular diseases.

* Corresponding author: Prevention of Metabolic Disorders Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Yaman St., Velenjak, Tehran, Iran. P.O. Box: 19395-4763
Tel: +98-21-22432500
email: fz.hadaegh@endocrine.ac.ir