

تأثیر امواج نشستی اجاق مایکروویو بر وزن بدن، هورمون‌های تیروپید، کورتیزول و لیپیدهای سرم در موش سوری نابالغ

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۸/۱۰/۰۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۰۲/۱۵

چکیده

زمینه و هدف: نشت امواج که از اجاق‌های مایکروفر صورت می‌گیرد ممکن است برای کاربران مخاطره‌آمیز باشد. گسترش اختلالات هورمونی امکان ارتباط این اختلالات را با افزایش حضور میادین مغناطیسی در زندگی مطرّح نمود. کودکان به‌دلیل کنجکاوی و یا حضور در کنار مادران در معرض امواج نشستی از اجاق مایکروفر قرار می‌گیرند. لذا هدف این تحقیق بررسی تأثیر امواج نشستی از اجاق مایکروفر بر غلظت T3، T4، کورتیزول، لیپیدهای سرم و وزن بدن در یک الگوی حیوانی می‌باشد. روش بررسی: میزان نشت امواج از یک دستگاه مایکروفر خانگی با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری RF تعیین شد. ۲۰ سر موش نابالغ (سن 7 ± 3 روز و وزن 5 ± 1 گرم) به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند، گروه آزمایش روزانه سه نوبت و هر بار سی دقیقه به‌مدت دو ماه در مجاورت دستگاه مایکروفر قرار گرفت. در پایان، همه موش‌ها مجدداً وزن شدند، میزان T4 و کورتیزول در سرم با استفاده از روش رادیوایمیونواسی (RIA) و میزان لیپیدهای سرم با استفاده از کیت تعیین گردید. یافته‌ها: میانگین وزن گروه آزمایش در پایان دوره $5/29\%$ کمتر از گروه کنترل بود ($p < 0.05$). میانگین غلظت هورمون‌های T3، T4 و کورتیزول به‌طور معنی‌داری ($p < 0.05$) در گروه آزمایش افزایش یافت. این مقادیر برای T4 در مقابل $77/80 \pm 7/67$ nmol/L، برای T3 $9/94 \pm 1/78$ ng/ml در مقابله $9/44 \pm 1/77$ ng/ml می‌باشد. در گروه آزمایش میزان تری گلیسرید افزایش و HDL کاهش یافت ($p < 0.05$). نتیجه‌گیری: امواج مایکروویو نشت یافته از اجاق‌های مایکروفر سبب کاهش رشد، افزایش میزان هورمون‌های T3، T4 و کورتیزول، تری گلیسرید و کاهش HDL گردید.

کلمات کلیدی: امواج مایکروویو، هورمون، تیروپید، کورتیزول، لیپیدهای پلاسمای.

* غلامعلی جلودار^۱
** محمد بیضائی^۲

۱- گروه فیزیولوژی
۲- دامپزشک

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

* نویسنده مسئول: شیراز، گروه فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
تلفن: ۰۱۳۸۷۵۷
email: jelodar@shirazu.ac.ir

مقدمه

نشان می‌دهند که امواج مایکروویو بسته به شدت فرکانس، نوع موج و طول مدت موجه شدن اثرات مختلف بیولوژیکی ایجاد می‌کنند.^{۱-۲} بسیاری از این اثرات عمده‌تاً به اثرات گرمایی مایکروویو نسبت داده می‌شود،^۳ ولی گزارشات اخیر نشان‌دهنده اثرات غیر گرمایشی این امواج و ارتباط آن با تغییرات مختلف مولکولی می‌باشد. در مورد اثرات بیولوژیک مایکروویو گزارشات متفاوت و متناقضی وجود دارد، این تناقضات عمده‌تاً به‌دلیل مکانیسم تعامل بین مایکروویو و سیستم بیولوژیک است. وقتی فرکانس امواج الکترومغناطیسی از ۱۵ مگاهرتز بیشتر شود بدن انسان به‌طور معنی‌داری این امواج را جذب می‌کند و میزان جذب این امواج در نقاط مختلف بدن متفاوت است. برای امواج بین $70-100$ مگاهرتز که با امواج تلویزیون و موج FM تداخل

امروزه امواج الکترومغناطیس (Electromagnetic waves) از منابع مختلف شامل رادار، رادیو، تلویزیون، تجهیزات پزشکی و اجاق‌های مایکروفر خانگی تولید می‌شود و با توجه به گسترش دستگاه‌های جدیدی که انواع مختلف از میدان‌های الکترومغناطیس را ایجاد می‌کنند، اثرات بیولوژیک این امواج اخیراً مورد توجه محققین قرار گرفته است. امواج مایکروویو بخشی از طیف وسیع امواج الکترومغناطیس می‌باشند که دامنه فرکانس آن‌ها بین 300 مگاهرتز تا 300 گیگاهرتز و طول موج آن‌ها بین یک متر تا یک میلی‌متر می‌باشد. این امواج الکترومغناطیس غیر یونیزه‌کننده به‌وسیله مولکول‌ها جذب می‌شوند و تغییراتی در انرژی مولکول ایجاد می‌کنند.^۱ شواهد موجود

ارتفاع صفر و پنج سانتی‌متری از سطح میز با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری نشت امواج RF (مدل HI-1600- SURVEY METER) میزان نشت امواج را در طول موج‌های بین ۹۱۵ تا ۲۴۵۰ مگاهرتز اندازه می‌گیرد) اندازه گرفته شد. تعداد ۲۰ سر بجه موش سوری (سن حدوداً یک هفته و وزن ۴-۶ گرم) نژاد BALB/C از مرکز نابالغ (سن حدوداً یک هفته و وزن ۴-۶ گرم) نژاد BALB/C از مرکز حیوانات دانشکده پژوهشکی خریداری و پس از انتقال به بخش فیزیولوژی موش‌ها به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. کلیه موش‌ها ابتدا در کنار مادران نگهداری شده و جهت آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. آب و غذا به صورت آزاد در اختیار آنها بوده و میزان نور اتاق به صورت ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی تنظیم گردید. گروه‌های آزمایش به مدت دو ماه در قفس در فاصله ۳۰ سانتی‌متری (که تا فاصله ۵۰ سانتی‌متری اجازه حرکت داشتند) از دستگاه مایکروفر (ساخت شرکت LG مدل MS-543XD) قرار گرفتند. این دستگاه امواج الکترومغناطیس را با فرکانس ۲۴۵۰ مگاهرتز تولید می‌کند. دستگاه سه نوبت، هر نوبت به مدت نیم ساعت روشن گردید. درجه دستگاه بر Power معادل ۱۰ و زمان ۱۰ دقیقه تنظیم شد (این تنظیم معمولاً برای پخت غذاهای گوشتشی به کار می‌رود) دستگاه سه نوبت، هر نوبت به مدت نیم ساعت (سه نوبت ده دقیقه‌ای متواالی) روشن گردید. به این ترتیب موش‌های گروه آزمایش یک ساعت و نیم در شبانه روز با امواج مایکروویو مواجه بودند. موش‌های گروه کنترل نیز همزمان از اتاق نگهداری خارج و در محیط آزمایشگاه با شرایط مساوی از نظر نور و دما با گروه آزمایش قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش (۶۰ روز) موش‌ها ابتدا وزن و سپس با اتر بیهوده و با خون‌گیری مستقیم از قلب، هورمون‌های تیروپییدی و کورتیزول سرم با روش رادیوایمیونواسی (RIA) اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها

میزان نشت امواج در فواصل مختلف از دستگاه در جدول ۱ نشان داده


دارد بدن انسان مثل یک آنتن عمل می‌کند و قویاً امواج این طول موج را جذب می‌کند.^۵ اثرات ترمیمی امواج مایکروویو بر بدن انسان و حیوانات نیز گزارش شده است.^۵ هورمون‌ها می‌توانند به محرک‌های مختلف محیطی بسته به نیاز اینمی بدن پاسخ‌های تطبیقی مناسب ایجاد نمایند. گزارشاتی وجود دارد که نشان می‌دهد مواجه شدن با امواج الکترومغناطیس بالاتر از یک حد مشخص (آستانه تحریک) میزان هورمون‌های استروپییدی در موش صحرایی را افزایش می‌دهند^۶ شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد امواج الکترومغناطیس در یک آستانه تحریک خاص فعالیت نرو اندرکراین را تحت تاثیر قرار می‌دهد هرچند این آستانه بسته به گونه و شرایط محیط متغیر می‌باشد ولی اثرات بیولوژیک این امواج در آستانه‌های موربد بورسی مبنای برای تعیین میزان استاندارد قابل استفاده و بی‌خطر این امواج شده است. افزایش فعالیت غده آدرنال در پاسخ به امواج الکترومغناطیس به افزایش درجه حرارت بدن نسبت داده می‌شود و بنابراین آدرنال غده هدف اولیه است که تحت تاثیر امواج الکترومغناطیس قرار می‌گیرد. افزایش اختلالات هورمونی از یکسو و گسترش حضور میادین مغناطیسی در زندگی انسان از سوی دیگر، امکان ارتباط آن‌ها مطرح گردید. بانوان بیشترین تماس را با مایکروفر دارند، از طرفی با توجه به این‌که در هیچ‌یک از گزارشات، اثر امواج نشی از اجاق مایکروفر آن‌هم در شرایط معمول مصارف خانگی بررسی نشده است، در پژوهش حاضر اثر امواج نشی از اجاق مایکروفر (امواج میکروویو با فرکانس ۲۴۵۰ مگاهرتز) با توجه به استفاده از این دستگاه در این مصارف در فاصله ۳۰-۵۰ سانتی‌متری، بر غلظت هورمون‌های تیروپییدی و کورتیزول در یک الگوی حیوانی بررسی شد.

روش بررسی


ابتدا میزان نشت امواج میکروویو از دستگاه در فواصل ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متری که موش‌ها اجازه حرکت داشتند در حالت درب بسته در

جدول-۱: میزان نشت امواج میکروویو (mW/cm^2) از اجاق میکروفر در فواصل مختلف در سه نقطه مقابل دستگاه


فاصله از اجاق میکروویو (cm)	چگالی توان سمت چپ (mW/cm^2)	چگالی توان وسط (mW/cm^2)	چگالی توان سمت راست (mW/cm^2)
ارتفاع صفر	ارتفاع پنج سانتی‌متری	ارتفاع صفر	ارتفاع پنج سانتی‌متری
۴۰	۱۵	۵۷/۵	۵۵
۳۷/۵	۲۵	۳۰	۳۵
۳۰	۱۶	۴۵	۲۰
			۱۰
			۱۸
			۲۴
			۱۶/۵
			۲۰
			۶/۵
			۱۰
			۱۸
			۴۰
			۳۰




نمودار-۳: مقایسه تأثیر امواج نشیتی از اجاق مایکروویو بر میزان T4 سرم موش‌های سوری نایالغ (n=۱۰)، تفاوت بین دو گروه معنی دار می‌باشد (p<۰/۰۵)



نمودار-۴: مقایسه تأثیر امواج نشیتی مایکروویو بر لیپیدهای سرم موش‌های سوری نایالغ (n=۱۰). * نشان‌دهنده تفاوت معنی دار بین دو گروه می‌باشد (p<۰/۰۵)



نمودار-۱: مقایسه تأثیر امواج نشیتی از اجاق مایکروویو بر میزان کورتیزول سرم موش‌های سوری نایالغ (n=۱۰)، تفاوت بین دو گروه معنی دار می‌باشد (p<۰/۰۵)



نمودار-۲: مقایسه تأثیر امواج نشیتی از اجاق مایکروویو بر میزان T3 سرم موش‌های سوری نایالغ (n=۱۰)، تفاوت بین دو گروه معنی دار می‌باشد (p<۰/۰۵)

جدول-۲: تأثیر امواج نشیتی از اجاق مایکروویو بر تغییر وزن موش‌ها (n=۱۰)

گروه‌ها	میانگین وزن (گرم)	درصد تغییر نسبت به کنترل
کنترل	۳۰/۳۵±۰/۵	۵±۱
آزمایش	۲۱/۴±۰/۵	۵±۱

تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنی دار می‌باشد (p<۰/۰۵)

تأثیر قرار گرفتن در میدان‌های مغناطیسی بر میزان هورمون‌های تیرویید و کورتیزول در نمودارهای ۱-۳ نشان داده شده است، میانگین غلظت هورمون‌های T4، T3 و کورتیزول به‌طور معنی داری (p<۰/۰۵) در گروه آزمایش نسبت به کنترل افزایش نشان داد. این مقادیر برای T4 (T4 ۵۴/۶۰±۶/۰ nmol/L) و T3 (T3 ۰/۸۶۰±۰/۰۹ nmol/L) در مقابل ۰/۰۸۶۰±۰/۰۹ در میانگین ۰/۰۸۶۰±۰/۰۹ در مورد غلظت کورتیزول (۹/۹۴±۱/۲۱ ng/ml) در مقابل ۱/۷۸±۱/۷۸ در میانگین ۱/۷۸±۱/۷۸ می‌باشد. قرار گرفتن در میدان مغناطیسی سبب افزایش تری‌گلیسریدها (۰/۵۲±۰/۰۵ mg/dl در مقابل ۰/۱۱±۰/۱۱ mg/dl) و کاهش HDL (۰/۱۵±۰/۰۱ mg/dl در مقابل ۰/۱۸±۰/۰۱ mg/dl) گردید (نمودار ۴).

بحث

با توجه به جدول ۱ میزان نشت امواج از دستگاه در فواصل مورد بررسی نسبتاً زیاد است. میزان امواج نشیتی در اکثر موارد در مقابل و

شده است. همان‌گونه که در جدول ذکر شده است در اکثر موارد توان امواج خروجی در مقابل دستگاه و در فواصل نزدیک بیشتر از کناره‌ها و فاصله‌های دورتر می‌باشد. همچنین در ارتفاع پنج سانتی‌متری که تقریباً موازی سطح داخلی دستگاه می‌باشد حضور امواج بیشتر می‌باشد. میانگین وزن موش‌ها در دو گروه در جدول ۲ نشان داده شده است. با توجه به اطلاعات این جدول، قرار گرفتن در میدان مغناطیسی سبب شد که میانگین وزن در این گروه در پایان دوره تقریباً ۲۹٪ کمتر از گروه کنترل باشد (۲۱/۴ در مقابل ۳۰/۳۵ گرم).

به دلیل ایجاد شرایط استرس و تحریک هیپوفیز به ترشح مقادیر بیشتر ACTH و به دنبال آن افزایش کورتیزول و یا به دلیل تحریک مستقیم میدان مغناطیسی بر غده آدرنال و افزایش فعالیت ترشحی آن باشد. با توجه به این که مواجهه شدن موشاهی صحرایی هیپوفیز اکتومنی شده با میدان‌های مغناطیسی تغییری در میزان کورتیزول سرم آن‌ها نسبت به کنترل ایجاد ننمود^{۱۳} لذا پیشنهاد شد که افزایش ترشح غده آدرنال به دلیل اثر مستقیم میادین مغناطیسی بر غده نباشد.^{۱۲} Lotz نیز افزایش کورتیزول را در میمون در اثر مواجهه شدن با امواج با فرکانس ۱۲۹ مگاهرتز گزارش نمود.^{۱۴} افزایش هورمون‌های T3 و T4 در شرایط مورد آزمایش می‌تواند به دلیل تاثیر امواج بر هیپوفیز و یا تاثیر مستقیم امواج بر غده تیرویید باشد. نتایج تحقیق حاضر، با گزارش Magin در مورد هورمون T4 همخوانی دارد.^{۱۵} این محققین نیز نتایجی مشابهی را در سگ‌هایی که به مدت دو ساعت در معرض امواج با فرکانس ۲۴۵۰ مگاهرتز قرار گرفته بودند گزارش نمودند. در حالی که با گزارش Lu که موشاهی صحرایی را در معرض امواج با فرکانس ۲۴۵۰ قرار دادند^{۱۶} و همچنین با گزارش Koyu که موشاهی صحرایی را در معرض امواج فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز قرار دارند همخوانی ندارد.^{۱۷} Lotz تغییری در میزان هورمون تیروییدی در میمون در اثر میدان‌های مغناطیسی با فرکانس ۱۲۹ مگاهرتز مشاهده ننمود.^{۱۸} کاهش TSH و هورمون‌های تیروییدی در اثر میدان‌های مغناطیسی با فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز گزارش شده است.^{۱۹} بنابراین به نظر می‌رسد همان‌طور که در مورد هورمون کورتیزول مطرح گردید اثر این میادین مغناطیسی بیشتر به صورت اثر مرکزی و از طریق (هیپوفیز) در غده تیرویید اعمال گردد. گزارشات متفاوت در مورد اثرات این میدان‌های مغناطیسی بر غلظت هورمون‌های سرم می‌تواند به دلیل شرایط آزمایش از نظر فرکانس مورد استفاده، فاصله از منبع تولید میدان مغناطیسی و مدت زمان قرار گرفتن در این میادین باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر اثرات منفی امواج نشت یافته از اجاق‌های مایکروفر بر میزان هورمون‌های T3، T4 و کورتیزول، تری گلیسرید و HDL در یک الگوی حیوانی می‌باشد لذا لزوم مراقبت بیشتر هنگام استفاده از اجاق‌های مایکروفر شدیداً توصیه می‌گردد.

سپاسگزاری: بدین‌وسیله از زحمات سرکار خانم سعیده احمدی کارشناس محترم بخش فیزیولوژی و صنایع الکترونیک شیراز جهت همکاری در اندازه‌گیری امواج نشتی تقدیر و تشکر می‌گردد.

در فواصل نزدیک بیشتر است، بنابراین قرار گرفتن در مقابل و فاصله کم از دستگاه اثرات سوء بیشتری ایجاد خواهد کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که امواج نشت یافته از اجاق مایکروفر در فاصله ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متری در حدی است که می‌تواند سبب افزایش ترشح هورمون-های تیروییدی و کورتیزول شود. در زمینه خطرات امواج نشتی از اجاق‌های مایکروفر نظرات متناقضی وجود دارد، برخی از گزارشات بیانگر عدم نشت مقادیر خطرناک امواج مایکروویو از درب بسته دستگاه مایکروفر می‌باشد. در این گزارشات محققین معتقدند انرژی امواج نشت یافته به بیرون در حدود 1mW/cm^2 می‌باشد و در حدی نیست که برای مصرف‌کننده خطرساز باشد.^{۲۰} در حالی که برخی Oates دیگر از گزارشات برخلاف این موارد می‌باشد، به عنوان مثال میزان نشت امواج مایکروویو از مایکروفر با درب بسته را در فاصله پنج سانتی‌متری بین 1mW/cm^2 تا 30 mW/cm^2 گزارش نمود.^{۲۱} همچنین Inaloz میزان نشت این امواج را از مایکروفر با درب بسته بر روی موش صحراخی باردار مضر و خطرناک دانست.^{۲۲} با توجه به اطلاعات ذکر شده در جدول ۲ تغییرات وزن طی مدت دو ماه در گروه آزمایش میزان افزایش وزن حدوداً $29/5\%$ کمتر از گروه کنترل می‌باشد. علت کمبود افزایش وزن در گروه آزمایش را می‌توان با افزایش میزان هورمون‌های تیروییدی و کورتیزول مرتبط دانست، چون افزایش هورمون‌های تیروییدی سبب افزایش متabolism سلولی و ممانعت از افزایش وزن می‌گردد و در شرایطی که فرد در محدودیت غذایی باشد می‌تواند سبب کاهش وزن گردد.^{۲۳} در تحقیق حاضر بر اثر مواجه شدن با امواج مایکروویو میزان هورمون‌های T3 و کورتیزول به طور معنی‌داری افزایش یافت. در بررسی انجام گرفته، گزارشات اندکی در مورد تاثیر امواج بر میزان هورمون‌های سرم یافت شد که به مقایسه آن‌ها با نتایج حاصل از این تحقیق خواهیم پرداخت. برخی از گزارشات موجود حاکی از افزایش میزان استروییدهای پلاسمایی در اثر قرار گرفتن در میدان‌های مغناطیسی می‌باشد.^{۲۴} نتایج این تحقیق در مورد افزایش میزان کورتیزول سرم در اثر مواجه شدن با امواج میکروویو با گزارش Lotz (۱۹۷۸، ۱۹۷۹ و ۱۹۸۲) همخوانی دارد.^{۲۵} در حالی که Selmaoui تاثیر قرار گرفتن کوتاه‌مدت (۹ ساعت) در میدان مغناطیسی با فرکانس ۵۰ هرتز را بر هورمون‌های تیروییدی و کورتیکوییدی مزاد از نظر آماری معنی‌داری ندانست.^{۲۶} افزایش میزان کورتیزول تحت اثر امواج الکترومغناطیس می‌تواند

References

- Verschaeve L, Maes A. Genetic, carcinogenic and teratogenic effects of radiofrequency fields. *Mutat Res* 1998;410(2):141-65.
- Rai S, Singh UP, Mishra GD, Singh SP, Samarketu, Wagner KG. Synergistic effects of ajoene and the microwave power density memories of water on germination inhibition of fungal spores. *Med Biol Eng Comput* 1995;33(3):313-6.
- Rai S, Singh UP, Mishra GD, Singh SP, Samarketu. Additional evidence of stable EMF-induced changes in water revealed by fungal spore germination. *Electr Magneto Biol* 1994;13(3):253-9.
- Gandhi OP, editor. IEEE Engineering in Medicine and Biology, 1987.
- Banik S, Bandyopadhyay S, Ganguly S. Bioeffects of microwave: a brief review. *Bioresour Technol* 2003;87(2):155-9.
- Lotz WG, Michaelson SM. Temperature and corticosterone relationships in microwave-exposed rats. *J Appl Physiol* 1978;44(3):438-45.
- Alhekail ZO. Electromagnetic radiation from microwave ovens. *J Radiol Prot* 2001;21(3):251-8.
- Delaney A. Reliability of modern microwave ovens to safely heat intravenous fluids for resuscitation. *Emerg Med (Fremantle)* 2001;13(2):181-5.
- Oates WH Jr, Snellings DD Jr, Wilson EF. Microwave oven survey results in Arkansas during 1970. *Am J Public Health* 1973;63(3):193-8.
- Inalöz SS, Daşdağ S, Ceviz A, Bilici A. Acceptable radiation leakage of microwave ovens on pregnant and newborn rat brains. *Clin Exp Obstet Gynecol* 1997;24(4):215-9.
- Koeppen BM, Stanton B. Berne and Levy Physiology. 6th ed. St. Louis: Mosby; 2008.
- Black DR, Heynick LN. Radiofrequency (RF) effects on blood cells, cardiac, endocrine, and immunological functions. *Bioelectromagnetics* 2003;Suppl 6:S187-95.
- Lotz WG, Michaelson SM. Effects of hypophysectomy and dexamethasone on rat adrenal response to microwaves. *J Appl Physiol* 1979;47(6):1284-8.
- Lotz WG, Podgorski RP. Temperature and adrenocortical responses in rhesus monkeys exposed to microwaves. *J Appl Physiol* 1982;53(6):1565-71.
- Selmaoui B, Lambrozo J, Touitou Y. Endocrine functions in young men exposed for one night to a 50-Hz magnetic field. A circadian study of pituitary, thyroid and adrenocortical hormones. *Life Sci* 1997;61(5):473-86.
- Magin RL, Lu S, Michaelson SM. Stimulation of dog thyroid by local application of high intensity microwaves. *Am J Physiol* 1977;233(5):E363-8.
- Lu ST, Lebda N, Pettit S, Michaelson SM. Delineating acute neuroendocrine responses in microwave-exposed rats. *J Appl Physiol* 1980;48(6):927-32.
- Koyu A, Cesur G, Ozguner F, Akdogan M, Mollaoglu H, Ozen S. Effects of 900 MHz electromagnetic field on TSH and thyroid hormones in rats. *Toxicol Lett* 2005;157(3):257-62.

The effects of radiation leakage of microwave oven on body weight, cortisol, thyroid hormones and lipid profile in immature mice

Gholamali Jelodar Ph.D.^{1*}
Mohammad Beyzaee DVM²

1- Department of Physiology, School
of Veterinary Medicine, Shiraz
University, Shiraz, Iran
2- Veterinarian

Abstract

Received: December 30, 2009 Accepted: May 05, 2010

Background: High-frequency electromagnetic field (EMF) is generated by different sources such as radar installations, radio and television transmitters, medical microwave diathermy device and domestic use of microwave ovens. Radiation leakage of microwave oven may be harmful for users. Kids who are residing near their mothers may expose to electromagnetic field. This study was carried out to evaluate the effect of radiation leakage of microwave oven on body weight, cortisol, thyroid hormones and plasma lipid profile.

Methods: Radiation leakage of microwave oven was measured by RF measuring instrument. For this study 20 immature (7 ± 3 days old and 5 ± 1 g weight) mice were selected and randomly divided in two groups, control and test group. Test groups were exposed to 2450 MHZ microwaves produced by microwave oven three times a day, 30 minute each time. After 60 days, body weights of both groups were determined and the blood samples were collected by heart puncture. Serum cortisol and thyroid hormones levels were evaluated using RIA method.

Results: Radiation leakage from oven showed variations from 6.5 to 57.5 mW/cm². Mean body weight in test group was 29.5% lower than control group. Serum cortisol, T3 and T4 level were significantly higher in test group compare to control group, (17.44 ± 1.78 vs. 9.94 ± 1.21 ng/ml), (1.39 ± 0.15 vs. 0.86 ± 0.09 nmol/L) and (77.80 ± 7.67 vs. 54.6 ± 6.2 nmol/L) respectively. Compare to control group serum Triglyceride level increased while HDL decreased significantly in test group ($p<0.05$).

Conclusion: Microwaves leaked from oven have deleterious effect on body weight, T4 and cortisol level by decreasing weight gain and increasing these hormones.

Keywords: Microwaves, hormone, thyroid, cortisol, plasma lipids.

* Corresponding author: Dept. of Physiology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran, PO Box.71345-1735
Tel: +98-711-6138757
email: Jelodar@shirazu.ac.ir