

نقش سینوویورتر با فسفر رادیواکتیو در درمان آرتروپاتی هموفیلیک

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۰۵/۱۷

چکیده

زمینه و هدف: سینوویورتر رادیواکتیو که با تزریق رادیوایزوتوپ‌های بی‌ضرر به داخل مفاصل مبتلا به آرتربیت مزمن صورت می‌گیرد، از جمله روش‌های جدید در درمان آرتروپاتی هموفیلیک محسوب می‌گردد. این روش درمانی که به اهداف اولیه کاهش همارتروز و مصرف فاکتور انعقادی به کار رفته است، می‌تواند تاثیر به سزانی در بهبود کیفیت زندگی و کاهش بار اقتصادی ناشی از مصرف فاکتور انعقادی داشته باشد. در این مطالعه تاثیر این روش درمانی بر میزان بروز همارتروز و مصرف فاکتور در آرتروپاتی هموفیلیک بررسی می‌شود. روش بررسی: در یک مطالعه مداخله‌ای برای ۵۶ مفصل مبتلا به آرتروپاتی هموفیلیک (پس از دارا بودن شرایط ورود به مطالعه و پس از کسب رضایت‌نامه)، تزریق داخل مفصلی فسفر رادیواکتیو صورت گرفت. متوسط سن بیماران ۱۶/۷۸ سال (محدوده ۲/۵ تا ۳۶ SD=۷/۴۶) و ۹۸/۲ درصد آنها مذکور بودند. مفاصل درگیر شامل زانو، ۸۰/۳۵ درصد و مچ پا ۱۲/۵ و آرنج هفت درصد بودند. پی‌گیری با متوسط ۴۳/۶۳ (محدوده ۲-۳) ماه انجام شد که در انتهای پی‌گیری متغیرهای مختلف مانند میزان بروز همارتروز و میزان مصرف فاکتور بررسی گردید. یافته‌ها: در انتهای پی‌گیری، میزان بروز همارتروز کاهش ۶۲٪ (p=۰/۰۰۰) و میزان مصرف فاکتور، کاهش ۸۴٪ (p=۰/۰۰۰)، را نشان می‌داد، اما درگیری مفاصل جدید دیگر باعث کمتر شدن کاهش متوسط مصرف کلی فاکتور شد. **نتیجه‌گیری:** سینوویورتر با فسفر رادیواکتیو، می‌تواند روشی مؤثر و به صرفه در کاهش همارتروز و مصرف فاکتور در بیماران مبتلا به آرتروپاتی هموفیلیک باشد.

کلمات کلیدی: هموفیلی، سینووکتومی، سینوویورتر رادیواکتیو.

مطرح شده است.^{۱-۶} با توجه به محدودیت‌های موجود در دسترسی به فاکتور انعقادی جهت پیشگیری و درمان همارتروز از یکسو و عوارض زیاد سینووکتومی جراحی (باز یا آرتروسکوپیک)، از سوی دیگر، امروزه تمایل زیادی برای استفاده از سینوویورتر (Synoviorthesis) یا سینووکتومی مدیکال به وجود آمده است. سینوویورتر به دو صورت انجام می‌شود: روش شیمیایی (Chemical) با استفاده از موادی مانند هیالورونیک اسید، کورتیکواستروییدها، اسید اسمیک، دی‌پنی‌سیلامین و ریفارمیسین^{۳-۵} و روش رادیواکتیو (Radioactive): با استفاده از مواد ایزوتوپ مختلفی مانند طلا (۱۹۸Au)، ایتريوم (۹۰Y)، رینیوم (۱۸۶Re) و فسفر (۳۲P).^{۶-۸} در مقایسه با سینووکتومی به طریق جراحی، سینوویورتر روشنی با عارضه کمتر، نیاز به بستری کوتاه‌تر و هزینه بسیار کمتر

سیده‌محمد جواد مرتضوی،^۱ تقی بغدادی،^۱ امیر رضا فرهود،^۱ غلامرضا توگه،^۲ محمد افتخاری،^۳ محمد رضا منقچی،^۴ رامین اسپندار*

- ۱- گروه جراحی ارتروپاتی
- ۲- گروه هماتولوژی و انکولوژی، مرکز تحقیقات ترومبوز و هموستانز
- ۳- پژوهشکار هسته‌ای
- ۴- پژوهشکار عمومی، مرکز تحقیقات ترومبوز و هموستانز

بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، بخش ارتروپاتی
تلفن: ۰۱۱۹۲۷۶۷
email: espandarmd@sina.tums.ac.ir

مقدمه

از شایع‌ترین انواع خونریزی در بیماران مبتلا به هموفیلی (Hemophilia)، همارتروز (Hemarthrosis) می‌باشد، به صورتی که ۸۳٪ بیماران مبتلا به هموفیلی به این مشکل دچار می‌شوند.^{۹-۱۰} با هر خونریزی که محل اولیه آن سینوویوم می‌باشد^{۱۱} مقدادی زیاد آهن حاصل از تجزیه خون، منجر به تخریب سینوویویت‌ها و پاره شدن لیزوزوم آنها و در نتیجه آزادسازی آنزیم‌های کندرولیتیک می‌گردد.^{۱۲} در صورت تکرار همارتروز و ادامه سینوویت، چرخه معیوب سینوویت- همارتروز به وجود آمده که در نتیجه آرتروپاتی پیشرونده هموفیلیک در مفصل ایجاد شده و می‌تواند متنه‌ی به آرتروفیبروز گردد.^{۱۳} علی‌رغم اینکه پروفیلاکسی اولیه از طریق جایگزینی فاکتور تغییظ شده، به عنوان درمان انتخابی برای هموفیلی (و آرتروپاتی آن)

مراجعه بیمار برای پیگیری، بودند. نوع درمان و فواید و معایب آن برای بیمار یا ولی وی توضیح داده شده، برای بیمار رادیوگرافی و MRI از مفصل مبتلا درخواست می‌شد. در صورت تأیید سینوویوت در MRI و تناسب بیمار با معیارهای ورود و حذف و همچنین امضاء رضایت‌نامه کتبی توسط بیمار یا ولی وی (در اطفال) بیمار وارد مطالعه می‌گردید. اطلاعات مربوط به سن، جنس، نوع اختلال خون‌ریزی دهنده ارشی، وجود یا عدم وجود مهار کننده، فرکانس همارتروز، میزان متوسط مصرف فاکتور در ماه برای مفصلی که قرار بود تحت تزریق قرار گیرد، میزان کل مصرف فاکتور در ماه و محدوده حرکتی مفصلی ثبت می‌شد.

با توجه به اینکه آماده شدن فسفر رادیوакتیو و هماهنگی جهت انجام سینوویورتر رادیوакتیو مشکلات مربوط به خود را داشت، تعیین دقیق زمان انجام سینوویورتر مقدور نبود، لذا تا آن زمان، بیمار بسته به شرایط درمان می‌شد. در طی مطالعه متاسفانه بارها با محدودیت کامل در دسترسی به فسفر رادیوакتیو روبرو شدیم. در صورت بروز همارتروز حاد تا زمان انجام سینوویورتر، دریافت فاکتور مناسب و درمان کانسرواتیو انجام می‌شد، در غیر این صورت در طی این مدت درمان معمول شامل فیزیوتراپی جهت حفظ یا اعاده ROM مفصل و تسکین درد با ضد درد مناسب (معمولًاً استامینوفن) صورت می‌گرفت. پس از آماده شدن فسفر رادیوакتیو (^{32}P) در سازمان انرژی اتمی (^{32}P Colloid)، ساخت سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران)، روز قبل یا صبح روز تزریق به مرکز رادیوتراپی بیمارستان منتقل و در آنجا (از لحظه خلوص و قطر ذرات کولوییدی) کنترل می‌گردید. قبل از انجام تزریق یک دوز فاکتور مناسب با هدف سطح خونی فاکتور 100% تزریق می‌شد. تحت شرایط آسپتیک، بعد از بی‌حسی پوست، زیر جلد و کپسول مفصل با دوز مناسب لیدوکائین (۰.۲٪، ساخت ایران، کارخانه فارماکوپیتال رشت، به صورت آمپول 100 میلی گرمی در پنج میلی لیتر) بر اساس سن، با سر سوزن شماره 19 ، وارد مفصل شده و وضعیت داخل مفصلی آن با آسپراسیون خون یا مایع مفصلی که به طور کامل تخلیه می‌شد، کنترل می‌گردید. در بالغین برای مفصل زانو (و سایر مفاصل بزرگ) یک میلی کوری (mci) و در مفاصل کوچک نیم میلی کوری فسفر رادیوакتیو تزریق می‌شد. برای اطفال (زیر 12 سال) نصف دوز بالغین در نظر گرفته می‌شد. بعد از تزریق سر سوزن جهت شسته شدن

بوده، اثربخشی تقریباً یکسانی ($80-85$ درصد) داشته است. مطالعات مختلفی نیز در مورد اثربخشی هر دو روش سینوویورتر انجام شده است که به طور کلی نوع رادیوакتیو در کاهش شدت و تعداد همارتروز اثربخشی بیشتر و عارضه کمتری داشته است.^{۲۶} در میان مواد ایزوتوپ مذکور فسفر (^{32}P) تمام معیارهای یک ماده مناسب جهت سینوویورتر را دارد. همچنین این ماده به تأیید FDA رسیده و بی‌خطری آن در مطالعات متعدد برای گروههای سنی متفاوت از جمله اطفال مشخص شده است.^{۲۷}

در کشور ما دسترسی همه بیماران هموفیلیک به فاکتور انعقادی آسان نبوده و کاهش میزان همارتروز، میزان مصرف فاکتور و در نتیجه سینوویورتر رادیوакتیو می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی بیماران، کند کردن روند پیشرفت آرتروپاتی هموفیلیک و کاهش بار اقتصادی تحمیل شده بر سازمان‌های مربوطه برای تامین هزینه‌های فاکتور انعقادی داشته باشد. علی‌رغم تجربه اندک استفاده از سینوویورتر، می‌توان از آن به عنوان انتخابی مناسب جهت جلوگیری از بروز همارتروز و قطع سیکل معیوب همارتروز، سینوویوت، همارتروز در بیماران هموفیلیک ایرانی استفاده نمود. در این مطالعه، تاثیر سینوویورتر با فسفر رادیوакتیو در کاهش میزان همارتروز و مصرف فاکتور انعقادی در بیماران مبتلا به آرتروپاتی هموفیلیک بررسی می‌شود.

روش بررسی

در یک مطالعه مداخله‌ای از سال 1380 ، هر بیمار مبتلا به اختلال خونریزی دهنده ارشی و درگیری مفصلی که به درمانگاه هموفیلی بیمارستان امام خمینی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه می‌کرد، به درمانگاه ارتودپی معرفی می‌شد. معیارهای ورود شامل ابتلای بیمار به کمبود ارشی فاکتور انعقادی (شامل هموفیلی A، B و بیماری فونویلبراند)، سابقه همارتروز در مفصل حداقل برای سه بار در شش ماه قبل، سینوویوت تأیید شده به وسیله MRI، رضایت کتبی بیمار یا ولی بیمار، و معیارهای خروج شامل: عدم رضایت بیمار یا ولی بیمار، شک به عفونت مفصل یا عفونت سیستمیک، عدم امکان پیگیری بیمار، علائم شدید بیماری و عدم دسترسی به ماده رادیوакتیو، همارتروز حاد (در این حالت بعد از درمان همارتروز در صورت داشتن معیارهای ورود بیمار وارد مطالعه می‌شدن)، عدم امکان یا

یافته‌ها

در مجموع از سال ۱۳۸۰ ۷۸ برای ۷۸ مفصل در همین تعداد بیمار مبتلا به آرتروپاتی هموفیلیک، تزریق فسفر صورت گرفت، ۲۲ بیمار به علت عدم مراجعه برای پی‌گیری (حداقل سه ماه) یا عدم دسترسی از مطالعه خارج شدند. برای ۵۶ پی‌گیری به طور متوسط، ۴۳/۶۳ ماه (محدوده سه تا ۱۰۲ ماه) صورت گرفت. ۵۵ مورد مذکر (٪۹۸/۲) بوده و تنها یک مورد جنس مؤنث، دختر ۹ ساله مبتلا به بیماری فون ویلبراند (Type3) بود که برای مدت ۳۲ ماه پی‌گیری شد. متوسط سن بیماران ۱۶/۷۸ سال (محدوده ۲/۵ تا ۳۶ ماه، SD=۷/۴۶) بود. ۵۲ بیمار به هموفیلی A نوع شدید ($\leq ۱/۱$) (Plasma facrto VIII $\leq ۱/۱$)، سه بیمار مبتلا به هموفیلی A نوع متوسط ($\leq ۱/۵$) (Plasma factor VIII $\leq ۱/۱$) و تنها یک بیمار (دختر ۹ ساله) مبتلا به بیماری فون ویلبراند (Type 3) بودند. ۱۷/۸۵ درصد بیماران (۱۰ بیمار) در هنگام تزریق Inhibitor مثبت داشتند. در گیری مفصلی در همه بیماران تنها در مفاصل زانو، آرنج و مچ پا دیده شد، که شامل زانو، ۸۰/۳۵ درصد (۴۵ عدد) و مچ پا ۱۲/۵ (هفت عدد) و آرنج هفت درصد (چهار عدد) می‌شدند. متوسط میانگین میزان بروز همارتروز قبل از تزریق ۶/۱۶ بار در ماه (محدوده: ۸/۸۳ تا ۳۰ و SD=۷/۲۶) و بعد از آن ۲/۳۶ بار در ماه (محدوده: صفر تا ۲۰ و SD=۳/۹۰) بود که این تفاوت معنی‌دار بوده (p<0.0001) و کاهش ۶۲ درصدی را در انتهای مدت پی‌گیری نشان می‌داد. برای مقایسه نتیجه حاصل از این مطالعه با مطالعات انجام شده قبلی، تغییر بروز همارتروز به صورت زیر طبقه‌بندی گردید.^۴ Grade 0: عدم بروز همارتروز. Grade 1: کاهش در بروز <100٪؛ Grade 2: کاهش در بروز >100٪؛ Grade 3: کاهش در بروز >50٪؛ Grade 4: کاهش در بروز >25٪. بر اساس این طبقه‌بندی، در انتهای پی‌گیری ۲۵٪ بیماران ۱، ۱۲/۵٪ Grade 2، ۳٪ Grade 3 و ۴٪ Grade 4، کاهش همارتروز را نشان دادند. متوسط میانگین میزان مصرف فاکتور برای مفصل تزریق شده، قبل از تزریق ۱۶۵۴۹/۰۲ واحد در ماه (محدوده: ۱۸۰۰۰-۱۰۰۰۰ و SD=۳۶۸۲۸/۹۲) و بعد از آن ۲۷۰۳/۸۲ واحد در ماه (محدوده: ۰-۲۰۰۰ و SD=۴۰۱۳/۳۴) بود که این تفاوت معنی‌دار بوده (p<0.0001) و کاهش ۸۴ درصدی را در انتهای مدت پی‌گیری نشان می‌داد. از آنجا که بعضی از بیماران در طی پی‌گیری، بروز همارتروز

سوzen از ماده رادیواکتیو و عدم هدر رفتن آن، با ۲ml تزریق مجدد سالین شسته شده، به آرامی در حالی که تزریق ادامه دارد، بیرون گشیده می‌شد. سپس فشار مستقیم بر روی محل تزریق برای مدت ۵ دقیقه اعمال شده، مفصل مربوطه دربازداش فشاری برای مدت یک روز و درآتل برای مدت یک هفته تا ده روز، بسته به سن و علایم بیمار بی‌حرکت می‌شد. پس از اتمام تزریق پزشک و بیمار و فضای اطراف وی از لحاظ آغشته شدن به مواد رادیواکتیو بررسی می‌شد. هشت تا ۱۲ ساعت بعد، دوز مجدد فاکتور برای دستیابی به سطح خونی ۱۰٪ تزریق می‌شد. در صورت بدون علامت بودن، بیمار ترخیص می‌شد و به بیمار یا ولی وی دستورات لازم داده می‌شد. در صورت بروز همارتروز حاد در هر زمان بعد از انجام سینوویورتیزیس، درمان آن با تزریق فاکتور به میزان لازم و درمان کانسرواتیو انجام می‌گردد. بعد از دوره بی‌حرکتی ذکر شده درمان فیزیوتراپی جهت اعاده محدوده حرکتی مفصل انجام می‌شود. بیمار بعد از یک هفته، سه ماه و سپس هر یک سال ویزیت می‌شود. اطلاعات مربوط به سن، جنس، وضعیت مهارکننده Inhibitor، وضعیت ابتلا به عفونت‌های ویرال، نوع بیماری هموفیلی و مفصلی که کاندیدای تزریق بود، ثبت می‌شود. قبل از تزریق و در هر ویزیت، متغیرهای مختلف مانند در گیری مفصل جدید، فرکانس بروز همارتروز و میزان نیاز به فاکتور در ماه برای مفصل تزریق شده و به طور کلی در فواصل بین معاینات، ثبت می‌شود. ابتدا قرار بود در صورت عدم پاسخدهی به سینوویورتیزیس رادیواکتیو و در صورت دسترسی به فسفر رادیواکتیو، برای دو بار دیگر با فاصله سه ماه این روش تکرار شده و در صورت عدم پاسخدهی مجدد، بیمار کاندید سینووکتومی به طریق جراحی (باز یا آرتروسکوپیک، بر اساس مفصل گرفتار) گردد. با توجه به محدودیت‌های مربوط به دسترسی به فسفر رادیواکتیو، برای بیماران، یک تزریق انجام و در صورت ادامه علایم شدید و مشکلات بیمار همراه با سینوویوت واضح، علی‌رغم درمان کافی با فاکتور انعقادی، سینووکتومی به طریق جراحی (باز یا آرتروسکوپیک، بر اساس مفصل گرفتار) به بیمار توصیه می‌شود. اطلاعات به دست آمده با نرم‌افزار SPSS ویراست ۱۱/۵ آنالیز گردید. با توجه به عدم توزیع نرمال در متغیرهای میزان بروز همارتروز مصرف فاکتور، برای محاسبه p از Nonparametric Wilcoxon signed-ranks test معنی دار در نظر گرفته شد.

گرفته بود، هنوز مصرف فاکتور ۴۰۰۰ واحد در ماه را نیاز داشت. ۳- در یک پسر ۲/۵ ساله، روز بعد از تزریق فسفر رادیواکتیو، برای زانوی راست، همارتروز شدید (تورم و درد و کاهش ROM) رخ داد، که بعد از دریافت فاکتور و رد کردن عفونت با استفاده از تست‌های تشخیصی، درمان مراقبتی (دریافت فاکتور و بی‌حرکتی) و سپس فیزیوتراپی ادامه یافته، که بعد از سه ماه زانو بهبودی کامل و در پی‌گیری ۲۰ ماهه، بروز همارتروز در حد صفر داشت. در دو بیمار ۱۹ و ۲۳ ساله با توجه به عدم پاسخ به درمان و همارتروز شدید با متوسط ۲۰ ماه پس از تزریق فسفر رادیواکتیو، سینووکتومی (یکی باز و دیگری به روش آرتروسکوپی Arthroscopic) صورت گرفت. یک بیمار، مرد ۱۸ ساله با درگیری زانوی راست ۳۳ ماه پی‌گیری شد، ولی در سال چهارم بعد از تزریق بر اثر خونریزی مغزی فوت نمود و از مطالعه خارج شد.

بحث

۸۳٪ بیماران مبتلا به هموفیلی (کمبود مادرزادی فاکتور انعقادی هشت یا ۹ اختلالات مشابه مانند بیماری فون‌ویلبراند) چهار همارتروزیس می‌شوند، که شایع‌ترین نوع خونریزی در بیماران مبتلا به هموفیلی می‌باشد و معمولاً در سینین پایین بین دو تا پنج سال شروع می‌شود. در این نوع همارتروز که با خونریزی متشر داخل سینوویوم همراه است، خون به داخل فضای مفصلی تراوش می‌شود^۳ و مواد حاوی آهن حاصل از تجزیه خون مانند هموسیدرین و فربین توسط سینوویوم جذب شده، مقادیر زیاد آهن منجر به تخریب سینوویسیت‌ها و پاره شدن لیزوژروم آنها و در نتیجه آزاد سازی آنزیم‌های کندرولیتیک می‌گردد.^۴ یکباره ایپیزود خونریزی داخل مفصلی ممکن است، اثرات کوتاه‌مدتی بر روی غضروف داخل مفضلی داشته باشد، اما به دنبال مواجهه مکرر با خون آسیب غضروفی محتمل تر می‌باشد.^۵ در مدت چندین روز بعد از خونریزی، سینوویوم دچار خونریزی همراه با مناطقی از افزایش ویلوس‌ها و همچنین افزایش واسکولاریتی می‌شود.^۶ سینوویوم هایپرتروفیه و پر عروق در داخل فضای مفصلی محصور شده، به دنبال آسیب‌های خفیف دچار خونریزی مکرر می‌گردد که خود باعث پایدار شدن التهاب سینوویوم (Chronic hypertrophic synovitis) و در نتیجه سیکل معیوب همارتروز- سینوویت- همارتروز می‌گردد.^۷ اگر این

را در مفاصل دیگر (غیر از مفصل تزریق شده) نشان دادند، از لحاظ تعداد مفصل جدید درگیر شده و همچنین میزان مصرف کلی فاکتور انعقادی، بر اساس متوسط میزان کل واحد دریافتی فاکتور در ماه، برای همارتروز های همه مفاصل درگیر (شامل مفصلی که تحت تزریق فسفر رادیواکتیو قرار گرفته و سایر مفاصل تزریق نشده)، بررسی انجام شد. در انتهای پی‌گیری (با حداقل مدت زمان ۱۰۲ ماه) ۵۸/۹٪ بیماران (۳۳ بیمار) درگیری مفصل جدید نداشتند، اما ۱۸٪ (۳۲ بیمار) آنها، درگیری یک مفصل جدید، ۷/۱٪ (چهار بیمار) درگیری دو مفصل جدید و ۱/۸٪ (یک بیمار) درگیری سه مفصل جدید را داشتند که با احتساب فاکتور مصرفی برای همارتروزهای مفاصل جدید متوسط میزان مصرف کلی فاکتور انعقادی در انتهای پی‌گیری برابر ۶۳۴۶/۴۲ واحد در ماه (محدوده: ۰-۱۰۰۰۰ و SD=۱۴۱۶۰/۹۳) بود. حتی با احتساب فاکتور کلی مصرفی برای مجموع همارتروزهای مفاصل جدید و مفصل تزریق شده، همچنان تفاوت بین مصرف فاکتور قبل از تزریق و فقط برای مفصل تزریق شده و فاکتور کلی مصرفی معنی دار بوده ($p<0.001$) و کاهش ۶۲ درصدی را در انتهای مدت پی‌گیری نشان می‌داد. در مجموع در سه بیمار عوارض به صورت زیر دیده شد: ۱- سوختگی پوستی در محل تزریق در بیمار ۳۰ ساله که برای وی تزریق فسفر رادیواکتیو برای آرتروپاتی هموفیلیک مج پای راست صورت گرفته بود، که هفت روز بعد از تزریق ایجاد شد، که خوشبختانه شدید نبوده و به نکروز منجر نشد، اما تا بهبودی کامل که دو ماه طول کشید و با فیزیوتراپی بیمار تداخل داشت. ۲- در یک پسر ۱۱ ساله که در هنگام تزریق محدودیت در اکستنسیون پاسیو مفصل (Flexion contracture) زانو در حد ۴۰ درجه و آتروفی واضح در کوادریسپس داشت، چند ماه بعد از تزریق فسفر رادیواکتیو برای آرتروپاتی هموفیلیک زانوی راست، در طی فیزیوتراپی، شکستگی سوپراکنڈیلار فمور همان (IM nailing) طرف رخ داد که برای بیمار میله‌گذاری ایترامدولاری (IM nail) همراه با استئوتومی سوپراکنڈیلار همزمان صورت گرفت. در انتهای پی‌گیری ۹۰ ماهه، بیمار، دامنه حرکتی: ۰-۶۰ درجه، اما کاهش واضح در بروز همارتروز (از چهار بار شدید در ماه به یک بار خفیف در شش ماه) و کاهش واضح در مصرف فاکتور انعقادی (از ۵۰۰۰ واحد در ماه به نزدیک صفر برای زانوی راست) داشت. اما درگیری شدید در زانوی مقابل که همزمان با زانوی راست تحت تزریق فسفر قرار

مقایسه سینوویورتیز با سینووکتومی به طریق جراحی، سینوویورتیز روشنی با عارضه کمتر، نیاز به بستره کوتاهتر و هزینه بسیار کمتر بوده و اثر بخشی تقریباً یکسانی (۷۵-۸۰ درصد) داشته است. مطالعات مختلفی نیز در مورد اثر بخشی هر دو روش سینوویورتیز انجام شده است که به طور کلی نوع رادیواکتیو در کاهش شدت و تعداد همارتروز اثر بخشی بیشتر و عارضه کمتری داشته است.^{۲۰} در میان مواد ایزوتوپ مذکور فسفر (۳۲P) تمام معیارهای یک ماده مناسب جهت سینوویورتیز را دارد و همچنین این ماده به تأییدیه FDA کسب کرده است. (ساعت کننده فقط اشعه بتا (نه اشعه گاما)، نفوذ ۳-۵mm در اندازه تقریبی ۱۰۰۰ آنگستروم و فرم کلوییدی و نیمه عمر ۱۴ روز) در مطالعات مختلفی که در مراکز متعددی صورت گرفته است، فسفر رادیواکتیو نتایج کلینیکی خوبی با کاهش متوسط ۷۵ درصد در تعداد همارتروز بیماران را نشان داده است و همچنین بی خطری آن در مطالعات متعدد برای گروههای سنی متفاوت از جمله اطفال مشخص شده است.^{۲۱} در این بررسی، در انتهای مدت پی گیری (سه تا ۱۰۲ ماه) کاهش معنی دار ($p < 0.0001$) و ۶۲ درصدی در میزان بروز همارتروز حاصل شد و ۵۰٪ بیماران درجه یک یا دو از کاهش همارتروز (کاهش < 75 تا 100 ٪) را داشتند. دکتر سید محمد جواد مرتضوی (نویسنده اول) و همکاران در مطالعه قبلی خود بر روی ۴۶ بیمار (که شامل ۲۶ بیمار مشترک با این مطالعه بود)، با متوسط پی گیری ۳۱ ماه (شش تا ۴۹ ماه)، کاهش معنی دار (۷۷٪ در میزان مصرف بروز همارتروز را بدست آورده‌اند.^۹ در مطالعه Siegel (تعداد مفصل: ۴۴، مدت پی گیری: حداقل چهار سال) ۷۴٪ بیماران، Grade صفر یا یک از تغییر همارتروز را گزارش نمود.^{۱۰} همچنین Silva (تعداد بیمار: ۱۳۰ نفر، مدت پی گیری: متوسط ۳۶/۵ ماه)، برای تزریق اول، میزان ۶۲٪، این مقدار از تغییر همارتروز را ثبت نمود.^{۱۱} Siegel، در مطالعه دیگری (تعداد بیمار: ۱۲۵، مدت پی گیری: دو تا ۱۰ سال) ۵۴٪ قطع کامل همارتروز، ۷۹٪ در افراد بالای ۱۸ سال و ۵۶٪ در افراد بالای ۴۰ سال Grade صفر یا یک از تغییر همارتروز را گزارش نموده است،^{۱۲} که می‌تواند نشانگر تاثیر سن بر یکی از نتایج درمانی (کاهش همارتروز) باشد.^{۱۳} Silva در بررسی خود ارتباط معنی داری بین سن و نتایج درمانی سینوویورتیز با P-۳۲ پیدا نکرد،^{۲۹} در این مطالعه نیز ما نتوانستیم ارتباط معنی داری بین سن و میزان کاهش همارتروز بیابیم. در انتهای پی گیری، کاهش

سیکل معیوب در همان مراحل ابتدایی قطع نشود منجر به تخریب غضروف مفضلي و استخوان شده که در رادیوگرافی (البته با تأخیر قابل ملاحظه) قابل رویت خواهد بود.^۶ علی‌رغم اینکه پروفیلاکسی اولیه از طریق جایگزینی انعقادی تغییر شده که قبل از بروز هرگونه تغییر داخل مفاصل و در اوایل زندگی (بین دو تا ۱۸ سالگی) شروع می‌گردد، به عنوان درمان انتخابی برای هموفیلی مطرح شده است،^{۲۰} اما در استفاده از این نوع درمان موانعی وجود دارد که عبارتند از: ۱- بوجود آمدن عوامل کننده در بدن بیمار مبتلا به هموفیلی که در این حالت تعداد و شدت همارتروز افزایش یافته و سینوویت شدیدتری حاصل می‌گردد.^۲ ۲- دسترسی محدود به فاکتور کافی جهت درمان پروفیلاکتیک و حتی جهت درمان جایگزینی برای ایزوودهای خون‌ریزی.^۵ با توجه به موانع موجود، تلاش جهت استفاده از آلترناتیووهای دیگر جهت جلوگیری از همارتروز و قطع سیکل معیوب همارتروز، سینوویت، همارتروز در نیم قرن اخیر صورت گرفته است. تئوری کنونی از میان برداشتمن سینوویوم هایپرتروفیه (سینووکتومی) می‌باشد که امر و زده دو روش جراحی و سینووکتومی مدیکال (سینوویورتیز) (Synoviorthesis) برای انجام آن وجود دارد. علی‌رغم نتایج مثبت روش جراحی (باز یا آرتروسکوپیک)، با توجه به نیاز به زمان بستره طولانی مدت و میزان زیاد فاکتور جهت کنترل خون‌ریزی و همچنین عارضه جدی محدودیت حرکت مفصل (آرتروفیبروزیس)،^{۲۵} سینوویورتیز که شامل تزریق داخل مفصلي یک ماده مشخص با هدف تثیت (Orthesis) پرده سینوویوم می‌باشد،^۲ بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در سینوویورتیز ماده تزریق شده با اثر فیبروزان، باعث فیبروز و به دام افتادن عروق ساب سینوویال می‌گردد.^۱ سینوویورتیز به دو صورت انجام می‌شود: ۱- Chemical Synoviorthesis: با استفاده از موادی مانند هیالورونیک اسید، کورتیکواسترویدها، اسید اسپیک، دی‌پنی سیالامین و ریفامپیسین که غیر از ریفامپیسین که آن نیز نیاز به تزریق‌های مکرر و دردناک دارد، سایر مواد موفقیت محدودی را در کاهش همارتروز ایجاد کرده‌اند.^{۲۰} ۲- Radioactive Synoviorthesis: با استفاده از مواد ایزوتوپ مختلفی مانند طلا (۱۹۸Au)، ایتریوم (۹۰Y)، رینیوم (۱۸۶Re) و فسفر (۳۲P) که با الهام از سینووکتومی رادیواکتیو که در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتویید، در بیماران هموفیلیک به کار برده شده است.^{۲۰}^{۲۱} علی‌رغم عدم وجود کارآمدی بالینی تصادفی جهت

(زیر هشت سال) شاید راهکارهای مناسبی برای کاهش عوارض باشد. در مطالعه ما بررسی کروموزومی انجام نشد، اما در طی ۱۰۲ ماه، هیچ مدرکی مبنی بر بروز بدخیمی در بیماران مورد بررسی یافت نشد (Rivard اعلام کرد که اگرچه در مطالعات اولیه آنها هیچگونه تغییر کروموزومی مشاهده نشد، اما در مطالعه بعدی در ۱۰٪ از آنالیزهای کروموزومی، بیش از ۵٪ از میتوژها، خردشدنگی در کروموزومها را داشته‌اند، که تمام این خردشدنگی‌ها در بیماران HIV مثبت و مواردی که CD4 آنها کاهش یافته بود، رخ داد. نویسنده‌گان این مقاله همچنین به این نکته اشاره کردند که در ۵۰۰۰ سینوویوتزیس انجام شده در بیماران RA، از سال ۱۹۷۰ هیچ مدرکی مبنی بر افزایش کارسینوژن یافت نشد.^{۱۴} با وجود اینکه در ابتدا سینوویوتزیس کارسینوژن را درمان موارد سینوویوت مزمن همراه با همارتزوژهای مکرر که به درمان‌های کانسرواتیو جواب نمی‌دهد، استفاده می‌شد و وجود عالیم رادیوگرافیک شدید به عنوان کتراندیکاسیون برای انجام آن در نظر گرفته می‌شد، اما امروزه این روش برای هر درجه‌ای از سینوویوت در بیمار هموفیلی توصیه می‌شود، حتی اگر تغییرات رادیو گرافیک آرتروپاتی وجود داشته باشد.^{۱۵} در این مطالعه نیز سینوویوتزیو رادیوکتیو برای هر شدتی از درگیری آرتروپاتی انجام شد. از سوی دیگر، به علت اینکه با گذشت سن بیشتر بیماران تخریب قابل ملاحظه مفصل را داشته‌اند، درمان هر چه زودتر سینوویوت در جهت پیشگیری از آرتروپاتی پیش‌رفته، در دهه اول زندگی لازم می‌باشد.^{۱۶}

با توجه به ارزان‌تر بودن، قابلیت انجام آسان‌تر با حداقل زمان بسترهای، کمتر تهاجمی بودن و همچنین بی‌خطر بودن، امروزه در مقایسه با سینووکتومی جراحی، سینوویوتزیو رادیوکتیو برای بیمار هموفیلیک مبتلا به سینوویوت روش انتخابی اول بوده و توصیه می‌شود هرچه زودتر در سیر بیماری و ترجیحاً قبل از ایجاد تغییرات غیر قابل برگشت قابل توجه در مفصل انجام گیرد. تنها در صورتی که انجام مکرر سینوویوتزیو رادیوکتیو (معمولًا سه بار) نتیجه‌بخش نباشد، جراحی به عنوان قدم بعدی پیشنهاد می‌گردد.^{۱۷}

سپاسگزاری: بدینوسیله از خدمات صمیمانه پرسنل درمانگاه هموفیلی بیمارستان امام خمینی و همچنین سرکار خانم داوری، کارشناس محترم بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان ولی‌عصر، قدردانی می‌گردد.

در میانگین میزان مصرف فاکتور برای مفصل تزریق شده، ۸۴٪ بود (p<0.05). در مطالعه قبلی دکتر مرتضوی و همکاران خود کاهش معنی‌دار ۷۴٪ در میزان مصرف فاکتور را به دست آورده‌اند.^۹ کاهش قابل ملاحظه در مصرف فاکتور، می‌تواند از لحظه کاربردی و صرفه اقتصادی در سطح کلان مخصوصاً با توجه به محدودیت در دسترسی بیماران به فاکتور، به تنها‌ی توچیه‌کننده ارزش سینوویوتز با فسفر رادیوکتیو در درمان آرتروپاتی هموفیلیک باشد و بتواند در کنار کاهش معنی‌دار بروز همارتزوژ و مزایای درمانی برای بیمار که در این مطالعه و مطالعات دیگر حاصل شده است، این روش درمانی را، حداقل برای احصال کاهش مصرف کلی فاکتور در جامعه و در نتیجه هزینه‌های تحمیل شده بر سازمان‌های متولی، روشی به صرفه معزز نماید اما در مورد آرتروپاتی هموفیلیک و مصرف فاکتور، در این مطالعه این نکته جلب توجه می‌نمود که علی‌رغم کاهش چشمگیر در مصرف فاکتور برای مفصل تزریق شده، به علت درگیری مفاصل جدید در طی مدت پی‌گیری، میزان کلی مصرف فاکتور انعقادی در بیماران متفاوت بوده و موجب تشویق ما برای محاسبه و مقایسه این متغیر (میزان کلی مصرف فاکتور) گردید.

در مطالعه ما حتی میزان کلی مصرف فاکتور نسبت به میزان مصرف فاکتور در هنگام تزریق، ۶۲٪ کاهش داشت (p<0.001). شاید نتوان به طور قطعی، شکستگی در طی فیزیوتراپی بعد از تزریق را به عنوان عارضه مربوط به سینوویوتزیو با فسفر رادیوکتیو در نظر داشت، چراکه عواملی مانند آتروفی و محدودیت دامنه حرکتی که مشکل آرتروپاتی هموفیلیک می‌باشند، در کنار روش نادرست فیزیوتراپی قادر به ایجاد چنین مساله‌ای خواهد بود. اما در صورت احتساب این مشکل به عنوان عارضه سینوویوتزیو، در مجموع ۵٪^{۱۸} عوارض، یعنی یک مورد سوختگی محل تزریق در مرد ۳۰ ساله (عارضه همانند در مطالعه Erken وجود داشت).^{۱۹} یک مورد شکستگی سوپراکوندیلار فمور در پسر ۱۱ ساله و یک مورد همارتزوژ و آرتربیت حاد در پسر ۲/۵ ساله، ایجاد شد. فیزیوتراپی ملایم و با احتیاط، تزریق به صورت Z (زیگزاگ)، به صورتی که مسیر ورودی پوست با ورودی کپسول مفصل یکی نباشد (که با کشیدن پوست قبل از ورود سوزن و سپس آزاد کردن پوست و ادامه فرو بردن سوزن تزریق، حاصل می‌شود) و بسترهای کردن، تزریق با تخدیر (Sedation) همراه با بی‌حرکتی و پایش برای سینوویوتز در بجه‌های

References

- Fernandez-Palazzi F. Treatment of acute and chronic synovitis by non-surgical means. *Haemophilia* 1998;4(4):518-23.
- Rodriguez-Merchan EC, Wiedel JD. General principles and indications of synoviorthesis (medical synovectomy) in haemophilia. *Haemophilia* 2001;7 Suppl 2:6-10.
- Gilbert MS, Cornwall R. The history of synoviorthesis in haemophilia. *Haemophilia* 2001;7 Suppl 2:3-5.
- Silva M, Luck JV Jr, Siegel ME. 32P chromic phosphate radiosynovectomy for chronic haemophilic synovitis. *Haemophilia* 2001;7 Suppl 2:40-9.
- Hoots WK, Rodriguez N, Boggio L, Valentino LA. Pathogenesis of haemophilic synovitis: clinical aspects. *Haemophilia* 2007;13 Suppl 3:4-9.
- Rodriguez-Merchan E.C. Hemophilic synovitis: Basic concepts. *Haemophilia* 2007;13 suppl 3:1-3.
- Rodriguez-Merchan EC, Heim M. Editorial comment. *Haemophilia* 2001;7 suppl 2:1-2.
- Rodriguez-Merchan EC, Quintana M, De la Corte-Rodriguez H, Coya J. Radioactive synoviorthesis for the treatment of haemophilic synovitis. *Haemophilia* 2007;13 Suppl 3:32-7.
- Mortazavi SM, Asadollahi S, Farzan M, Shahriaran S, Aghili M, Izadyar S, et al. (32)P colloid radiosynovectomy in treatment of chronic haemophilic synovitis: Iran experience. *Haemophilia* 2007;13(2):182-8.
- Siegel HJ, Luck JV Jr, Siegel ME, Quines C, Anderson E. Hemarthrosis and synovitis associated with hemophilia: clinical use of P-32 chromic phosphate synoviorthesis for treatment. *Radiology* 1994;190(1):257-61.
- Silva M, Luck JV Jr, Quon D, Young CR, Chin DM, Ebramzadeh E, et al. Inter- and intra-observer reliability of radiographic scores commonly used for the evaluation of haemophilic arthropathy. *Haemophilia* 2008;14(3):504-12.
- Siegel HJ, Luck JV Jr, Siegel ME, Quinones C. Phosphate-32 colloid radiosynovectomy in hemophilia: outcome of 125 procedures. *Clin Orthop Relat Res* 2001;(392):409-17.
- Erken EH. Radiocolloids in the management of hemophilic arthropathy in children and adolescents. *Clin Orthop Relat Res* 1991;(264):129-35.
- Rivard GE, Girard M, Bélanger R, Jutras M, Guay JP, Marton D. Synoviorthesis with colloidal 32P chromic phosphate for the treatment of hemophilic arthropathy. *J Bone Joint Surg Am* 1994;76(4):482-8.

The role of colloid 32p synoviorthesis in treatment of haemophilic arthropathy

Seyed Mohammad Javad
Mortazavi MD.¹
Taghi Baghdadi MD.¹
Amirreza Farhoud MD.¹
Gholamreza Togeh MD.²
Mohammad Eftekhari MD.³
Mohammadreza Managhchi
MD.⁴
Ramin Espandar MD.^{1*}

1- Department of Orthopedic
Surgery, Imam Khomeini Hospital,
Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran.

2- Department of Hematology and
Oncology, Thrombosis and
Homeostasis Research Center,
Imam Khomeini Hospital, Tehran
University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.

3- Department of Nuclear Medicine,
Imam Khomeini (Valiasr) Hospital,
Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran.

4- General Practitioner,
Thrombosis and Homeostasis
Research Center, Imam Khomeini
Hospital, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran.

Abstract

Received: June 28, 2010 Accepted: August 08, 2010

Background: Radioactive synoviorthesis by injection of safe radioisotopes into the joints affected to chronic arthritis is accounted as a novel method to treat haemophilic arthropathy. The main goal of this therapy would be decrease in frequency of hemarthrosis and consumption of coagulation factors. In this study we assessed the effect of radioactive synoviorthesis on the frequency of hemarthrosis, factor consumption and other related parameters.

Methods: In an interventional study in Imam Khomeini Hospital in Tehran, Iran, after meeting of inclusion criteria and taking written consent, colloid 32p radiosynovectomy was performed for 56 joints with haemophilic arthropathy. After local anesthesia of injection site, one mci of 32P for large joints (knee) and 0.5 mci for small joints (ankle and elbow) was injected, respectively. Half of these doses were considered for children (age <12 years).

Results: The mean of age was 16.78 year old (Range: 2.5-36; SD: 7.46) and 98.2% of cases were male. Injected were knee 80.35%, ankle 12.5%, and elbow 7%. The mean of follow-up was 43.63 months (range: 3-102) that at the end, the result was 62% decrease in frequency of hemarthrosis ($p=0.0001$) and 84% decrease in factor consumption ($p=0.0001$). However, the involvement of other (non injected) joints during follow-up could lower the decrease of mean of total factor consumption.

Conclusions: Radioactive synoviorthesis can be a cost-effective alternative to decrease hemarthrosis and factor consumption in haemophilic arthropathy.

Keywords: Haemophilia, synovectomy, synoviorthesis.

*Corresponding author: Imam Khomeini
Hospital, Keshavarz Blvd., Tehran, Iran.
Tel: +98-21- 61192767
email: espandarmd@sina.tums.ac.ir