

بررسی ارتباط بین فلور باکتریال بزاق با سرانجام نامطلوب بارداری

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۰۹/۲۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۱۱/۱۰

چکیده

زمینه و هدف: تحقیقات زیادی نشان می‌دهند که پاتوژن‌های پریودنتال می‌توانند به عنوان یک ریسک‌فاکتور برای زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد عمل نمایند، در مورد این‌که بین سایر باکتری‌های دهانی با سرانجام بارداری ارتباطی وجود دارد یا نه مطالعات بسیار کمی وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه فلور باکتریال بزاق در دوران حاملگی با سرانجام نامطلوب حاملگی انجام شد. **روش بررسی:** مطالعه به صورت کوهورت (آینده‌نگر) بر روی ۳۰۰ زن باردار که در سال ۱۳۸۸-۸۹ برای مراقبت‌های دوره بارداری به بیمارستان حضرت زینب (س) مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه بزاق افراد مورد مطالعه حداقل یک ساعت بعد از صحبتانه با استفاده از سیپلر تهیه و بر روی لام ثبت شد. عمل شمارش باکتری‌ها بر اساس شکل و واکنش گرم صورت گرفت. میکروارگانیسم‌های مورد مطالعه شامل کوکوس‌های گرم مثبت و منفی، باسیل‌های گرم مثبت و منفی، اسپریل‌ها، اسپریوکت‌ها، مخمرها، باکتری‌های فوزی فرم و اکتینومیست‌ها بودند. **یافته‌ها:** از ۳۰۰ فرد مورد مطالعه داده‌های کامل مربوط به ۲۴۳ زن به دست آمد. پنج مورد (۲%) از نمونه‌های مورد بررسی مردمزایی داشتند و ۲۳۸ نفر (۹۸%) نوزادانی زنده به دنیا آوردن. فقط بین میانگین کوکوس‌های گرم منفی و مردمزایی ارتباط آماری معنی‌داری یافت شد ($P=0.04$). ۱۰ مورد (۱٪) از نمونه‌های مورد بررسی دارای زایمان نامطلوب و ۲۳۳ مورد (۹۵٪) زایمان مطلوب داشتند. نتایج نشان داد بین میانگین اسپریوکت‌ها با زایمان نامطلوب ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت ($P<0.05$). **نتیجه‌گیری:** برخی گونه‌های باکتری موجود در بزاق ممکن است به عنوان ریسک‌فاکتوری در زایمان زودهنگام و وزن کم هنگام تولد نقش داشته باشند.

کلمات کلیدی: فلور باکتریال بزاق، سرانجام بارداری، وزن کم هنگام تولد، زایمان زودرس.

رخساره صادقی^{*}، مریم ربیعی^۲
حوریه صادری^۳، مرضیه جعفری^۴

- ۱- گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
- ۲- گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
- ۳- گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
- ۴- دندان‌پزشک، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: تهران، خیابان وصال، خیابان ایتالیا.
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۵۹۲۱۰
email: sadeghi@shahed.ac.ir

مقدمه

شده است.^۱ سرانجام نامطلوب حاملگی به صورت تولد زودرس Low Birth Weight (LBW) و وزن کم هنگام تولد Pre Term Delivery (PTD) نوزادان^۲ اعم از PTD و محدودیت رشد داخل رحمی^۳ جنبین (IUGR) Intra Uterine Growth Retardation^۴ تعریف می‌شود.^۵ منظور از تولد زودرس نوزاد، زایمان پیش از هفتاه ۳۷ بارداری است و وزن کم هنگام تولد به وزن کمتر از ۲۵۰۰ gr می‌گردد.^۶ شیوع وزن کم هنگام تولد از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ از ۷/۶٪ رسیده است و شیوع تولد زودرس نوزادان از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۸ از ۱۰/۲٪ به ۱۱/۶٪ رسیده است.^۷ مشکلات پزشکی متعدد کودکان دارای وزن کم هنگام تولد و کودکان نارس سبب تحمیل هزینه‌های سنگین مرتبط با نگهداری و درمان آنها بر خانواده‌ها و

تغییرات هورمونی که در دوران بارداری به وقوع می‌پیوندد منجر به تغییراتی در اغلب سیستم‌های بدن از جمله حفره دهان (Oral cavity) می‌شوند. از این تغییرات می‌توان به پاسخ افزایش یافته بافت لثه نسبت به پلاک میکروبی و التهاب و افزایش حجم لثه ناشی از آن اشاره کرد.^۸ علاوه بر اثری که بارداری بر حفره دهان دارد، به طور معکوس ارتباط مثبتی بین تغییرات فلور میکروبی دهان مانند آنچه در بیماری‌های پریودنتال ایجاد می‌شود و عوارض نامطلوب بارداری نظیر زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد (اعم از تولد زودرس یا محدودیت رشد داخل رحمی) و پره‌اکلامپسی نشان داده شده است.^۹ در عین حال ایجاد فلور مشابه دهان مادر در نوزاد گزارش

بارداری ارتباط داشته باشد.^۲ با توجه به احتمال وجود ارتباط مثبت بین فلور باکتریال بزاق و عوارض نامطلوب بارداری ضروری است عوامل خطری که در این رابطه نقش دارند شناسایی گردد. تحقیقاتی که در زمینه رابطه فلور باکتریال بزاق با سرانجام حاملگی باشد، در مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه تغییرات فلور باکتریال بزاق در دوران حاملگی با سرانجام نامطلوب حاملگی در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان حضرت زینب (س) در سال ۱۳۸۷-۸۸ انجام شد.

روش بررسی

مطالعه به صورت کوهورت بر روی ۳۰۰ زن باردار در گروه سنی ۱۸-۳۵ سال که جهت انجام مراقبت‌های دوران بارداری در سال ۱۳۸۸-۸۹ به بیمارستان حضرت زینب (س) تهران مراجعه می‌کردند انجام پذیرفت. حجم نمونه بر اساس محاسبات آماری و با توجه به حجم نمونه در مطالعات مشابه (مطالعه Dasanyake که بر روی ۲۹۷ نفر صورت گرفته بود) استخراج گردید و در نهایت تعداد نمونه ۳۰۰ نفر در نظر گرفته شد. در این پژوهش افرادی وارد مطالعه شدند که در هفته ۲۰-۳۰ حاملگی بودند. معیارهای خروج از مطالعه شامل مصرف آنتی‌بیوتیک در سه ماه گذشته، استعمال دخانیات و الکل، ابتلا به بیماری سیستمیک مثل دیابت، سابقه پره اکلامپسی، سابقه سقط، سابقه چندقولی و سابقه خانوادگی زایمان زودرس بود. شرایط مطالعه برای بیماران واجد شرایط شرح داده می‌شد و پس از کسب رضایت آن‌ها به صورت کتبی بیماران در تحقیق شرکت داده می‌شدند. همچنین به آن‌ها اطمینان داده می‌شد که نتایج به صورت کلی و بدون ذکر اسامی گزارش خواهد گردید. متغیرهای مستقل شامل سن، میزان تحصیلات، وزن اولیه، وزن هنگام نمونه‌گیری، قد، سن حاملگی، فشارخون، تاریخ آخرین قاعدگی (LMP) و تاریخچه پزشکی با قند خون ناشتا (FBS) و تاریخچه پزشکی با پرسش از مادران و مشاهده پرونده آنان ثبت شد. برای نمونه‌گیری از بزاق و ارزیابی باکتری‌های دهانی بیمار، نمونه بزاق هر فرد مورد مطالعه حداقل یک ساعت بعد از صبحانه به صورت غیر تحریکی تهیه و ۱۰۰ میلی‌لتری میکرولیتری جمع آوری می‌شد. نمونه به صورت دایره‌ای به قطر ۱ cm روی لام قرار داده می‌شد و با استفاده از متابول ثابت می‌گردید. سپس نمونه‌ها جهت رنگ‌آمیزی

سیستم بهداشتی کشور می‌شود. اهمیت این موضوع در کشورهای در حال توسعه از آن‌جا حالت جدی‌تری به خود می‌گیرد که ۹۸٪ از این موارد در این کشورها به موقع می‌پیوندد و در این رابطه بیشترین سهم را کشورهای آفریقایی و پس از آن آسیا دارا می‌باشد.^۵ در حال حاضر در مورد اتیولوژی سرانجام نامطلوب حاملگی فاکتورهای متعددی ذکر شده است که برخی از آن‌ها قابل اجتناب هستند مثل مصرف الکل، سیگار یا مواد مخدر، سن بالا یا کم مادر، وضعیت اجتماعی-اقتصادی ضعیف، مراقبت ناکافی پیش از تولد، نمایه توده بدنی کم در مادر (Body Mass Index (BMI)، بالا بودن فشار خون، عفونت گستردگی، دیابت، عفونت مجاری رئیتال، استرس، حاملگی‌های متعدد و غیره.^۶ تلاش‌های وسیعی انجام شده است که اثرات این ریسک‌فاکتورها را با مراقبت‌های پیش‌گیرانه از بین ببرند با این حال میزان تولد زودرس نوزادان و نوزاد نارس کاهش نیافر است چرا که در ۵۰ درصد موارد ریسک‌فاکتورهای ذکر شده وجود ندارند.^۶ یکی از عواملی که در سال‌های اخیر به عنوان عامل خطر ذکر شده است پاتوژن‌های پریودنتال و وجود بیماری‌های پریودنتال است به طوری که حتی حضور عوامل پاتوژن پریودنتال در مایع آمنیوتیک گزارش شده است.^۷ اولین بار در سال ۱۹۹۶ Offenbacher در مطالعه‌ای اعلام کرد که بیماری پریودنتال یک ریسک‌فاکتور برای LBW و PTD است. در تحقیقات بعدی برخی نتایج مشابه Offenbacher و برخی دیگر عدم ارتباط بین بیماری پریودنتال و سرانجام نامطلوب حاملگی را نشان دادند که در نهایت نتایج به صورت ضد و نقیض گزارش شده است.^۸ Scannapieco یک مرور سیستماتیک بر روی بیماری پریودنتال به عنوان یک ریسک‌فاکتور برای نتایج زیان‌آور بارداری انجام داد.^۹ تعداد زیادی از مطالعات نشان داده‌اند که باکتری‌های مجرای زایمان با زایمان زودرس و وزن کم زمان تولد در ارتباط بوده و یک علت مشخص در مرگ و میر نوزادان محسوب می‌شود. این محققان نتیجه گرفتند مداخله و درمان پریودنتال ممکن است باعث کاهش نتایج زیان‌آور زایمان شوند.^۹ Dasanayake در مطالعه‌ای که بر روی ۲۹۷ زن باردار انجام داد نشان داد که میزان اکتینومایسین نئوزلندي موجود در بزاق در طول حاملگی به طور مثبت در ارتباط با وزن کم هنگام تولد و زایمان زود هنگام است و در نهایت نتیجه گیری شد که علاوه بر پاتوژن‌های پریودنتال، دیگر انواع باکتری‌های دهان (اکتینومایسین، انواع لاکتوسیل‌ها، انواع استرپتوكوک‌ها) می‌توانند با مشکلات حین

سنی آنها ۱۸-۳۵ سال به دست آمد. روش زایمان در ۶۰ مورد (۲۴/۱٪) طبیعی و در ۱۸۹ مورد (۷۵/۹٪) به صورت سزارین بود و در مجموع ۱۲ نفر (۴/۸٪) از بیماران پره اکلامپسی داشتند. نتایج نشان داد وزن نوزادان در کمترین مقدار ۱۱۲۵ گرم و در بیشترین مقدار ۴۶۰۰ گرم با میانگین ۳۱۹۸/۸۸ گرم و انحراف معیار ۴۶۳/۷۷۳ بود. جنس نوزادان به دنیا آمده در ۱۱۹ مورد (۴۸/۴٪) دختر و در ۱۲۷ مورد (۵۱/۶٪) پسر بود. آنالیز آماری نشان داد پنج مورد (۲٪) از نمونه‌های مورد بررسی مرده‌زایی داشتند و ۲۳۸ نفر (۹۸٪) نوزادانی زنده به دنیا آورده‌اند. در بررسی ارتباط بین میانگین باکتری‌های کوکسی گرم مثبت، باسیل گرم مثبت و منفی، اسپیروکت، اکتینومیست، فوزی فرم، اسپریل و مخمر با مرده‌زایی ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت. در حالی که بین میانگین کوکسی‌های گرم منفی و مرده‌زایی ارتباط آماری معنی‌داری یافت شد ($P=0/04$) (جدول ۱). ۱۰ مورد (۴/۱٪) از نمونه‌های مورد بررسی دارای زایمان نامطلوب و ۲۳۳ مورد (۹۵٪) زایمان مطلوب داشتند.

نتایج نشان داد بین میانگین باکتری‌های کوکسی گرم مثبت و منفی، باسیل گرم مثبت و منفی، اکتینومیست، فوزی فرم، مخمر و اسپریل با زایمان نامطلوب ارتباط آماری، معنی‌دار نبود، در حالی که بین میانگین اسپیروکت‌ها با زایمان نامطلوب ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت ($P<0/05$) (جدول ۲).

جدول ۲: مقایسه میانگین تعداد میکرووارگانیسم‌های بزاق خانم‌های باردار در دو

گروه زایمان مطلوب و نامطلوب				
P*	گروه بیماران		ن= ۱۰	ن= ۲۲۳
	زایمان نامطلوب	زایمان مطلوب		
۰/۰۵۹	۸۰/۹۰	۱۲۲/۷۶	با سیل گرم مثبت	
۰/۲۶۶	۹۷/۹۰	۱۲۳/۷۶	با سیل گرم منفی	
۰/۰۹۹	۱۵۷/۸۵	۱۲۰/۴۶	کوکسی گرم مثبت	
۰/۰۸۵	۱۵۸/۵۰	۱۲۰/۴۳	کوکسی گرم منفی	
۰/۱۱۸	۱۳۱/۱۵	۱۲۱/۶۱	اسپریل	
۰	۱۵۱/۸۰	۱۲۰/۷۲	اسپیروکت	
۰/۰۵۶	۱۲۷/۳۵	۱۲۱/۷۷	مخمر	
۰/۰۵۲	۱۱۸	۱۲۲/۱۷	فوزی فرم	
۰/۱۸۵	۱۳۹/۹۵	۱۲۲/۲۳	اکتینومیست	

* آزمون U-Mann Whitney ($P<0/05$) از نظر آماری معنی‌دار تعریف شده است)

و مشخص شدن نوع باکتری‌های موجود در فلور میکروبی دهان به آزمایشگاه میکروب‌شناسی دانشکده پرشنگی شاهد ارسال می‌گردید. در آزمایشگاه لامها با روش گرم رنگ‌آمیزی می‌شدند و تعداد میکرووارگانیسم‌های موجود در روی هر لام در هر یک از گروه‌های زیر شمارش و ثبت می‌گردید: کوکسی‌های گرم مثبت، کوکسی‌های گرم منفی، باسیل‌های گرم منفی، باسیل‌های گرم مثبت، اسپریل‌ها، اسپیروکت‌ها، مخمرها، باکتری‌های فوزی فرم و اکتینومیست‌ها. برای آنالیز آماری ارتباط بین میکرووارگانیسم‌های مورد بررسی و زایمان نامطلوب، با توجه به عدم تعیت داده‌ها از توزیع نرمال، میزان کلی در دو گروه زایمان زنده و مرده‌زایی، همچنین دو گروه زایمان مطلوب و نامطلوب با استفاده از آزمون U-Mann Whitney به تفکیک نوع میکرووارگانیسم مقایسه شد. عملیات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویراست ۱۱/۵ با در نظر گرفتن $\alpha=0/05$ انجام گردید.

یافته‌ها

از مجموع ۳۰۰ زن بارداری که به صورت آینده‌نگر وارد مطالعه شدند، ۵۰ نفر به دلیل زایمان در بیمارستان دیگر و عدم دسترسی و هفت نفر به دلیل مخدوش شدن اطلاعات میکروبیولوژی از مطالعه حذف شدند. در مجموع داده‌های کاملی برای ۲۴۳ زن به دست آمد. میانگین سن نمونه‌های مورد بررسی برابر $۲۶/۹۷\pm ۴/۲۳$ سال و دامنه

جدول ۱: مقایسه میانگین تعداد میکرووارگانیسم‌های بزاق خانم‌های باردار در دو

گروه مرده‌زایی و زنده‌زایی

گروه بیماران			
P*	مرده‌زایی n= ۵	زنده‌زایی n= ۲۳۸	میکرووارگانیسم
۰/۰۵۷	۱۹/۸۰	۸۶/۴۷	با سیل گرم مثبت
۰/۴۶۳	۴۵/۲۰	۶۲/۷۳	با سیل گرم منفی
۰/۱۳۵	۸۱/۴۰	۴۷/۰۹	کوکسی گرم مثبت
۰/۰۰۴	۷۵/۸۰	۲۶/۳۶	کوکسی گرم منفی
۰/۷۲۰	۰	۰/۲۵	اسپریل
۰/۶۰۷	۰	۰/۳۶	اسپیروکت
۰/۱۶۱	۴	۰/۳۷	مخمر
۰/۶۷۷	۰	۰/۰۲	فوزی فرم
۰/۱۲۰	۰/۴۰	۰/۱۵	اکتینومیست

* آزمون U-Mann Whitney ($P<0/05$) از نظر آماری معنی‌دار تعریف شده است)

بحث

میانگین باکتری‌های بزاق در همه موارد به جز اسپیروکت‌ها با سرانجام نامطلوب حاملگی ارتباط معنی‌داری ندارد. Villagram استرپتوکوک‌های موتانس را در ۱۷۴ خانم باردار در سه دوره سه ماهه اول، دوم و سوم با میانگین سنی 27 ± 5 شمارش کرد. در نمونه‌های بزاق گرفته شده، کلنی‌ها با متدهای کمی و نیمه‌کمی بررسی شدند. در شمارش استرپتوکوک‌های موتانس در سه گروه خانم‌های حامله تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد اما نسبت به گروه کترل، تعداد استرپتوکوک‌های موتانس در خانم‌های حامله بالاتر بود.^{۱۴} در مطالعه‌ای مشابه Dasanayake به بررسی ارتباط بین گونه‌های خاصی از باکتری‌های موجود در بزاق با سرانجام بارداری پرداخت. او در مطالعه خود بهارزیابی گونه‌های باکتریال پوسیدگی‌زا شامل استرپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوکوس سوربینوس، استرپتوکوکوس سانگوینس، لاکتوباسیل اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس کازی و اکتینومایسین نژولنلندی پرداخت. نتایج این مطالعه ارتباط مثبتی بین افزایش میزان اکتینومایسین نژولنلندی و کاهش وزن نوزاد هنگام تولد و نیز زمان بارداری نشان داد. بر عکس افزایش لاکتوباسیل کازی با افزایش وزن هنگام تولد و مدت زمان بارداری همراه بود.^{۱۵} مطالعه ما چندین تفاوت با مطالعه فوق دارد، اول این‌که در مطالعه فوق گونه‌های خاصی از باکتری‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند ولی در مطالعه ما گروه‌های کلی باکتری‌ها شامل کوکوس، باسیل، اسپیریل، اسپیروکت و غیره مورد بررسی قرار گرفت. دوم این‌که در مطالعه Dasanayake روش کشت چهت ارزیابی باکتریال مورد استفاده قرار گرفته در حالی‌که در مطالعه ما از اسپیر جهت شمارش باکتری استفاده شده است. علت انتخاب روش اسپیر در مطالعه ما این بود که در روش کشت باید شرایط مناسب برای رشد هر باکتری لحاظ شود و چون میکروارگانیسم‌های موجود در بزاق بسیار متنوع است، بنابراین در صورتی که بخواهیم روش کشت آن‌ها را مطالعه کنیم باید شرایط و محیط‌های کشت برای هر میکروارگانیسم را فراهم نماییم، که این کار بسیار دشوار و در برخی از موارد غیر قابل انجام است. بسیاری از اسپیروکت‌ها تاکنون کشت داده نشده‌اند، همچنین بسیاری از باکتری‌های موجود در دهان فقط در شرایط بی‌هوایی قادر به رشد هستند، که با روش‌های متداول و در آزمایشگاه‌های معمول قادر به کشت آن‌ها نیستیم. به علاوه در روش کشت تعداد باکتری‌ها زیاد می‌شود و در صورتی که بخواهیم تعداد اولیه باکتری‌ها را داشته باشیم

در مطالعه حاضر از نمونه‌های بزاق غیر تحریکی برای بررسی ارتباط بین فلور باکتریال بزاق و سرانجام نامطلوب بارداری (زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد) استفاده شد. در اکثر مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین باکتری‌های دهانی و سرانجام بارداری پرداخته‌اند، جهت نمونه‌گیری از پلاک زیر لثه استفاده شده است. در این مطالعه به دو دلیل بزاق جهت ارزیابی باکتری‌های دهانی به کار برده شده است. اول این‌که طبق مطالعه Dasanayake، این احتمال وجود دارد که علاوه بر پاتوژن‌های پریودنتال، پاره‌ای ارگانیسم‌های پوسیدگی‌زا هم در سرانجام حاملگی تاثیرگذار باشند.^{۱۶} دوم این‌که نقش تشخیصی بزاق در پیشرفت پوسیدگی‌ها، ترکیب پلاک دندانی و ارزیابی خطر بیماری پریودنتال در برخی تحقیقات تأیید شده است. مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد از بزاق می‌توان برای تعیین حضور باکتری‌های پریودنتال و نیز باکتری‌های پوسیدگی‌زا استفاده کرد. ارتباط میان استرپتوکوک موتانس و لاکتوباسیل در پلاک دندانی و بزاق نشان داده شده است.^{۱۷} Umeda از بزاق کلی برای تعیین حضور باکتری‌های مربوط به عفونت‌های پریودنتال استفاده کرد. در این مطالعه وجود شش باکتری عامل بیماری لثه در بزاق و پلاک ساب ژنتیوال در ۲۰۲ نفر بررسی شد. نتایج نشان داد که نمونه‌های بزاق برای تعیین باکتری‌های پوفیروموناس ژنتیوالیس، پره و تلا ایترمیدیا، پره و تلا نیگرسنس و تریونما دنتیکولا در حفره دهان مفید است و برای تعیین آکتینو باسیلوس آکتینو میستوم کومیتانس و باکتروبید فورسیتوس بهتر است که از هر دو نمونه بزاق و پاکت پریودنتال استفاده شود.^{۱۸} ارتباط تعداد باکتری‌های بزاق و پلاک زیر لثه‌ای را بررسی کرد. نتایج ارتباط نسبتاً خوبی را میان شمارش هر دو نمونه، برای باسیل‌های گرم منفی، باسیل‌های گرم منفی پیگماتنه بی‌هوایی، باسیل‌های غیر پیگماتنه گرم منفی بی‌هوایی، اسپیروکت‌ها، کوکوس‌های گرم منفی، باسیل‌های گرم منفی اختیاری، باسیل‌های گرم منفی هوایی نشان داد. بنابراین می‌توان گفت که جهت آگاهی از باکتری‌های موجود در پلاک زیر لثه‌ای نمونه‌های بزاق تا حد زیادی می‌توانند کمک‌کننده باشند.^{۱۹} در مطالعه ما نشان داده شد که میانگین باکتری‌های موجود در بزاق در همه موارد به جز کوکسی‌های گرم منفی ارتباط معنی‌داری با مردهزایی ندارد. همچنین

به نحوی صورت گیرد که تعداد دقیق باکتری‌های بزاق تعیین شود. ذکر این نکته نیز لازم است که روش مشاهده میکروارگانیسم‌ها در روی لام روشی سریع بوده و همچنین از نظر اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه است. در بین باکتری‌های مورد بررسی فقط بین میانگین کوکسی گرم منفی با مرده‌زایی ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت ($p=0.04$). همچنین بین میانگین اسپیروکت‌ها با سرانجام نامطلوب بارداری ارتباط قابل ملاحظه آماری مشاهده شد ($p<0.05$). با محدودیت‌های موجود در مطالعه نتیجه می‌گیریم برخی از گونه‌های باکتری‌های دهانی مثل کوکسی‌های گرم منفی و اسپیروکت‌ها ممکن است به عنوان ریسک‌فاکتور در زایمان زودهنگام و وزن کم هنگام تولد نقش داشته باشد.

سپاسگزاری: لازم به ذکر است که تحلیل آماری این مطالعه توسط جناب آقای دکتر خرازی فرد انجام شده است که بدین وسیله از زحمات ایشان سپاسگزاری می‌شود.

باید تمهیدات خاصی به کار رود، در حالی که با روش اسمیر می‌توان انواع مختلف میکروارگانیسم‌ها را به راحتی مورد شمارش قرار داد و همچنین تعداد نسبی آن‌ها را به هم تعیین نمود. این مسئله مزیت روش اسمیر نسبت به روش کشت را نشان می‌دهد. هر چند باید در نظر داشت در روش کشت امکان شناسایی میکروارگانیسم جدا شده در حد گونه فراهم می‌گردد و در حالی که روش اسمیر این قابلیت را ندارد و فقط گروه آن را مشخص می‌نماید. ما در این بررسی نشان دادیم حضور کدام گروه از میکروارگانیسم‌ها رابطه معنی‌داری با زایمان نامطلوب دارد اما در صورتی که بخواهیم نوع دقیق میکروارگانیسم را مشخص کنیم بهتر است محیط‌های مناسب و شرایط رشد مطلوب آن گروه از میکروارگانیسم‌ها را فراهم نموده و از روش کشت استفاده شود. در این صورت هم نتایج اولیه به دست آمده تایید خواهد شد و هم اطلاعات دقیق‌تری در مورد نوع میکروارگانیسم‌های درگیر به دست خواهد آمد. البته باید شرایط کشت

References

- Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA, editors. Carranza's Clinical Periodontology. 10th ed. Philadelphia: WB Saunders Co; 2006. p.639-41, 380-1.
- Dasanayake AP, Li Y, Wiener H, Ruby JD, Lee MJ. Salivary Actinomyces naeslundii genospecies 2 and Lactobacillus casei levels predict pregnancy outcomes. *J Periodontol* 2005;76(2):171-7.
- Urbán E, Radnai M, Novák T, Gorzó I, Pál A, Nagy E. Distribution of anaerobic bacteria among pregnant periodontitis patients who experience preterm delivery. *Anaerobe* 2006;12(1):52-7.
- Liu Y, Liu Z, Feng X, Zhu M, Pan Y. A study on transmission of pathogenic bacteria of rampant caries from mothers to children. *Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi* 2001;19(2):89-92.
- World Health Organization. Neonatal and Perinatal Mortality: Country, Regional and Global Estimates [Online]. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2006. [cited 1 Mar 2011]; Available from: URL:http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241563206_eng.pdf
- Agueda A, Ramón JM, Manau C, Guerrero A, Echeverría JJ. Periodontal disease as a risk factor for adverse pregnancy outcomes: a prospective cohort study. *J Clin Periodontol* 2008;35(1):16-22.
- Boggess KA. Pathogenicity of periodontal pathogens during pregnancy. *Am J Obstet Gynecol* 2005;193(2):313-21.
- Offenbacher S, Katz V, Fertik G, Collins J, Boyd D, Maynor G, et al. Periodontal infection as a possible risk factor for preterm low birth weight. *J Periodontol* 1996;67(10 Suppl):1103-13.
- Scannapieco FA, Bush RB, Paju S. Periodontal disease as a risk factor for adverse pregnancy outcomes. A systematic review. *Ann Periodontol* 2003;8(1):70-8.
- Mundorff SA, Eisenberg AD, Leverett DH, Espeland MA, Proskin HM. Correlations between numbers of microflora in plaque and saliva. *Caries Res* 1990;24(5):312-7.
- Zoitopoulos L, Brailsford SR, Gelbier S, Ludford RW, Marchant SH, Beighton D. Dental caries and caries-associated micro-organisms in the saliva and plaque of 3- and 4-year-old Afro-Caribbean and Caucasian children in south London. *Arch Oral Biol* 1996;41(11):1011-8.
- Umeda M, Contreras A, Chen C, Bakker I, Slots J. The utility of whole saliva to detect the oral presence of periodontopathic bacteria. *J Periodontol* 1998;69(7):828-33.
- Testa M, Ruiz de Valladares R, Benito de Cárdenas IL. Correlation between bacterial counts in saliva and subgingival plaque. *Acta Odontol Latinoam* 1999;12(2):63-74.
- Villagrán E, Linossier A, Donoso E. Count of salivary Streptococci mutans in pregnant women of the metropolitan region of Chile: cross-sectional study. *Rev Med Chil* 1999;127(2):165-70.

The relationship between salivary bacterial flora and adverse pregnancy outcomes

Rokhsareh Sadeghi DDS.^{1*}
Maryam Rabiee MD.²
Horieh Saderi PhD.³
Marziyeh Jafari DDS.⁴

1- Department of Periodontology,
Dental School, Shahed University,
Tehran, Iran.

2- Department of Obstetrics &
Gynecology, Zeynab Hospital,
Shahed University, Tehran, Iran.

3- Department of Microbiology,
Medical School, Shahed University,
Tehran, Iran.

4- General Dentist, Tehran, Iran.

Abstract

Received: December 14, 2010 Accepted: January 30, 2011

Background: Many studies have shown that periodontal pathogens are emerging as a risk factor for preterm delivery and low birth weight, but there are few studies about the relationship between other oral bacteria and pregnancy outcomes. The aim of the present study was to determine the relationship between salivary bacteria and pregnancy outcomes.

Methods: This cohort study was performed on 300 pregnant women who were recruited from the prenatal clinic of Zeynab Hospital in Tehran during 2009-2010. The patients' demographic and pregnancy data were recorded. Using samplers, saliva samples were collected about one hour after breakfast. Microbial evaluation was performed by counting the bacteria based on their shape and the Gram reaction. The studied bacteria were composed of gram-positive and negative cocci, gram-positive and negative bacilli, spirilla, spirochetes, yeasts, fusiform bacteria and actinomycetes.

Results: The data on the bacteriological profile and pregnancy outcome of 243 out of the 300 eligible participants of the study were completed. Five cases (2%) had intrauterine fetal death (IUFD) while 238 (98%) delivered live infants. There was a significant statistical relationship between the mean of gram-negative cocci and IUFD ($P=0.04$). 10 cases (4.1%) of 243, experienced adverse delivery outcomes and 233 cases (95%) had normal delivery. The adverse pregnancy outcomes had a significant relationship with the presence of spirochetes in saliva ($P<0.05$) but this relationship was not true for the other bacteria.

Conclusion: Some oral bacteria may pose a risk for premature deliveries and low birth weights.

Keywords: Bacterial flora, low birth weight, pregnancy outcomes, premature delivery.

* Corresponding author: Shahed
University, Dental School, Italia St.,
Vessal Ave., Tehran, Iran.
Tel: +98-21-88959210
email: sadeghi@shahed.ac.ir