

بررسی عوارض و نتایج حاصل از شیمی درمانی با سیس پلاتین و جمسيتايين همزمان با راديوتراپي در کانسر پيشرفته سرويکس

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۰۴/۰۱

چکیده

زمینه و هدف: در طی ۸۰ سال گذشته، راديوتراپي یک درمان استاندارد برای موارد پيشرفته کانسر سرويکس به شمار می‌رفته است. بر اساس تعداد زیادی از مطالعات فاز سه در دهه گذشته، راديوتراپي همزمان با داروی سیس پلاتین هفتگی به عنوان درمان استاندارد موارد پيشرفته درآمده است. علی‌رغم درمان‌های جدید در کانسر سرويکس هنوز این کانسر با موارد عود لوکال و متاستاز بالایی همراه است و مطالعات متعددی درباره اضافه کردن جمسيتايين به درمان کمورادیاسیون استاندارد انجام شده است. داروی جمسيتايين یک داروی آنتی‌متابولیت جدید است، این دارو به عنوان دارویی حساس‌کننده به اشعه قوی همراه با راديوتراپي در مطالعات مختلف در کانسر سرويکس استفاده شده است. روش بررسی: ۳۰ بیمار مبتلا به کانسر پيشرفته سرويکس (Stage IB2-IVA) در حد فاصل شهریور ۸۸ لغايت شهریور ۸۹ که به درمانگاه راديوتراپي - انکولوژی بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده بودند وارد مطالعه شدند. جمسيتايين با دوز هفتگی $60\text{mg}/\text{m}^2$ و به دنبال آن داروی سیس پلاتین هفتگی $35\text{mg}/\text{m}^2$ به صورت داخل وریدی همزمان با راديوتراپي لگن تجویز شد. یکماه و سه‌ماه پس از اتمام درمان، بیماران از نظر عوارض و از نظر پاسخ به درمان بررسی شدند. یافته‌ها: در ۳۰ بیمار مورد مطالعه میانگین سنی $58/13 \pm 11/83$ سال (حداقل ۲۹ سال و حداکثر ۷۸ سال) و در معاينه سه ماه بعد میزان پاسخ کامل $73/3\%$ و پاسخ نسبی $26/7\%$ بود. در بررسی انمی گرید سه در 10% ، لکوپنی گرید سه در 10% و ترومبوسیتوپنی گرید سه در $2/3\%$ بیماران حین درمان مشاهده شد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج گرفته شده در این تحقیق بهخصوص در مرحله B2 مطالعات تکمیلی فاز دو و سه درباره کمورادیاسیون با جمسيتايين توصیه می‌شود.

كلمات کلیدی: کانسر سرويکس، جمسيتايين، راديوتراپي.

* فرناز آموزگار هاشمي
احسان حامد اکبری
بینا کلاچی
ابراهیم عصمتی

گروه راديوتراپي، دانشگاه علوم پزشکي تهران،
تهران، ايران.

* نويسنده مسئول: تهران، بلوار كشاورز، بیمارستان
امام خمینی، بخش راديوتراپي تلفن: ۰۲۱-۶۱۱۹۲۵۱۸
E-mail: amoozfar@sina.tums.ac.ir

مقدمه

ایران، مطالعه Mousavi نشان داد که کانسر سرويکس دومین کانسر شایع ژنیکولوژیک پس از کانسر پستان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان پستان از کانسر تخدمنان است.^۱ بعضی مطالعات جدید نشان‌دهنده حضور HPV DNA در بیشتر از ۹۰ درصد موارد کانسر سرويکس بوده است. استفاده از واکسن ضد ویروس HPV در بعضی کشورهای پيشرفته شروع شده و به موفقیت‌هایی هم دست یافته است.^۲ کانسر سرويکس گسترش موضوعی ابتدا به بافت‌های پاراسرويکال، ارگان‌های لگنی بعد به غدد لنفاوی موضوعی و آن‌گاه به نواحی دوردست، که شایع‌ترین محل آن ریه است، دارد.^۳ درمان

کانسر سرويکس (Cervical cancer) هفتمین کانسر زنان و شایع‌ترین کانسر ژنیکولوژیک در جهان است و طبق گزارش انجمن سرطان آمریکا (American cancer society) ۱۵ درصد مرگ‌های ناشی از کانسر ژنیکولوژیک مربوط به کانسر سرويکس است. در کشورهای در حال توسعه کانسر سرويکس در بیش از نیمی از موارد به شکل پيشرفته بارز می‌شود.^۱ این میزان در کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا بیشتر و در کشورهای اسلامی کمتر است.^۲ در

به صورت داخل وریدی و در عرض ۳۰ دقیقه تجویز شد. بلافاصله سیس پلاتین هفتھه $35\text{mg}/\text{m}^2$ (Sobhan Oncology, Iran) به صورت داخل وریدی در عرض ۶۰ دقیقه تجویز شد. این داروها یک تا دو ساعت قبل از شروع درمان رادیوتراپی به صورت هفتگی تا پنج هفتھه تجویز می‌شوند. درمان رادیوتراپی به کل لگن با دوز $50\text{-}55\text{Gy}$ در پنج هفتھه و سپس برآکتی تراپی MDR یا HDR یک تا دو هفتھه پس از ختم درمان رادیوتراپی تا رسیدن دوز نقطه A به حداقل $85\text{-}90$ گری داده شد. درمان لگن با چهار فیلد (AP, PA و دو فیلد لترال) و با دستگاه کالت ۶۰ انجام شد. محوطه درمان شامل رحم، پاراسرویکس، پارامتر، اوتروساکرال بود. حد فوقانی فیلدھای PA, AP از فضای بین L5-4 و حد تحتانی سوراخ اوپتراتور یا حد تحتانی گسترش تومور با مارژین مناسب و حدود لترال $1/5\text{cm}$ مارژین به دیواره لترال لگن بود. برای فیلدھای لترال در قدام، دیواره قدامی سمفیزیس پوپیس و حد خلفی آن فضای S2-S3 می‌باشد. کلیه بیماران قبل از درمان توسط سرویس انکولوژی زنان و رادیوتراپی انکولوژی مورد معاینه و طبق سیستم FIGO staging شده و در صورت داشتن معیارهای ورود (یعنی stage IVA تا IIIB) بررسی می‌شوند. کلیه بیماران باید CXR و سی تی اسکن شکم و لگن و در صورت لزوم پروکتوسکوپی و سیستوسکوپی انجام دهند. تست‌های خونی شامل Cr, LFT, CBC اخذ می‌شوند. این اقدامات تشخیصی برای کلیه بیماران مبتنی بر کانسر سرویکس انجام شده و تا این مرحله هیچ هزینه اضافی و یا اقدام تشخیص اضافی به بیماران تحمیل نمی‌شود. تست‌های خونی شامل Cr, LFT, CBC به طور هفتگی حین درمان تکرار شده و بیماران طبق کلیسیفیکاسیون RTOG از نظر عوارض غیرخونی بررسی می‌شوند. یک‌ماه بعد و سه‌ماه پس از اتمام درمان رادیوتراپی بیماران از نظر عوارض درمان طبق پروتکل RTOG و از نظر پاسخ به درمان با معاینه دقیق کلینیکی و MRI لگن بررسی شوند.

یافته‌ها

مشخصات بیماران: در ۳۰ بیمار مورد مطالعه میانگین سنی $58/13\pm11/83$ سال (حداقل ۲۹ سال و حداکثر ۷۸ سال) واجد معاینه بالینی به نفع Stage IIIB $13/3\%$ ، Stage IIIA $16/7\%$ و Stage IVA $6/7\%$ و Stage IIIB $6/7\%$ dLN⁺. گزارش شده

موارد پیشرفتی که شامل Stage IB2-IVA است با رادیوتراپی است.^۶ در طی ۸۰ سال گذشته، رادیوتراپی یک درمان استاندارد برای موارد پیشرفتی به شمار می‌رفته است.^۷ بر اساس تعداد زیادی از مطالعات فاز سه در دهه گذشته، رادیوتراپی همزمان با داروی سیس پلاتین هفتگی به عنوان درمان استاندارد موارد پیشرفتی درآمده است.^۸ داروی جمسیتایین یک داروی آنتی‌متاپولیت جدید است، این دارو ابتدا به صورت محدود و تک‌دارویی در موارد عود یا متاستاتیک کانسر سرویکس استفاده شد. مطالعات انجام شده در مورد رادیوتراپی با شیمی‌درمانی همزمان با داروی سیس پلاتین و جمسیتایین به شکل فاز I و II انجام شده است. در این مطالعات جمسیتایین با دوزهای مختلف بین $30\text{mg}/\text{m}^2$ تا $150\text{mg}/\text{m}^2$ هفتگی استفاده شده است.^۹ دوز قابل تحمل دارو به طور متوسط $100\text{mg}/\text{m}^2$ هفتگی جمسیتایین بوده است.^{۱۰,۱۱} در مطالعه Pattaranutaporin که به شکل یک مطالعه فاز I و روی ۱۹ بیمار مبتلا به کانسر پیشرفتی سرویکس انجام شد، یک دوز فیکس $300\text{mg}/\text{m}^2$ هفتگی داروی جمسیتایین همزمان با رادیوتراپی با توکسیستی متوسط و پاسخ کامل 89% همراه بوده است.^{۱۲} در مطالعه Umanzor به شکل یک مطالعه فاز II، ۲۳ بیمار پیشرفتی سرویکس با داروی سیس پلاتین ($40\text{mg}/\text{m}^2$) و جمسیتایین ($125\text{mg}/\text{m}^2$) هفتگی همزمان با رادیوتراپی درمان شدن و در بررسی یک‌ساله 80 درصد بیماران شواهد دال بر عود نداشته‌اند.^{۱۳} با توجه به شیوع کانسر سرویکس در مراجعت به درمانگاه رادیوتراپی - انکولوژی انسیتیو کانسر در بیمارستان امام (ره) که تا حدود 10 درصد از کل مراجعت را تشکیل می‌دهند، درصد برآمدیم که با طراحی یک مطالعه فاز II به بررسی کارایی و عوارض ناشی از اضافه کردن داروی جمسیتایین با دوز $60\text{mg}/\text{m}^2$ هفتگی به درمان استاندارد کانسر سرویکس پیشرفتی بپردازیم.

روش بررسی

این مطالعه، یک مطالعه فاز ۲ است. تعداد ۳۰ بیمار مبتلا به سرطان سرویکس پیشرفتی Stage IIb-IVA از نوع سلول سنگفرشی از شهریور ۸۸ تا شهریور ۸۹ که برای درمان به بخش رادیوتراپی بیمارستان امام خمینی تهران مراجعه کردند با رضایت شخصی وارد مطالعه شدند. جمسیتایین (Actavis, Ireland) با دوز هفتگی $60\text{mg}/\text{m}^2$

جدول-۱: میزان پاسخ به درمان در پی گیری یک و سه ماه بعد از خاتمه درمان

بررسی سوم	بررسی دوم	بررسی اول	جدول-۳: عوارض خونی حین درمان
آنمی			
%۳۶/۶	%۳۶/۶	%۴۰	۱ گرید
%۳۳/۳	%۳۳/۳	%۲۳/۳	۲ گرید
.	%۱۰	.	۳ گرید
لکوپنی			
%۱۳/۳	%۳۳/۳	%۳/۳	۱ گرید
%۴۰	%۱۰	%۶/۶	۲ گرید
%۱۰	%۱۰	.	۳ گرید
تروموبوستیوپنی			
%۳۳/۳	%۳/۳	%۳/۳	۱ گرید
%۶/۶	.	.	۲ گرید
%۳/۳	.	.	۳ گرید

جدول-۲: نتایج درمان بر حسب Stage در معاینه سه ماه بعد

مرحله بیماری	پاسخ کامل	پاسخ نسبی	جدول-۲: نتایج درمان بر حسب Stage در معاینه سه ماه بعد
2b	۱۶ (%۹۴/۱)	۱ (%۵/۹)	۱
3a	۲ (%۵۰)	۲ (%۵۰)	۲
3b	۳ (%۶۰)	۲ (%۴۰)	۳
4a	۱ (%۵۰)	۱ (%۵۰)	۴a LN+
	.	۲ (%۱۰۰)	

جدول-۴: عوارض غیر خونی حین درمان و سه ماه بعد

سه ماه پس از درمان	حین درمان	عوارض	جدول-۴: عوارض غیر خونی حین درمان و سه ماه بعد
تهوع و استفراغ			
.	%۳۶/۷	۱ گرید	.
.	%۱۳/۳	۲ گرید	.
.	%۳۰	۳ گرید	.
.	%۳۳/۳	۱ گرید	.
.	%۱۰	۲ گرید	.
.	%۴۶/۷	۳ گرید	.
.	%۱۰	۱ گرید	.
%۶/۷	%۳۶/۷	۲ گرید	.
.	%۱۰	۳ گرید	.

افزایش گرید یک لکوپنی در بررسی دوم و افزایش گرید یک ترومبوستیوپنی در بررسی سوم در مقایسه با سایر بررسی‌ها گردید. در ۱۴ بیمار (۷/۴۶) حین درمان سابقه تزریق خون (حداقل دو واحد و حداقل سه واحد (یک بیمار)) و ۱۲ بیمار (۰/۴۰) حین درمان سابقه تزریق آمپول G-CSF (حداقل یک واحد و حداقل دو واحد) داشته‌اند. میزان بستره بیماران به دلیل عوارض خونی یا

بودند. ۶۶/۷٪ بیماران با توتال دوز Gy ۵۴Gy، ۱۳/۳٪ با دوز ۵۲Gy و ۲۰٪ با دوز Gy با دستگاه کبات ۶۰ تحت درمان اکسترنال رادیوتراپی قرار گرفتند.

نتایج درمان: میزان پاسخ کلینیکی به درمان در معاینه اولیه و معاینه سه ماه بعد در جدول ۱ و بر حسب پاسخ به درمان بر حسب STAGE در معاینه سه ماه بعد از ختم درمان در جدول ۲ به شرح زیر گزارش می‌شود. همان‌گونه که در جدول ۲ مشاهده می‌شود افزایش Stage از 2b به 3b و 4a به طور معنی‌داری با کاهش پاسخ به درمان همراه بود (P<۰/۰۵). پس از مراجعه ماه سوم از بیماران جهت بررسی MRI درخواست شد که در این بررسی ۵۳/۲٪ بیماران (۱۶ نفر) قادر بهیچ‌گونه دال بر عود یا باقی‌مانده یا متاستاز داخل و خارج لگن بوده‌اند. ۱۶/۷٪ (پنج نفر) شواهد دال بر باقی‌مانده تا حداقل ۲/۵ سانتی‌متر در ناحیه سرویکس داشته‌اند که جهت جراحی سالویج ارجاع شدند. در این میان هفت نفر (۲/۲۳٪) شواهد دال بر متاستاز کبدی (دو نفر)، LAP پارا آثرورتیک (سه نفر) و جدار لگن (دو نفر) داشته‌اند. لازم به توضیح است که از این هفت نفر، پنج نفر فاقد شواهد در گیری ناحیه سرویکس به شکل باقی‌مانده بوده‌اند. جدول ۳ نشان‌دهنده عوارض خونی در سه بررسی هفتگی حین درمان است. همان‌طور که جدول ۳ نشان می‌دهد انجام درمان به طور معنی‌داری با

هسته‌ای در تومور می‌شود و اثرات کموترابی هم‌زمان را افزایش می‌دهد.^{۱۶} در مطالعه Zebra به‌شکل یک مطالعه فاز II، با دوز هفتگی سیس پلاتین $40\text{ mg}/\text{m}^2$ جمسيتايين $125\text{ mg}/\text{m}^3$ هم‌زمان با راديوتراپي در سال ۲۰۰۲ انجام شد. ۳۵ مبتلا به کانسر سرویکس Stage IIIB-IV تحت راديوتراپي گرفتند. در این مطالعه DFS سه ساله ۷۷٪ و سورویوال پنج ساله ۶۷٪ بوده است. پاسخ به‌درمان در مدت ۱۴ ماه به‌صورت ۸۹٪ پاسخ کامل، ۸٪ پاسخ نسبی و ۳٪ عدم پاسخ بوده است.^{۱۷} در مطالعه Alvarez از جمسيتايين $30\text{ mg}/\text{m}^3$ هفته‌ای دو بار و سیس پلاتین $30\text{ mg}/\text{m}^3$ هفتگی با راديوتراپي استفاده شد میزان پاسخ کامل 86% پاسخ نسبی 2% و عدم پاسخ 2% و میزان عوارض گرید سه و چهار خونی به‌شکل 4% ترموبوسیتوپنی، 4% نوتروپنی و 6% آنمی بوده است. با توجه به این‌که در مطالعه ما میزان عوارض خونی به‌شکل $3/3\%$ ترموبوسیتوپنی گرید سه، $9/9\%$ لکوپنی گرید سه و 10% آنمی گرید سه بدون عوارض گرید چهار بوده است. عوارض خونی تقریباً مشابه این مطالعه بوده است. میزان پاسخ به‌درمان در این مطالعه در ماه سوم پس از درمان به‌میزان $73/3\%$ پاسخ کامل و $26/7\%$ پاسخ نسبی بوده است.^{۱۸} در مطالعه مشابهی که توسط Aghili شده است میزان پاسخ به‌درمان در کانسر پیشرفت سرویکس که تحت کمورادیاسیون با سیس پلاتین قرار گرفتند 80% پاسخ کامل و $13/3\%$ پاسخ نسبی بوده است. در این مطالعه میزان عوارض به‌صورت 19% سیستیت 15% پروکتیت و 18% واژینیت بوده است. تفاوتی که بین مطالعه ما و Aghili وجود دارد این است که در مطالعه Aghili بیماران در Stage IIB و در مطالعه ما $56/6\%$ Stage IIB و بقیه پیشرفت‌تر بوده‌اند که این می‌تواند توجیه‌کننده میزان کم‌تر پاسخ کامل به‌درمان در مطالعه ما باشد.^{۱۹} در مطالعه مشابه Amouzegar Hashemi میزان پاسخ به‌درمان در کانسر سرویکس که تحت کمورادیاسیون با سیس پلاتین قرار گرفتند 81% پاسخ کامل در مدت ۱۸ ماه و 19% عود لوکال و متاستاز بوده است. تفاوتی که بین مطالعه ما و مطالعه Amouzegar Hashemi وجود دارد این است که در مطالعه Amouzegar Hashemi تواند $56/6\%$ بیماران در Stage IIB و پایین‌تر ولی در مطالعه ما $56/6\%$ Stage IIB و بقیه ادوانس‌تر بوده‌اند که این می‌تواند توجیه‌کننده میزان کم‌تر پاسخ کامل به‌درمان در مطالعه ما باشد.^{۲۰} به عبارت دیگر دو دلیل مهم را برای پایین‌تر بودن پاسخ به‌درمان در مطالعه ما با مطالعات مشابه مثل مطالعات Zebra Alvarez

عدم تحمل خوراکی پنج بیمار (۱۶٪) بوده است و قطع درمان در هشت نفر (۲۶٪) از دو روز تا هفت روز به‌دلیل عوارض خونی، پوستی یا عدم تحمل خوراکی رخ داده است. جدول ۴ نشان‌دهنده میزان عوارض گوارشی، ادراری و پوستی حین درمان و در بررسی سه‌ماه پس از درمان می‌باشد.

بحث

طی ۲۰ سال گذشته توجه زیادی به کموترابی هم‌زمان در کانسر سرویکس شده است. از آنجا که کانسر سرویکس در کشورهای در حال توسعه اغلب با مراحل پیشرفته ظاهر می‌شود و راديوتراپی به‌نهایی با میزان عود بالایی همراه است. مطالعات زیادی درباره مشخص کردن یک رژیم استاندارد شیمی‌درمانی هم‌زمان برای افزایش اثرات راديوتراپی انجام شده است. عمله محققان بر این اعتقادند که شیمی‌درمانی هم‌زمان با راديوتراپی در کانسر سرویکس با افزایش اثرات درمانی همراه است. پنج مطالعه راندو میزه فاز III نشان دادند که اضافه کردن سیس پلاتین به راديوتراپی باعث کاهش میزان مرگ و میر ناشی از کانسر به‌میزان 30% تا 50% می‌شود، یک متأنالیز که 4580 بیمار را در ۱۹ مطالعه راندو میزه بررسی کرده بود اثبات کرد که کمورادیوتراپی بر راديوتراپی ارجح است.^۹ در یک مطالعه بزرگ استفاده از راديوتراپی در کانسر سرویکس از 62% در سال 1983 به 42% در 1990 رسیده است.^{۱۰} اگرچه میزان توکسیتی درمان به‌طور واضحی افزایش می‌یابد. در یک مطالعه توسط Henry در مقایسه بین راديوتراپی و کمورادیاسیون با سیس پلاتین $40\text{ mg}/\text{m}^2$ هفتگی باعث افزایش گرید و عوارض کردن سیس پلاتین 14% می‌شود.^{۱۱} جمسيتايين به عنوان یک داروی آنتی‌متاپولیت باعث افزایش حساسیت سلول‌های تومورال به اشعه می‌شود. مکانیسم‌های متعددی در این‌باره مطرح شده است، براساس مطالعات مختلف کلینیکی دیده شده است که جمسيتايين باعث مهار ترسیم آسیب DNA ناشی از رادیاسیون، افزایش زمان حضور سلول در فاز G2-S می‌شود. به علاوه جمسيتايين اثر سینزیتیک با نمک‌های پلاتینی در مطالعات In vitro داشته است. دیده شده است که استفاده از جمسيتايين قبل از سیس پلاتین باعث تشدید پیش مهار ترمیم

جدار لگنی، لغافنوباتی پاراآئورتیک یا متابستاز کبد داشته‌اند. با توجه به این که علی‌رغم درمان‌های جدید در کانسر سرویکس هنوز این کانسر با موارد عود لوکال و متابستاز بالایی همراه است و مطالعات متعددی درباره اضافه کردن جمسيتایین به درمان کمورادیاسیون استاندارد انجام شده است. مطالعات تکیلی فاز دو و سه درباره کمورادیاسیون با جمسيتایین با حجم بیمار بیشتر و دستگاه شتاب‌دهنده در کانسر سرویکس در انتیتو کانسر توصیه می‌شود.

Umanzor و غیره برشمرد اول پیش‌فته‌تر بودن بیماران و دوم زمان بین ختم درمان اکسترنال رادیوتراپی تا شروع برآکی تراپی بوده است. طبق بررسی‌های ما، مطالعه جزء محدود مطالعاتی است که از MRI لگن در بررسی پاسخ تومور پس از ختم درمان کمورادیاسیون استفاده کرده است. در مطالعه ما از ۲۸ بیمار تحت بررسی با MRI، ۱۶٪ (۵/۳) نفر MRI شکم و لگن کاملاً نرم‌النرم (پنج نفر) شواهد دال بر باقی‌مانده در سرویکس و ۰٪ (۰/۲) (هفت نفر) شواهد دال بر توده

References

- Petersson F. Carcinoma of the cervix. Annual Report on the Result of Treatment in Gynecological Cancer. Sweden, Stockholm: International Federation of Gynecology and Obstetrics, 1988.
- Magné N, Mancy NC, Chajon E, Duvillard P, Pautier P, Castaigne D, et al. Patterns of care and outcome in elderly cervical cancer patients: a special focus on brachytherapy. *Radiother Oncol* 2009;91(2):197-201.
- Mousavi A, Karimi Zarchi M, Gilani MM, Behtash N, Ghaemmaghami F, Shams M, et al. Radical hysterectomy in the elderly. *World J Surg Oncol* 2008;6:38.
- Karimi Zarchi M, Akhavan A, Gholami H, Dehghani A, Naghshi M, Mohseni F. Evaluation of cervical cancer risk-factors in women referred to Yazd-Iran hospitals from 2002 to 2009. *Asian Pac J Cancer Prev* 2010;11(2):537-8.
- Vizcaino AP, Moreno V, Bosch FX, Muñoz N, Barros-Dios XM, Borras J, et al. International trends in incidence of cervical cancer: II. Squamous-cell carcinoma. *Int J Cancer* 2000;86(3):429-35.
- National Cancer Institute (NCI). clinical Announcement: Concurrent Chemoradiation for Cervical Cancer. Washington, DC: US Department of Public Health, 1999.
- Peters WA 3rd, Liu PY, Barrett RJ 2nd, Stock RJ, Monk BJ, Berek JS, et al. Concurrent chemotherapy and pelvic radiation therapy compared with pelvic radiation therapy alone as adjuvant therapy after radical surgery in high-risk early-stage cancer of the cervix. *J Clin Oncol* 2000;18(8):1606-13.
- Dueñas-Gonzalez A, Cetina L, Mariscal I, de la Garza J. Modern management of locally advanced cervical carcinoma. *Cancer Treat Rev* 2003;29(5):389-99.
- Green J, Kirwan J, Tierney J, Symonds P, Fresco L, Williams C, et al. Concomitant chemotherapy and radiation therapy for cancer of the uterine cervix. *Cochrane Database Syst Rev* 2001;(4):CD002225.
- Burnett AF, Roman LD, Garcia AA, Muderspach LI, Brader KR, Morrow CP. A phase II study of gemcitabine and cisplatin in patients with advanced, persistent, or recurrent squamous cell carcinoma of the cervix. *Gynecol Oncol* 2000;76(1):63-6.
- Lorvidhaya V, Kamnerdsupaphon P, Chitapanarux I, Sukthomya V, Tonusin A. Cisplatin and gemcitabine in patients with metastatic cervical cancer. *Gan To Kagaku Ryoho* 2004;31(7):1057-62.
- Pattaranutaporn P, Thirapakawong C, Chansilpa Y, Therasakvichya S, Ieumwananontachai N, Thephamongkh K. Phase II study of concurrent gemcitabine and radiotherapy in locally advanced stage IIIB cervical carcinoma. *Gynecol Oncol* 2001;81(3):404-7.
- Umanzor J, Aguiluz M, Pineda C, Andrade S, Erazo M, Flores C, Santillana S. Concurrent cisplatin/gemcitabine chemotherapy along with radiotherapy in locally advanced cervical carcinoma: a phase II trial. *Gynecol Oncol* 2006;100(1):70-5.
- Zarbá JJ, Jaremchuk AV, Gonzalez Jazey P, Keropian M, Castagnino R, Mina C, et al. A phase I-II study of weekly cisplatin and gemcitabine with concurrent radiotherapy in locally advanced cervical carcinoma. *Ann Oncol* 2003;14(8):1285-90.
- Klopp AH, Eifel PJ. Chemoradiotherapy for cervical cancer in 2010. *Curr Oncol Rep* 2011;13(1):77-85.
- Rose PG, Degeest K, McMeekin S, Fusco N. A phase I study of gemcitabine followed by cisplatin concurrent with whole pelvic radiation therapy in locally advanced cervical cancer: a Gynecologic Oncology Group study. *Gynecol Oncol* 2007;107(2):274-9.
- Puget Sound Oncology Consortium, Swisher EM, Swensen RE, Greer B, Tamimi H, Goff BA, et al. Weekly gemcitabine and cisplatin in combination with pelvic radiation in the primary therapy of cervical cancer: a phase I trial of the Puget Sound Oncology Consortium. *Gynecol Oncol* 2006;101(3):429-35.
- Alvarez AM, Mickiewicz E, Rodger J, Bonomi M, Brosio CA, Menendez P, et al. Radiotherapy (RT) with low dose biweekly gemcitabine (LDBG) and cisplatin in locally advanced cervical carcinoma (LACC): (stages IIA-IVA). *Proc Am Soc Clin Oncol* 2002;21:822-34.
- Aghili M, Andalib B, Amouzegar Hashemi F, Farhan F, Kazemian A, Kalaghchi B, et al. Concurrent Chemo-brachytherapy with Cisplatin and intracavitary brachytherapy in locally advanced uterine cervical cancer. *Basic Clin Cancer Res* 2010;2(1):45-52.
- Amouzegar Hashemi F, Zahedi F, Farhan F, Kalaghchi B, Mehrdad N, Haddad P. Medium dose rate brachytherapy for patients with cervical carcinoma; early result of a prospective study. *Tehran Uni Med J (TUMJ)* 2009;66(12):888-93.

Concurrent chemoradiation with weekly Gemcitabine and Cisplatin in locally advanced cervical cancer

Received: May 04, 2011 Accepted: June 22, 2011

Farnaz Amouzegar Hashemi
M.D.*

Ehsan Hamed Akbari M.D.

Bita Kalaghchi M.D.

Ebrahim Esmati M.D.

Department of Radiation Oncology,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Abstract

Background: More than 80 years, the standard treatment of locally advanced cervical cancer was radiotherapy. However, based on several phase III randomized clinical trials in the past decade, concurrent cisplatin-based chemoradiotherapy is the current standard of treatment for this disease. Gemcitabine has potent radiosensitizing properties in preclinical and clinical trials, so it can be utilized simultaneously with radiation.

Methods: Thirty Women with untreated invasive squamous-cell carcinoma of the cervix of stage IIB to stage IVA were enrolled in the study in Radiation Oncology department of Imam Khomeini Hospital in Tehran from September 2009 to September 2010. Sixty mg/m² gemcitabine followed by 35 mg/m² cisplatin were concurrently administered with radiotherapy to the whole pelvic region on day one of each treatment week for five weeks One and three months after treatment, patients underwent a complete physical examination and MRI to determine the response to treatment.

Results: The mean age of the participants was 58.13±11.83 (29-78) years. After 3 months of treatment, 73.3% had complete and 26.7% had partial response to treatment. Grade 3 anemia was seen in 10%, grade 3 thrombocytopenia in 3.3% and grade 3 leukopenia in 10% of the patients.

Conclusion: According to the positive results of this study in stage IIB, further phase II and III clinical trials are suggested to evaluate the role of chemoradiation by gemcitabine in advanced cervical cancers.

Keywords: Cervical cancer, gemcitabine, radiotherapy.

* Corresponding author: Dept. of Radiation Oncology, Imam Khomeini Hospital, Keshavarz Blvd., Tehran, Iran.
Tel: +98-21-61192518
E-mail: amoozfar@sina.tums.ac.ir